201
0 D
24

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CAROLI À LINNÉ

SYSTEMA NATURÆ.

TOM. II. PARS II.

Digitized by Google

CLASSIS XIII.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

† *calicibus ſuperis.*

DISPERMA. *Sem.* 2. calice coronata.

†† *inferis.*
* *ſubquinqueſidis.*

1236.	PERILLA.	*Stili* 2. *Stamina* diſtantia.
722.	LEONURUS.	*Antheræ* punctis oſſeis adſperſæ.
714.	GLECOMA.	*Antherarum* paria cruciata.
709.	HYSSOPUS.	*Filamenta* diſtantia, recta. *Corolla* ringens.
713.	MENTHA.	*Filamenta* diſtantia, recta. *Corolla* ſubæqualis.
712.	SIDERITIS.	*Stigma* alterum vaginans alterum.
711.	LAVANDULA.	*Corolla* reſupinata.
706.	TEUCRIUM.	*Corollæ* labium ſuperius o. 2partitum.
705.	AJUGA.	*Corollæ* labium ſuperius ſtaminibus brevius.
723.	PHLOMIS.	*Corollæ* labium ſuperius hirtum.
718.	BETONICA.	*Corollæ* labium ſuperius planum, aſcendens, tubo cylindrico. *Stamina* longitudine faucis.
716.	LAMIUM.	*Corollæ* labium inferius utrinque dente ſetaceo.
717.	GALEOPSIS.	*Corollæ* labium inferius ſupra bidentatum.
	POLLICHIA.	*Corollæ* labium ſuperius integrum, inferius ſine dentibus ad faucem.
719.	STACHYS.	*Corollæ* labium inferius lateribus deflexum. *Stamina* deflorata ad latera deflexa.
710.	NEPETA.	*Corollæ* labium inferius crenatum. *Faux* margine reflexo.
707.	SATUREIA.	*Corolla* laciniis ſubæqualibus. *Stamina* remota.
720.	BALLOTA.	*Cal.* 10ſtriatus. *Corollæ* labium ſuperius fornicatum.
721.	MARRUBIUM.	*Cal.* 10ſtriatus. *Corollæ* labium ſuperius rectum.
724.	MOLUCCELLA.	*Cal.* campanulatus, corolla amplior, dentibus ſpinoſis.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA IN ROMA

HYPTIS.	*Cal.* turbinatus. *Cor.* labium inferius ſemibifidum.

* *Verbenæ multæ.*

** *calicibus bilabiatis.*

734. SCUTELLARIA.	*Calix* fructiferus operculatus.
727. THYMUS.	*Calix* fauce villis clauſus.
732. OCYMUM.	*Corolla* reſupinata. *Filamenta* bina baſi proceſſu.
GLANDULARIA.	*Germen* 4partitum. *Stil.* 2fidus, glandula inter utramque laciniam media.
735. PRUNELLA.	*Filamenta* omnia apice bifurca.
736. CLEONIA.	*Stigmata* 4.
733. TRICHOSTEMA.	*Filamenta* longiſſima.
729. DRACOCEPHALUM.	*Corollæ* faux inflato-dilatata.
726. ORIGANUM.	*Strobilus* calices colligens.
725. CLINOPODIUM.	*Involucrum* calices colligens.
708. THYMBRA.	*Calix* utrinque linea ciliata carinatus. *Stilus* ſemibifidus. *Corollæ* labia plana.
731. MELITTIS.	*Cal.* tubo corollæ amplior. *Corollæ* labium ſuperius planum integrum. *Antheræ* cruciatæ.
728. MELISSA.	*Cal.* angulatus, ſcarioſus, labio ſuperiore aſcendente.
730. HORMINUM.	*Cor.* laciniæ 4 ſubæquales, quinta majore emarginata.
737. PRASIUM.	*Semina* baccata.
738. PHRYMA.	*Semen* 1.

ANGIOSPERMIA.

* *corollis monopetalis.*

† *calicibus monophyllis.*

‡ *calicibus integris.*

408. CASTILLEIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* ringens. *Labium* inferius glandulis tubuloſis. *Cal.* tubuloſus longitudinaliter hians.
CONOBEA.	*Capſ.* 1locularis, 4valvis, polyſperma. *Cor.* ringens. *Stigma* 2lobum. *Cal.* 5dentatus.
TANÆCIUM.	*Bacca* corticoſa maxima. *Cor.* tubuloſa, ſubæqualis, 5fida. *Cal.* cylindricus, truncatus. *Rudimentum* filamenti 5ti.

260. BRUNSFELSIA. *Bacca* 1locularis, polyſperma, conceptaculo maximo. *Cor.* tubo longiſſimo. *Cal.* 5dentatus.

TALIGALEA. *Bacca* 1locularis, 2pyrena, oſſiculis 1ſpermis. *Cor.* infundibuliformis, tubo longo. *Cal.* 4-5dentatus.

GALIPEA. *Peric.* – – – *Cor.* 4-5fida, tubo brevi. *Cal.* 4-5angulatus, 4-5dentatus. *Germen* 4-5gonum.

AMBULIA. *Capſ.* 5gona, 1locularis polyſperma. *Cor.* tubuloſa, 4fida. *Cal.* 5dentatus.

†† *calicibus bifidis.*

778. OBOLARIA. *Capſ.* 1locularis. *Cor.* campanulata, 4fida. *Filamenta* ex diviſuris corollæ.

779. OROBANCHE. *Capſ.* 1locularis. *Cor.* ſubæqualis, 4fida. *Glandula* ſub baſi germinis.

770. HEBENSTREITIA. *Capſ.* 2ſperma. *Cor.* 1labiata, 4fida. *Stamina* margini laterali corollæ inſerta.

754. TORENIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata. *Filamenta* 2 2fida.

793. ACANTHUS. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* 1labiata, 3fida. *Antheræ* villoſæ.

DOMBEYA. *Capſ.* 4locularis. *Cor.* 1labiata, labio concamerato. *Cal.* 2labiatus.

1316. PREMNA. *Bacca* 4ſperma. *Cor.* 4fida, inæqualis.

162. CRECENTIA. *Bacca* 1locularis. *Sem.* 2locularia. *Cor.* tubo campanulato. *Germen* pedicellatum.

††† *calicibus trifidis.*

761. HALLERIA. *Bacca* 2locularis. *Cor.* 4fida, labio ſuperiore longiore.

†††† *calicibus quadrifidis.*

769. SELAGO. *Sem.* 1. involutum, corollæ inæquali.

781. LIPPIA. *Sem.* 1. 2loculare. *Cor.* hypocrateriformis. *Cal.* compreſſus.

743. LATHRÆA. *Capſ.* 1locularis. *Cor.* perſonata. *Glandula* ſub germine.

MATUREA. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, polyſperma. *Cor.* 2labiata. *Stigma* 2lamellatum.

739. BARTSIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata. *Cal.* coloratior.

741. EUPHRASIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata. *Antheræ* inferiores hinc ſpinoſæ.
740. RHINANTHUS.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata. *Cal.* compreſſus.
742. MELAMPYRUM.	*Capſ.* 2locularis. *Sem.* bina, gibboſa. *Cor.* perſonata.
749. SCHWALBEA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata. *Cal.* laciniæ ſuperiores ſenſim minores.
PATTERSONIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* infundibuliformis. *Sem.* 4.
785. BARLERIA.	*Capſ.* 2locularis, elaſtica. *Semina* bina. *Cor.* infundibuliformis.
PIRIPEA.	*Capſ.* 2locularis, 2valvis, polyſperma. *Cor.* hypocrateriformis.
767. LOESELIA.	*Capſ.* 3locularis. *Cor.* laciniis ſecundis. *Stamina* petalo adverſa.
763. GMELINA.	*Drupa* nucleo 2loculari. *Cor.* 2labiata. *Antheræ* binæ craſſiores 2partitæ.
NEPHRANDRA.	*Drupa* nuce 2loculari, *loculis* 1ſpermis. *Cor.* galea 3fida, media involuta, labium 2fidum.
765. LANTANA.	*Drupa* nucleo 2loculari. *Cor.* hypocrateriformis. *Stigma* uncinatum.

rrrrr *calicibus quinquefidis.*

1237. AVICENNIA.	*Capſ.* 1locularis, coriacea, 1ſperma. *Cor.* labio ſuperiore quadrato.
745. TOZZIA.	*Capſ.* 1locularis, 1ſperma. *Cor.* hypocrateriformis.
776. LIMOSELLA.	*Capſ.* 1locularis, polyſperma. *Cor.* campanulata, regularis.
773. BROWALLIA.	*Capſ.* 1locularis, polyſperma. *Cor.* hypocrateriformis.
1315. LINDERNIA.	*Capſ.* 1locularis. *Cor.* ringens. *Stamina* inferiora dente terminali.
1265. VANDELLIA.	*Capſ.* 1locularis. *Cor.* ringens. *Stamina* inferiora e diſco labii enata.
749. GESNERIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* ſupera.
GALVESIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* tuluoſa, baſi ſubventricoſa.
NEMIA.	*Capſ.* 2locularis, 2valvis. *Cor.* infundibuliformis, limbo ſubæquali 5partito.
756. SCROPHULARIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* reſupinata. *Labium* ſegmento intermedio interno.

777. STEMODIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* inæqualis. *Stam.* 2fida. *Antheræ* geminæ.
MONTIRA.	*Capſ.* 2locularis, 4 valvis, polyſperma. *Cor.* tubus ventricoſus, incurvus.
757. CELSIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* rotata. *Filamenta* lanata.
1405. HEMIMERIS.	*Capſ.* 2locularis, loculo altero magis gibboſo. *Cor.* rotata, lacinia una majore obcordata, *foſſula* laciniarum nectarifera.
775. SIBTHORPIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* rotata. *Stamina* 2 & 2 approximata.
768. CAPRARIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Stigma* cordatum 2valve.
758. DIGITALIS.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata ſubtus ventricoſa. *Stamina* declinata.
759. BIGNONIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Sem.* alata, imbricata.
TOURRETIA.	*Capſ.* 4locularis. *Sem.* alata, imbricata. *Cor.* 2labiata.
784. RUELLIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Stamina* per paria approximata.
772. BUCHNERIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* hypocrateriformis, limbi laciniis obcordatis æqualibus.
771. ERINUS.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* 2labiata, labio ſuperiori breviſſimo reflexo.
764. PETRÆA.	*Capſ.* 2locularis, ſeminibus ſolitariis. *Cor.* rotata calice colorato minor.
1264. MANULEA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* limbus 5partitus, lacinia infima profundiore reflexa.
750. ANTIRRHINUM.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata ſubtus nectario prominente.
792. COLUMNÈA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* ringens ſupra baſin gibba. *Antheræ* connexæ.
747. GERARDIA.	*Capſ.* 2locularis, 1ſperma, baſi dehiſcens. *Cor.* hypocrateriformis, inæqualis.
AFZELIA.	*Capſ.* 2locularis, polyſperma, receptaculis hemiſphæricis. *Cor.* campanulata.
746. PEDICULARIS.	*Capſ.* 2locularis, ſeminibus tunicatis. *Cor.* perſonata.
783. MIMULUS.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata. *Cal.* priſmaticus.
780. DODARTIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata, labio ſuperiore brevi, aſcendente.

748. CHELONE.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* perſonata, inflata, clauſa. *Rudimentum* filamenti quinti.
782. SESAMUM.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata inæqualis. *Rudimentum* filamenti quinti.
753. MARTYNIA.	*Capſ.* 5locularis. *Cor.* campanulata. *Rudimentum* filamenti quinti.
752. CRANIOLARIA.	*Capſ.* 5locularis. *Cor.* hypocrateriformis, tubo filiformi longiſſimo.
TAMONEA.	*Nux* carnoſa, 4locularis, *ſeminibus* ſolitariis. *Cor.* ringens, limbo 5fido. *Cal.* 5ariſtatus.
794. PEDALIUM.	*Nux* 2locularis.
1409. AMASONIA.	*Nux* ovata, 1locularis.
774. LINNÆA.	*Bacca* 3locularis, ſicca. *Cor.* campanulata. *Cal.* ſuperus.
791. BONTIA.	*Bacca* 1ſperma, ſemine plicato. *Cor.* labium inferius revolutum.
766. CORNUTIA.	*Bacca* 1ſperma. *Cor.* ringens. *Stilus* longiſſimus.
789 CLERODENDRON.	*Bacca* 1ſperma. *Cor.* ringens, tubo anguſto. *Stamina* longiſſima.
MYOPORUM.	*Bacca* 1-2ſperma, *ſeminibus* 2locularibus. *Cor.* campanulata, limbo 5partito.
758. VOLKAMERIA.	*Bacca* 2ſperma, *ſeminibus* 2locularibus. *Cor.* laciniis ſecundis.
760. CITHAREXYLON.	*Bacca* 2ſperma, *ſeminibus* 2locularibus. *Cor.* ſubæqualis.
787. OVIEDA.	*Bacca* 2ſperma. *Cor.* longiſſima, limbo 3fido. *Cal.* fructificus campanulatus.
1406. MILLINGTONIA.	*Siliqua.* *Cor.* longiſſima, limbo 4fido. *Calicis* margo reflexus. *Antheræ* 2-partitæ, vaginantes.
770. VITEX.	*Bacca* 4ſperma. *Cor.* ringens, labio ſuperiori 3fido.
786. DURANTA.	*Bacca* 4ſperma, ſeminibus 2locularibus. *Cor.* ſubringens, tubo curvo.
755. BESLERIA.	*Bacca* polyſperma 1locularis. *Cor.* inæqualis.

rrrrrr *calicibus multifidis.*

751. CYMBARIA.	*Capſ.* 2locularis. *Cor.* ringens. *Cal.* 10-dentatus.

1407. THUNBERGIA. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* campanulata. *Cal.* duplex; *exterior* 2phyllus, *interior* multipartitus.

†† *calicibus non monophyllis.*

1317. HYOBANCHE. *Capſ.* 2locularis. *Cor.* 1labiata. *Cal.* 5-phyllus.

** *corollis tetrapetalis.*

793. MELIANTHUS. *Capſ.* 4locularis, 4loba. *Corollæ* labium ſuperius 0.

GEVUINA. *Capſ.* 1locularis, coriacea. *Cal.* 0.

GYMNOSPERMIA.

DISPERMA. *Cor.* tubuloſa, limbo 4fido. *Cal.* 2-phyllus. *Sem.* 2calice coronata hinc marginata plana inde convexa.

repens. 1. DISPERMA. *Walt. flor. carol. p.* 160.

705. AJUGA. *Cor.* labium ſuperius minimum. *Stamina* labio ſuperiori longiora.

orientalis. 1. A. foliis ovatis, corollis obliquis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 100. *β*) *Dill. h. Elth. t.* 53. *f.* 61.

pyramidalis. 2. A. tetragono-pyramidalis villoſa, foliis oblongis dentatis, radicalibus maximis. *Flor. dant. t.* 185.

alpina. 3. A. caule ſimplici, foliis dentatis, caulinis radicalia æquantibus, bracteis integris. *Mant. p.* 80. *Pluckn. phyt. t.* 18. *f.* 3. *an mera pyramidalis varietas?*

genevenſis. 4. A. foliis tomentoſis lineatis dentatis, bracteis plurimis trilobis, calicibus hirſutis. *Riv. monop. t.* 140. *f.* 2. *an mera pyramidalis reptantiſve varietas?*

reptans. 5. A. glabra, ſtolonibus reptantibus, foliis ovatis crenatis. *Blackw. herb. t.* 64. *f.* 1.

decumbens. 6. A. decumbens villoſa, foliis obovatis dentatis. *Thunb. flor. jap. p.* 243.

706. TEUCRIUM. *Cor.* labium ſuperius erectum, ultra baſin profunde 2partitum, inter ejus diviſuram ſtamina.

campanulatum. 1. T. foliis multifidis, floribus lateralibus ſolitariis, caulibus repentibus. *Riv. monop. t.* 24. *β*) *Till. h. piſ. t.* 49. *f.* 1. *Flos centralis interdum pentandrus, corolla campanulata.*

parviflorum. 2. T. foliis multifidis linearibus, racemo decompoſito, pedicellis elongatis divaricatis. *Schreb. vertic. unilab. gen. & ſp. p.* 31. *n.* 18. *ic.*

orientale. 3. T. foliis multifidis linearibus, racemo compoſito, pedicellis brevibus. *Riv. monop. t.* 19.

Botrys. 4. T. foliis multifidis, floribus lateralibus ternis pedunculatis. *Hoffmann bot. Taſchenb. f. 1791. t. 9.*

mauritanum. 5. T. foliis multifidis linearibus, floralibus mucronatis, racemo ſimplici. *Shaw. it. 2. app. p. 121. n. 575. ic.*

lævigatum. 68. T. foliis inferioribus multifidis, ſummis tripartitis, pedunculis ſolitariis longitudine foliorum. *Vahl ſymb. bot. 1. p. 40.*

niſſolianum. 6. T. foliis quinquefidis trifidiſque linearibus muticis, pedunculis ſolitariis breviſſimis, caule decumbente.

chium. 7. T. foliis trifidis, floribus axillaribus ſolitariis folio longioribus, caule diffuſo. *Schreb. vert. unilab. gen. & ſp. p. 25. n. 5.*

Chamæpitys. 8. T. foliis trifidis, floribus axillaribus ſolitariis folio brevioribus, caule diffuſo. *Flor. dan. t. 733.*

Pſeudochamæpitys. 9. T. foliis trifidis integriſque linearibus mucronatis, pedunculis ſolitariis elongatis, caule diffuſo. *Sabb. h. rom. 3. t. 95.*

Iva. 10. T. foliis ſubtricuſpidatis linearibus, floribus ſeſſilibus axillaribus ſolitariis. *Lob. ic. 384.*

moſchatum. 11. T. foliis linearibus integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus. *Schreb. vert. unilab. gen. & ſp. p. 26. n. 7.*

Libanitis. 12. T. foliis linearibus integerrimis revolutis confertis cauleque tomentoſis, ſpicis ſubrotundis. *Barr. pl. rar. ic. 1090.*

Supinum. 13. T. foliis linearibus integerrimis margine revolutis, corymbo terminali. *Jacq. flor. auſtr. 5. t. 417. an meræ montani varietas ?*

pumilum. 14. T. foliis linearibus integerrimis planis quadrifariis confertis, capitulis ſeſſilibus terminalibus, caule procumbente tomentoſo. *Barr. pl. rar. ic. 1092. β) Barr. pl. rar. ic. 1093.*

anguſtiſſimum. 15. T. foliis linearibus integerrimis ſubnudis, capitulis terminalibus piloſis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic. 1080.*

cæleſte. 16. T. foliis linearibus integerrimis incanis, capitulis terminalibus tomentoſis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic. 1081.*

creticum. 17. T. foliis linearibus integerrimis acuminatis ſubtus niveis, racemo floribus ternatis ſolitariiſque, caulibus ſpinoſis. *Alpin. exot. t. 102.*

brevifolium. 18. T. foliis lanceolatis revolutis integerrimis obtuſis incanis, floribus ſolitariis, calicibus muticis. *Rivin. monop. t. 20.*

fruticans. 19. T. foliis lanceolatis integerrimis ſubtus niveis, floribus ſolitariis. *Jungh. plant. ic. cent. 1. t. 20.*

ſalicifolium. 20. T. foliis lanceolato-ellipticis obtuſiuſculis integerrimis, calicibus ſolitariis quadrifidis. *Mant. p. 80. Schreb. dec. pl. 1. t. 9.*

latifolium. 21. T. foliis integerrimis rhombeis acutis villoſis ſubtus tomentoſis. *Dill. h. Elth. t. 284. f. 368.*

trifoliatum. 69. T. foliis oblongis ternis tomentoſis revolutis anterius crenatis, capitulis ſubrotundis laxis. *Vahl ſymb. bot. 1. p. 40.*

Marum. 22. T. foliis integerrimis ovatis acutis petiolatis, floribus racemoſis ſecundis. *Mant. p. 409. Blackw. herb. t. 47. Regn. bot. t. 164.*

Laxmanni. 23. T. foliis ovato-oblongis integerrimis ſeſſilibus, floribus ſolitariis ſeſſilibus.

montanum. 24. T. foliis petiolatis ellipticis margine revolutis ſubtus tomentoſis, corymbis terminalibus glabris, caule procumbente. *Riv. monop. t. 25. f. inf. 6.*

multiflorum. 25. T. foliis ovatis, ſuperne glabris ſerrato-dentatis, floribus racemoſis, verticillis ſexfloris. *Bocc. muſc. t. 117.*

thymifolium. 26. T. foliis ovatis obtuſis petiolatis ſubtus tomentoſis, capitulis terminalibus paucifloris, caule procumbente. *Barr. pl. rar. ic. 1062.*

japonicum. 66. T. foliis ovatis acuminatis ſerratis petiolatis, racemis nudiuſculis verticillato-ſpicatis. *Pluken. amalth. t. 441. f. 2.*

ſibiricum. 27. T. foliis ovatis ſerratis, pedunculis ſolitariis trifloris, intermedio ſeſſili bracteis lineari-lanceolatis.

Arduini. 28. T. foliis ovatis ſerratis, racemo ſpicato tereti ſeſſili terminali. *Mant. p. 81. Arduin. ſpec. 1. t. 3.*

virginicum. 29. T. foliis ovatis inæqualiter ſerratis, racemis terminalibus. *Jungh. pl. ic. cent. 1. t. 30.*

maſſilienſe. 30. T. foliis ovatis rugoſis inciſo-crenatis incanis, caulibus rectis, racemis rectis ſecundis. *Jacq. h. Vind. 1. t. 94.*

lucidum. 31. T. foliis ovatis inciſo-ſerratis glabris, verticillis dimidiatis, caulibus erectis lævibus. *Medic. act. Palat. 3. phyſ. t. 12. f. 7-9.*

flavum. 32. T. foliis ovatis crenatis, floralibus integerrimis, verticillis dimidiatis in raceſſos digeſtis, caule fruticoſo pubeſcente. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 5.

nitidum. 33. T. foliis ovatis crenatis, floralibus integerrimis, verticillis dimidiatis racemoſis, caule bifariam barbato. *Schreb. vertic. unilab. gen. & ſp. p.* 35. *n.* 24.

regium. 34. T. foliis ovatis anterius dentatis, floralibus integerrimis ſeſſilibus, verticillis racemoſis, caule ramoſo. *Pluckn. alm. t.* 365. *f.* 2.

aureum. 35. T. foliis ovatis ſerratis caulibuſque denſe lanatis, ſummitatibus luteis nitidis, corymbis terminalibus piloſis. *Rivin. monop. t.* 25.

villoſum. 36. T. foliis elliptico-ovatis acuminatis ſerratis petiolatis villoſis, racemo ſpicato terminali, calicibus inflatis. *Forſt. fl. auſtr. p.* 43.

hetero- phyllum. 37. T. foliis ellipticis crenatis, floribus lateralibus ſolitariis, corollæ labio exterius lanato, ramis heterophyllis. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *p.* 84.

Chamæ- drys. 38. T. foliis cuneiformi-ovatis inciſis crenatis petiolatis, floribus ternis, caulibus procumbentibus ſubpiloſis. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 83. *β*) *Blackw. herb. t.* 80.

betonicæ- ſolium. 39. T. foliis rhombeo-ovatis obtuſe ſerratis incanis, racemis terminalibus, bracteis oppoſitis lanceolatis acutis integerrimis, caule fruticoſo. *Jacq. collect.* 1. *p.* 145. *t.* 17. *f.* 2.

quadra- tulum. 40. T. foliis ovato-rhombeis dentatis ſubtus niveis, verticillis racemoſis. *Schreb. vert. unilab. gen. & ſp. p.* 36. *n.* 27.

canaden- ſe. 41. T. foliis ovato-lanceolatis ſerratis, caule erecto, racemo tereti terminali, verticillis hexaphyllis.

cubenſe. 42. T. foliis obovatis inciſo-ſerratis glabris in petiolum attenuatis, floribus ſolitariis pedunculatis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 164.

pyrenai- cum. 43. T. foliis cuneiformi-orbiculatis crenatis piloſis, corymbis terminalibus.

rotundi- folium. 44. T. foliis ſubrotundis crenatis villoſis, corymbis terminalibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1095.

Salviaſ- trum. 45. T. foliis ovalibus crenulatis rugoſis ſubtus tomentoſis petiolatis, racemo ſecundo. *Schreb. vertic. unilab. gen. & ſp. p.* 38. *n.* 33.

buxifolium. 46. T. foliis ovalibus rugoſis villoſis apice crenatis, corymbis terminalibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1036.

abutiloides. 47. T. foliis cordatis dentatis acuminatis, racemis lateralibus nutantibus. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *p.* 84.

Scorodonia. 48. T. foliis cordatis ſerratis petiolatis, racemis lateralibus ſecundis, caule erecto. *Flor. dan. t.* 485. *β*) *Geſn. op.* 1. *t.* 85. b.

hircanicum. 49. T. foliis cordatis oblongis obtuſis, caule brachiato dichotomo, ſpicis longiſſimis terminalibus ſeſſilibus ſpiralibus. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 19.

ſcordioides. 50. T. foliis cordatis oblongis amplexicaulibus crenatis lanuginoſis, floribus axillaribus pedunculatis geminis. *Schreb. vertic. unilab. gen. & ſp. p.* 37. *n.* 30.

Scordium. 51. T. foliis oblongis ſeſſilibus dentatis nudiuſculis, floribus axillaribus pedunculatis geminis, caule diffuſo pubeſcente. *Flor. dan. t.* 593.

arenarium. 52. T. foliis oblongis obtuſis inciſo-crenatis ſeſſilibus, floribus axillaribus pedunculatis ſubternis. *S. G. Gmelin. it.* 1. *p.* 149. *t.* 26. *f.* 2.

inflatum. 53. T. foliis oblongis acuminatis inæqualiter ſerratis pubeſcentibus, ſpicis ſeſſilibus terminalibus, calicibus inflatis villoſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 88. *an forte idem cum villoſo ?*

Pſeudhyſſopus. 54. T. foliis oblongis anterius crenatis tomentoſis incanis, capitulis rotundatis laxis, caule lanato corymbifero. *Col. ecphr.* 1. *t.* 67.

betonicum. 55. T. foliis lanceolatis ſerratis utrinque acutis, racemis terminalibus, caule floriſero brachiato. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *p.* 82. *t.* 40.

capitatum. 56. T. foliis lanceolatis crenatis tomentoſis niveis, capitulis ſubrotundis breviter pedunculatis, caule erecto. *Barrel. ic.* 1047.

Polium. 57. T. foliis lanceolatis crenatis tomentoſis incanis, capitulis ſubrotundis breviter pedunculatis, caule decumbente. *Regn. bot. t.* 161. *β*) *Barr. pl. rar. ic.* 1078.

aſiaticum. 58. T. foliis lanceolatis repande-ſerratis baſi rectangulis, floribus ſolitariis. *Mant. p.* 80. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 41.

trifidum. 59. T. foliis lanceolatis trifidis, pedunculis axillaribus trifloris. *Retz. obſ. bot.* 1. *p.* 2.

Achæme- 60. T. foliis inverſe lanceolatis anterius crenatis tomentoſis nis. incanis, floralibus flore longioribus, corymbis denſis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 2. *f.* 12.

flaveſ- 61. T. foliis lineari-lanceolatis anterius crenatis capitulisque cens. ſubrotundis tomentoſis, ſummitatibus flavis. *Barr. pl. rar. ic.* 1073.

valenti- 62. T. foliis linearibus crenatis, capitulis ſubrotundis breviter num. pedunculatis, caule erecto incano. *Barr. pl. rar. ic.* 1048.

luſitani- 63. T. foliis linearibus obtuſis crenulatis incanis, capitulis cum. laxis, caule pubeſcente corymbifero. *Schreb. vertic. unilab. p.* 47. *n.* 50.

pycno- 64. T. foliis linearibus revolutis anterius crenatis confertis phyllum. cauleque denſe tomentoſis, capitulis ſubrotundis. *Barr. pl. rar. ic.* 1091. 1096.

gnapha- 65. T. foliis linearibus revolutis crenatis calicibusque lanatis, lodes. floribus ſolitariis confertis. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *p.* 84. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1083.

ſpinoſum. 67. T. ſpinoſum, pedunculis geminis, calicum labio ſuperiore ovato, corollis reſupinatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 389. Teucrium mucronatum. *Barr. pl. rar. ic.* 202.

707. SATUREIA. *Corollæ* laciniæ ſubæquales. *Staminà* diſtantia.

Thym- 1. S. floribus verticillatis hiſpidis, foliis oblongis acutis. bra. *Blackw. herb. t.* 318.

juliana. 2. S. verticillis faſtigiatis, foliis lineari-lanceolatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 17. *f.* 4.

capitata. 3. S. floribus ſpicatis, foliis carinatis punctatis ciliatis. *Barr. pl. rar. ic.* 897.

montana. 4. S. pedunculis lateralibus ſolitariis, floribus faſciculatis faſtigiatis, foliis mucronatis lineari-lanceolatis integerrimis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 64.

rupeſtris. 5. S. pedunculis lateralibus ſolitariis ſecundis, foliis ovato-lanceolatis ſerrulatis. *Wulf ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 130.

viminea. 6. S. pedunculis axillaribus trifloris, involucris linearibus, foliis lanceolato-ovatis integerrimis.

græca. 7. S. pedunculis ſubtrifloris lateralibus, involucellis calice brevioribus. *Pluckn. alm. t.* 84. *f.* 8.

hortenſis. 8. S. pedunculis bifloris. *Blackw. herb. t.* 419.

thymifolia. 10. S. pedunculis ramoſis corymboſis, foliis ovatis ſubdentatis. *Scop. fl. carn. ed.* 2. *t.* 29.

ſpinoſa. 9. S. ramis ſpinoſis, foliis hiſpidis.

708. THYMBRA. *Cal.* ſubcylindricus, 2labiatus, utrinque linea villoſa exaratus. *Stilus* ſemibifidus.

ſpicata. 1. Th. floribus ſpicatis. *Pluckn. alm. t.* 116. *f.* 5.

verticillata. 2. Th. floribus verticillatis. β) Thymbra caroliniana. *Walt. flor. carol. p.* 162.

709. HYSSOPUS. *Corollæ* labium inferius lacinula intermedia crenata. *Stamina* erecta, diſtantia.

officinalis. 1. H. ſpicis ſecundis, foliis lanceolatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 254.

Lophanthes. 2. H. corollis reſupinatis, ſtaminibus inferioribus corolla brevioribus, foliis cordatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 182.

nepetoides. 3. H. caule acuto quadrangulo. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 69.

HYPTIS. *Cal.* turbinatus. *Corollæ* limbus patentiſſimus, labium inferius ſemibifidum. *Antheræ* dependentes.

capitata. 1. Hyptis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 102. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 109. *f.* 2. *an forſan clinopodii generi adjungenda?*

710. NEPETA. *Corollæ* labium inferius lacinula intermedia crenata, faux margine reflexo. *Stamina* approximata.

ſidæfolia. 1. N. paniculis laxiſſimis, pedunculis verticillatis filiformibus, foliis cordatis. *Herit. ſert. angl. p.* 19.

pectinata. 2. N. paniculis compactis, floribus ſecundis, corollis minimis, foliis cordato-ovatis nudis, caule fruteſcente.

3. N.

lavandulacea. 3. N. ſpica compacta, foliis ovatis inciſo-ſerratis lineatis. *Suppl. p.* 272. *Pallas act. Petrop.* 1779. 2. t. 12.

ſcordotis. 4. N. ſpicis terminalibus ſeſſilibus: bracteis ſubcordatis villoſis, foliis cordatis obtuſis. *Alp. exot. t.* 283.

tuberoſa. 5. N. ſpicis terminalibus: bracteis oblongis acuminatis nervoſo-lineatis coloratis, foliis cordatis pubeſcentibus, corollæ lobis lateralibus reflexis. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 72. *β) Sabb. h. rom.* 3. *t.* 81.

lanata. 22. N. ſpicis terminalibus: bracteis ovatis nervoſo-rugoſis ſubſcarioſis, foliis oblongis cordatis villoſis, corollæ lobis lateralibus patentibus. *Jacq. obſ. bot.* 3. *p.* 21. *t.* 75.

multifida. 6. N. floribus ſpicatis, corollæ lobis lateralibus ſubpatulis, foliis pinnatifidis: laciniis ſubæqualibus linearibus. *Suppl. p.* 273. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 55.

americana. 23. N. ſpicis imbricatis acuminatis, foliis ovatis acutis ſerratis. *Pluckn. amer. t.* 162. *f.* 2.

tomentoſa. 24. N. tomentoſa, ſpicis verticillatis, foliis ellipticis acute ſerratis. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv.*

Cataria. 7. N. floribus ſpicatis: verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis. *Flor. dan. t.* 580.

malabarica. 8. N. ſpica verticillata: bracteis filiformibus, foliis lanceolatis inferne integerrimis. *Mant. p.* 566.

italica. 9. N. floribus ſeſſilibus verticillato-ſpicatis: bracteis lanceolatis longitudine calicis, foliis petiolatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 112.

hirſuta. 10. N. floribus ſeſſilibus verticillato-ſpicatis: verticillis tomento obvolutis. *Bocc. ſic. t.* 25. *f.* 2.

cærulea. 20. N. cymis pedunculatis multifloris hirtis, foliis oblongis cordatis villoſis ſubſeſſilibus, corollæ lobis lateralibus reflexis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 285.

violacea. 11. N. cymis pedunculatis multifloris, foliis ſubpetiolatis cordatis nudiuſculis, corollæ lobis lateralibus patentibus. *Barr. pl. rar. ic.* 601.

amboinica. 12. N. floribus ſubverticillatis: bracteis ovatis, foliis cordatis obtuſis crenatis. *Suppl. p.* 273. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 90.

nuda. 13. N. florum racemis verticillatis nudis, foliis cordato-oblongis ſeſſilibus ſerratis. *Mant. p.* 410. *Jacq. fl. auſtr.* 2. *t.* 129.

canefcens. 21. N. cymis pedunculatis multifloris, foliis petiolatis oblongis ſubcordatis crenatis tomentoſis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 285.

Nepetella. 14. N. cymis pedunculatis, foliis cordatis oblongo-lanceolatis tomentoſis profunde ſerratis.

ucranica. 15. N. floribus paniculatis, foliis lanceolatis ſerratis ſeſſilibus nudis.

pannonica. 16. N. cymis pedunculatis multifloris, foliis cordatis lanceolato-oblongis nudis petiolatis obſolete crenatis, corollæ lobis lateralibus reflexis. *Jacq. fl. auſtr.* 1. *t.* 24.

incana. 17. N. florum paniculis axillaribus, foliis petiolatis ovatis ſerratis tomentoſis. *Thunb. flor. jap. p.* 244.

anguſtifolia. 25. N. corymbis pedicellatis ſpicatis, foliis lanceolatis rugoſis tomentoſis obtuſe ſerratis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 41.

virginica. 18. N. capitulis terminalibus, ſtaminibus flore longioribus, foliis lanceolatis. *Pluckn. alm. t.* 85. *f.* 2.

indica. 19. N. corollarum labio ſuperiore integerrimo breviſſimo.

711. LAVANDULA. *Cal.* ventricoſus, ſubdentatus, ſtriatus, bractea ſuffultus. *Cor.* reſupinata. *Stamina* intra tubum. *Sem.* baſi late deroſa.

Spica. 1. L. foliis ſeſſilibus lanceolato-linearibus margine revolutis, ſpica interrupta nuda. α) *Blackw. herb. t.* 294. β) *Blackw. herb. t.* 295.

Stœchas. 2. L. foliis ſeſſilibus linearibus margine revolutis, ſpica coarctata comoſa. *Blackw. herb. t.* 241.

viridis. 3. L. foliis ſeſſilibus linearibus rugoſis villoſis margine revolutis, ſpica comoſa: bracteis indiviſis. *Herit. ſert. angl. p.* 19. *t.* 21.

dentata. 4. L. foliis ſeſſilibus linearibus pectinato-pinnatis, ſpica coarctata comoſa. *Kniph. bot. orig. cent.* 2. *n.* 38.

pinnata. 5. L. foliis petiolatis pinnatis: foliolis cuneiformibus, ſpica imbricata. *Jacq. pl. rar. ic.* 1. *t.* 9.

multifida. 6. L. foliis petiolatis pinnatis: foliolis decurſive pinnatifidis, ſpica quadrangulari: angulis ſpiralibus. *Burm. ind. t.* 38. *f.* 1. *Commel. rar. t.* 27. γ)

Pluckn. alm. t. 303. f. 5. Gaertn. de fr. & ſem. cent. 5. t. 66. f. 11.

carnoſa. 7. L. foliis petiolatis ovato-cordatis ſerratis carnoſis, ſpica tetragona : calicibus recurvatis. *Suppl. p. 273. Diſſ. de lavandula t. 2.*

712. SIDERITIS. *Stamina* intra tubum corollæ. *Stigma* brevius involvens alterum.

* *ebracteatæ.*

canarienſis. 1. S. fruticoſa villoſa, foliis cordato-oblongis, acutis petiolatis, ſpicis verticillatis ante floreſcentiam nutantibus, ramis divaricatis. *Jacq. h. Vind. 3. t. 30.*

candicans. 2. S. fruticoſa tomentoſa, foliis ovato-lanceolatis cordatis apice attenuatis ſubtus niveis, verticillis ſub-octofloris remotis. *Commel. hort. amſt. 2. p. 197. t. 99.*

cretica. 3. S. fruticoſa tomentoſa, foliis cordato-oblongis obtuſis petiolatis, ramis divaricatis, ſpicis verticillatis.

ſyriaca. 4. S. fruticoſa tomentoſo-lanata, foliis lanceolatis integerrimis, floribus verticillatis. *Sabb. h. rom. 3. t. 40.*

perfoliata. 5. S. herbacea hiſpido-piloſa, foliis ſuperioribus amplexicaulibus. *Kniph. bot. orig. cent. 8. n. 86.*

montana. 6. S. herbacea, calicibus corolla majoribus ſpinoſis : labio ſuperiori trifido. *Jacq. flor. auſtr. 5. t. 434.*

elegans. 7. S. herbacea villoſa, caule diffuſo, calicum laciniis ſubæqualibus ſpinuloſis. *Murray comm. Goett. 1778. p. 92. t. 4.*

romana. 8. S. herbacea decumbens, calicibus ſpinoſis : labio ſuperiori ovato. *Moriſ. hiſt. pl. 3. t. 12. f. 5.*

** *bracteatæ.*

incana. 9. S. ſuffruticoſa tomentoſa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis : floralibus bracteiſque dentatis. *Bocc. muſ. 2. t. 67. f. 2.*

hyſſopifolia. 10. S. foliis lanceolatis glabris integerrimis, bracteis cordatis dentato-ſpinoſis, calicibus æqualibus.

ſcordioides. 11. S. foliis lanceolatis ſubdentatis ſupra glabris, bracteis ovatis dentato-ſpinoſis, calicibus æqualibus. *Lob. ic. 528.*

hirſuta. 12. S. foliis lanceolatis obtuſis dentatis piloſis, bracteis dentato-ſpinoſis, caulibus hirtis decumbentibus. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 58.

ſpinoſa. 15. S. hirſuta, foliis lanceolatis bracteiſque cordatis dentato-ſpinoſis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 41.

ciliata. 13. S. herbacea, foliis ovatis ſerratis, bracteis ciliatis. *Thunb. flor. jap. p.* 245.

lanata. 14. S. erecta, foliis cordatis obtuſis villoſis, ſpica oblonga, calicibus muticis lanatis.

713. MENTHA. *Cor.* ſubæqualis, 4fida: lacinia latiore emarginata. *Stamina* erecta, diſtantia.

* *floribus paniculatis.*

plumoſa. 1. M. paniculis dichotomis terminalibus: calicibus plumoſis, foliis ovatis petiolatis ſerratis ſubtus albo-tomentoſis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 273. *Herit. ſert. angl. p.* 20. *t.* 22.

origanifolia. 2. M. paniculis dichotomis: calicibus plumoſis, foliis ovatis integerrimis ſubtus candidiſſimis. *Herit. ſert. angl. p.* 20.

** *floribus racemoſis.*

perilloides. 3. M. racemis ſecundis lateralibus. *Sp. pl. p.* 833. Ocymum fruteſcens. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 77.

*** *floribus ſpicatis.*

Auricularia. 4. M. ſpicis oblongis, foliis oblongis ſerratis piloſis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Mant. p.* 81. *Rumpf amb.* 6. *t.* 16.

milliaca. 5. M. ſpicis oblongis, foliis ovatis ſerratis villoſis ſeſſilibus. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 87.

ſylveſtris. 6. M. ſpicis oblongis, foliis oblongis ſerratis tomentoſis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Flor. dan. t.* 484.

viridis. 7. M. ſpicis oblongis, foliis lanceolatis nudis ſerratis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Regn. bot. t.* 166.

rotundifolia. 8. M. ſpicis oblongis, foliis ſubrotundis rugoſis crenatis ſeſſilibus.

dubia. 9. M. floribus ſpicato-capitatis: ſtaminibus corolla brevioribus, foliis hirſutis acuminatis ſerratis ovato-lanceolatis. *Villars pl. Delph.* 2. *p.* 358. *n.* 4.

**** *floribus capitatis.*

criſpa. 10. M. foliis cordatis dentatis undulatis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla duplo longioribus. *Rivin. monop. t.* 50.

hirſuta. 11. M. foliis ovatis ferratis ſubſeſſilibus pubeſcentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Mant. p.* 81. *β) Raj. ſt. angl.* 3. *t.* 10. *f.* 1.

aquatica. 12. M. foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Flor. dan. t.* 673.

piperita. 13. M. foliis ovatis petiolatis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Knigge de menth. piper. diſſ. ic. Jungh. pl. off. ic. t.* 10.

punctata. 14. M. pedunculis dichotomis, foliis ovatis dentatis glabris punctulatis. *Herit. ſert. angl. p.* 20. *t.* 23.

canarienſis. 15. M. pedunculis dichotomis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis ovatis crenatis ſubtus villoſis, caule arboreſcente. *Pluckn. alm. t.* 317. *f.* 2.

***** *floribus verticillatis.*

ſativa. 16. M. foliis ovatis acutiuſculis ſerratis, ſtaminibus corolla longioribus. *Flor. dan. t.* 794.

gentilis. 17. M. foliis ovatis acutis ſerratis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Flor. dan. t.* 736.

arvenſis. 18. M. foliis ovatis acutis ſerratis, ſtaminibus corollam æquantibus. *Flor. dan. t.* 512.

Pulegium. 19. M. foliis ovatis obtuſis ſubcrenatis, caulibus ſubteretibus repentibus, ſtaminibus corolla longioribus. *Blackw. herb. t.* 302.

auſtriaca. 20. M. foliis ſubovatis villoſis, corollæ laciniis omnibus obtuſis ſtamina ſuperantibus. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 430.

exigua. 21. M. foliis lanceolato-ovatis glabris acutis integerrimis. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 38.

cahirina. 22. M. foliis ovato-lanceolatis acutis ſerratis: ſerraturis deſcendentibus. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 213.

canadenſis. 23. M. foliis lanceolatis ſerratis petiolatis piloſis, ſtaminibus corollam æquantibus.

cervina. 24. M. foliis linearibus, bracteis palmatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Blackw. herb. t.* 304.

1236. PERILLA. *Calicis* lacinia ſuprema breviſſima. *Stamina* diſtantia. *Stili* 2 connexi.

ocymoides. 1. PERILLA. *Arduin. ſpec.* 2. *t.* 13.

714. GLECOMA. *Cal.* 5fidus. *Antherarum* ſingula paria in formam crucis conniventia.

hederaceum. 1. GLECOMA. *Flor. dan. t.* 789.

716. LAMIUM. *Cor.* labium ſuperius integrum, fornicatum: *labium* inferius obcordatum; faux utrinque dente ſetaceo.

Orvala. 1. L. foliis cordatis inæqualiter arguteque ſerratis, corollis fauce inflata, caulibus coloratis. *Scop. flor. carn. ed.* 2. *t.* 27. *β*) Orvala garganica. *Sp. pl. p.* 807. *Michel. n. pl. gen. t.* 17.

lævigatum. 2. L. foliis cordatis rugoſis, caule lævi, calicibus glabris longitudine tubi corollæ. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 34.

rugoſum. 3. L. foliis cordatis acutis rugoſis caulibuſque piloſis, verticillis multifloris: faucis dente unico ſetaceo. *Bocc. muſ. p.* 35. *t.* 23.

garganicum. 4. L. foliis cordatis pubeſcentibus, corollis fauce inflata: tubo recto dente utrinque gemino. *Till. h. piſ. t.* 34. *f.* 2.

maculatum. 5. L. follis cordatis acuminatis, verticillis decemfloris. *Col. ecphr.* 1. *t.* 192.

album. 6. L. foliis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis, verticillis vigintifloris. *Flor. dan. t.* 594.

bifidum. 10. L. foliis cordatis acuminatis, corollæ galea bifida: laciniis divaricatis. *Cyrill. pl. rar. Neap. faſc.* 1. *t.* 7. *an hujus generis?*

purpureum. 7. L. foliis cordatis obtuſis petiolatis. *Flor. dan. t.* 523.

molle. 8. L. foliis petiolatis ſubdentatis : inferioribus cordatis ; ſuperioribus ovatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 297.

multifidum. 9. L. foliis multipartitis. *Commel. rar. t.* 26.

717. GALEOPSIS. *Cor.* labium ſuperius ſubcrenatum, fornicatum, inferius trifidum : faux utrinque dente obtuſiuſculo concavo acuta.

Ladanum. 1. G. verticillis omnibus remotis, calicibus campanulatis pubeſcentibus : dentibus lineari-ſetaceis divergentibus longioribus. *Mant. p.* 411.

grandiflora. 2. G. verticillis omnibus remotis, calicibus tubuloſis hirſutiſſimis : dentibus lanceolato-acuminatis brevioribus rectis. *Riv. monop. t.* 24.

Tetrahit. 3. G. verticillis ſummis ſubcontiguis, calicibus ventricoſis : dentibus longiſſimis ſetaceis æqualibus. *Mant. p.* 411. *Riv. monop. t.* 44.

cannabina. 4. G. verticillis ſummis ſubcontiguis, calicibus tubuloſis : dentibus brevioribus linearibus inæqualibus ; tribus majoribus. *Rivin. monop. t.* 45.

POLLICHIA. *Corollæ* labium ſuperius integrum, fornicatum ; faux abſque dentibus.

Galeobdolon. 1. P. calicibus pungentibus, corollæ labio inferiore trifido, foliis omnibus cordatis dentatis petiolatis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 394. Galeopſis Galeobdolon. *Knorr del. hort.* I. *t.* N. 9. *n.* 1.

amplexicaulis. 2. P. calicibus inermibus, corollæ labio inferiore bifido, foliis caulinis ſeſſilibus rotundatis inciſis : radicalibus petiolatis cordato-lobatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 393. Lamium amplexicaule. *Flor. dan. t.* 752.

718. BETONICA. *Cal.* ariſtatus. *Corollæ* labium ſuperius erectum planum: tubus cylindricus.

officinalis. 1. B. ſpica interrupta: corollæ galea integra; labii lacinia intermedia emarginata, calicibus glabriuſculis. *Flor. dan. t.* 726.

incana. 2. B. ſpica interrupta: corollæ galea bifida; labii lacinia intermedia crenata, tubo tomentoſo incurvo. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 299.

ſtricta. 3. B. ſpica oblonga: corollæ galea integra; labii lacinia intermedia crenato-undulata calicibus piloſis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 299.

orientalis. 4. B. ſpica integra: corollæ labii lacinia intermedia integerrima.

alopecuros. 5. B. ſpica baſi folioſa: corollæ galea bifida. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 78.

hirſuta. 6. B. ſpica baſi folioſa: corollis galea integra. *Mant. p.* 248. *Murr. comm. Goett.* 1779. 2. *p.* 13. *t.* 3.

heraclea. 7. B. calicibus lanatis: dentibus filiformibus, foliis lanceolatis nudis. *Mant. p.* 83.

719. STACHYS. *Corollæ* labium ſuperius fornicatum; inferius lateribus reflexum: lacinia intermedia majore emarginata. *Stamina* deflorata verſus latera reflexa.

ſpinoſa. 1. St. ramulis ſpina terminatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 10. *f.* 9.

glutinoſa. 2. St. ramis ramoſiſſimis, foliis lanceolatis glabris.

patens. 3. St. ramoſiſſima, ramis filiformibus patentibus, foliis lanceolatis ſerratis glabris, floribus ſubverticillatis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 88.

maritima. 4. St. foliis cordatis obtuſis tomentoſis crenatis, bracteis oblongis integerrimis. *Mant. p.* 82. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 70.

palæſtina. 5. St. floribus ſubſpicatis, foliis lanceolatis ſeſſilibus tomentoſis rugoſis integerrimis, calicibus muticis. *Sp. pl. p.* 1674. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 109. 112.

orientalis. 6. St. foliis tomentoſis ovato-lanceolatis: floralibus verticillo brevioribus.

recta. 7. St. verticillis ſubſpicatis, foliis cordato-ellipticis crenatis ſcabris, caulibus adſcendentibus. *Mant. p.* 82. *Jacq. fl. auſtr.* 4. *t.* 359.

æthiopica. 8. St. verticillis bifloris. *Mant. p.* 82. *Plukn. alm. t.* 315. *f.* 3.

paluſtris. 9. St. verticillis ſubſexfloris, foliis lineari-lanceolatis ſemiamplexicaulibus ſeſſilibus. *Curt. flor. Lond. t.* 208.

Lavandulifolia. 24. St. verticillis ſexfloris hirſutiſſimis, foliis lanceolatis integerrimis lineatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 42.

ſylvatica. 10. St. verticillis ſexfloris, foliis cordatis petiolatis. *Curt. flor. Lond. t.* 283.

arvenſis. 11. St. verticillis ſexfloris, foliis obtuſis nudiuſculis, corollis longitudine calicis, caule debili. *Curt. flor. Lond. t.* 246.

rugoſa. 12. St. verticillis ſexfloris, foliis lanceolatis baſi attenuatis tomentoſis rugoſis ſerratis, calicibus muticis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 303.

annua. 13. St. verticillis ſexfloris, foliis ovato-lanceolatis trinerviis lævibus petiolatis, caule erecto. *Mant. p.* 411. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 360.

hirta. 14. St. verticillis ſexfloris, caulibus proſtratis, corollæ labio ſuperiori bifido divaricato reflexo.

canarienſis. 15. St. verticillis ſexfloris, foliis cordatis villoſis crenatis, caulibus ſuberectis, calicibus fructiferis campanulato-patentiſſimis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 43.

circinata. 16. St. verticillis ſexfloris, foliis cordato-rotundatis crenatis. *Herit. ſtirp. nov.* 3. *p.* 51. *t.* 26.

heraclea. 23. St. hirſuta, verticillis decemfloris, foliis atro-virentibus elliptico-lanceolatis. *Allion. flor. pedem. t.* 84. *f.* 1.

cretica. 17. St. verticillis trigintafloris, calicibus pungentibus, caule hirto. *Walth. hort. t.* 19.

lanata. 18. St. verticillis multifloris, foliis lanatis ſubcrenulatis, caulibus baſi procumbentibus radicantibus. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 59.

intermedia. 19. St. verticillis multifloris, calicibus ſubpungentibus, foliis oblongis ſubcordatis crenatis, caule ſublanato. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 301.

germanica. 20. St. verticillis multifloris, foliorum ſerraturis imbricatis, caule lanato. *Flor. dan. t.* 684. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 319.

alpina. 21. St. verticillis multifloris, foliorum ſerraturis apice cartilagineis, corollis labio plano. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 41.

latifolia. 22. St. verticillis multifloris ſubſpicatis: galea bifida; laciniis acutis, foliis latis cordatis rugoſis piloſis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 303.

720. BALLOTA. *Cal.* hypocrateriformis, 5dentatus, 10ſtriatus. *Cor.* labium ſuperius crenatum, concavum.

nigra. 1. B. foliis cordatis indiviſis ſerratis, calicibus acuminatis. *Blackw. herb. t.* 136.

alba. 2. B. foliis cordatis indiviſis ſerratis, calicibus ſubtruncatis; *an vere diſtincta a nigra?*

ſuaveolens. 3. B. foliis cordatis, pedunculis axillaribus ſolitariis, calicibus truncatis: ariſtis linearibus. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 42.

lanata. 4. B. foliis palmatis dentatis, caule lanato. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 42.

diſticha. 5. B. verticillis dimidiatis bipartitis ſemiſpicatis. *Mant. p.* 83. *Burm. zeyl. t.* 71. *f.* 1.

721. MARRUBIUM. *Cal.* hypocrateriformis, rigidus, 10ſtriatus. *Cor.* labium ſuperius 2fidum, lineare, rectum.

* *calicibus 5dentatis.*

Alyſſon. 1. M. foliis cuneiformibus quinquedentatis plicatis, verticillis involucro deſtitutis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 10 *f.* 12.

plicatum. 2. M. foliis ſemiorbiculatis tomentoſis rugoſis plicato-lobatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 213.

peregrinum. 3. M. foliis ovato-lanceolatis ſerratis, calicum-denticulis ſetaceis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 160.

candidiſſimum. 4. M. foliis ſubovatis lanatis ſuperne emarginato-crenatis, calicum denticulis ſubulatis. *Dill. h. Elth. t.* 174. *f.* 214.

aſtracani-cum. 5. M. foliis ovatis crenatis tomentoſis rugoſiſſimis, calicum dentibus ſubulatis, corollæ laciniis ſuperioribus acutis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 7.

indicum. 13. M. foliis cordatis ſerratis, calicibus villoſis: dentibus ſubulatis. *Burm. th. zeyl. t.* 71. *f.* 1.

ſupinum. 6. M. calicum dentibus ſetaceis rectis villoſis. *Barr. pl. rar. ic.* 685. 686.

** *calicibus* 10*dentatis.*

africa-num. 7. M. foliis cordatis ſubrotundis emarginato-crenatis. *Pluckn. alm. t.* 306. *f.* 2.

criſpum. 8. M. foliis cordatis ſubrotundis crenato-ſubdentatis, calicibus muticis. *Sp. pl. p.* 1674. *Herm. par. Lugdb. t.* 200.

vulgare. 9. M. calicum dentibus ſetaceis uncinatis. *Blackw. herb. t.* 479.

hiſpani-cum. 10. M. calicum limbis patentibus: denticulis acutis. *Herm. par. Lugdb. t.* 201.

Pſeudodic-tamnus. 11. M. calicum limbis planis villoſis, foliis cordatis concavis, caule fruticoſo. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 47.

acetabu-loſum. 12. M. calicum limbis tubo longioribus membranaceis: angulis majoribus rotundatis. *Barr. pl. rar. ic.* 129.

722. LEONURUS. *Antheræ* punctis nitidis adſperſæ.

criſpus. 1. L. foliis omnibus acute ſerratis rugoſiſſimis margine inæqualiter reflexis: caulinis quinquelobis. *Murray comm. Goett.* 1777. *p.* 44. *t.* 4.

Cardiaca. 2. L. foliis caulinis lanceolatis trilobis. *Flor. dan. t.* 727.

ſibiricus. 3. L. foliis tripartitis multifidis linearibus obtuſiuſculis. *Amm. ruth. t.* 8. *an varietas tatarici?*

tataricus. 4. L. foliis tripartitis laciniatis, calicibus villoſis. *Mill. h. angl. t.* 80.

Marrubiaſ-trum. 5. L. foliis ovatis lanceolatiſque ſerratis, calicibus ſeſſilibus ſpinoſis. *Mant. p.* 412. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 405.

723. PHLOMIS. *Cal.* angulatus. *Cor.* labium ſuperius incumbens, compreſſum, villoſum.

* *floribus nudis.*

Niſſolii. 1. Phl. foliis radicalibus cordato-ſagittatis utrinque tomentoſis villoſis. *Mill. h. angl. t.* 204.

ſinenſis. 2. Phl. foliis ovatis ſerratis tomentoſo-ſericeis, calicibus verticillatis decemdentatis. *Bladh. apud Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 19.

laciniata. 3. Phl. foliis alternatim pinnatis: foliolis lanceolatis, calicibus lanatis.

** *floribus involucratis.*

Lychnitis. 4. Phl. foliis lanceolatis tomentoſis: floribus ovatis, involucris ſetaceis lanatis. *Mill. h. angl. t.* 203.

zeylanica. 5. Phl. foliis lanceolatis ſubſerratis, capitulis terminalibus, calicibus octodentatis. *Rumpf amb.* 6. *t.* 16. *f.* 1. *β*) Leonurus indicus. *Sp. pl. p.* 817.

Leonurus. 6. Phl. foliis lanceolatis ſerratis, calicibus decagonis decemdentatis muticis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 412. *Knorr del. hort.* 2. *t.* L.

caribæa. 7. Phl. foliis ovato-lanceolatis oppoſitis ſerratis petiolatis villoſis, verticillis axillaribus multifloris, involucris hirſutis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 154.

alba. 8. Phl. ovatis ſerratis villoſis, calicibus quinquedentatis obliquis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 107.

glabrata. 19. Phl. foliis ovatis ſerratis, calicibus labio inferiore producto, tridentato, ramis reverſe piloſis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 42.

moluccoides. 20. Phl. foliis ovatis, involucris ſetaceis, calicis labio inferiore magno rotundato membranaceo. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 107. Clinopodium fruticoſum.

Leonotis. 9. Phl. foliis ovatis obtuſis ſubtomentoſis crenatis, calicibus ſeptemdentatis ariſtatis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 83. *Mill. h. angl. t.* 162.

indica. 10. Phl. foliis ovatis piloſis, involucris linearibus, calicibus unilabiatis obliquis.

Samia. 11. Phl. foliis ovatis ſubtus tomentoſis, involucris ſubulatis ſtrictis tripartitis.

Herba-venti. 12. Phl. foliis ovato-oblongis ſcabris, involucris ſetaceis hiſpidis, caule herbaceo. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 17.

martinicenſis. 13. Phl. foliis ovato-oblongis villoſis, involucris ſetaceis, verticillis ſubgloboſis, calicibus recurvis : laciniis ſuperioribus ſubulatis longiſſimis. *Jacq. ſtirp. amer. p.* 160. *t.* 177. *f.* 75.

alpina. 14. Phl. foliis cordatis ſerratis : floralibus lanceolatis trinerviis, involucris ſetaceis villoſis. *Pallas nov. comm. Petrop.* 1779. 2. *p.* 265. *t.* 13.

neptifolia. 15. Phl. foliis cordatis acutis ſerratis ſubtomentoſis, calicibus ſex-vel octodentatis : dente ſupremo infimoque majori, caule herbaceo. *Suppl. p.* 274. *Herm. par. Lugdb. t.* 117.

tuberoſa. 16. Phl. foliis cordatis ſcabris, involucris hiſpidis ſubulatis, caule herbaceo. *Buxb. cent.* 1. *t.* 6. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 9.

purpurea. 17. Phl. foliis cordatis oblongis tomentoſis, involucris linearibus obtuſis calice brevioribus, caule ſuffruticoſo. *Pluckn. alm. t.* 57. *f.* 6.

fruticoſa. 18. Phl. foliis ſubrotundis tomentoſis crenatis, involucris lanceolatis, caule fruticoſo. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 15. *β*) *Dill. h. Elth. t.* 237. *f.* 306.

724. MOLUCCELLA. *Cal.* ampliatus, corolla latior, ſpinoſus. *Sem.* 3quetra.

lævis. 1. M. calicibus campanulatis ſubquinquedentatis : denticulis æqualibus. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 45. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 10.

ſpinoſa. 2. M. calicibus ringentibus octodentatis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 46.

fruteſcens. 3. M. calicibus infundibuliformibus quinquefidis, corollis calice longioribus. *Burm. ind. t.* 38. *f.* 2.

tuberoſa. 4. M. calicibus infundibuliformibus patentiſſimis ſexdentatis corolla duplo brevioribus. *Pallas it.* 3. *p.* 738. *t.* T. *f.* 1-3.

725. CLINOPODIUM. *Stamina* curvata : *antheris* conniventibus.

vulgare. 1. Cl. capitulis ſubrotundis hiſpidis, bracteis ſetaceis *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 65. *β*) *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 66. *γ*) *Mill. ic. t.* 95.

rugoſum. 2. Cl. capitulis axillaribus pedunculatis explanatis radiatis, foliis rugoſis. *Pluckn. phyt. t.* 222. *f.* 7.

incanum. 3. Cl. foliis ſubtus tomentoſis, verticillis explanatis; bracteis lanceolatis. *Pluckn. mant. t.* 344. *f.* 7.

martinicenſe. 4. Cl. foliis ovato-oblongis baſi attenuatis, verticillis globoſis: bracteis ſetaceis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 45.

726. ORIGANUM. *Strobilus* 4gonus, ſpicatus, calices colligens.

ægyptiacum. 1. O. foliis carnoſis tomentoſis, ſpicis nudis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 3. *f. ult.*

Dictamnus. 2. O. foliis inferioribus tomentoſis, ſpicis nutantibus. *Blackw. herb. t.* 462.

ſipyleum. 3. O. foliis omnibus glabris, ſpicis nutantibus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 4. *f.* 2.

creticum. 4. O. ſpicis aggregatis longis priſmaticis rectis: bracteis membranaceis calice duplo longioribus.

bengalenſe. 15. O. foliis ovatis dentatis, ſpicis imbricatis lanuginoſis: bracteis ovatis. *Burm. ind. t.* 38. *f.* 3.

ſmyrnæum. 5. O. foliis ovatis acutis ſerratis, ſpicis congeſtis umbellatim faſtigiatis.

Tournefortii. 6. O. ſpicis tetragonis: bracteis ſubrotundis maximis. *Tournef. it.* 1. *p.* 240. *ic.*

heracleoticum. 7. O. ſpicis longis pedunculatis aggregatis: bracteis longitudine calicum. *Lob. ic.* 492.

vulgare. 8. O. ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis: bracteis calice longioribus ovatis. *Flor. dan. t.* 638.

Onites. 9. O. ſpicis oblongis aggregatis hirſutis, foliis cordatis tomentoſis. *Bocc. muſc.* 2. *t.* 38.

ſyriacum. 10. O. ſpicis longis ternatis pedunculatis villoſis, foliis ovatis villoſis. *Lob. ic.* 499.

Maru. 11. O. ſpicis hirſutis, foliis ovatis tomentoſis ſeſſilibus. *Alp. exot. t.* 288.

Majorana. 12. O. foliis ovatis obtuſis, ſpicis ſubrotundis compactis pubeſcentibus. *Zorn pl. med. ic. t.* 41. *β*) *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 78.

clinopodioides. 13. O. capitulis rotundatis verticillatis terminalibusque, floribus ſeſſilibus, foliis cordato-ovatis ſubpetiolatis glabris. *Walt. flor. carol. p.* 165.

flexuoſum. 14. O capitulis axillaribus: floribus ſeſſilibus, caule flexuoſo, foliis ſublinearibus. *Walt. flor. carol. p.* 165. *an diſtincta hujus generis ſpecies?*

727. THYMUS. *Cal.* 2labiatus: faux villis clauſa.

Serpyllum. 1. Th. floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis. *Zorn pl. med. ic. t.* 17. *β*) *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 69.

cephalotus. 2. Th. capitulis imbricatis magnis, bracteis ovatis, foliis lanceolatis. *Barr. pl. rar. ic.* 787.

villoſus. 3. Th. capitulis imbricatis magnis, bracteis dentatis, foliis ſetaceis piloſis.

virginicus. 4. Th. capitulis terminalibus, caule erecto, foliis lanceolatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 389. Satureja virginiana. *Pluckn. alm. t.* 54. *f.* 2.

numidicus. 5. Th. floribus capitato-ſpicatis hirſutis, foliis linearibus glabris integerrimis, bracteis baſi latiuſculis. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 187.

vulgaris. 6. Th. erectus, foliis revolutis ovatis, floribus verticillato-ſpicatis. *Blackw. herb. t.* 211. *β*) *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 68.

Zygis. 7. Th. floribus verticillato-ſpicatis, caule ſuffruticoſo erecto, foliis linearibus baſi ciliatis. *Barr. pl. rar. ic.* 777.

Acinos. 8. Th. floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. *Balliard herb. Franc. t.* 318.

Maſtichina. 9. Th. floribus verticillatis: calicibus lanuginoſis; dentibus ſetaceis villoſis. *Mant. p.* 413. *Blackw. herb. t.* 134.

Tragoriganum. 10. Th. floribus verticillatis, caule fruticoſo erecto, foliis hiſpidis acuminatis. *Mant. pl.* 84. *Alp. exot. t.* 78.

indicus. 16. Th. ſpicis verticillato-interruptis, caulibus erectis. *Burm. ind.*

pannonicus. 17. Th. verticillis ad apicem ramorum congeſtis, foliis ovatis cauleque hirſutis. *Bauh. hiſt. pl.* 3. *p.* 267.

alpinus. 11. Th. verticillis ſexfloris, foliis obtuſiuſculis concavis ſubſerratis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 97.

Piperella. 12. Th. pedunculis multifloris lateralibus, foliis ovatis obtuſis glabris nervoſis integerrimis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 694.

Brownei. 13. Th. floribus pedunculatis axillaribus, foliis orbiculatis crenatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 89.

imbricatus. 14. Th. floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus, caulibus decumbentibus imbricatis, foliis ovatis acutis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 108.

filiformis. 15. Th. floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis, foliis cordatis acutis integerrimis petiolatis, caulibus filiformibus decumbentibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 313.

728. MELISSA. *Cal.* aridus, angulatus: labio ſuperiori reflexo-patente. *Cor.* labium ſuperius ſubfornicatum, 2fidum; inferius lobo medio cordato.

Nepeta. 1. M. pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus, caule adſcendente hirſuto. *Giſeck. ic. faſc.* 1. *n.* 14. *β*) *Riv. monop. t.* 47. *Faux villis clauſa; an thymus?*

grandiflora. 2. M. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum. *Beſl. h. Eyſt. æſt.* 7. *t.* 7. *f.* 1.

Calamintha. 3. M. pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. *Blackw. herb. t.* 166.

officinalis. 4. M. racemis axillaribus verticillatis: pedicellis ſimplicibus. *Blackw. herb. t.* 27.

cretica. 5. M. racemis terminalibus: pedunculis ſolitariis breviſſimis. *Barr. rar. pl. ic.* 1166.

fruticoſa. 6. M. ramis attenuatis virgatis, foliis ſubtus tomentoſis, caule fruticoſo.

729.

729. DRACOCEPHALUM. *Cor.* faux inflata : labium ſuperius fornicatum.

* *floribus ſpicatis.*

virginianum. 1. Dr. foliis lineari-lanceolatis ſerratis, floribus confertis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 26.

denticulatum. 2. Dr. foliis obovato-lanceolatis ſuperne denticulatis, floribus remotis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 317.

canarienſe. 3. Dr. foliis compoſitis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 27.

pinnatum. 4. Dr. foliis cordatis pinnato-ſinuatis. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 52.

Ruyſchiana. 5. Dr. foliis bracteiſque lanceolatis indiviſis muticis. *Flora dan. t.* 121.

auſtriacum. 6. Dr. foliis bracteiſque linearibus partitis ſpinoſis.

peregrinum. 7. Dr. floribus ſubſpicatis, foliis caulinis ovato-oblongis inciſis, bracteis lineari-lanceolatis denticulato-ſpinoſis.

** *floribus verticillatis.*

ſibiricum. 8. Dr. floribus ſubverticillatis : pedunculis bifidis ſecundis, foliis cordato-oblongis acuminatis nudis. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 51.

Moldavica. 9. Dr. bracteis lanceolatis : ſerraturis capillaceis. *Blackw. herb. t.* 551.

caneſcens. 10. Dr. bracteis oblongis : ſerraturis ſpinoſis, foliis ſubtomentoſis. *Mill. h. angl. t.* 129.

peltatum. 11. Dr. bracteis orbiculatis ferrato-ciliatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 8. *n.* 38.

grandiflorum. 12. Dr. foliis crenatis : radicalibus cordatis ; caulinis orbiculatis ſeſſilibus, bracteis acuminato-dentatis. *Suppl. p.* 274. *Laxmann act. Petrop.* 1770. *t.* 29. *f.* 3.

nutans. 13. Dr. bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis majuſculis nutantibus. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 49.

thymiflorum. 14. Dr. bracteis oblongis ovatis integerrimis, corollis vix calice majoribus. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 50. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 5. *t.* 65. *f.* 8.

730. HORMINUM. *Cal.* campanulatus: laciniis 4 ſubæqualibus; 5ta majore emarginata. *Corollæ* labium ſuperius concavum.

pyrenai-cum. 1. HORMINUM. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 183.

831. MELITTIS. *Cal.* tubo corollæ amplior. *Cor.* labium ſuperius erectum integrum; inferius trifidum. *Antheræ* cruciatæ.

Meliſſo-phyllum. 1. MELITTIS. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 26.

732. OCYMUM. *Cal.* labio ſuperiore rotundato, inferiore 4fido. *Cor.* reſupinatæ alterum labium 4fidum, alterum indiviſum. *Filamenta* exteriora baſi proceſſum emittentia.

thyrſiflo-rum. 1. O. floribus paniculato-faſciculatis, caule ramoſiſſimo. *Mant. p.* 84. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 72.

inflexum. 2. O. panicula terminali racemoſa, caule ramiſque flexuoſis. *Thunb. flor. jap. p.* 249.

[illegible]do-ium. 33. O. racemis paniculatis, foliis ovalibus denticulatis. *Burm. th. zeyl. t.* 80. *f.* 2.

rugoſum. 3. O. racemis terminalibus, foliis ovatis acutis ſerratis ſubtus rugoſis. *Thunb. flor. jap. p.* 249.

criſpum. 4. O. racemis terminalibus, foliis ovatis ſerratis criſpis, calicibus hiſpidis. *Thunb. flor. jap. p.* 248.

ſerphylli-folium. 5. O. racemis terminalibus, foliis oblongo-cuneatis acutiuſculis complicatis ſubtus ſcabris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 110.

acutum. 6. O. racemis filiformibus, foliis ovatis acuminatis ſerratis, bracteis birtis. *Thunb. flor. jap. p.* 248.

Plectanthrus. 34. O. racemis erectis : pedicellis ramoſis ; nectario gibbo, foliis cordato-ovatis acuminatis ſerratis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 43.

ſcutellarioides. 7. O. racemis erectis, pedicellis ramoſis, corollis falcatis. *Mant. p.* 84. *Rumpf amb.* 5. *t.* 101.

polyſtachyon. 8. O. racemis aphyllis apice nutantibus : corollis quadrifidis. *Mant. p.* 567. *Murray comm. Goett.* 1772. *t.* 3.

punctulatum. 9. O. racemis ſimplicibus erectis, foliis ovatis ſubtus punctatis. *Thunb. flor. jap. p.* 249.

gratiſſimum. 10. O. racemis teretibus, caule ſuffruticoſo, foliis lanceolato-ovatis. *Mant. p.* 414. *Burm. zeyl. t.* 80. *f.* 1.

americanum. 11. O. racemis teretibus, caule ſubherbaceo, foliis ſublanceolatis acuminatis ſubſerratis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 86.

hadienſe. 12. O. racemis aphyllis : nectario gibbo, caule æquali. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 109.

virgatum. 13. O. racemis verticillatis virgatis, foliis oblongis ſerratis. *Thunb. flor. jap. p.* 250.

verticillatum. 14. O. racemo elongato nudo : floribus verticillato-quaternis pedunculatis, foliis ovatis obtuſis. *Suppl. p.* 276.

album. 15. O. racemorum verticillis approximatis : nubilibus tetragonis, corollis crenatis, foliis ovatis obtuſis. *Mant. p.* 85.

Zatarhendi. 16. O. racemis bracteatis, nectario gibboſo, foliis ovatis carnoſis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 109. *an cum Plectanthro & hadienſi diſtincti generis ?*

filamentoſum. 17. O. foliis ovatis ſerratis, genitalibus longiſſimis, caule fruticoſo. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 108. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *t.* 43.

proſtratum. 18. O. caulibus proſtratis, foliis ellipticis lineatis. *Mant. p.* 566.

punctatum. 19. O. caule herbaceo hirto, floribus ſpicatis, nectario gibboſo. *Suppl. p.* 275. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *p.* 87. *t.* 42.

fruticoſum. 20. O. caule fruticoſo lævigato, racemis compoſitis, pedunculis tripartitis, nectario calcarato. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *p.* 85. *t.* 41. *an cum punctato diſtinctum genus conſtituit ?*

tenuiflorum. 21. O. ſpicis filiformibus, bracteis cordatis reflexis concavis, foliis ovato-oblongis ſerratis. *Burm. zeyl. t.* 70. *f.* 2.

capitella- rum. 22. O. floribus aggregatis, foliis ovatis; petiolis lateralibus. *Suppl. p.* 276.

monacho- rum. 23. O. ſtaminibus edentulis: alternis baſi barbatis. *Mant. p.* 85.

Baſilicum. 24. O. foliis ovatis glabris, calicibus ciliatis. *Blackw. herb. t.* 104.

ſalinum. 25. O. foliis ovatis glabris, caule geniculato. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 116.

minimum. 26. O. foliis ovatis integerrimis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 85.

menthoi- des. 27. O. foliis lineari-lanceolatis ferratis.

ſanctum. 28. O. foliis oblongiuſculis obtuſis ſerratis undulatis, caule hirto, bracteis cordatis. *Mant. p.* 85.

Vaalæ. 29. O. caule tetragono brachiato, calicibus piloſis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 111.

holoſeri- ceum. 30. O. foliis ovato-acuminatis tomentoſis undulatis mollibus, calicis labio inferiore quinquedentato ſemina tegente, bracteis perſiſtentibus. *Medic. act. palat.* 4. *phyſ. p.* 199. *t.* 7.

molle. 31. O. foliis ovatis cordatis acutis ſerratis rugoſis: ſinubus clauſis, bracteis ſubrotundo-cuneiformibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 322.

zeylani- cum. 23. O. foliis ellipticis planis nudis nitidis duris, calicis labio inferiore quinquedentato ſemina tegente, bracteis deciduis. *Medic. act. palat.* 4. *phyſ. p.* 197. *t.* 6.

733. TRICHOSTEMA. *Cor.* labium ſuperius falcatum. *Stamina* longiſſima.

dichoto- mum. 1. Tr. ſtaminibus longiſſimis exſertis, foliis lanceolatis.

lineare. 2. Tr. ſtaminibus exſertis, foliis linearibus. *Walt. flor. Carol. p.* 164.

brachia- tum. 3. Tr. ſtaminibus brevibus incluſis. *Dill. h. Elth. t.* 285. *f.* 367.

734. SCUTELLARIA. *Calix* ore ſubintegro: poſt floreſcentiam clauſo, operculato.

orientalis. 1. Sc. foliis inciſis ſubtus tomentoſis, ſpicis rotundato-tetragonis. *Tournef. it.* 3. *t.* 306.

albida. 2. Sc. foliis ſubcordatis ſerratis rugoſis opacis, ſpicis ſecundis: bracteis ovatis. *Mant. p.* 248. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 29.

peregrina. 3. Sc. foliis ſubcordatis ſerratis, ſpicis elongatis ſecundis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 187.

Columnæ. 18. Sc. villoſa, foliis cordatis, caule erecto brachiato, floribus racemoſis internodio longioribus. *Allion. flor. pedem. t.* 84. *f.* 2.

lupulina. 4. Sc. foliis cordatis inciſo-ſerratis acutis glabris, ſpicis imbricatis rotundato-tetragonis.

alpina. 5. Sc. foliis cordatis inciſo-ſerratis crenatis, ſpicis imbricatis rotundato-tetragonis. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 87.

cretica. 6. Sc. villoſa, foliis cordatis obtuſis obtuſeque ſerratis, ſpicis imbricatis: bracteis ſetaceis.

altiſſima. 7. Sc. foliis cordato-oblongis acuminatis ſerratis, ſpicis ſubnudis.

purpuraſcens. 8. Sc. foliis cordato-ovatis dentatis petiolatis, racemis nudis terminalibus, corollæ labio utroque trifido. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 89.

havanenſis. 9. Sc. foliis cordato-ovatis crenatis, floribus ſolitariis axillaribus, corollæ labio utroque trifido. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 165.

minor. 10. Sc. foliis cordato-ovatis ſubintegerrimis, floribus axillaribus. *Curt. flor. Lond. t.* 283.

caroliniana. 11. Sc. foliis cordato-ovatis obtuſe ſerratis, ſpicis terminalibus ſubhirſutis. *Walt. flor. carol. p.* 163.

galericulata. 12. Sc. foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus. *Flor. dan. t.* 637.

lateriflora. 13. Sc. foliis cordato-lanceolatis lævibus carina ſcabris, racemis lateralibus folioſis.

hyſſopifolia. 14. Sc. foliis lanceolatis. *Mant. p.* 414.

ovata. 19. Sc. foliis ovatis, floribus axillaribus. *Hill. hort. Kew. t.* 8.

haſtifolia. 15. Sc. foliis integerrimis: inferioribus haſtatis; ſuperioribus ſagittatis. *Riv. monop. t.* 77.

integrifolia. 16. Sc. foliis ſeſſilibus ovatis: inferioribus obſolete ſerratis; ſuperioribus integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 313. *f.* 4.

indica. 17. Sc. foliis ſubovatis crenatis petiolatis, racemis nudiuſculis. *Pluckn. amalth. t.* 441. *f.* 1.

GLANDULARIA. *Cal.* tubulatus: ore obliquo 5-fido, ſetaceo. *Germ.* 4partitum. *Stigma* 2fidum: glandula inter binas lacinias.

caroliniensis. 1. GLANDULARIA. *Walt. flor. carol. p.* 164.

735. PRUNELLA. *Filamenta* 2furca: altero apice antherifera. *Stigma* 2fidum.

indica. 7. Pr. foliis oblongis ſuperne crenatis, ſpicis capitatis: bracteis ciliatis. *Burm. ind.*

vulgaris. 1. Pr. foliis omnibus ovato-oblongis ſerratis petiolatis, calicibus labio ſuperiore truncato ſubtridentato. *Blackw. herb. t.* 24.

grandiflora. 2. Pr. foliis omnibus ovato-oblongis ſubſerratis, calicis labio ſuperiore profunde trilobo. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 377.

intermedia. 3. Pr. foliis inferioribus ſinuato-dentatis: ſuperioribus integris dentatis, calicibus ſummis coloratis. *Linck. Ann. Naturg.* 1. *p.* 32.

laciniata. 4. Pr. foliis ovato-oblongis petiolatis: inferioribus ſinuato-dentatis: ſupremis laciniatis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 378.

hyſſopifolia. 5. Pr. foliis lanceolatis integerrimis ſeſſilibus, caule erecto baſi procumbente. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 7.

parviflora. 6. Pr. foliis petiolatis ovato-lanceolatis ſubdentatis, ſpica ſeſſili: floribus vix bracteas ſuperantibus. *Poir. voy. en Barbar.* 2. *p.* 188.

736. CLEONIA. *Filamenta* 2furca : apice altero antherifera. *Stigmata* 4.

luſitanica. 1. CLEONIA. *Mant. p.* 414. *Mill. h. angl. t.* 70. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 7.

737. PRASIUM. *Sem.* epidermide molli baccata.

majus. 1. Pr. foliis ovato-oblongis ſerratis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 37. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 5. *t.* 66. *f.* 12.

minus. 2. Pr. foliis ovatis : crena utrinque duplici.

coccineum. 3. Pr. foliis ſubovatis. *Walt. flor. carol. p.* 166.

purpureum. 4. Pr. foliis lanceolatis ſeſſilibus. *Walt. flor. carol. p.* 166.

incarnatum. 5. Pr. foliis ſubamplexicaulibus lanceolato-oblongis. *Walt. flor. carol. p.* 165.

738. PHRYMA. *Semen* 1, calice tectum.

Leptoſtachyon. 1. Phr. foliis ovatis ſerratis petiolatis, calice monophyllo quinqueſido. *Suppl. p.* 277. *Pluckn. amalth. t.* 380. *f.* 5. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 5. *t.* 75. *f.* 10.

caroliníenſe. 2. Phr. foliis ſeſſilibus obovato-oblongis ſerratis. *Walt. flor. carol. p.* 166.

ANGIOSPERMIA.

1408. CASTILLEJA. *Cal.* 1phyllus tubuloſus ; anterius longitudinaliter fiſſus. *Cor.* ringens : Labium inferius glandulis 2. *Capſ.* 2locularis : diſſepimento contrario.

fiſſifolia. 1. C. foliis apice pinnato-inciſis. *Suppl. p.* 293. *Mutis amer.* 1. *t.* 11. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 40.

integrifolia. 2. C. foliis lineari-lanceolatis integris. *Mutis amer.* 1. *t.* 12. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 39.

TALIGALEA. *Cal.* 1phyllus, 4-5dentatus. *Cor.* infundibuliformis : tubo longo 5angulari. *Antheræ* baſi 2fidæ. *Stigm.* 2. *Bacca* 1locularis, 2-pyrena : oſſiculis 1ſpermis.

campeſtris. 1. TALIGALEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 625. *t.* 252. *utrum diſtincti generis, an Amaſoniæ ſpecies?*

739. BARTSIA. *Cal.* 2lobus, emarginatus, apice coloratus. *Cor.* calice minus colorata ; labio ſuperiore longiore. *Capſ.* 2locularis.

coccinea. 1. B. foliis alternis linearibus utrinque bidentatis. *Plukn. alm. t.* 102. *f.* 5.

pallida. 2. B. foliis alternis lanceolatis integerrimis : floralibus ovatis dentatis. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 42.

viſcoſa. 3. B. foliis ſuperioribus alternis ſerratis, floribus diſtantibus lateralibus. *Plukn. alm. t.* 27. *f.* 5.

alpina. 4. B. foliis oppoſitis cordatis obtuſe ſerratis. *Flor. dan. t.* 43.

Gymnandra. 5. B. diandra, foliis radicalibus binis petiolatis, caule ſubdiphyllo uniſpicato : ſpica lineari obtuſa, verticillis bracteatis coarctatis. *Suppl. p.* 278. *Pall. it.* 3. *t.* 4. *f.* 1.

740. RHINANTHUS. *Cal.* 4fidus, inflatus. *Capſ.* 2locularis, obtuſa, compreſſa. *Semina* pauca.

orientalis. 1. Rh. corollis labio ſuperiori ſubulato incurvo. *Tournef. it.* 2. *p.* 299. *it.*

Elephas. 2. Rh. corollis labio ſuperiori ſubulato recto. *Col. ecphr.* 1. *t.* 188.

Criſta galli. 3. Rh. corollis labio ſuperiori compreſſo breviori, calicibus glabris. *Bulliard herb. Franc. t.* 125. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 1.

Alectoro-lophus. 4. Rh. corollarum labio ſuperiore compreſſo breviori: auriculis truncatis, calicibus villoſis. *Hall. hiſt. ſtirp. helv.* 1. *p.* 137. *n.* 314.

virginicus. 5. Rh. corollis fauce patentibus, foliis ſinuato-dentatis.

trifidus. 11. Rh. corollis fauce patentibus, foliis trifidis. *Buxb. cent.* 1. *p.* 5. *t.* 8.

capenſis. 6. Rh. calicibus tomentoſis bracteis ovatis, foliis lanceolatis dentatis. *Sp. pl. p.* 879. Buchnera africana. *Pluckn. alm. t.* 310. *f.* 3.

Trixago. 7. Rh. calicibus hirſuto-tomentoſis, foliis oppoſitis obtuſe ſerratis, caule ſimpliciſſimo. *Col. ecphr.* 1. *t.* 197.

indicus. 8. Rh. foliis ſublanceolatis piloſis integerrimis. *Burm. ind. t.* 39. *f.* 1. *β*) *Pluckn. alm. t.* 113. *f.* 2.

maximus. 9. Rh. foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſeſſilibus: ſuperioribus alternis, calicibus tubuloſis acutis. *La Mark dict. bot. n.* 10.

verſicolor. 10. Rh. foliis ſubcompoſitis lanceolato-linearibus ſerratis, ſerraturis diſtantibus, calicibus brevibus oppoſitis. *La Mark dict. bot. n.* 11.

741. EUPHRASIA. *Cal.* 4fidus, cylindricus. *Antheræ* inferiores altero lobo baſi ſpinoſæ. *Capſ.* 2locularis, ovato-oblonga. *Semina* pauca deorſum incumbentia.

latifolia. 1. Eu. foliis dentato-palmatis, floribus ſubcapitatis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 7.

officinalis. 2. Eu. foliis ovatis lineatis argute dentatis. *Zorn pl. med. ic. t.* 39. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 8.

rubra. 9. Eu. foliis cordato-ovatis acute ſerratis, calice obtuſe dentato, caule ramoſo. *Hoffm. bot. Taſchenb.* 1791. *p.* 215.

tricuſpidata. 3. Eu. foliis linearibus tridentatis. *Pluckn. alm. t.* 177. *f.* 1.

Odontites. 4. Eu. foliis linearibus: omnibus ſerratis. *Flor. dan.* 655.

lutea. 5. Eu. foliis linearibus ſerratis; ſuperioribus integerrimis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 398.

linifolia. 6. Eu. foliis linearibus: omnibus integerrimis, calicibus glabris. *Col. ecphr.* 2. *t.* 69.

viſcoſa. 7. Eu. foliis linearibus, calicibus glutinoſo-hiſpidis. *Mant. p.* 86. *Garid. aix. t.* 78.

cuneata. 8. Eu. foliis ſubcuneiformibus inciſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 43.

742. MELAMPYRUM. *Cal.* 4fidus. *Cor.* labium ſuperius compreſſum: margine replicato. *Capſ.* 2locularis, compreſſa, obliqua, hinc dehiſcens. *Sem.* ſolitaria gibba.

criſtatum. 1. M. ſpicis quadrangularibus: bracteis cordatis compactis denticulatis imbricatis. *Pluckn. alm. t.* 99. *f.* 2.

arvenſe. 2. M. ſpicis conicis laxis: bracteis dentato-ſetaceis coloratis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 8. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 1.

nemoroſum. 3. M. floribus ſecundis lateralibus: bracteis dentatis; ſummis coloratis ſterilibus, calicibus lanatis. *Flor. dan. t.* 305.

pratenſe. 4. M. floribus ſecundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis clauſis. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 1.

ſilvaticum. 5. M. floribus ſecundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis hiantibus. *Flor. dan. t.* 145.

743. LATHRÆA. *Cal.* 4–5partitus. *Glandula* depreſſa ad angulum alterum germinis. *Capſula* 1locularis: receptaculis fungoſis lateralibus.

Clandeſtina. 1. L. caule ramoſo ſubterreſtri, floribus erectis ſolitariis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 16. *f.* 15.

Phelypæa. 2. L. corollis campanulato-patentibus.

Anblatum. 3. L. corollarum labiis indiviſis.

quinquefida. 4. L. caule ſimplici, ſpica undique imbricata, calice corollaque quinquefidis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 111.

Squamaria. 5. L. caule ſimpliciſſimo, corollis pendulis: labio inferiori trifido. *Flor. dan. t.* 136. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 3. *t.* 52. *f.* 3.

744. SCHWALBEA. *Cal.* 4fidus: laciniâ ſuperiore minima; infima maxima apice bifida. *Capſ.* 2locularis: diſſepimento duplicato. *Semina* paleacea.

americana. 1. SCHWALBEA. *Mant. p.* 414. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 3.

PATTERSONIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* infundibuliformis. *Capſ.* 2locularis. *Sem.* in utriſque loculis 4 imbricata.

caroliniensis. 1. PATTERSONIA. *Walt. flor. carol. p.* 167.

745. TOZZIA. *Cal.* 5dentatus. *Capſ.* 1locularis, globoſa, 1ſperma.

alpina. 1. TOZZIA. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 165.

746. PEDICULARIS. *Cal.* 5fidus. *Capſ.* 2locularis, mucronata, obliqua. *Semina* tunicata, pauca.

paluſtris. 1. P. caule ramoſo, calicibus criſtatis calloſo-punctatis, corollis labio obliquis. *Flor. dan. t.* 225.

ſilvatica. 2. P. caule ramoſo, calicibus oblongis angulatis lævibus, corollis labio cordato. *Flor. dan. t.* 225.

roſtrata. 3. P. caule declinato ſubramoſo, corollis galea roſtrato-acuminatis, calicibus criſtatis ſubhirſutis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 205.

myriophylla. 4. P. caule ſubſimplici, foliis quaternis verticillatis pinnatifidis: laciniis crenulatis, calicibus truncato-bilobis. *Pallas it.* 3. *p.* 738. *t.* S. *f.* 2. B.

Sceptrum Carolinum. 5. P. caule ſimplci, floribus terno-verticillatis, corollis clauſis, calicibus criſtatis, capſulis regularibus. *Flor. dan. t.* 26.

verticillata. 6. P. caule ſimplici, foliis quaternis pinnatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 206. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 5.

reſupinata. 7. P. caule ſimplici, foliis lanceolatis ſerratis crenulatis, floribus reſupinatis. *Gmel. ſlor. ſib.* 3. *t.* 44.

recutita. 8. P. caule ſimplici, foliis pinnatifidis ſerratis, ſpica foliofa: calicibus coloratis, corollis obtuſis. *Jacq flor. auſtr.* 3. *t.* 258.

flava. 9. P. caule ſimplici angulato, foliis bipinnatifidis dentatis, ſpica folioſa, calicibus pentandris quinquedentatis, galeæ mucrone truncato-emarginato. *Pall. it.* 3. *p.* 736. *t.* R. *f.* 1. A. B.

triſtis. 10. P. caule ſimplici, corollarum galeis margine villoſis.

flammea. 11. P. caule ſimplici, foliis pinnatis retro imbricatis. *Flor. lapp. t.* 11. *f.* 2.

hirſuta. 12. P. caule ſimplici, foliis dentato-pinnatis linearibus, calicibus hirſutis. *Flor. lapp. t.* 4. *f.* 3.

roſea. 13. P. caule ſimplici, foliis pinnatis: pinnis oblongis pinnatifidis, calicibus hirſutis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 40.

incarnata. 14. P. caule ſimplici, foliis pinnatis ſerratis, calicibus rotundatis glabris, corollis galea uncinata acuta. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 140.

criſtata. 23. P. caule ſimplici, foliis pinnatis obtuſe dentatis, galea roſtrata. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 324.

lapponica. 15. P. caule ſimplici, foliis pinnatifidis ſerratis, calicibus bifidis obtuſis. *Flor. dan. t.* 2.

comoſa. 16. P. caule ſimplici, ſpica folioſa, corollis galea acuta emarginata, calicibus quinquedentatis. *Allion. fl. pedem. t.* 12. *f.* 1.

folioſa. 17. P. caule ſimplici, ſpica folioſa, corollis galea obtuſiſſima integra. *Mant. p.* 89. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 139.

canadenſis. 18. P. caule ſimplici, ſpica ſubfolioſa, corollis galea ſetaceo-bidentata, calicibus deorſum truncatis. *Mant. p.* 86.

tuberoſa. 19. P. caule ſimplici, calicibus criſtatis, corollis galea roſtrato adunca. *Bocc. muſ. t.* 8.

ſtriata. 20. P. caule ſimpliciſſimo, foliis pinnatifidis: laciniis linearibus ſerrulatis, calicibus cylindricis quinquedentatis corolla triplo brevioribus, galea obtuſe bidentata. *Pall. it.* 3. *p.* 737. *t.* R. *f.* 2. C.

ſpicata. 21. P. caule ſimpliciſſimo rectiſſimo, foliis ternis verticillatis pinnatifidis: laciniis crenulatis, calicibus truncato-bilobis. *Pall. it.* 3. *p.* 738. *t.* S. *f.* 2. B.

acaulis. 22. P. pedunculis radicalibus unifloris flore brevioribus, labii tripartiti lobo intermedio baſi bicarinato. *Wulfen apud Jacquin coll.* 1. *p.* 207. *t.* 14.

AFZELIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata. *Capſ.* rotundata, acuminata, 2locularis, apice dehiſcens polyſperma: receptaculis hemiſphæricis.

caſſioides. 1. AFZELIA. *Walt. flor. carol. p.* 171.

747. GERARDIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 2labiata: labio inferiore 3partito; laciniis emarginatis, medio 2partito. *Capſ.* 2locularis, baſi dehiſcens.

tuberoſa. 1. G. foliis ſubovatis tomentoſis repandis longitudine caulis. *Plum. ic.* 75. *f.* 2.

glutinoſa. 2. G. foliis ovatis ſerratis, bracteis linearibus hiſpidis. *Osb. it. t.* 9.

japonica. 3. G. foliis ovatis-inciſo-pinnatifidis petiolatis, caule ſimplici. *Thunb. flor. jap. p.* 251.

ſcabra. 4. G. hiſpida ſcabra, foliis oblongis pinnatifidis. *Suppl. p.* 279.

pedicularia. 5. G. foliis oblongis duplicato-ſerratis, caule paniculato, calicibus crenatis.

nigrina. 6. G. ſcabra, foliis lanceolatis inferne ſerratis, caule tetragono. *Suppl. p.* 278. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 154. Nigrina viſcoſa. *Berg. fl. cap. t.* 3. *f.* 4. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 4.

flava. 7. G. foliis lanceolatis pinnato-dentatis, caule ſimpliciſſimo. *Pluckn. mant. t.* 368.

delphinifolia. 8. G. foliis linearibus pinnatifidis, caule ſubramoſo.

tubuloſa. 9. G. lævis, foliis linearibus integris acutis, tubo calice longiore. *Suppl. p.* 279.

purpurea. 10. G. foliis linearibus integerrimis, floribus oppoſitis. *Pluckn. phyt.* 12. *f.* 2.

erecta. 11. G. foliis linearibus pedunculo brevioribus, floribus axillaribus. *Walt. flor. carol. p.* 170.

ſetacea. 12. G. foliis ſetaceis, caule ramoſiſſimo, floribus terminalibus. *Walt. flor. carol. p.* 170.

748. CHELONE. *Cal.* 5partitus. *Rudimentum* filamenti quinti inter ſuprema ſtamina. *Capſ.* 2locularis: diſſepimento duplicato. *Sem.* bracteata, membranaceo-marginata.

glabra. 1. Ch. foliis petiolatis lanceolatis ſerratis: ſummis oppoſitis. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 6.

obliqua. 2. Ch. foliis petiolatis lanceolatis ſerratis oppoſitis. *Mill. h. angl. t.* 93. *an ſatis diſtincta a glabra ?*

hirſuta. 3. Ch. caule foliiſque hirſutis. *Mill. h. angl. t.* 252. *an varietas pentſtamonis ?*

Pentſtamon. 4. Ch. foliis amplexicaulibus, panicula dichotoma. *Mant. p.* 415. *Arduin. ſpec. t.* 5. *β) Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 21. *f.* 3. *an cum præcedente diſtincti generis ?*

ruellioides. 5. Ch. foliis radicalibus petiolatis ovatis ſerratis: caulinis oppoſitis amplexicaulibus, pedunculis elongatis, calicibus ciliatis. *Suppl. p.* 279. *nonne diſtincti generis planta, rudimento filamenti quinti deſtituta ?*

260. BRUNSFELSIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* tubo longiſſimo. *Filamentum* 5tum ſterile. *Capſula* exterius baccata, 1locularis, polyſperma : conceptaculo maximo.

america-na. 1. Br. foliis ellipticis acuminatis : petiolis longioribus, corollæ tubo erecto, limbo integro. *Plum. ic.* 65.

undulata. 2. Br. foliis lanceolato-ovatis utrinque attenuatis : petiolis breviſſimis, corollæ tubo curvo, limbo undulato. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 90.

749. GESNERIA. *Cal.* 5fidus, germini inſidens. *Cor.* incurva, recurvaque. *Capſ.* infera; ſubbilocularis.

ventricoſa. 1. G. foliis ellipticis acuminatis crenatis glabris, pedunculis ſubquadrifloris, calicis laciniis ſubulatis elongatis, corollis ventricoſis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 90.

pulchella. 2. G. herbacea, foliis ternatis ovatis acutis ſerratis villoſis, pedunculis axillaribus unifloris. *Brown. jam. p.* 270. *t.* 30. *f.* 1.

corymboſa. 3. G. foliis ovatis acutis ſerratis ſcarioſis aſperis, pedunculis multipartitis, floribus corymboſis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 89.

pumila. 4. G. acaulis, foliis ovato-cuneiformibus crenatis ſubſeſſilibus, pedunculis ſubunifloris, foliis brevioribus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 90.

ſcabra. 5. G. foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſcabris, pedunculis axillaribus, corollis cylindricis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 89.

exſerta. 6. G. foliis ovato-lanceolatis crenatis glabris, pedunculis trifloris, genitalibus corolla duplo longioribus, capſulis ovatis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 89.

tomentoſa. 7. G. foliis ovato-lanceolatis crenatis hirſutis, pedunculis lateralibus longiſſimis corymbiferis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 47.

acaulis. 8. G. foliis lanceolato-ovatis ſerratis ſubpetiolatis terminali- confertis, pedunculis trifloris, folio brevioribus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 102. *f.* 1.

calicina. 9. G. foliis lanceolato-ovatis acuminatis ſerratis glabris, pedunculis trifloris, genitalibus corolla longioribus, calice campanulato, capſula cylindrica. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 90.

grandis. 10. G. foliis lato-lanceolatis longiſſimis denticulatis ſuperne hirtis ſubtus ſcabris, pedunculis terminalibus, caule arboreſcente. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 89.

humilis. 11. G. foliis lanceolatis ſerratis ſeſſilibus, pedunculis ramoſis multifloris. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 104. *f.* 2.

750. ANTIRRHINUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* baſi gibba aut calcarata. *Capſ.* 2locularis, polyſperma, apice in lacinulas reflexas dehiſcens.

* *corollis calcaratis.*

† *clauſis.*

† *aphylla.*

aphyllum. 1. A. ſcapo aphyllo capillari. *Suppl. p.* 280.

†† *folioſa.*

† *foliis alternis.*

Cymbalaria. 2. A. foliis cordatis quinquelobis, caulibus procumbentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 55.

dalmaticum. 3. A. foliis cordatis amplexicaulibus. *Buxb. cent.* 1. *t.* 24.

piloſum. 4. A. foliis reniformibus piloſiſſimis, caulibus procumbentibus. *Mant. p.* 149. *Jacq. obſ. bot.* 2. *t.* 48.

reflexum. 5. A. foliis ovatis glabris, pedunculis axillaribus: fructiferis elongatis recurvis, caule procumbente. *Allion. corſ.* 205. *f.* 1.

ſpurium. 6. A. foliis ovatis villoſis, caulibus procumbentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 205.

7. A.

Elatine. 7. A. foliis haſtatis, caulibus procumbentibus. *Flor. dan. t.* 426. *Siliqua breviſſima ſpuria.*

cirrhoſum. 8. A. foliis haſtatis: petiolis paſſim cirrheſcentibus, caulibus patulis. *Mant. p.* 249. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 82.

ægyptiacum. 9. A. foliis haſtatis, caule erecto ramoſiſſimo, pedunculis rigeſcentibus.

hirtum. 10. A. foliis lanceolatis hirtis, floribus ſpicatis: foliolo calicino ſupremo maximo. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 30.

geniſtifolium. 11. A. foliis lanceolaris acuminatis, panicula virgata flexuoſa. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 244.

linifolium. 12. A. foliis lanceolatis trinerviis, floribus racemoſis: pedunculis diſtantibus bractea brevioribus. *Buxb. cent.* 1. *t.* 25. *f.* 2.

Linaria. 13. A. foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis. *) *Knorr del. hort.* 2. *t.* L. 6. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7.

chalepenſe. 14. A. foliis lineari-lanceolatis, floribus racemoſis, calicibus corolla longioribus, caule erecto. *Riv. monop. t.* 80. *f.* 2.

junceum. 15. A. foliis linearibus, caule paniculato virgato, floribus racemoſis.

pedunculatum. 16. A. foliis linearibus remotis, floribus paniculatis: pedunculis folio longioribus ſtrictis.

minus. 17. A. foliis plurimis alternis lanceolatis obtuſis, caule ramoſiſſimo diffuſo. *Flor. dan. t.* 502. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 1.

† † *foliis oppoſitis.*

peliſſerianum. 18. A. foliis caulinis linearibus alternis: radicalibus lanceolatis ternis, floribus corymboſis. *Mant. p.* 416. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 4.

---

*) PELORIA *Amœn. acad.* 1. *p.* 55. *t.* 3. LINARIÆ *proles hybrida, ejuſdemque qualitatis & conſtans, radicibus infinite ſeſe multiplicans charactere fructificationis diverſiſſima corolla regulari, quinquecorniculata pentandra, ut genus proprium abſolute conſtitueret & diſtinctiſſimum, niſi fructus frequentiſſime abortiret. Naturæ prodigium. Ita quidem a Linné. Veriſimilior autem videtur ea opinio, quæ peloriam pro peculiari degeneratione monſtroſa floris habet, in quam inclinare hoc genus præ aliis, ſimilis a forma deflexio in aliis ſpeciebus e. g. ſpurio, Elatine, Cymbalaria, obſervata, teſtatur. Murr. Goett. gel. Anz.* 1774. *n.* 121. *Lyck Annal. Naturg.* 1. *p.* 32.

Hælava. 19. A. foliis linearibus alternis: infimis ternis, floribus racemoſo-capitatis: galea bifida, labio tridentato. *Forſk. fl. æg. arab. p.* 111.

viſcoſum. 20. A. foliis caulinis linearibus alternis: radicalibus lanceolatis quaternis, calicibus villoſis cauli approximatis.

ſaxatile. 21. A. foliis lanceolato-linearibus ſparſis villoſis: inferioribus quaternis, caule decumbente, floribus ſpicatis. *Mant. p.* 416.

origanifolium. 22. A. foliis (plurimis) oppoſitis oblongis, floribus alternis. *Barr. pl. rar. ic.* 598.

triſte. 23. A. foliis linearibus ſparſis: inferioribus oppoſitis, nectariis ſubulatis, floribus ſubſeſſilibus. *Mill. h. angl. t.* 166.

villoſum. 24. A. foliis ovatis villoſis, caulibus ſimplicibus, floribus oppoſitis lateralibus. *Barr. pl. rar. ic.* 597.

macrocarpon. 53. A. foliis ovatis ſerratis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris, capſulis compreſſis carinatis truncatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 335.

bicorne. 25. A. foliis ovato-oblongis ſerratis, caule erecto, floribus racemoſis, capſulis bicornibus. *Burm. afr. t.* 75. *f.* 3.

hexandrum. 26. A. foliis cordato-ovatis ſerratis, pedunculis axillaribus unifloris. *Forſt. flor. auſtr. p.* 43.

pinnatum. 27. A. foliis pinnatifidis, caule erecto, floribus racemoſis. *Suppl. p.* 280.

verſicolor. 28. A. foliis lineari-lanceolatis: inferioribus ternis, caule erecto ſpicato. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 31.

ſparteum. 29. A. foliis ſubulatis canaliculatis carnoſis: inferioribus ternis, caule paniculato corolliſque glaberrimis.

triphyllum. 30. A. foliis ternis ovatis. *Bocc. ſic. t.* 22. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7. H.

viſcoſum. 31. A. foliis radicalibus quaternis lanceolatis: caulinis linearibus alternis, calicibus villoſis cauli approximatis.

arvenſe. 32. A. foliis ſublinearibus: inferioribus quaternis, calicibus piloſo-viſcidis, floribus ſpicatis, caule erecto. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 5.

bipunctatum. 33. A. foliis linearibus glabris: inferioribus quaternis, caule erecto paniculato, floribus ſpicato-capitatis.

repens. 34. A. foliis linearibus confertis: inferne quaternis, calicibus capſulam æquantibus. *Dill. h. Elth. t.* 163. *f.* 197.

aeragineum. 54. A. foliis linearibus inferioribus quaternis, floribus racemoſis: calicis lacinia ſuprema ceteris duplo longiori. *Gouan. illuſtr.*

ſupinum. 35. A. foliis ſubquaternis linearibus, caule diffuſo, floribus racemoſis: calcari recto.

purpureum. 36. A. foliis quaternis linearibus, caule erecto ſpicato. *Mant. p.* 416. *Rivin. monop. t.* 85. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7. k.

alpinum. 37. A. foliis quaternis lineari-lanceolatis glaucis, caule diffuſo, floribus racemoſis: calcari recto. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 58.

triornithophorum. 38. A. foliis quaternis lanceolatis, caule erecto ramoſo, floribus pedunculatis. *Herm. par. Lugdb. t.* 377.

glaucum. 39. A. foliis quaternis ſubulatis carnoſis, caulibus erectis, floribus ſpicatis. *Buxb. cent.* 4. *t.* 37.

multicaule. 40. A. foliis quinis linearibus carnoſis, floribus capitatis. *Bocc. ſic. t.* 19. *f.* 1.

monſpeſſulanum. 41. A. foliis linearibus confertis, caule nitido paniculato, pedunculis ſpicatis nitidis.

flavum. 42. A. foliis inferioribus ternis ſubovatis: ſuperioribus ſparſis linearibus. *Poir. voy. en Barbar.* 2. *p.* 191. *Corollæ intenſe flavæ.*

virgatum. 43. A. foliis ovato-lanceolatis ſparſis: inferioribus ternis, caule ſimpliciſſimo. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 192.

† † † *foliis ſparſis.*

lagopodioides. 44. A. foliis mollibus apice recurvis, ſpicis ovatis villoſis. *Suppl. p.* 279.

pinifolium. 45. A. foliis filiformibus, floribus ſpicatis: pedunculis calicibuſque hirſutis. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 193.

⊥⊥ *corollis hiantibus.*

bellidifolium. 46. A. foliis radicalibus lingulatis dentatis lineatis, caulinis partitis integerrimis. *Mant. p.* 417.

canadenſe. 47. A. foliis linearibus alternis, corollæ labio inferiore explanato.

** *corollis ecaudatis.*

unilabia-tum. 48. A. caule paniculato, foliis alternis pinnatis, corollæ callis duobus. *Suppl. p.* 279.

molle. 49. A. caulibus procumbentibus, foliis oppoſitis ovatis tomentoſis. *Barr. pl. rar. ic.* 598.

Aſarina. 50. A. caulibus procumbentibus, foliis oppoſitis cordatis crenatis. *Lob. ic.* 601.

papilionaceum. 51. A. foliis carnoſis, floribus axillaribus: calicibus papilionaceis. *Mant. p.* 86.

Orontium. 52. A. floribus ſubſpicatis: calicibus corolla longioribus. *Curt. flor. Lond. t.* 234. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7. H.

majus. 53. A. floribus ſpicatis: calicibus rotundatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* L. 12. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 7. G.

751. CYMBARIA. *Cal.* 10dentatus. *Capſ.* ovata, 2locularis.

daurica. 1. CYMBARIA. *Amm. ruth.* 47. *t.* 1. *f.* 2. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 12.

1407. THUNBERGIA. *Cal.* duplex: exterior 2-phyllus; interior multipartitus. *Capſ.* globoſa, roſtrata, 2locularis.

capenſis. 1. THUNBERGIA. *Suppl. p.* 292. *Retzius act. Lund.* 1. *p.* 163. *ic.*

752. CRANIOLARIA. *Cal.* duplex: *perianth.* 4-phyllum; *ſpatha* 1phylla. *Cor.* tubus longiſſimus. *Capſ.* lignoſa, corticata: roſtro hamato, 3locularis, 2valvis.

fruticoſa. 1. Cr. foliis lanceolatis dentatis. *Plum. gen. t.* 137. *an Geſneriæ jungenda?*

annua. 2. Cr. foliis cordatis angulatis, calice exteriore diphyllo. *Mant. p.* 417. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 166. *an Martyniæ potius ſpecies ?*

753. MARTYNIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* campanulata. *Rudimentum* filamenti 5ti. *Capſ.* lignoſa, corticata; roſtro hamato, 2valvis.

perennis. 1. M. caule ſimplici, foliis ſerratis. *Ehret pl. ſel. t.* 9. *f.* 1.

longiflora. 2. M. caule ſimplici, foliis orbiculatis repandis. *Meerburgh Afbeeld. t.* 7.

annua. 3. M. caule ramoſo, foliis cordato-orbiculatis dentatis. *Ehret pl. ſel. t.* 1. *f.* 5.

proboſcidea. 4. M. caule ramoſo, foliis cordato-ovatis integerrimis, capſulæ roſtro longiſſimo. *Schmidel icon pl. & anal. t.* 12. 13. *Gaertn. de fr. & ſem. faſc.* 7. *t.* 110. *f.* 1.

754. TORENIA. *Cal.* 2labiatus: labio ſuperiori 3cuſpide. *Filamenta* inferiora ramulo ſterili. *Capſ.* 2locularis.

aſiatica. 1. TORENIA. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 53.

755. BESLERIA. *Cal.* 5partitus. *Bacca* ſupera, 1locularis, ſubgloboſa, polyſperma.

melittifolia. 1. B. pedunculis ramoſis, foliis ovatis. *Plum. ic.* 48.

lutea. 2. B. pedunculis ſimplicibus confertis, foliis lanceolatis. *Plum. ic.* 49. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 2. *t.* 52. *f.* 2.

criſtata. 3. B. pedunculis ſimplicibus ſolitariis, calicibus ſerrato-criſtatis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 180.

bivalvis. 4. B. calicibus bivalvibus laceris. *Suppl. p.* 283.

violacea. 5. B. caule ſcandente, foliis ovatis acutis integerrimis, floribus ſpicatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 630. *t.* 254.
β) Beſleria cærulea. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 631.

coccinea. 6. B. caule ſcandente, foliis ovato-acuminatis involucro diphyllo, calicibus coccineis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 632. *t.* 255.

incarnata. 7. B. foliis ovatis crenatis utrinque tomentoſis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 635. *t.* 256.

MONTIRA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* tubo ventricoſo, incurvo; limbo 5lobo. *Germen* 2dymum. *Capſ.* 2ventricoſa, 2-locularis, 4valvis, polyſperma.

guianenſis. 1. MONTIRA. *Aubl. pl. guj.* 1. *p.* 637. *t.* 257.

CONOBEA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* ringens, 2labiata: labio 3fido. *Stigma* 2lobum. *Capſ.* 1locularis, 4valvis, polyſperma.

aquatica. 1. CONOBEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 639. *t.* 257.

MYOPORUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata: limbo patente ſubæquali 5-partito. *Bacca* 1-2ſperma: ſeminibus 2locularibus.

lætum. 1. M. foliis oblongis apice ſubſerratis lævibus glabris nitidis, corollis hirſutis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 44.

craſſifolium. 2. M. foliis oblongis ſubſerratis carnoſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 44.

pubeſcens. 3. M. foliis oblongo-ellipticis ſerratis pubeſcentibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 44.

tenuifolium. 4. M. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, corollis brevibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 44.

NEMIA. *Cal.* 5partitus, ſuperus. *Cor.* infundibuliformis: limbo ſubæquali, 5partito. *Capſ.* 2locularis, 2valvis.

capenſis. 1. NEMIA. *Berg. fl. cap. p.* 160.

GALVESIA. *Cal.* 5fidus, parvus. *Cor.* tubuloſa, baſi ſubventricoſa: galea 2loba; labio 3partito. *Capſ.* globoſa, 2locularis.

fruticoſa. 1. GALVESIA. *Juſſieu gen. plant. p.* 119.

756. **SCROPHULARIA.** *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5partita: tubo globoſo; lacinia infima reflexa. *Capſ.* 2locularis, diſſepimento duplicato.

marilandica. 1. Scr. foliis cordatis ſerratis acutis baſi rotundatis, caule obtuſangulo. *Kniph. bot. orig. cent.* 2. *n.* 80.

Scorodonia. 2. Scr. foliis cordatis duplicato-ſerratis, racemo compoſito foliis interſtincto. *Plukn. alm. t.* 59. *f.* 5.

glabrata. 20. Scr. foliis oblongo-lanceolatis cordatis duplicato-ſerratis glabris, paniculis racemoſis terminalibus trichotomis, caule ſuffruticoſo. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 341.

arguta. 21. Scr. foliis cordatis glabris duplicato-ſerratis, paniculis axillaribus dichotomis, capſulis acuminatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 342.

altaica. 3. Scr. foliis cordatis duplicate ſerrato-dentatis ovatis: dentibus baſin reſpicientibus, racemo compoſito aphyllo. *Murray comm. Goett.* 1781. *p.* 35. *t.* 2.

betonicifolia. 4. Scr. foliis cordatis oblongis dentatis: dentibus integerrimis, baſeos profundioribus. *Mant. p.* 87. *Barr. pl. rar. ic.* 274.

nodoſa. 5. Scr. foliis cordatis trinervatis, caule obtuſangulo. *Blackw. herb. t.* 87.

aquatica. 6. Scr. foliis cordatis obtuſis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Flor. dan. t.* 507. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 8.

auriculata. 7. Scr. foliis cordatis ſubtus tomentoſis baſi appendiculatis, racemis terminalibus. *Lob. ic.* 533.

vernalis. 8. Scr. foliis cordatis: caulinis ternis, pedunculis axillaribus ſolitariis bifidis. *Flor. dan. t.* 411.

peregrina. 9. Scr. foliis cordatis lineatis lucidis, pedunculis axillaribus bifloris, caule ſexangulari. *Mant. p.* 418. *Cam. hort. t.* 43.

orientalis. 10. Scr. foliis lanceolatis ſerratis petiolatis: caulinis ternis, ramis oppoſitis. *Kniph. bot. orig. cent.* 5. *n.* 80.

ſinenſis. 11. Scr. foliis ovato-oblongis ſerratis pubeſcentibus. *Mant. p.* 250.

meridionalis. 12. Scr. foliis oblongo-ovatis ſerratis glabris, pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 280.

coccinea. 13. Scr. foliis quaternis ovatis, floribus verticillatis ſpicatis.

frutescens. 14. Scr. foliis ſubcarnoſis ſeſſilibus lævibus apice recurvis. *Mant. p.* 418. *Herm. par. Lugdb. t.* 547.

trifoliata. 15. Scr. foliis glabris: inferioribus ternato-pinnatis obtuſis; ſuperioribus ſimplicibus, pedunculis ſubtrifloris axillaribus. *Pluckn. alm. t.* 313. *f.* 6.

ſambucifolia. 16. Scr. foliis interrupte pinnatis cordatis inæqualibus, racemo terminali: pedunculis axillaribus geminis dichotomis. *Mill. h. angl. t.* 231.

viridiflora. 17. Scr. foliis glabris interrupte pinnatis: pinnis ovato-oblongis ſerratis, racemo terminali ſubnudo longiſſimo. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 194.

lucida. 18. Scr. foliis inferioribus bipinnatis ſubramoſis glaberrimis, racemis bipartitis. *Tournef. it.* 1. *t.* 85.

canina. 19. Scr. foliis pinnatifidis, racemo terminali nudo: pedunculis bifidis. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 90.

757. CELSIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* rotata, ſemiquinquefida. *Filamenta* extrorſum lanata. *Capſ.* 2locularis.

orientalis. 1. C. foliis bipinnatis. *H. Upſ. t.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 7.

Arcturus. 2. C. foliis radicalibus lyrato pinnatis, pedunculis flore longioribus. *Mant. p.* 339. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 170. Verbaſcum Arcturus. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 117.

cretica. 3. C. foliis radicalibus lyratis: caulinis ſubcordatis amplexicaulibus, floribus ſubſeſſilibus. *Suppl. p.* 281. *Mill. ic. t.* 273.

linearis. 4. C. foliis lineari-lanceolatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 270. *pl. rar. ic. cent.* 2. *faſc.* 1. *t.* 13

1405. HEMIMERIS. *Cal.* 5partitus. *Cor.* rotata: *lacinia* una majore obcordata. *Foſſula* laciniarum nectarifera.

montana. 1. H. diandra, foliis oppoſitis ovatis ſerratis, caule erecto. *Suppl. p.* 280.

ſabuloſa. 2. H. diandra, foliis oppoſitis pinnatifidis, caule proſtrato. *Suppl. p.* 280.

diffuſa. 3. H. foliis alternis oppoſitiſque pinnatifidis, caule patulo. *Suppl. p.* 280.

MATUREA. *Cal.* 4partitus. *Cor.* 2labiata: labio ſuperiori 2fido; inferiori 3fido. *Stigm.* 2lamellatum. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, polyſperma.

pratenſis. 1. MATUREA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 642. *t.* 259. *an diſtincti generis?*

758. DIGITALIS. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata: 5fida, ventricoſa. *Capſ.* ovata, 2locularis, polyſperma.

purpurea. 1. D. calicis foliolis ovatis acutis, corollis obtuſis: labio ſuperiori integro. *Flor. dan. t.* 74. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 6.

minor. 2. D. calicis foliolis ovatis acutis, corollis obtuſis: labio ſuperiori ſubbilobo, foliis lævibus. *Mant. p.* 567.

Thapſi. 3. D. calicis foliolis ovatis acutis, foliis decurrentibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1185.

obſcura. 4. D. calicis foliolis ovatis acutiuſculis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis baſi adnatis. *Mant. p.* 418. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 91.

ferruginea. 5. D. calicis foliolis ovatis obtuſis patentibus, corollarum labio inferiori barbato. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 86.

lutea. 6. D. calicis foliolis lanceolatis, corollis acutis; labio ſuperiori bifido. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 105.

ambigua. 7. D. calicis foliolis lanceolatis, corollis galea emarginata, foliis ſubtus pubeſcentibus. *Suppl. p.* 282. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 57.

canarienſis. 8. D. calicis foliolis lanceolatis, corollis bilabiatis acutis, caule fruticoſo. *Mill. h. angl. t.* 120.

Sceptrum. 9. D. calicis foliolis ſubulatis, corollis quadrifidis, foliis oblongis ſpatulatis ſerratis, ſpicis terminalibus ovatis pedunculatis coma bracteārum terminatis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 282. *Herit. ſert. angl. t.* 24.

TOURRETTIA. *Cal.* 2labiatus. *Cor.* 2labiata: tubo inæquali, ventricoſo. *Rudimentum* ſæpe filamenti 5ti. *Capſ.* 4locularis, hiſpida, ungue elaſtico terminata. *Semina* alata, imbricata.

volubilis. 1. Tourrettia. *Fougeroux de Bonderoy act. Pariſ. ann.* 1784. *p.* 200. *t.* 1.

759. BIGNONIA. *Cal.* 5fidus, cyathiformis. *Cor.* fauce campanulata, 5fida, ſubtus ventricoſa. *Capſ.* ſiliquoſa 2locularis. *Sem.* membranaceo-alata.

* *foliis ſimplicibus.*

Catalpa. 1. B. foliis ternis cordatis, caule erecto, floribus diandris. *Catesb. Car.* 1. *t.* 29.

tomentoſa. 2. B. foliis cordatis ſubtus tomentoſis, floribus axillaribus paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 262. *Kaempf. am. exot.* 5. *p.* 859. 860. *ic.*

ſempervirens. 3. B. foliis lanceolatis, caule volubili. *Catesb. Car.* 1. *t.* 53. *Jacq. coll.* 3. *p.* 259. *an forſan diſtincti generis?*

citrifolia. 30. B. foliis ovato-lanceolatis: petiolo alato, caule ſcandente. *Barrel. fr. equin.* 23.

longiſſi-ma. 4. B. arborea, foliis oblongis acuminatis, floribus diandris, capſulis filiformibus; ſeminibus lanatis. *Jacq. ſtirp. amer. p.* 182. *t.* 176. *f.* 78.

** *foliis compoſitis.*

unguis. 5. B. foliis conjugatis: cirrho breviſſimo arcuato tripartito. *Pluckn. alm. t.* 163. *f.* 2.

dichotoma. 31. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis ovatis; imis ternatis, floribus racemoſis: pedunculo communi dichotomo. *Jacq. am. p.* 183.

æquinoctialis. 6. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis ovato-lanceolatis, pedunculis bifloris, capſulis linearibus. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 85.

paniculata. 7. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis cordato-ovatis, floribus racemoſis, pedunculis trifloris. *Jacq. ſtirp. am. pict. t.* 175.

pubeſcens. 8. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis cordato-ovatis ſubtus pubeſcentibus.

crucigera. 9. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis cordatis, caule muricato. *Plum. ic. t.* 58.

capreolata. 10. B. foliis conjugatis cirrhoſis: foliolis cordato-lanceolatis, foliis imis ſimplicibus. *Du Hamel arbr.* 1. *t.* 40.

alliacea. 11. B. foliis conjugatis: foliolis ellipticis integris coriaceis, pedunculis quinquefloris axillaribus: calicibus integris. *Aubl. guj. p.* 659. *n.* 14.

echinata. 12. B. foliis inferioribus ternatis: ſuperioribus conjugatis; petiolis dichotomis cirrhoſis, capſulis echinatis. *Aubl. guj.* 2. *t.* 263. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 3. *t.* 52. *f.* 1.

incarnata. 13. B. foliis inferioribus ternatis: ſuperioribus conjugatis, petiolis cirrhigeris, capſulis glabris. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 645. *t.* 261.

Kerere. 14. B. foliis binatis ternatiſque, floribus corymboſis axillaribus, capſulis ovatis ſubcompreſſis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 644. *t.* 260.

triphylla. 15. B. foliis ternatis: foliolis ovatis acuminatis, caule fruticoſo erecto.

alba. 16. B. foliis ternatis: foliolis ovatis acuminatis, caule ſcandente. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 653. *t.* 266.

fluviatilis. 17. B. foliis digitatis: foliolis ovato-oblongis glabris integerrimis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 655. *t.* 267.

penta-phylla. 18. B. foliis digitatis : foliolis integerrimis obovatis. *Cateſb. Car.* 1. *t.* 37.

Leucoxylon. 19. B. foliis digitatis : foliolis integerrimis ovatis acuminatis. *Pluckn. alm. t.* 200. *f.* 4. *β?*) Bignonia orbiculata. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 262. *f.* 77.

radiata. 20. B. foliis digitatis : foliolis pinnatifidis. *Feuill. peruv.* 1. *t.* 22.

radicans. 21. B. foliis pinnatis : foliolis inciſis, caule geniculis radicatis. *Mill. h. angl.* 65. *β*) *Cateſb. Car.* 1. *t.* 65.

ſtans. 22. B. foliis pinnatis : foliolis ſerratis, caule erecto firmo, floribus racemoſis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 176.

grandiflora. 23. B. foliis pinnatis : foliolis ovatis acuminatis ſerratis, caule volubili, calice ſemiquinquefido. *Thunb. flor. jap. p.* 253. *Banks ic. Kaempf. t.* 21.

Chelonoides. 24. B. foliis impari-pinnatis : foliolis ovatis integerrimis acuminatis pubeſcentibus, floribus barbatis ſemipentandris. *Suppl. p.* 282.

ſpathacea. 25. B. foliis impari-pinnatis : foliolis ovatis hirtis, calice monophyllo ſpathaceo, corolla hypocrateriformi. *Suppl. p.* 283.

peruviana. 26. B. foliis decompoſitis : foliolis inciſis, caule geniculis cirrhoſis.

indica. 27. B. foliis bipinnatis : foliolis integerrimis ovatis acuminatis. *Rheed. h. malab.* 1. *t.* 43. 45.

cærulea. 28. B. foliis bipinnatis : foliolis lanceolatis integris. *Cateſb. Car.* 1. *t.* 42.

Copaja. 29. B. foliis bipinnatis : foliolis ovatis feſſilibus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 650. *t.* 265. *an ſatis diſtincta ab indica?*

760. CITHAREXYLUM. *Cal.* 5dentatus, campanulatus. *Cor.* infundibuliformi-rotata : laciniis æqualibus ſupra villoſis. *Bacca* 2pyrena : oſſiculis 2locularibus.

cinereum. 1. C. ramis teretibus, racemis lateralibus, calicibus dentatis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 178.

erectum. 2. C. ramis teretibus, racemis erectis terminalibus, calicibus dentatis. *Brown. jam. t. 28. f. 2.*

caudatum. 3. C. ramis teretibus, calicibus truncatis.

villoſum. 4. C. ramis teretibus: junioribus tetragonis; novellis villoſis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 1. t. 82.*

quadrangulare. 5. C. ramis tetragonis, racemis erectis. *Jacq. h. Vind. 1. t. 22.*

ſubſerratum. 6. C. ramis tetragonis, racemis axillaribus nutantibus, calicibus dentatis, foliis ellipticis ſubſerratis venoſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p. 91.*

Melanocardium. 7. C. ramis tetragonis, racemis terminalibus compoſitis, floribus tetrandris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p. 91.*

paniculatum. 8. C. floribus paniculatis. *Gaertn. de fr. & ſem. cent. 4. t. 56. f. 8.*

761. HALLERIA. *Cal.* 3fidus. *Cor.* 4fida, filamentis brevior. *Bacca* infera, 2locularis.

lucida. 1. HALLERIA. *Burm. afr. t. 89. f. 3. β) Burm. afr. t. 89. f. 1.*

TANÆCIUM. *Cal.* cylindricus, truncatus. *Cor.* tubuloſa, ſubæqualis, 5fida. *Rudimentum* filamenti quinti. *Bacca* corticoſa maxima.

Jaroba. 1. T. foliis inferioribus ternatis; ſuperioribus geminatis; cirrhis interpetiolaribus terminalibus, caule ſcandente. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p. 92.*

paraſiticum. 2. T. foliis ovatis coriaceis, caule ſcandente fruticoſo radicante. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p. 92.*

762. CRESCENTIA. *Cal.* 2partitus, æqualis. *Cor.* gibba. *Bacca* pedicellata, 1locularis. *Semina* multa 2locularia.

Cujete. 1. Cr. foliis cuneato-lanceolatis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t. 167.*

cucurbitina. 2. Cr. foliis lanceolato-ovatis. *Mant. p.* 250. *Pluckn. alm.* *t.* 171. *f.* 2.

pinnata. 3. Cr. foliis pinnatis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 203. *t.* 18.

763. GMELINA. *Cal.* obſolete 4dentatus. *Cor.* 4-fida, campanulata. *Antheræ* 2 2partitæ, 2 ſimplices. *Drupa* baccata: *putamine* 3loculari; loculamento inferiori ſterili.

aſiatica. 1. Gm. ſpinis oppoſitis horizontalibus. *Rumpf amb.* 1. *t.* 40. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 5.

coromandelica. 2. Gm. ſpinis oppoſitis erectiuſculis. *Sloan. jam. t.* 207. *f.* 1.

indica. 3. Gm. ſpinis alternis folio longioribus. *Burm. fl. ind. p.* 132.

764. PETREA. *Cal.* 5partitus, maximus, coloratus. *Cor.* rotata. *Capſ.* 2locularis in fundo calicis. *Sem.* ſolitaria.

volubilis. 1. PETREA. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 173.

1316. PREMNA. *Cal.* campanulatus, integerrimus, aut obſolete 2lobus, vel obiter 4dentatus. *Cor.* 4fida. *Drupa* baccata: putamine 4loculari. *Semina* ſolitaria.

integrifolia. 1. Pr. foliis integerrimis. *Mant. p.* 252. *Burm. ind. t.* 41. *f.* 1.

ferratifolia. 2. Pr. foliis ſerratis. *Mant. p.* 253. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 6.

GALIPEA. *Cal.* 4-5angulus, 4-5dentatus. *Cor.* 4-5fida: tubo brevi. *Filam.* 2 ſterilia, 2 fertilia. *Germen* 4-5gonum. *Stigma* 4partitum. *Peric.* - - -

trifoliata. 1. GALIPEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 662. *t.* 269.

AMBULIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* tubuloſa, 4fida: laciniis inæqualibus. *Capſ.* 5gona, 1locularis, 1ſperma.

monoſperma. 1. AMBULIA. *la Marck encycl.* 1. *p.* 128.

765. LANTANA. *Cal.* obſolete 4dentatus. *Cor.* limbus ſubquadrifidus inæqualis. *Stigma* uncinato-refractum. *Drupæ congregatæ* (plurimis) 3loculares, loculamento inferiori ſterili.

ſalvifolia. 1. L. foliis oppoſitis ſubſeſſilibus, floribus racemoſis. *Mant. p.* 419.

aculeata. 2. L. foliis oppoſitis, caule aculeato ramoſo, ſpicis hemiſphæricis. *Mant. p.* 419. *Pluckn. alm. t.* 233. *f.* 5. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 4.

Camara. 3. L. foliis oppoſitis, caule inermi ramoſo, floribus capitato-umbellatis aphyllis. *Dill. h. Elth. t.* 56. *f.* 65.

annua. 4. L. foliis oppoſitis, caule inermi herbaceo, ſpicis oblongis. *Mant. p.* 419. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 195.

miſta. 5. L. foliis oppoſitis acuminatis, floribus capitatis: involucris longitudine florum. *Dill. h. Elth. t.* 56. *f.* 64.

Radula. 6. L. foliis oppoſitis ovatis acutis ſerratis rugoſis aſperis ſubhirſutis, caule ſubinermi aſpero, capitulis oblongis: bracteis ovatis acutis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 92.

ſtricta. 7. L. foliis oppoſitis oblongo-lanceolatis acutis, caule inermi, capitulis ſubrotundis: bracteis ovato-lanceolatis ſquarroſis. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 195. *f.* 4.

meliſſæfolia. 8. L. foliis oppoſitis ovato-oblongis villoſis mollibus, caule aculeato, ſpicis hemiſphæricis: bracteis tubo dimidio brevioribus. *Dill. h. Elth. t.* 57. *f.* 66.

ſcabrida. 9. L. foliis oppoſitis ovato-ellipticis ſcabris, caule aculeato, ſpicis hemiſphæricis; bracteis tubo dimidio brevioribus lanceolatis acutis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 352.

viburnoides. 14. L. foliis oppoſitis ovato-lanceolatis, caule inermi, floribus capitato-ſpicatis, involucris lanceolatis. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 117. Charaſtera viburnoides. *β*) Charactera tetragona. *Forsk.* l. m. c.

odorata. 10. L. foliis oppoſitis ternisque lanceolato-ellipticis, caule inermi.

involucrata. 11. L. foliis oppoſitis ternisque cuneato-obovatis obtuſis lineatis tomentoſis, capitulis ſquarroſis. *Medic. act. palat.* 3. *phyſ. t.* 16. *an proprii generis?*

trifolia. 12. L. foliis ternis, ſpicis oblongis imbricatis. *Plum. ic.* 70.

africana. 13. L. foliis alternis ſeſſilibus, floribus ſolitariis. *Commel. rar. t.* 6. *an diſtincti generis? Drupa 2locularis: loculis 1pyrenis.*

NEPHRANDRA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* galea trifida: media involuta; labium 2fidum. *Drupa* nuce 2loculari: loculis 1ſpermis.

dubia. 1. NEPHRANDRA. *Willden. ap. Cothen. diſp. pl. meth. p.* 8.

766. CORNUTIA. *Cal.* 5dentatus. *Stamina* corolla longiora. *Stil.* longiſſimus. *Bacca* 1ſperma.

pyramidata. 1. CORNUTIA. *Plum. ic.* 106. *f.* 1.

767. LOESELIA. *Cal.* tubuloſus, 4fidus. *Cor.* profunde 5fida: laciniis oblongis ciliatis. *Rudimentum* ſtaminis 5ti. *Capſ.* 3locularis, apice dehiſcens.

ciliata. 1. LOESELIA. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 62. *f.* 3.

768.

768. **CAPRARIA.** *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata, 5fida, acuta. *Stigma* 2valve. *Capſ.* 2locularis, polyſperma.

biflora. 1. C. foliis alternis, floribus geminis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 174. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 9.

lucida. 2. C. foliis oppoſitis oblongis acutis argute ſerrulatis lævibus alatis, pedunculis trifloris. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 353.

undulata. 3. C. foliis alternis ovatis undulatis, racemis ſecundis. *Suppl. p.* 284. *Herit. ſert. angl. t.* 25.

durantifolia. 4. C. foliis ternis dentatis, pedunculis ſolitariis, ramis alternis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 124. *f.* 2.

uniflora. 8. C. foliis oppoſitis cordatis, floribus ſolitariis. *Burm. ind. t.* 19. *f.* 3.

lanceolata. 5. C. foliis oppoſitis lanceolatis, corymbo terminali compoſito. *Suppl. p.* 284.

cruſtacea. 6. C. repens, foliis oppoſitis ovatis ſubpetiolatis crenatis. *Mant. p.* 87. *Rumpf amb.* 5. *t.* 170. *f.* 3. *an Linderniæ ſpecies ?*

humilis. 7. C. pubeſcens, foliis oppoſitis ternisve ovatis ſerratis petiolatis, pedunculis axillaribus petiolo brevioribus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 354.

1315. **LINDERNIA.** *Cal.* 5partitus. *Cor.* ringens: labio ſuperiori breviſſimo. *Stam.* 2 inferiora dente terminali antheraque ſublaterali. *Capſ.* 1locularis.

pyxidaria. 1. L. foliis ovalibus integerrimis ſeſſilibus, pedunculis ſolitariis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 419. Capraria gratioloides. *Lindern fl. alſat. t.* 1. 2.

japonica. 2. L. foliis obovatis dentatis: infimis petiolatis. *Thunb. flor. jap. p.* 253.

dianthera. 3. L. foliis petiolatis ovato-ſubrotundis ſubſerratis, caule repente. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 92.

769. SELAGO. *Cal.* 5fidus. *Cor.* tubus filiformis: limbus ſubæqualis. *Sem.* 2 nuda, inverſa.

corymboſa. 1. S. corymbo multiplici, floribus diſjunctis, foliis filiformibus faſciculatis. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 40.

faſciculata. 2. S. corymbo multiplici, foliis obovatis glabris ſerratis. *Mant. p.* 250. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 3. *t.* 51. *f.* 6. *Jacq. coll.* 3. *p.* 246.

cinerea. 3. S. corymbo compoſito, foliis linearibus faſciculatis glabris: margine reflexo. *Suppl. p.* 285.

rotundifolia. 4. S. corymbo compoſito, foliis ovatis glabris obtuſis. *Suppl. p.* 285.

polyſtachya. 5. S. corymbo ſpicis faſciculatis, foliis filiformibus aggregatis. *Mant. p.* 250.

coccinea. 6. S. ſpicis corymboſis, foliis inferioribus linearibus integerrimis: ſuperioribus lanceolato-ſubulatis ſubdentatis.

ſpuria. 7. S. ſpicis corymboſis, foliis linearibus denticulatis. *Burm. afr. t.* 42. *f.* 3.

rapunculoides. 8. S. ſpicis corymboſis, foliis dentatis. *Burm. afr. t.* 42. *f.* 1.

ſerrata. 20. S. ſpicis corymboſis, foliis oppoſitis cuneiformibus obtuſis ſerratis glabris decurrentibus. *Berg. flor. cap.*

ſtricta. 21. S. ſpicis paniculatis ſubrotundis, foliis faſciculatis filiformibus hirſutis. *Berg. flor. cap.*

verbenacea. 9. S. ſpicis faſciculatis, foliis oblongis glabris, caule tetragono rectangulo. *Suppl. p.* 285.

hirta. 10. S. hirta, ſpicis longiſſimis, foliis obovatis. *Suppl. p.* 285.

geniculata. 11. S. ſpicis terminalibus, foliis linearibus faſciculatis glabris margine reflexo. *Suppl. p.* 284.

triquetra. 12. S. ſpicis terminalibus, foliis triquetris imbricatis recurvato-reflexis glabris. *Suppl. p.* 284.

hiſpida. 13. S. ſpicis terminalibus, foliis linearibus ſparſis reflexis hiſpidis. *Suppl. p.* 284.

polygaloides. 14. S. ſpicis terminalibus: bracteis calicibusque carinatis, foliis linearibus glabris: margine reflexo. *Suppl. p.* 284.

fastigiata. 15. S. ſpicis terminalibus, foliis filiformibus faſciculatis glabris. *Suppl. p.* 284.

ciliata. 16. S. floribus ſpicatis, foliis ovatis ciliatis acutis. *Suppl. p.* 285.

divaricata. 17. S. capitulis terminalibus, foliis filiformi-linearibus faſciculatis glabris. *Suppl. p.* 284.

fruticoſa. 18. S. capitulis ſubrotundis terminalibus, foliis ſparſis linearibus obtuſis integerrimis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 87.

capitata. 19. S. capitulo terminali, foliis faſciculatis linearibus carnoſis glabris. *Mant. p.* 568. *an cum univerſo genere gymnoſpermis accenſenda ?*

1264. MANULEA. *Cal.* 5partitus *Cor.* ſubinfundibuliformis: limbo 5partito; laciniis ſubulatis, ſuperioribus 4 magis connexis. *Capſ.* 2locularis, polyſperma.

Cheiranthus. 1. M. foliis nudis, caulibus ſubaphyllis, pedicellis alternis unifloris. *Mant. p.* 88.

tomentoſa. 2. M. foliis tomentoſis, caulibus folioſis, pedunculis multifloris. *Mant. p.* 420. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 419. Selago tomentoſa.

microphylla. 3. M. foliis ovatis faſciculatis glabris integris. *Suppl. p.* 285.

integrifolia. 4. M. foliis ovatis ſparſis glabris integris. *Suppl. p.* 285.

plantaginis. 5. M. foliis ovatis ſubdentatis integriſque glabris, capitulis ovatis, ramis diffuſis. *Suppl. p.* 285.

capitata. 6. M. foliis ovatis ſerratis villoſis, capitulis globoſis, ramis diffuſis. *Suppl. p.* 285.

antirrhinoides. 7. M. foliis ovatis dentatis glabris, floribus alternis. *Suppl. p.* 285.

pinnatifida. 8. M. foliis ovatis inciſo-pinnatifidis: pinnis dentatis. *Suppl. p.* 286.

cuneifolia. 9. M. foliis elliptice ovatis glabris dentatis, ſpicis oblongis. *Suppl. p.* 285.

thyrſiflora. 10. M. foliis obovatis tomentoſis dentatis corymbo terminali elongato compoſito. *Suppl. p.* 285.

argentea. 11. M. foliis obovatis cuneiformibus ſerratis argenteo-punctatis, floribus axillaribus. *Suppl. p.* 286.

capillaris. 12. M. foliis caulinis obovatis glabris dentatis; rameis linearibus, ſpicis ovatis. *Suppl. p.* 285.

heterophylla. 13. M. foliis linearibus ſparſis villoſis integris dentatiſve. *Suppl. p.* 285.

cærulea. 14. M. foliis linearibus oppoſitis tomentoſis dentatis, floribus racemoſis. *Suppl. p.* 285.

corymboſa. 15. M. foliis oblongis dentatis glabris, corymbo faſtigiato. *Suppl. p.* 286.

altiſſima. 16. M. foliis lanceolatis ſubdentatis villoſis, ſpica ovata. *Suppl. p.* 286.

rubra. 17. M. foliis lanceolatis villoſis ſerratis, floribus racemoſis remotis. *Suppl. p.* 286.

770. HEBENSTREITIA. *Cal.* ſubtus longitudinaliter dehiſcens. *Cor.* 1. labiata: labio extrorſum ampliato apice trilobo; lobo medio 2fido, lateralibus emarginatis, *Stamina* margini limbi corollæ inſerta. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, 2ſperma.

dentata. 1. H. foliis linearibus dentatis, ſpicis lævibus. *Burm. afr. t.* 41. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 3. *t.* 51. *f.* 5.

integrifolia. 2. H. foliis linearibus integerrimis.

ciliata. 3. H. foliis linearibus dentatis, calicibus trivalvibus ciliatis. *Mant. p.* 420.

cordata. 4. H. foliis ſubcarnoſis cordatis ſeſſilibus. *Mant. p.* 420.

erinoides. 5. H. foliis oblongis ſerratis piloſis, bracteis integris hiſpidis. *Suppl. p.* 286.

fruticoſa. 6. H. foliis lanceolatis dentatis glabris, bracteis integris, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 287.

771. ERINUS. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* inæqualis: limbo 5partito ſubæquali, laciniis obcordatis. *Capſ.* 2locularis, polyſperma.

alpinus. 1. E. floribus racemoſis, foliis ſpatulatis. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 5. *Bulliard herb. Franc. t.* 5.

africanus. 2. E. floribus lateralibus ſeſſilibus, foliis lanceolatis, ſubdentatis. *Burm. afr. t.* 50. *f.* 1.

maritimus. 3. E. foliis lanceolatis integerrimis glabris, limbi laciniis ſemibifidis. *Suppl. p.* 287.

Lychnidea. 4. E. foliis lanceolatis ſerratis, limbi laciniis ſemibifidis. *Sup. p.* 287. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 419. Selago lychnidea.

peruvianus. 5. E. foliis lanceolato-ovatis ſerratis. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 25. *f.* 3.

triſtis. 6. E. foliis oblongis inciſis dentatis. *Suppl. p.* 287.

capenſis. 7. E. foliis linearibus dentatis, floribus ſpicatis. *Mant. p.* 252. *Burm. afr. t.* 49. *f.* 4. *an idem cum lychnidea ?*

laciniatus. 8. E. foliis laciniatis. *Feuill. peruv.* 3. *p.* 35. *t.* 25.

772. BUCHNERA. *Cal.* obſolete 5dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 5fido æquali; laciniis 3 infimis cordatis. *Capſ.* 2locularis, polyſperma.

americana. 1. B. foliis dentatis lanceolatis trinerviis. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 2.

cernua. 2. B. foliis cuneatis quinquedentatis glabris, floribus ſpicatis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 251.

cuneifolia. 3. B. foliis cuneiformibus glabris apice ſeptemdentatis. *Suppl. p.* 288.

cordifolia. 4. B. caule tetragono, ſoliis oppoſitis cordatis trinerviis ſerratis, racemis terminalibus ſubſpicatis. *Suppl. p.* 287.

grandiflora. 5. B. ſcabra, foliis oppoſitis ſeſſilibus oblongis integris, pedunculis axillaribus unifloris diphyllis, calice infundibuliformi. *Suppl. p.* 287.

elongata. 6. B. foliis integris oppoſitis, calicibus ſubpiloſis capſula longioribus. *aubl. pl. guj. p.* 627. *t.* 253. Peripea paluſtris.

æthiopica. 7. B. foliis tridentatis, floribus pedunculatis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 251.

capenſis. 8. B. foliis dentatis linearibus, calicibus pubeſcentibus. *Mant. p.* 88. *Burm. afr. t.* 50. *f.* 2.

coccinea. 9. B. foliis oblongis crenatis villoſis. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 10. *t.* 5.

aſiatica. 10. B. foliis integerrimis linearibus, calicibus ſcabris.

pinnatifida. 11. B. foliis pinnatifidis glabris. *Suppl. p.* 288.

773. BROWALLIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* infundibuliformis: limbo 5fido, umbilico clauſo antheris 2 majoribus. *Capſ.* 2locularis, apice 4valvis. *Semina* parva, angulata.

demiſſa. 1. Br. pedunculis unifloris. *Sabb. h. rom.* 2. *t.* 100. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 4.

elata. 2. Br. pedunculis unifloris multiflorisque.

humifuſa. 3. Br. hiſpida proſtrata, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 112.

alienata. 4. Br. foliis ſuperioribus oppoſitis, ſtaminibus duobus longitudine corollæ. *Mill. h. angl. t.* 69.

774. LINNÆA. *Cal.* duplex: fructus 4phyllus; floris 5partitus ſuperus. *Cor.* campanulata. *Bacca* ſicca, 3locularis.

borealis. 1. LINNÆA. *Flor. dan. t.* 3.

775. SIBTHORPIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* rotata, 5partita. *Stamina* paribus remotis. *Capſ.* compreſſa, orbiculata, 2locularis: diſſepimento tranſverſo. *Semina* pauca.

europæa. 1. S. foliis reniformi-ſubpeltatis crenatis. *Mant. p.* 421. *Pluckn. alm. t.* 7. *f.* 6. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 55. *f.* 6.

africana. 2. S. foliis orbiculatis integris crenatis, pedunculis ſolitariis; *an hujus generis?*

776. LIMOSELLA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* 5fida æqualis. *Stamina* per paria approximata. *Germen* 2loculare. *Capſ.* ſubunilocularis, 2valvis, polyſperma.

aquatica. 1. L. foliis lanceolatis. *Flor. dan. t.* 69. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 3. *t.* 50. *f.* 3.

diandra. 2. L. foliis ſublinearibus. *Mant. p.* 252.

calicina. 3. L. calice exteriore parvo diphyllo: interiore pentaphyllo, corolla campanulata ſubæquali. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 112. *an hujus generis?*

1265. VANDELLIA. *Cal.* quadripartitus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2 exteriora e diſco labii corollæ. *Antheræ* per paria connexæ. *Capſ.* 1locularis, polyſperma.

diffuſa. 1. VANDELLIA. *Mant. p.* 89.

777. STEMODIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ſubbilabiata. *Stamin.* 4: filamentis ſingulis 2fidis, 2antheris. *Capſ.* 2locularis. *Semina* minutula.

maritima. 1. St. foliis ſeſſilibus denticulatis haſtatis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 48.

ruderalis. 2. St. foliis petiolatis ſerratis ovatis. *Koenig apud Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 25.

778. OBOLARIA. *Cal.* bracteæ 2. *Cor.* 4fida, campanulata. *Stamina* ex diviſuris corollæ. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, polyſperma.

virginica. 1. Obolaria. *Pluckn. alm. t.* 209. *f.* 6. β) Obolaria caroliniana. *Walt. flor. carol. p.* 166.

779. OROBANCHE. *Cal.* ſubbifidus. *Cor.* ringens. *Glandula* ſub baſi germinis. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, polyſperma.

purpuraſcens. 1. O. caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus incluſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 276. *an ſatis diſtincta a lævi?*

major. 2. O. caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus ſubexſertis. *Curt. flor. Lond. t.* 232.

fœtida. 3. O. caule ſimpliciſſimo pubeſcente, antheris exſertis mucronato-ſpinoſis. *Poir. voy. en. Barb.* 2. *p.* 195.

lævis. 4. O. caule ſimpliciſſimo lævi, ſtaminibus exſertis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 16. *f.* 2.

tinctoria. 5. O. caule ſimpliciſſimo bracteis imbricato, floribus ſpirali ductu caulem cingentibus: corollæ limbo quinquefido. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 112.

americana. 6. O. caule ſimpliciſſimo, foliis imbricato, corollis recurvatis, ſtaminibus exſertis. *Mant. p.* 88.

cernua. 7. O. caule ſimpliciſſimo, nudiuſculo, corollis recurvatis, bractea ovata longioribus.

Ægine-tia. 8. O caule unifloro, flore ſubſpathaceo. *Rheed. h. malab.* 11. *t.* 47.

uniflora. 9. O caule unifloro, calice nudo. *Pluckn. mant. t.* 348. *f.* 3.

crenata. 10. O. caule ſimplici villoſo, corolla quinqueloba denticulato-crenata ſtamina includente. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 113.

purpurea. 11. O. caule ſimplici ramoſoque, corollis quadrifidis, ſtaminibus calcaratis. *Suppl. p.* 288.

ramoſa. 12. O. caule ramoſo, corollis quinquefidis. *Bull. herb. Franc. t.* 399.

virginiana. 13. O. caule ramoſo, corollis quadridentatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 16. *f.* 9.

1317. HYOBANCHE. *Cal.* 7phyllus. *Cor.* ringens: labio inferiori o. *Capſ.* 2locularis, polyſperma.

ſanguinea. 1. HYOBANCHE. *Mant. p.* 253. *Pet. gaz. t.* 37. *f.* 4.

780. DODARTIA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* ringens: labio inferiori duplo longiori. *Stigma* 2fidum. *Capſ.* ſubgloboſa, 2locularis. *Semina* plura, angulata.

orientalis. 1. D. foliis linearibus integerrimis glabris. *Mill. h. angl. t.* 127. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 53. *f.* 3.

indica. 2. D. foliis ovatis ſerratis villoſis.

781. LIPPIA. *Cal.* 4dentatus, ſeminibus maturis 2-valvis. *Cor.* ſubinfundibuliformis, 4fida. *Sem.* 2 oſſea, calice corticata.

americana. 1. L. capitulis pyramidatis. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 2.

hemiſphærica. 2. L. capitulis hemiſphæricis. *Mant. p.* 89. *Jacq. ſtirp. amer. t.* 179. *f.* 100.

ovata. 3. L. capitulis ovatis, foliis linearibus integerrimis. *Mant. p. 89. Gaertn. de fr. & ſem. cent. 3. t. 51. f. 2. Diſtinɑ̃i proɾſus generis.*

hirſuta. 4. L. hirſuta, foliis oblongis ſatis rugoſis ſerratis ſubtus tomentoſis, paniculis axillaribus, capitulis ovatis. *Suppl. p. 288.*

cymoſa. 5. L. floribus cymoſis, foliis ovatis ſubintegris. *Sloane hiſt. jam. 2. p. 30. t. 174. f. 3. 4. Nonne potius cum univerſo genere ad gymnoſperma amandanda?*

DOMBEYA. *Cal.* 2labiatus. *Cor.* 1labiata: labio concamerato. *Capſ.* 4locularis, turgida. *Semina* pauca, imbricata, marginata.

lappacea. 1. DOMBEYA. *Herit. nov. ſtirp. 2. p. 133. t. 17.*

782. SESAMUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata, 5fida: lacinia infima paulo longiore. *Rudimentum* filamenti 5ti. *Stigma* lanceolatum. *Capſ.* 4locularis.

proſtratum. 1. S. caule depreſſe diffuſo, foliis orbiculatis crenatis hiſpidis. *Plukn. amalth. t. 373. f. 2.*

orientale. 2. S. foliis ovato-oblongis integris. *Burm. zeyl. t. 38. f. 1.*

javanicum. 3. S. foliis lanceolatis ſerratis-ſeſſilibus. *Burm. ind. p. 133. Rheede h. malab. 9. t. 37.*

indicum. 4. S. foliis inferioribus trifidis. *Rumpf amb. 5. t. 76. f. 1.*

783. MIMULUS. *Cal.* priſmaticus, 4-5dentatus. *Cor.* ringens: labio ſuperiore lateribus reflexo. *Capſ.* ovalis, 2locularis, apice dehiſcens, polyſperma.

ringens. 1. M. erectus, foliis oblongis linearibus ſeſſilibus. *Plukn. phyt. 393. f. 3. Gaertn. de fr. & ſem. cent. 4. t. 53. f. 2.*

alatus. 2. M. erectus, foliis ovatis petiolatis, caule tetragono alato. *Ait. hort. Kew. 2. p. 361.*

luteus. 3. M. repens, foliis ovatis. *Feuill. peruv. 2. t. 34.*

784. RUELLIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* irregularis. *Stamina* per paria approximata. *Stigma* 2fidum. *Capſ.* 2locularis. *Semina* 3na-4na: retinaculis uncinulatis.

Blechum. 1. R. foliis ovatis integerrimis, ſpicis ovatis: bracteis interioribus geminis, floribus binis ſeſſilibus. *Sloan. hiſt. jam. 1. t. 109. f. 1.*

rubra. 2. R. foliis ovato-oblongis ſinuatis glabris ſeſſilibus, corymbis axillaribus pedunculatis. *Aubl. pl. guj. 2. p. 666. t. 270.*

violacea. 3. R. foliis ovato-oblongis acutis tomentoſis ſubſinuatis ſubpetiolatis, pedunculis ſolitariis unifloris alternatim axillaribus. *Aubl. pl. guj. 2. p. 668. t. 271.*

blechioides. 4. R. foliis oblongis ſubdentatis glabris, ſpicis ovatis; floribus bracteis longioribus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p. 93.*

alternata. 33. R. foliis oblongis cordatis crenatis petiolatis, ſpicis alternis folioſis: bracteis crenatis. *Rumpf amb. 6. t. 13. f. 2. 3.*

anguſtifolia. 5. R. foliis lineari-lanceolatis, ſpicis oblongis: bracteis ovatis hirſutis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p. 93.*

repanda. 6. R. foliis lanceolatis obtuſe dentatis petiolatis, caule repente. *Burm. ind. t. 40. f. 2.*

repens. 7. R. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, floribus ſeſſilibus, bracteis petiolatis calice longioribus, caule repente. *Mant. p. 89. Burm. ind. t. 41. f. 1.*

Anagalis. 34. R. foliis lanceolatis ſerratis, caule procumbente, floribus axillaribus ſolitariis. *Rumpf amb. 5. t. 170. f. 2.*

guttata. 8. R. foliis ovato-lanceolatis, ſpicis terminalibus imbricatis; bracteis ternis calice longioribus. *Forsk. flor. æg. arab. p. 114.*

criſpa. 9. R. foliis lanceolato-ovatis ſubcrenatis, capitulis ovatis foliolis hiſpidis, caule repente.

adhærens. 10. R. foliis ovatis acutis petiolatis profunde crenatis ſubtus hiſpidis, ſpicis terminalibus: floribus ſubſeſſilibus. *Forsk. flor. æg. arab. p. 114.*

longiflora. 36. R. foliis ovatis integerrimis, floribus axillaribus ſolitariis longiſſimis, caule fruticoſo. *Vahl. ſymb. bot.* 4. *p.* 45. *t.* 15.

piloſa. 11. R. foliis ovatis oppoſitis integris ciliatis, floribus terminalibus ſolitariis. *Suppl. p.* 290.

tuberoſa. 12. R. foliis ovatis crenatis, pedunculis unifloris. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 95. *f.* 1.

patula. 13. R. fruticoſa villoſa viſcoſa, foliis ovatis integerrimis, floribus axillaribus aggregatis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 41.

erecta. 35. R. foliis ovalibus integerrimis, caule erectiuſculo, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Burm. ind. t.* 41. *f.* 3.

paniculata. 14. R. foliis integerrimis, pedunculis dichotomis lateralibus, calicibus ſeſſilibus: lacinia ſuprema majore. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 100. *f.* 2.

ringens. 15. R. foliis oblongis integerrimis, floribus ſolitariis ſeſſilibus, caule procumbente. *Vog. ſuppl. pl. Ehr. ſel. t.* CX.

uliginoſa. 16. R. diffuſa hirſuta, foliis ſeſſilibus oblongis integris, ſpicis terminalibus tetragonis. *Suppl. p.* 290.

fragrans. 17. R. foliis ſeſſilibus oblongis obtuſe ſerratis, floribus axillaribus ſolitariis ſeſſilibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 44.

reptans. 18. R. foliis petiolatis ovatis obtuſis obtuſe ſerratis, pedunculis terminalibus ſubſpicatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 44.

faſciculata. 19. R. decumbens, foliis petiolatis lanceolatis dentatis oppoſitis: alterno minore, floribus faſciculatis. *Koenig apud Retz. obſ. bot.* 4. *p.* 28.

balſamica. 20. R. erecta glabra, foliis petiolatis lanceolatis ſerratis, verticillis ſeſſilibus. *Suppl. p.* 289.

ſtrepens. 21. R. foliis petiolatis, pedunculis trifloris brevibus. *Mant. p.* 422. *Subb. h. rom.* 2. *t.* 92. *Gaert n. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 3.

clandeſtina. 22. R. foliis petiolatis, pedunculis longis ſubdiviſis nudis. *Dill. h. Elth. t.* 248. *f.* 320.

depreſſa. 23. R. foliis petiolatis oppoſitis obovatis integris, caule arcte depreſſo. *Suppl. p.* 290.

tentaculata. 24. R. foliis obovatis, verticillis obvallatis ſpinis inermibus bifurcatis. *Pluckn. phyt.* 279. *f.* 7.

japonica. 25. R. foliis ellipticis, floribus ſpicatis: bracteis oblongis obtuſis. *Thunb. fl. r. jap. p.* 254.

littoralis. 26. R. fruticoſa cana, foliis cuneiformibus ſerratis glabris, floribus axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Suppl. p.* 289.

antipoda. 27. R. foliis mucronato-ſerratis, caule repente, floribus ſubſpicatis terminalibus quinis terniſve. *Mant. p.* 422. *Rumpf amb.* 5. *t.* 170. *f.* 2.

difformis. 28. R. diffuſa hirſuta, foliis linearibus dentato-ſinuatis integris, floribus verticillatis axillaribus. *Suppl. p.* 289. *Rheede h. mal.* 2. *t.* 46.

imbricata. 29. R. floribus in axillis foliorum ſummorum congeſtis ſecundis ſeſſilibus: bractea obliqua ſubrotunda. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 113.

biflora. 30. R. floribus geminis ſubſeſſilibus.

intruſa. 31. R. foliis petiolatis ovatis piloſis, floribus ſpicatis ſecundis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 113.

acaulis. 32. R. foliis petiolatis oblongis crenato-undulatis, ſcapis erectis multifloris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 93.

785. BARRELIERA. *Cal.* 4partitus: laciniis 2 majoribus. *Stam.* 2 longe minora. *Stigm.* 2fidum. *Capſ.* angulata, 2locularis. *Semina* gemina: retinaculis uncinatis.

longifolia. 1. B. ſpinis verticillorum ſenis, foliis enſiformibus longiſſimis ſcabris. *Pluckn. alm. t.* 133. *f.* 4.

ſolanifolia. 2. B. ſpinis axillaribus, foliis lanceolatis denticulatis. *Plum. ic.* 43. *f.* 2.

Hyſtrix. 3. B. ſpinis axillaribus geminis ſimplicibus, foliis integerrimis lanceolato-ovatis. *Mant. p.* 89. *Seb. muſ.* 1. *t.* 13. *f.* 1.

acanthoides. 13. B. ſpinis axillaribus geminis foliaceis, ſpicis axillaribus ſecundis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 47.

Prionitis. 4. B. ſpinis axillaribus pedatis quaternis, foliis integerrimis lanceolato-ovatis. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 41.

buxifolia. 5. B. ſpinis axillaribus oppoſitis ſolitariis, foliis ſubrotundis integerrimis. *Rheed. h. malab.* 2. *t.* 47.

noctiflora. 6. B. ſpinis axillaribus ramoſis, foliis lanceolatis integerrimis cuſpidatis, bracteis ovatis ſcarioſis, tubo elongato. *Suppl. p.* 20.

triſpinoſa. 14. B. ſpinis axillaribus compoſitis triradiatis, ſpicis terminalibus imbricatis. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 6. Juſticia triſpinoſa.

biſpinoſa. 15. B. ſpinis axillaribus biradiatis floriferis, foliis ovatis ſubtus piloſis. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 6. Juſticia biſpinoſa.

criſtata. 7. B. foliis oblongis integerrimis, calicis laciniis duabus latioribus ciliatis, duabusque linearibus acutis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 23. *f.* 7.

coccinea. 8. B. inermis, foliis ovatis denticulatis petiolatis. *Plum. ic.* 43. *f.* 1.

nitida. 9. B. inermis, foliis ovatis acuminatis integerrimis utrinque nitidis. *Jacq. ſtirp. amer.*

pungens. 10. B. inermis, foliis ovatis acutis pungentibus, bracteis ciliatis. *Suppl. p.* 290.

longiflora. 11. B. inermis, foliis ovatis ſericeis, bracteis cordatis ſcarioſis corollis longiſſimis. *Suppl. p.* 290. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 2?

hirſuta. 12. B. inermis, foliis lanceolato-ovatis integerrimis, caule hirſuto. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 192.

786. DURANTA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* infundibuliformis, 5fida. *Drupa* 1locularis, 4pyrena: oſſiculis 2locularibus.

Plumieri. 1. D. calicibus fructiferis contortis. *Plum. ic.* 79. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 53. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 57. *f.* 3.

Ellisia. 2. D. calicibus fructiferis erectis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 179.

Mutiſii. 3. D. foliis ellipticis integerrimis. *Suppl. p.* 291.

787. OVIEDA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* ſupera, tubo longiſſimo; limbo 3lobo. *Bacca* 1locularis, 4pyrena: *oſſicula* 1locularia.

ſpinoſa. 1. O. foliis ovalibus dentatis. *Plum. ic.* 256.

mitis. 2. O. foliis lanceolatis ſubrepandis. *Burm. ind. t.* 40. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 57. *f.* 2.

1406. MILLINGTONIA. *Cal.* margine 5dentatus, reflexus. *Cor.* longiſſima: limbo 4partito. *Antheræ* 2partitæ, vaginantes. *Capſula* ſiliquoſa.

hortenſis. 1. MILLINGTONIA. *Suppl. p.* 291.

788. VOLKAMERIA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* ringens, 5partita: laciniis ſecundis. *Stigm.* 2fidum. *Drupa* 2-pyrena: oſſiculis 2locularibus.

aculeata. 1. V. ſpinis petiolorum rudimentis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 177. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 3.

inermis. 2. V. ramis inermibus, foliis floribuſque ſubternis. *Pet. gaz. t.* 42. *f.* 7. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 57. *f.* 1. *an Clerodendri ſpecies?*

ſerrata. 3. V. inermis, foliis lato-lanceolatis ſerratis ſeſſilibus. *Mant. p.* 90.

ſcandens. 4. V. inermis, foliis petiolatis cordatis ovatis integerrimis, panicula corymboſa terminali: ramulis dichotomis. *Suppl. p.* 292.

japonica. 5. V. inermis, foliis cordatis ovatis acutis dentatis, racemis ſecundis. *Thunb. flor. jap. p.* 255.

Kaempferi. 6. V. inermis, foliis cordatis acutis ſubintegerrimis, panicula terminali erecta. *Jacq. coll.* 3. *p.* 207. *Banks ic. Kaempf. t.* 58.

789. CLERODENDRUM. *Cal.* 5partitus, campanulatus. *Cor.* irregularis: tubo filiformi; limbo 5partito æquali. *Stamina* longiſſima inter corollæ lacinias hiantes. *Bacca* 1locularis, 4pyrena: *Oſſicula* 1locularia.

infortunatum. 1. Cl. foliis cordatis tomentoſis. *Rumpf amb.* 4. *t.* 49. *β*) *Burm. zeyl. t.* 29.

fortunatum. 2. Cl. foliis lanceolatis integerrimis. *Osb. it. t.* 11.

Phlomidis. 3 Cl. foliis ovatis ſerratis canis *Suppl. p.* 292.

calamitoſum. 4. Cl. foliis ovalibus ſubdentatis nudis. *Mant. p.* 90. *Burm. ind. t.* 44.

paniculatum. 5. Cl. foliis lobatis ſerratis, panicula ampliſſima. *Mant. p.* 90. *Burm. ind. t.* 45. *f.* 1.

trichotomum. 6. Cl. foliis ovatis indiviſiſque lato-ovatis integris, panicula trichotoma. *Thunb. flor. jap. p.* 256. *Banks ic. Kaempf. t.* 22.

790. VITEX. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* ringens, 2labiata. *Stigm.* 2. *Drupa* baccata: putamine 4loculari. *Sem.* ſolitaria.

ovata. 1. V. foliis ſimplicibus ovatis. *Suppl. p.* 294. *Thunb. flor. jap. p.* 257.

altiſſima. 2. V. foliis ternatis integerrimis, panicula verticillata, bacca triſperma. *Suppl. p.* 294.

divaricata. 3. V. foliis ternatis integerrimis utrinque glabris, panicula dichotoma divaricata. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 93.

trifolia. 4. V. foliis ternatis quinatiſque: foliolis ovatis acutis integerrimis ſubtus caneſcentibus, panicula rhachi recta: pedicellis dichotomis. *Suppl. p.* 293. *Rumpf amb.* 4. *t.* 18.

5. V.

Negundo. 5. V. foliis quinatis ternatiſque ſerratis, floribus racemoſo-paniculatis. *Mill. ic.* 275. *f.* 1. 2.

umbroſa. 6. V. foliis quinatis integerrimis utrinque glabris, racemis compoſitis axillaribus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 93.

Leucoxylon. 7. V. foliis digitatis quinatis: foliolis petiolatis oblongis integerrimis, paniculis dichotomis, bacca monoſperma. *Suppl. p.* 293.

Agnus-caſtus. 8. V. foliis digitatis ſerratis, ſpicis verticillatis. *Blackw. herb. t.* 139. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 56. *f.* 7.

ſinuata. 9. V. foliis digitatis ſinuatis, verticillis pedunculatis corymboſis cauli adpreſſis. *Medic. act. Palat.* 4. *phyſ. p.* 202. *t.* 8.

pinnata. 10. V. foliis pinnatis integerrimis, paniculis trichotomis. *Burm. ind. t.* 43. *f.* 2.

791. BONTIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 2labiata: labio inferiori ſemitrifido, revoluto. *Drupa* ovata, 1ſperma: apice obliquo.

daphnoides. 1. B. foliis alternis, pedunculis unifloris. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 161. *f.* 57.

1237. AVICENNIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 2labiata: labio ſuperiore quadrato. *Capſ.* coriacea, rhomboidea, 1ſperma.

tomentoſa. 1. A. foliis cordato-ovatis ſubtus tomentoſis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 46.

reſinifera. 2. A. foliis ovato-lanceolatis ſubtus tomentoſis. *Forſt. pl. eſcul. p.* 44. *flor. auſtr. p.* 45.

nitida. 3. A. foliis lanceolatis utrinque nitidis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 169.

792. COLUMNEA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ringens: labio ſuperiori ſæpe 3partito; lacinia intermedia fornicata ſupra baſin gibba. *Antheræ* connexæ. *Capſ.* 2locularis. *Sem.* nidulantia.

ſcandens. 1. C. foliis ovatis acutis integris ſubvilloſis, calicis foliolis integris corolliſque pubeſcentibus: labio ſuperiori indiviſo. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 48.

hirſuta. 2. C. foliis ovatis acuminatis ſuperne hirtis, calicis foliolis denticulatis lanceolatis corolliſque hirſutis: labio ſuperiori bifido. *Brown. hiſt. jam. t.* 30. *f.* 3.

hiſpida. 3. C. foliis ovatis obtuſis denticulatis hiſpido-hirſutis, calicis foliolis lanceolatis integris piloſis, caule piloſo ſcabro. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 94.

rutilans. 4. C. foliis ovato-lanceolatis villoſis denticulatis, calicis foliolis laciniatis, corollis villoſis: labio ſuperiori bipartito. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 94.

longifolia. 5. C. foliis lanceolatis longiſſimis ſubſerratis glabris. *Mant. p.* 90. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 87.

793. ACANTHUS. *Cal.* foliolis trium parium alternantium. *Cor.* 1labiata, plana, 3loba. *Capſ.* 2locularis. *Sem.* ſolitaria: retinaculis uncinatis.

mollis. 1. A. foliis ſinuatis inermibus. *Blackw. herb. t.* 89. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 54. *f.* 1.

arboreus. 2. A. foliis ſinuato-dentatis ſpinoſis glabris, caule fruticoſo. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 115.

carduifolius. 3. A. foliis ſerrato-dentatis ſpinoſis, ſpica florum radicali. *Suppl. p.* 294.

ſpinoſus. 4. A. foliis pinnatis ſpinoſis. *Sabb. h. rom.* 3. *t.* 14.

edulis. 5. A. foliis quaternis lineari-lanceolatis dentato-ſpinuloſis, caule ſcabriculoſo. *Mant. p.* 89. Ruellia ciliaris. *Burm. fl. ind. t.* 42. *f.* 1.

Dioſcoridis. 6. A. foliis lanceolatis integerrimis margine ſpinoſis.

ilicifolius. 7. A. foliis repandis dentato-ſpinoſis, caule fruticoſo aculeato. *Rumpf amb.* 6. *t.* 71.

integrifolius. 8. A. foliis oblongis integris, caule herbaceo procumbente. *Suppl. p.* 294.

procumbens. 9. A. foliis oblongis ſerrato-ciliatis, caule procumbente fruticoſo. *Suppl. p.* 294.

furcatus. 10. A. foliis oblongis dentato-ſpinoſis, caule fruticoſo, bracteis ſpina trifurcata terminatis. *Suppl. p.* 295.

capenſis. 11. A. foliis oblongis dentato-ſpinoſis, caule fruticoſo erecto, bracteis ſpina ſimplici terminatis. *Suppl. p.* 295.

maderaſpatenſis. 12. A. foliis quaternis, floribus axillaribus: calicibus ciliatis. *Burm. ind. t.* 42. *f.* 2.

794. PEDALIUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ſubringens: limbo 5fido. *Drupa* corticoſa, 4ſpinoſa, 2locularis. *Sem.* ſolitaria, arillata.

Murex. 1. PEDALIUM. *Burm. ind. t.* 45. *f.* 2. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 58. *f.* 1.

1409. AMASONIA. *Cal.* campanulatus, ſemiquinquefidus. *Cor.* tubuloſa: limbo parvo 5fido. *Nux* ovata, 1locularis.

erecta. 1. AMASONIA. *Suppl. p.* 294.

TAMONEA. *Cal.* 5ariſtatus. *Cor.* ringens: limbo 5fido. *Nux* carnoſa, 4locularis. *Sem.* ſolitaria.

mutica. 1. TAMONEA. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 94. *Aublét pl. guj.* 2. *p.* 660. *t.* 268.

GEVUINA. *Cal.* o. *Cor.* 4petala. *Capſ.* coriacea, 1locularis.

Avellana. 1. GEVUINA. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 159.

795. MELIANTHUS. *Cal.* 5partitus: lacinia infima gibba. *Petala* 4: nectario infra infima. *Capſ.* 4locularis.

major. 1. M. ſtipulis ſolitariis petiolo adnatis. *Mill. illuſtr. ic.*

minor. 2. M. ſtipulis geminis diſtinctis. *Commel. rar. t.* 4.

CLASSIS XIV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

* *ſilicula apice non emarginata.*

800. DRABA.	*Silic.* valvis planiuſculis. *Stilus* 0.
MOENCHIA.	*Silic.* ovata, ſtilo coronata: valvis convexiuſculis.
809. LUNARIA.	*Silic.* valvis planis, pedicellata. *Stilus* exſertus.
799. SUBULARIA.	*Silic.* valvis ſemiovatis. *Stilus* ſilicula brevior.
796. MYAGRUM.	*Silic.* valvis concavis. *Stilus* perſiſtens.
797. VELLA.	*Silic.* valvis diſſepimento dimidio brevioribus.

** *Silicula apice emarginata.*

804. IBERIS.	*Petala* 2 exteriora majora.
805. ALYSSUM.	*Filamenta* quædam latere interiore dente notata. *Silicula* 2locularis.
807. CLYPEOLA.	*Silicula* orbiculata, decidua: valvis planis.
806. PELTARIA.	*Silicula* orbiculata, compreſſo-plana, non dehiſcens.
803. COCHLEARIA.	*Silicula* cordata: valvis obtuſis gibbis.
801. LEPIDIUM.	*Silicula* cordata: valvis acute carinatis.
802. THLASPI.	*Silicula* obcordata: valvis marginato-carinatis.
808. BISCUTELLA.	*Silicula* biloba ſupra infraque: margine carinato.
798. ANASTATICA.	*Silicula* retuſa: valvis diſſepimento mucronato longioribus.

SILIQUOSÆ.

* *calice clauſo: foliolis longitudinaliter conniventibus.*

822. RAPHANUS.	*Siliqua* articulata.
MNEMOSILLA.	*Siliqua* toroſo-articulata, articulatim decidua.
814. ERYSIMUM.	*Siliqua* tetragona.
CHAMIRA.	*Cal.* baſi cornutus. *Glandul.* extra ſtamina breviora.

815. CHEIRANTHUS.	*Germen* utrinque glandula notatum.
817. HESPERIS.	*Glandulæ* intra ſtamina breviora. *Petala* obliqua.
818. ARABIS.	*Glandulæ* 4 intra foliola calicina. *Stigma* ſimplex.
820. BRASSICA.	*Glandulæ* 2 intra ſtamina breviora, 2 extra ſtamina longiora.
819. TURRITIS.	*Petala* erecta.
811. DENTARIA.	*Siliqua* valvis revoluto-dehiſcentibus.
810. RICOTIA.	*Siliqua* unilocularis.

** *calice hiante: foliolis ſuperne diſtantibus.*

825. CRAMBE.	*Siliqua* decidua, globoſa, ſicco-baccata. *Filamenta* 4 apice 2 furca.
824. ISATIS.	*Siliqua* decidua, lanceolata, monoſperma.
823. BUNIAS.	*Siliqua* decidua, ſubrotunda, muricata.
826. CLEOME.	*Siliqua* dehiſcens, 1 locularis.
812. CARDAMINE.	*Siliqua* dehiſcens: valvis revolutis.
827. SINAPIS.	*Siliqua* dehiſcens. *Cal.* horizontaliter patens.
813. SISYMBRIUM.	*Siliqua* dehiſcens: valvis rectiuſculis. *Cal.* patulus.
816. HELIOPHILA.	*Siliqua* dehiſcens. *Nectaria* 2 recurvata.

SILICULOSA.

796. MYAGRUM. *Silicula* evalvis ſtilo conico terminata : loculo ſubmonoſpermo.

perenne. 1. M. ſiliculis biarticulatis monoſpermis, foliis extrorſum ſinuatis denticulatis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 414.

orientale. 2. M. ſiliculis ſulcatis lævibus, foliis oblongis dentato-ſinuatis.

rugoſum. 3. M. ſiliculis ſulcatis piloſis rugoſis, foliis oblongis obtuſis dentatis.

rigidum. 4. M. ſiliculis didymis ſeſſilibus ſulcatis piloſiſſimis bilocularibus diſpermis, foliis ovali-oblongis dentatis. *Pallas. it.* 3. *p.* 741. *t.* L l. *f.* 1. & *t.* M m. *f.* 2.

hiſpanicum. 5. M. ſiliculis lævibus ſubtoroſis, foliis lyratis.

auſtriacum. 6. M. ſiliculis ſubrotundis glabris, foliis oblongis amplexicaulibus, radice repente. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 111.

perfoliatum. 7. M. ſiliculis obcordatis ſubſeſſilibus, foliis amplexicaulibus. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 3. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 13.

paniculatum. 8. M. ſiliculis lentiformibus orbiculatis punctato-rugoſis. *Flor. dan. t.* 204. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 9. *an diſtincti generis?*

ſaxatile. 9. M. ſiliculis lentiformibus obovatis glabris, foliis petiolatis oblongis ſerratis ſcabris, caule paniculato. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 128.

ægyptium. 10 M. ſiliculis angulatis, foliis tripartitis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 4.

797. VELLA. *Silicula* ſ. potius *Antrum* ſiliquoſum globoſum diſſepimento valvis duplo majore extrinſecus in laminam cochleariformem producto.

annua. 1. V. foliis pinnatifidis, ſiliculis pendulis. *Trew. ic.* 10. *t.* 8. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 8. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 10.

Pſeudo-cytiſus. 2. V. foliis integris obovatis ciliatis, ſiliculis erectis. *Lob. ic.* 2. *p.* 49.

tenuiſſima. 3. V. foliis lanceolatis obtuſis margine piloſis, ſiliculis remotiſſimis. *Pallas it.* 3. *p.* 740. *t.* U. *f.* 2.

798. ANASTATICA. *Silicula* ſ. potius *Antrum* ſiliquoſum ſubgloboſum retuſum margine coronatum, valvis diſſepimento duplo longioribus, *ſtilo* intermedio mucronato obliquo, loculis 1ſpermis.

hierochuntica. 1. A. foliis obtuſis, ſpicis axillaribus breviſſimis, ſiliculis ungulatis ſpinoſis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 58. *Gaertn. de fruct. & ſem. pl.* 9. *t.* 141. *f.* 11.

ſyriaca. 2. A. foliis acutis, ſpicis folio longioribus, ſiliculis ovatis roſtratis. *Mant. p.* 424. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 4. *Gaertn. de fr. & ſem. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 11. *an potius buniades ſpecies?*

799. SUBULARIA. *Silicula* integra, ovata: valvis ovatis, concavis, diſſepimento contrariis. *Stilus* ſilicula brevior.

aquatica. 1. S. foliis teretiuſculis. *Flor. dan. t.* 53.

purpurea. 2. S. foliis cordato-oblongis ſubdentatis. *Forsk. flor. ægy. arab. p.* 117.

800. DRABA. *Silicula* integra, elliptico-oblonga compreſſiuſcula: valvis planiuſculis diſſepimento parallelis. *Stilus* o.

verna. 1. Dr. ſcapis nudis, foliis ſubſerratis. *Curt. flor. Lond. t.* 7. *Gaertn. de fr. & ſem. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 11.

pyrenaica. 2. Dr. ſcapo nudo, foliis cuneiformibus palmatis trilobis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 228.

alpina. 3. Dr. ſcapo nudo ſimplici, foliis lanceolatis integerrimis. *Flor. dan. t.* 56.

caroliniana. 9. Dr. ſcapo nudo ſimplici lævi, foliis hirſutis ovatis. *Walt. flor. carol. p.* 171.

hirta. 4. Dr. ſcapo unifolio, foliis ſubhirſutis, ſiliculis obliquis pedicellatis. *Flor. dan. t.* 142. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 432.

ſtadnizenſis. 5. Dr. ſcapo bifolio, foliis glabris ciliatis, ſiliculis rectis pedicellatis. *Wulfen apud Jacq. miſcell.* 1. *p.* 147. *t.* 17. *f.* 1.

ciliaris. 6. Dr. caule ſubnudo, foliis linearibus margine carinaque ciliatis, petalis integris. *Mant. p.* 91. *Ger. flor. prov. t.* 13. *f.* 1.

muralis. 7. Dr. caule ramoſo, foliis ovatis ſeſſilibus dentatis. *Scop. del. inſ.* 2. *t.* 15. β) Draba nemoroſa. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 432. *Col. ecphr.* 1. *t.* 272.

incana. 8. Dr. foliis caulinis numeroſis incanis, ſiliculis oblongis obliquis ſubſeſſilibus. *Flor. dan. t.* 130.

MOENCHIA. *Silicula* integra, ovata, ſtilo coronata: valvis convexiuſculis diſſepimento parallelis; loculis polyſpermis.

aizoides. 1. M. ſcapo nudo ſimplici, foliis enſiformibus carinatis ciliatis. *Mant. p.* 91. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 432. Draba aizoides. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 192.

ſativa. 2. M. floribus racemoſis, petalis integerrimis, ſiliculis obovatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 431. Myagrum ſativum. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 78. β) *Lindern flor. alſ. t.* 1.

campeſtris. 3. M. floribus racemoſis, petalis bifidis, filamentis quatuor in medio denticulatis, ſiliculis ovatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 436. Alyſſum campeſtre.

incana. 4. M. floribus corymboſo-racemoſis, petalis bifidis, ſiliculis ovatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 436. Alyſſum incanum.

801. LEPIDIUM. *Silicula* emarginata, compreſſa : valvis argute carinatis ; loculis 1ſpermis.

* *floribus tetradynamis.*

veſicarium. 1. L. caulium geniculis inflatis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 26.

procumbens. 2. L. ſcapo nudo, foliis ſinuato-pinnatifidis : extremo majore, caulibus proſtratis racemiferis. *Mant. p.* 424. *Magn. fl. monſp. t.* 184.

ſpinoſum. 3. L. foliis pinnatis : foliolis lanatis ; exterioribus elongatis, ramis mucronatis. *Mant. p.* 253. *Arduin. ſpec.* 2. *t.* 16.

petræum. 4. L. foliis pinnatis integerrimis, petalis emarginatis, calice minoribus. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 131.

ſuffruticoſum. 5. L. foliis lanceolato-linearibus tenuibus integerrimis, caulibus ſuffruticoſis. *Mant. p.* 91.

Piſcidium. 6. L. foliis elliptico-oblongis acutis integerrimis. *Forſt. pl. eſc. p.* 39. *flor. auſtr. p.* 46.

latifolium. 7. L. foliis ovato-lanceolatis integris ſerratis. *Flor. dan. t.* 557.

ſubulatum. 8. L. foliis ſubulatis indiviſis ſparſis, caule ſuffruticoſo.

lyratum. 9. L. foliis lyratis criſpis. *Tournef. it.* 1. *p.* 339. *ic.*

ſativum. 10. L. foliis oblongis multifidis. *Korn pl. med. ic. t.* 16. *Gaertn. de fr. & ſem.* 9. *t.* 141. *f.* 5. *β) C. Bauh: pr. th. bot. p.* 43. *ic.*

chalepenſe. 11. L. foliis ſagittatis ſeſſilibus dentatis. *Cent.* 169.

Draba. 12. L. foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 435. Cochlearia Draba. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 315.

perfoliatum. 13. L. foliis caulinis pinnato-multifidis ramiferis cordatis amplexicaulibus integris. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 346.

cardamines. 14. L. foliis radicalibus pinnatis, caulinis lyratis. *Arduin. ſpec.* 1. *t.* 8.

** *floribus hexandris.*

graminifolium. 15. L. foliis linearibus : ſuperioribus integerrimis, caule paniculato virgato.

*** *floribus tetrandris.*

alpinum. 16. L. foliis pinnatis integerrimis, ſcapo ſubradicato, ſiliculis lanceolatis mucronatis. *Jacq. flor auſtr.* 2. *t.* 137.

nudicaule. 17. L. ſcapo nudo ſimpliciſſimo, foliis pinnatifidis. *Magn. fl. monſp. t.* 186.

oleraceum. 18. L. foliis elliptico-oblongis acutis ſerratis. *Forſt. pl. eſc. p.* 38. *flor. auſtr. p.* 46.

**** *floribus ſubtriandris.*

virginicum. 19. L. foliis linearibus pinnatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 123. *f.* 3.

***** *floribus diandris.*

ruderale. 20. L. foliis radicalibus dentato-pinnatis: rameis linearibus integerrimis, floribus ſubapetalis. *Flor. dan. t.* 184.

Iberis. 21. L. foliis inferioribus lanceolatis ſerratis: ſuperioribus linearibus integerrimis. *Mant. p.* 425.

bonarienſe. 22. L. foliis omnibus pinnato-multifidis. *Dill. h. Elth. t.* 236. *f.* 370.

didymum. 23. L. foliis pinnatifidis, caule erecto, fructibus didymis. *Mant. p.* 92.

****** *incertæ tribus.*

divaricatum. 24. L. foliis pinnatifidis, caule ramoſiſſimo, ſiliculis ovatis ſubemarginatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 375.

802. THLASPI. *Silicula* emarginata, obcordata: valvis navicularibus carinatis, (ſæpius) alato-marginatis, loculis polyſpermis.

peregrinum. 1. Thl. ſiliculis ſuborbiculatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 18. *f.* 30.

arvenſe. 2. Thl. ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris. *Flor. dan. t.* 793. *Gaertn. de fr. & ſem. faſc.* 9. *t.* 141. *f.* 3.

alliaceum. 3. Thl. ſiliculis ſubovatis ventricoſis, foliis oblongis obtuſis dentatis glabris. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 18. *f.* 28.

ſaxatile. 4. Thl. ſiliculis ſubrotundis, foliis lanceolato-linearibus obtuſis carnoſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 236.

hirtum. 5. Thl. ſiliculis ſubrotundis piloſis, foliis caulinis ſagittatis villoſis. *C. Bauh. prodr. t. bot. t.* 47.

campeſtre. 6. Thl. ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis. β) *Blackw. herb. t.* 407.

montanum. 7. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis glabris: radicalibus ſubcarnoſis obovatis integerrimis; caulinis amplexicaulibus, corollis calice majoribus. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 237.

alpinum. 8. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis glabris: radicalibus ſubcarnoſis obovatis integerrimis, caulinis ſeſſilibus, corollis calice majoribus. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 238.

perfoliatum. 9. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis caulinis cordatis glabris ſubdentatis, petalis longitudine calicis, caule ramoſo. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 337.

alpeſtre. 10. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis ſubdentatis: caulinis amplexicaulibus, petalis longitudine calicis, caule ſimplici. *Ard. ſpec.* 2. *t.* 15. *f.* 2. *an mera perfoliati varietas?*

præcox. 11. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis carnoſis glaucis ſubcrenulatis decurrentibus: caulinis ſemiamplexicaulibus, obtuſe cordato-ſagittatis, petalis calice longioribus. *Wulf. ap. Jacq. Collect.* 2. *p.* 124. *t.* 9.

Schranckii. 12. Thl. ſiliculis obcordatis, foliis ſubhiſpidis integris, radicalibus petiolatis caulinis amplexicaulibus, calice petalis minore. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 182.

Burſa paſtoris. 13. Thl. ſiliculis compreſſis obcordato-triangulis: valvis dorſo nudis obtuſis, foliis radicalibus pinnatifidis. *Flor. dan. t.* 729. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 3. *an diſtincti generis?*

ceratocarpon. 14. Thl. ſiliculis oblongis furſum utrinque membranaceo cornutis, foliis ſuperioribus oblongis ſagittatis amplexicaulibus: inferioribus ovalibus petiolatis. *Murray comm. Goett.* 1774. *t.* 1.

803. COCHLEARIA. *Silicula* emarginata, turgida, ſcabra, polyſperma: valvis gibbis obtuſis.

officinalis. 1. C. foliis radicalibus cordato-ſubrotundis: caulinis oblongis ſubſinuatis. *Flor. dan. t.* 135.

danica. 2. C. foliis haſtato-angulatis: omnibus deltoidibus. *Mant. p.* 425. *Flor. dan. t.* 100.

anglica. 3. C. foliis omnibus ovato-lanceolatis. *Flor. dan. t.* 329.

groenlandica. 4. C. foliis reniformibus integris carnoſis. *Barthol. act. Hafn.* 3. *t.* 144.

Coronopus. 5. C. foliis pinnatifidis, caule depreſſo. *Flor. dan. t.* 202. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. faſc.* 9. *t.* 142. *f.* 5.

Armoracia. 6. C. foliis radicalibus lanceolatis crenatis: caulinis inciſis. *Blackw. herb. t.* 415.

glaſtifolia. 7. C. foliis caulinis cordato-ſagittatis amplexicaulibus. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 12.

fœtida. 8. C. foliis caulinis ſtriatis lanceolato-ſagittatis dentatis, ſiliculis cochleariformibus repandis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 185.

804. IBERIS. *Cor.* inæqualis: petalis 2 exterioribus majoribus. *Silicula* ſubrotunda compreſſa: ſepto contrario, loculis 1ſpermis.

* *fruteſcentes.*

ſemperflorens. 1. I. foliis cuneiformibus integerrimis obtuſis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 13. *f.* 4.

ſempervirens. 2. I. foliis linearibus acutis integerrimis. *Rivin. tetrap.* 224. *f.* 1.

gibraltarica. 3. I. foliis apice dentatis. *Dill. h. Elth. t.* 287. *f.* 37.

** *ſuffruteſcens.*

ſaxatilis. 4. I. foliis lanceolato-linearibus carnoſis acutis integerrimis ciliatis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 277. *f.* 1.

*** *herbaceæ.*

rotundifolia. 5. I. foliis ovatis: caulinis amplexicaulibus lævibus ſucculoſis, floribus ſubregularibus. *Arduin. ſpec.* 2. *t.* 15. *f.* 1.

cepæfolia. 6. I. foliis ovatis: caulinis ſeſſilibus lævibus ſucculoſis. *Jacq. miſcell.* 2. *p.* 28. *t.* 1.

arabica. 7. I. foliis ovatis glabris aveniis integerrimis, ſiliculis baſi apiceque bilobis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 2. *f.* 1.

amara. 8. I. foliis lanceolatis acutis ſubdentatis, floribus racemoſis. *Rivin. tetrap.* 112.

umbellata. 9. I. foliis lanceolatis acuminatis: inferioribus ſerratis; ſuperioribus integerrimis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 7.

linifolia. 10. I. foliis linearibus integerrimis: caulinis ſerratis, caule paniculato, corymbis hemiſphæricis. *Gard. fl. aix. t.* 105.

odorata. 11. I. foliis linearibus ſuperne dilatatis ſerratis.

nudicaulis. 12. I. foliis ſinuatis, caule nudo ſimplici. *Flor. dan. t.* 323.

pinnata. 13 I. foliis pinnatifidis. *Lob. ic.* 218.

805. ALYSSUM. *Filamenta* quædam introrſum dente notata. *Cor.* æqualis. *Silicula* ſubgloboſa, leviter emarginata, ſtilo perſiſtente coronata: loculis ſubdiſpermis.

* *ſiliculis compreſſis.*

† *ſuffruticoſa.*

ſpinoſum. 1. A. ramis ſenilibus ſpiniformibus nudis. *Barr. pl. rar. ic.* 808.

halimifolium. 2. A. caulibus procumbentibus perennantibus, foliis lanceolato-linearibus acutis integerrimis. *Herm. par. Lugdb. t.* 595.

ſaxatile. 3. A. caulibus fruteſcentibus paniculatis, foliis lanceolatis molliſſimis repandis. *Ard. ſpec.* 1. *t.* 7. *Mill. h. angl. t.* 20. *f.* 1.

alpeſtre. 4. A. caulibus diffuſis, foliis ſubrotundis incanis, calicibus coloratis. *Mant. p.* 92. *Gerard. fl. prov. t.* 13. *f.* 2.

†† *herbacea.*

hyperboreum. 5. A. foliis incanis dentatis, ſtaminibus quatuor bifurcatis. *Kraſchenninck. act. Petrop. t.* 15. *f.* 1.

minimum. 6. A. caulibus diffuſis, foliis lanceolato-linearibus ſubhiſpidis.

calicinum. 7. A. ſtaminibus omnibus dentatis, calicibus perſiſtentibus. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 338. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 4.

montanum. 8. A. caulibus diffuſis, foliis ſublanceolatis punctato-echinatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 37.

clypeatum. 9. A. caule erecto, ſiliculis ſeſſilibus, ovalibus, petalis linearibus; *an potius lunariæ ſpecies?*

* * *ſiliculis inflatis.*

ſinuatum. 10. A. caule herbaceo, foliis lanceolato-deltoidibus. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 20.

gemonenſe. 11. A. caule herbaceo, ramis divaricatis, foliis radicalibus obovatis ſubtomentoſis. *Mant. p.* 92. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 61.

utriculatum. 12. A. caule herbaceo erecto, foliis lævibus lanceolatis integerrimis. *Mant. p.* 92.

Veſicaria. 13. A. foliis linearibus dentatis, ſiliculis angulatis acutis. *Tournef. it.* 2. *t.* 14.

deltoideum. 14. A. caulibus ſuffruteſcentibus proſtratis, foliis lanceolato-deltoidibus, ſiliculis hirtis.

creticum. 15. A. caule fruticoſo, foliis lanceolatis ſubdentatis tomentoſis, ſiliculis globoſis. *Mant. p.* 92. *Alp. exot. t.* 118.

807. CLYPEOLA. *Silicula* ſubemarginata, orbiculata, compreſſo-plana, decidua.

Jonthlaſpi. 1. Cl. ſiliculis unilocularibus monoſpermis. *Mant. p.* 426. *Col. ecphr.* 1. *t.* 284. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 6.

tomentoſa. 2. Cl. ſiliculis bilocularibus, foliis ſubtomentoſis. *Mant. p.* 92. *Ard. ſpec.* 2. *t.* 15. *f.* 1.

maritima. 3. Cl. perennis, ſiliculis bilocularibus ovatis diſpermis. *Mant. p.* 426. *Barr. pl. rar. ic.* 844.

caroliniana. 4. Cl. ſiliculis bilocularibus, foliis duplicato-ſerratis ſubſcabris. *Walt. flor. carol. p.* 173.

806. PELTARIA. *Silicula* ſ. potius *Pericarpium* ſimplex 1loculare integrum, ſuborbiculatum, compreſſo-planum non dehiſcens.

alliacea. 1. P. foliis amplexicaulibus oblongis indiviſis. *Suppl. p.* 295. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 123. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 7.

capenſis. 2. P. foliis caulinis quinato-pinnatis linearibus ſubcarnoſis. *Suppl. p.* 296.

808. BISCUTELLA. *Silicula* ſ. potius *Pericarpium* 1loculare gemellum compreſſo-planum, rotundatum, ſupra infraque bilobum: lobis 1ſpermis evalvibus. *Cal.* foliola baſi gibba.

auriculata. 1. B. calicibus nectario utrinque gibbis, ſiliculis in ſtilum coëuntibus. *Col. ecphr.* 2. *t.* 61. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 1.

apula. 2. B. ſiliculis ſcabris, foliis lanceolatis ſeſſilibus ſerratis. *Mant. p.* 254. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 417. Biſcutella didyma. *Col. ecphr.* 1. *t.* 284. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 1.

lyrata. 3. B. ſiliculis ſcabris, foliis lyratis. *Mant. p.* 254. *Bocc. ſic. t.* 23. *β?*) Biſcutella raphanifolia. *Poir. it.* 2. *p.* 198.

ſempervirens. 4. B. ſiliculis ſcabriuſculis, foliis lanceolatis tomentoſis. *Mant. p.* 255. *Barr. pl. rar. ic: t.* 841.

coronopifolia. 5. B. ſiliculis glabris, foliis dentatis hirtis. *Mant. p.* 255.

lævigata. 6. B. ſiliculis glabris, foliis lanceolatis ſerratis.

apetala. 7. B. floribus apetalis, calicibus margine ſcabris. *Walt. flor. carol. p.* 174.

809. LUNARIA. *Silicula* integra, compreſſo-plana, ſubovata pedicellata: valvis diſſepimento æqualibus, parallelis planis. *Cal.* foliolis 2 ſaccatis.

rediviva. 1. L. foliis alternis, ſiliculis lanceolatis. *Beſl. h. Eyſt. vern.* 7. *f.* 2. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 1.

annua. 2. L. foliis oppoſitis, ſiliculis ellipticis. *Mill. illuſtr. ic. Sabb. h. rom.* 4. *t.* 22.

SILI-

SILIQUOSA.

810. RICOTIA. *Siliqua* 1locularis, oblonga; compreſſa: valvis planis.

ægyptiaca. 1. Ricotia. *Mill. h. angl.* 169. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 1. *an lunariæ jungenda?*

811. DENTARIA. *Siliqua* teres, marginata, elaſtice diſſiliens: valvis revolutis, diſſepimento fungoſo paulo brevioribus, *Stigma* emarginatum. *Cal.* longitudinaliter connivens.

enneaphylla. 1. D. foliis ternis ternatis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 316.

bulbifera. 2. D. foliis inferioribus pinnatis, ſummis ſimplicibus. *Flor. dan. t.* 361.

pentaphylla. 3. D. foliis ſummis digitatis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 30. *β*) *Geſn. faſc.* 1. *t.* 1. *f.* 1.

812. CARDAMINE. *Siliqua* longa, anceps elaſtice dehiſcens: valvis revolutis, diſſepimento membranaceo parallelo. *Stigma* integrum, capitatum. *Cal.* ſubhians.

* *foliis ſimplicibus.*

bellidifolia. 1. C. foliis ovatis integerrimis, petiolis longis. *Flor. dan. t.* 20.

nivalis. 2. C. foliis radicalibus ovatis inæqualiter ſerratis: caulinis ſublanceolatis ſeſſilibus alternis. *Pall. it.* 2. *p.* 740. *t.* U.

nudicaulis. 3. C. foliis lanceolatis ſinuato-dentatis, caulibus nudis.

petræa. 4. C. foliis oblongis dentatis. *Flor. dan. t.* 386.

aſarifolia. 5. C. foliis ſubcordatis. *Herm. par. Lugdb. t.* 203.

reſedifolia. 6. C. foliis inferioribus indiviſis: ſuperioribus trilobis pinnatiſque. *Jacq. flor. auſtr. 5. app. t. 21.*

** *foliis ternatis.*

africana. 7. C. foliis ternatis acuminatis, caule ramoſiſſimo. *Herm. par. Lugdb. t. 202.*

trifolia. 8. C. foliis ternatis obtuſis, caule ſubnudo. *Jacq. flor. auſtr. 1. t. 27.*

*** *foliis pinnatis.*

hirſuta. 9. C. floribus interdum tetrandris. *Curt. flor. Lond. t. 277. An ſatis conſtanterque diſtincta a pratenſi?*

amara. 10. C. axillis ſtoloniferis. *Curt. flor. Lond. t. 158.*

impatiens. 11. C. foliis inciſis ſtipulatis, floribus apetalis. *Flor. dan. t. 735.*

parviflora. 12. C. foliis exſtipulatis: foliolis lanceolatis obtuſis.

virginica. 13. C. foliolis lanceolatis baſi unidentatis. *Pet. gaz. t. 105. f. 18.*

chelidonia. 14. C. foliolis quinis inciſis. *Herm. par. Lugdb. t. 204.*

græca. 15. C. foliolis palmatis æqualibus petiolatis. *Mant. p. 427. Bocc. muſ. 2. t. 166. Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent. 9. t. 143. f. 1.*

pratenſis. 16. C. foliolis radicalibus ſubrotundis: caulinis lanceolatis. *Curt. flor. Lond. t. 175.*

813. SISYMBRIUM. *Siliqua* teres, dehiſcens: valvis rectiuſculis diſſepimento fere æqualibus. *Cal.* patens. *Cor.* patens.

* *ſiliquis declinatis brevibus.*

Naſturtium. 1. S. foliis pinnatis: foliolis ſubcordatis. *Flor. dan. t. 690.*

ſilveſtre. 2. S. ſiliquis oblongo-ovatis, foliolis lanceolatis ſerratis. *Curt. flor. Lond. t. 153.*

iſlandicum. 3. S. foliis lyrato-pinnatis: foliolis ovalibus dentatis. *Flor. dan. t. 403.*

amphibium. 4. S. ſiliquis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ſerratis, petalis calice longioribus. *Tabernaem. Krauterb. p. 468.*

paluſtre. 5. S. ſiliquis oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ſerratis, petalis calice minoribus. *C. Bauh. prodr. th. bot. r. 38.*

pyrenaicum. 6. S. ſiliquis ſubovatis, foliis inferioribus lyratis: ſuperioribus bipinnatifidis amplexicaulibus, ſtilis filiformibus. *de la Chanal act. helv. 4. t. 15.*

tanacetifolium. 7. S. foliis pinnatis: foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis: extimis confluentibus. *Moriſ. hiſt. pl. 2. t. 6. f. 19.*

tenuifolium. 8. S. foliis integerrimis: infimis tripinnatifidis; ſupremis integris. *Blackw. herb. t. 266.*

ſalſugineum. 9. S. foliis oblongo-cordatis ſeſſilibus ſubcarnoſis. *Pallas it. 2. p. 740.*

molle. 10. S. ſiliquis ſubcylindricis, foliis mollibus denticulatis: cauliuis haſtatis oblongis. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 1. t. 85.*

lippizenſe. 11. S. foliis inferioribus pinnatis: ſummis inferiorumque pinnis integerrimis. *Wulf. ap. Jacq. coll. 2. p. 161. pl. rar. ic. cent. 2. t. 62.*

ſagittatum. 41. S. pubeſcens, ſiliquis ſubcylindricis recurvis, foliis obovato-oblongis ſagittatis dentatis. *Ait. hort. Kew. 2. p. 390.*

** *ſiliquis ſeſſilibus axillaribus.*

ſupinum. 12. S. ſiliquis ſubſeſſilibus ſolitariis, foliis dentato-ſinuatis. *Isnard act. Pariſ. 1724. t. 18.*

hiſpanicum. 13. S. ſiliquis cylindricis breviuſculis erectis, foliis lanceolatis ſerratis ſeſſilibus. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 1. t. 84.*

polyceratium. 14. S. ſiliquis ſubulatis aggregatis, foliis repando-dentatis. *Jacq. h. Vind. 1. t. 79.*

burſifolium. 15. S. racemo flexuoſo, foliis lyratis, caule erecto folioſo. *Dill. h. Elth. t. 148. f. 177.* β) Heſperis dentata. *Sp. pl. 2. p. 928.*

*** *caule nudo, aut nullo.*

vimineum. 16. S. acaule, foliis lyratis lævibus, ſcapis adſcendentibus, floribus minutis. *Bocc. ſic. t. 10.*

monenſe. 17. S. acaule, foliis pinnato-dentatis ſubpiloſis, ſcapis lævibus. *Dill. h. Elth. t. 111. f. 135.*

murale. 18. S. ſubacaule, foliis lanceolatis ſinuato-ſerratis læviuſculis, ſcapis ſubſcabris adſcendentibus. *Barr. pl. rar ic. t. 131.*

Barrelieri. 19. S. caule ſubnudo ramoſo, foliis radicalibus runcinatis dentatis hiſpidis. *Barr. pl. rar. ic. 1016.*

arenoſum. 20. S. caule ſubfolioſo ramoſo, foliis lyratis rectangulo-dentatis hiſpidis: pilis ramoſis. *Scop. flor. carn. ed.* 2. *t.* 40.

valentinum. 21. S. caule ſimplici erecto ſuperne glabro, foliis lanceolatis hiſpidis antrorſum dentatis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 80.

ſimpliciſſimum. 22. S. caule ſimpliciſſimo, foliis radicalibus ovatis ciliato-hiſpidis petiolatis integerrimis. *S. G. Gmel. it.* 3. *p.* 303. *t.* 36. *f.* 3.

**** *foliis diviſis aut compoſitis.*

altiſſimum. 23. S. foliis runcinatis flaccidis: foliolis linearibus integerrimis, pedunculis laxis. *Buxb. cent.* 5. *t.* 51.

Parra. 24. S. cauleſcens, foliis runcinatis muricatis. *Mant. p.* 255.

Columnæ. 25. S. foliis runcinatis dentatis cauleque villoſis ſubincanis, ſiliquis erectis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 323.

Loeſelii. 26. S. foliis runcinatis acutis hirtis, caule hiſpido. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 324.

orientale. 27. S. foliis runcinatis tomentoſis, caule lævi.

Irio. 28. S. foliis runcinatis dentatis nudis, caule lævi, ſiliquis erectis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 322.

ſinapios. 29. S. foliis radicalibus runcinatis dentatis hirtis: caulinis inciſis linearibus glabris, ſiliquis patentibus. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 37.

pinnatifidum. 30. S. foliis lyrato-pinnatifidis, ſiliquis glabris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 118.

album. 31. S. ſiliquis lineari-teretibus lævibus, foliis pinnatifidis incanis: laciniis oblongo-linearibus obtuſis ſubintegris. *Pallas it.* 3. *p.* 739. *t.* U. *f.* 1.

aſperum. 32. S. ſiliquis ſcabris, foliis pinnatifidis: pinnis lineari-lanceolatis ſubdentatis, corollis calice longioribus.

Sophia. 33. S. petalis calice minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. *Flor. dan. t.* 528.

catholicum. 34. S. ſiliquis filiformibus lævibus, foliis pinnatis denticulatis caulinis. *Mant. p.* 93.

heterophyllum. 35. S. foliis pinnatifidis: foliolis reniformibus ſubtrilobis; infimis pinnatifidis piloſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 46.

pannonicum. 36. S. foliis caulinis ſuperioribus glabris pinnatis: pinnis linearibus integerrimis; extima elongata. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 83.

***** *foliis ſimplicibus indiviſis.*

barbareæ. 37. S. foliis ſpatulato-ovatis dentatis amplexicaulibus nudis.

indicum. 38. S. foliis lanceolato-ovatis ſerratis petiolatis lævibus, ſiliquis ſubarcuatis. *Mant. p.* 93.

ſtrictiſſimum. 39. S. foliis lanceolatis dentato-ſerratis caulinis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 194.

integrifolium. 40. S. foliis linearibus integerrimis, pedunculis glutinoſo-hiſpidis. *Gmel. flor. ſibir.* 3. *t.* 63.

814. ERYSIMUM. *Siliqua* linearis ſtricta, exacte tetraëdra. *Cal.* clauſus. *Stigma* capitatum.

officinale. 1. E. ſiliquis ſpicæ adpreſſis, foliis runcinatis. *Flor. dan. t.* 560. *annon potius ſiſymbrio adſcribendum?*

Barbarea. 2. E. ſiliquis obſolete tetragonis, foliis lyratis: extimo ſubrotundo. *Regn. bot. t.* 202.

Alliaria. 3. E. foliis cordatis. *Zorn pl. off. ic. t.* 91.

polyceraton. 4. E. foliis repando-dentatis, ſiliquis piloſis ſeſſilibus patentibus. *Pallas it.* 3. *p.* 741. *t.* M m. *f.* 1. A. *an ſatis diſtinctum a cheiranthoide?*

cheiranthoides. 5. E. caule ramoſiſſimo, foliis lanceolatis obliquis repando-dentatis, ſiliquis patentibus. *Flor. dan. t.* 731. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 23. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 7.

repandum. 6. E. foliis lanceolatis dentatis, racemis oppoſitifoliis, ſiliquis ſubſeſſilibus, corollis minutis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 22.

hybridum. 7. E. foliis lanceolatis denticulatis glaberrimis, ſiliquis calice triplo longioribus ſuperne incraſſatis. *Weber ſuppl. flor. holſ. p.* 9.

hieracifolium. 8. E. foliis lanceolatis ſerratis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 73.

pinnatum. 9. E. foliis pubeſcentibus pinnatis: pinnis pinnatifidis. *Walt. flor. carol. p.* 174.

bicorne. 10. E. foliis lanceolatis piloſis, ſiliquis apice bicornibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 394.

Digitized by Google

CHAMIRA. *Cal.* baſi cornutus. *Glandula* extra ſtamina breviora.

cornuta. 1. CHAMIRA. *Thunb. nov. pl. gen. p.* 49.

815. CHEIRANTHUS. *Germen* utrinque denticulo glandulato. *Cal.* clauſus: foliolis 2 baſi gibbis. *Semina* plana.

eryſimoides. 1. Ch. foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto ſimpliciſſimo, ſiliquis tetragonis. *Flor. dan. t.* 229. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 74. *annon potius eryſimi ſpecies?*

helveticus. 2. Ch. foliis lanceolatis dentatis nudis, caule erecto, ſiliqua tetragona ſtilo acuminata. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 9.

calloſus. 3. Ch. foliis lanceolatis integris calloſis, caule angulato fruticoſo. *Suppl. p.* 296.

incanus. 4. Ch. foliis lanceolatis integerrimis obtuſis incanis, ſiliquis apice truncatis compreſſis, caule ſuffruticoſo. *Mill. illuſtr. ic.*

ſcapiger. 5. Ch. foliis lanceolatis integerrimis, caule florifero aphyllo: ſterilibus ſimplicibus. *Will. denow fl. Beror. n.* 663. *an diſtincta ſpecies?*

ſalinus. 6. Ch. foliis lanceolatis obtuſis integerrimis, caule erecto, antheris incluſis. *Mant. p.* 93.

feneſtralis. 7. Ch. foliis conferto-capitatis recurvatis undatis, caule indiviſo. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 179.

annuus. 8. Ch. foliis lanceolatis ſubdentatis obtuſis incanis, ſiliquis cylindricis apice acutis, caule herbaceo. *Kniph. bot. orig. cent.* 12. *n.* 26.

littoreus. 9. Ch. foliis lanceolatis ſubdentatis ſubtomentoſis ſubcarnoſis, petalis emarginatis, ſiliquis tomentoſis.

ſinuatus. 10. Ch. foliis tomentoſis obtuſis ſubſinuatis: rameis integris, ſiliquis muricatis.

trilobus. 11. Ch. foliis dentatis obtuſis, calicibus lævibus, ſiliquis nodoſis mucronatis filiformibus lævibus.

fruticuloſus. 12. Ch. foliis lanceolatis acutis glabris ſubſerratis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 94. *Barr. pl. rar. ic.* 1228.

Cheiri. 13. Ch. foliis lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis, caule fruticoſo. *Knorr. del. hort.* 1. *t.* V. 1. *Regn. bot. t.* 204.

mutabilis. 14. Ch. fruteſcens, foliis lanceolatis laxe ſerratis. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *p.* 92.

Farſetia. 15. Ch. foliis lineari-lanceolatis, caule fruticoſo erecto, ſiliquis ovalibus compreſſis. *Mant. p.* 94. *Forsk. flor. æg. arab. ic. t.* 16. β) Cheiranthus linearis. *Forsk. fl. p.* 120.

montanus. 16. Ch. foliis linearibus integris, ſiliquis ſeſſilibus oblongis tetragonis. *Pallas it.* 1. *p.* 496. *Herit. ſtirp. nov. p.* 91. *t.* 44.

villoſus. 17. Ch. foliis linearibus villoſo-ſcabris remote dentatis, caulibus decumbentibus, floribus ſeſſilibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 120.

alpinus. 18. Ch. foliis linearibus integris ſubtomentoſis, caule ramoſo. *Mant. p.* 93. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 75.

canus. 19. Ch. foliis linearibus integris ſubtomentoſis, caule ramoſo tereti uſculo ſcabro ſubtomentoſo, ſiliquis brevibus tomentoſis ſcabris ſubtetraëdris. *Pill. & Mitterp. it. p.* 146.

ſtrictus. 20. Ch. foliis linearibus acutis glabris, caule fruticoſo erecto. *Suppl. p.* 296.

triſtis. 21. Ch. foliis linearibus ſubſinuatis, floribus ſeſſilibus: petalis undatis, caule fruticoſo. *Bocc. muſ. t.* 111.

tenuifolius. 22. Ch. fruteſcens, foliis linearibus integerrimis. *Herit. ſtirp. nov.* 4. *p.* 92.

maritimus. 23. Ch. foliis ellipticis obtuſis nudis ſcabriuſculis, caule diffuſo ſcabro. *Mant. p.* 568. *Barr. pl. rar. ic.* 1127.

chius. 24. Ch. foliis obovatis aveniis emarginatis, ſiliquis apice ſubulatis. *Dill. h. Elth. t.* 147. *f.* 178.

tricuſpidatus. 25. Ch. foliis lyratis, ſiliquis apice tridentatis. *Sabb. h. rom.* 4. *t.* 25. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 3.

816. HELIOPHILA. *Nectaria* 2 recurvata verſus calicis baſin veſicularem.

integrifolia. 1. H. foliis lanceolatis ſupra piloſis. *Mant. p.* 428. *Seb. muſ.* 1. *t.* 17. *f.* 5. *Jacq. coll.* 3. *p.* 219.

amplexicaulis. 2. H. foliis amplexicaulibus integris glabris, ſiliquis moniliformibus. *Suppl. p.* 296.

circæoides. 3. H. foliis cordatis. *Suppl. p.* 298.

filiformis. 4. H. foliis ſubulatis filiformibus glabris, ramis divaricatis, ſiliquis pendulis. *Suppl. p.* 296.

puſilla. 5. H. foliis linearibus, ſiliquis moniliformibus erectis. *Suppl. p.* 297.

flava. 6. H. foliis linearibus, caulibus fruticoſis junceis. *Suppl. p.* 297.

corono-pifolia. 8. H. foliis linearibus pinnatifidis. *Herm. par. Lugdb. t.* 367.

digitata. 8. H. foliis palmato-pinnatifidis villoſis: laciniis linearibus. *Suppl. p.* 296.

pinnata. 9. H. foliis trifidis pinnatiſque: foliolis linearibus, ſiliquis moniliformibus erectis. *Suppl. p.* 297.

817. HESPERIS. *Petala* oblique flexa. *Glandula* intra ſtamina breviora. *Cal.* clauſus. *Siliqua* ſtricta. *Stigma* baſi 2furcum: apice conivente.

triſtis. 1. H. caule hiſpido ramoſo-patente. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 102.

matronalis. 2. H. caule ſimplici erecto, foliis ovato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis. *Gmel. ſibir. ſib.* 2. *t.* 58. β) Heſperis ſibirica. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 442.

inodora. 3. H. caule ſimplici erecto, foliis ſubhaſtatis dentatis, petalis obtuſis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 347.

tatarica. 4. H. caule nudo flexuoſo decumbente, foliis radicalibus craſſiuſculis lanatis ovali-oblongis lacero-dentatis. *Pallas it.* 1. *p.* 497. *t.* L. *f.* 1. 2.

africana. 5. H. caule ramoſiſſimo diffuſo, foliis lanceolatis petiolatis acute dentatis ſcabris, ſiliquis ſeſſilibus. *Bocc. ſic. t.* 42. *t.* 1.

verna. 6. H. caule erecto ramoſo, foliis cordatis amplexicaulibus ſerratis villoſis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 8. *f.* 5.

lacera. 7. H. foliis runcinatis, ſiliquis tricuſpidatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 442. Cheiranthus lacerus. *Herm. par. Lugdb. t.* 193.

acris. 8. H. foliis oblongo-ovatis dentato-ſinuatis glabris: inferioribus petiolatis, petalis ſubrotundis obtuſis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 118.

818. ARABIS. *Glandulæ* nectariferæ 4, ſingulæ intra calicis foliola, ſquamæ inſtar reflexæ. *Siliqua* longa, compreſſa, linearis: apice integro, capitato.

alpina. 1. A. foliis amplexicaulibus dentatis. *Flor. dan. t.* 62.

lucida. 2. A. foliis amplexicaulibus lucidis. *Suppl. p.* 298.

pendula. 3. A. foliis amplexicaulibus, ſiliquis ancipitibus linearibus, calicibus ſubpiloſis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 34.

turrita. 4. A. foliis amplexicaulibus, ſiliquis decurvis planis linearibus, calicibus ſubrugoſis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 11.

grandiflora. 5. A. caule nudo. *Amœn. acad. vol.* 4. *t.* 4. *f.* 10.

ovirenſis. 6. A. caule ſubnudo, foliis glabris petiolatis ſubovatis repando-denticulatis. *Wulfen apud Jacquin collect.* 1. *p.* 196.

lyrata. 7. A. foliis glabris: radicalibus lyratis; caulinis linearibus.

hiſpida. 8. A. foliis hiſpidis: radicalibus runcinatis; caulinis lanceolatis.

bellidifolia. 9. A. foliis ſubdentatis: radicalibus obovatis; caulinis lanceolatis. *Mant. p.* 94. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 280. *β*) Arabis pumila. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 281.

Halleri. 10. A. foliis caulinis ſublyratis: rameis lanceolatis inciſis. *Haller. opuſc. t.* 1. *f.* 1.

canadenſis. 11. A. foliis caulinis lanceolatis dentatis glabris, floribus pendulis. *Pluckn. alm. t.* 86. *f.* 8.

Thaliana. 12. A. foliis petiolatis lanceolatis integerrimis. *Curt. flor. Lond. t.* 73.

cærulea. 13. A. foliis radicalibus obovato-cuneiformibus acutis glabris margine ſuperiori dentatis, racemo paucifloro nutante. *Allion. flor. pedem. n.* 981. *t.* 40. *f.* 2.

819. TURRITIS. *Siliqua* longiſſima, angulata, ſtricta, ſtigmata 2colli terminata. *Cal.* connivens, erectus. *Cor.* erecta.

glabra. 1. T. foliis radicalibus dentatis hiſpidis: caulinis amplexicaulibus integerrimis glabris. *Curt. flor. Lond. t.* 253. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9.) *t.* 143. *f.* 8.

alpina. 2. T. foliis radicalibus dentatis hiſpidis; caulinis ſemiamplexicaulibus integerrimis glabris.

hirſuta. 3. T. foliis omnibus hiſpidis: caulinis amplexicaulibus. *C. Bauh. prodr. th. bot. t. 42. nonne potius arabis?*

820. BRASSICA. *Cal.* erectus, connivens. *Glandula* inter ſtamina breviora & piſtillum, interque longiora & calicem. *Sem.* globoſa.

* *ſtilo obtuſiuſculo.*

orientalis. 1. Br. foliis amplexicaulibus cordatis glabris: radicalibus ſcabris integerrimis, ſiliquis tetragonis. *Jacq. flor. auſtr. 3. t. 282.*

auſtriaca. 2. Br. foliis amplexicaulibus cordatis glabris integerrimis, ſiliquis tetragonis ſtriatis erectis. *Jacq. flor. auſtr. 3. t. 283.*

arvenſis. 3. Br. foliis amplexicaulibus ſpatulatis repandis: ſummis cordatis integerrimis. *Mant. p. 95. 568. Bocc. ſic. t. 25. f. 3. 4.*

alpina. 4. Br. foliis caulinis amplexicaulibus cordato-ſagittatis: radicalibus ovatis, petalis erectis. *Mant. p. 95.*

campeſtris. 5. Br. foliis caulinis uniformibus cordatis ſeſſilibus, radice cauleque tenui. *Flor. dan. t. 550.*

Napus. 6. Br. radice cauleſcente fuſiformi. *Blackw. herb. t. 224.*

Rapa. 7. Br. radice caulefcente orbiculari depreſſa carnoſa. *Blackw. herb. t. 226.*

oleracea. 8. Br. radice caulefcente tereti carnoſa. *Regn. bot. t. 207. 209. Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent. 9. t. 143. f. 2.*

ſinenſis. 9. Br. foliis ovalibus ſubintegerrimis: floralibus amplexicaulibus lanceolatis, calicibus ungue petalorum longioribus.

violacea. 10. Br. foliis lanceolato-ovatis glabris indiviſis dentatis.

muralis. 11. Br. foliis lanceolatis ſinuato-ſerratis læviuſculis, caule erecto glabro. *Hudſ. flor. angl. 290.*

polymorpha. 12. Br. foliis inferioribus lineari-lanceolatis pinnatifido-dentatis: ſuperioribus ſubulatis integris. *Murray comm. Goett. 1776. t. 6.*

craſſifolia. 13. Br. foliis craſſis pinnatifidis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 118. An hujus tribus?*

** *ſtilo enſiformi*, Erucæ.

Eruca. 14. Br. foliis lyratis, caule hirſuto, ſiliquis glabris. *Blackw. herb. t.* 242.

Erucaſtrum. 15. Br. foliis runcinatis, caule hiſpido, ſiliquis lævibus. *Bulliard herb. Franc. t.* 331.

veſicaria. 16. Br. foliis runcinatis, ſiliquis hiſpidis tectis calice tumido.

821. SINAPIS. *Cal.* patens. *Cor.* ungues erecti. *Glandula* inter ſtamina breviora & piſtillum, interque longiora & calicem. *Siliqua* roſtrata dehiſcens: valvis diſſepimento brevioribus.

alba. 1. S. ſiliquis hiſpidis: roſtro obliquo longiſſimo enſiformi. *Mant. p.* 429. *Blackw. herb. t.* 29. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 4.

orientalis. 2. S. ſiliquis retrorſum hiſpidis apice ſubtetragonis compreſſis.

pyrenaica. 3. S. ſiliquis ſtriatis ſcabris, foliis runcinatis lævibus. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 97.

pubeſcens. 4. S. ſiliquis pubeſcentibus erectis: roſtro compreſſo, foliis lyratis villoſis. *Mant. p.* 95. *Ard. ſpec.* 1. *t.* 9.

Allioni. 5. S. ſiliquis ovato-oblongis patuiis, foliis pinnatifidis: laciniis inciſis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 168.

nigra. 6. S. ſiliquis glabris, racemo adpreſſis. *Blackw. herb. t.* 446.

arvenſis. 7. S. ſiliquis multangulis toroſo-turgidis lævibus roſtro ancipiti longioribus. *Flor. dan. t.* 753.

ſinenſis. 8. S. ſiliquis lævibus ſubarticularis patulis, foliis lyrato-runcinatis ſubhirſutis. *Mant. p.* 95. *Ard. ſpec.* 1. *t.* 10.

incana. 9. S. ſiliquis racemo adpreſſis lævibus: foliis inferioribus lyratis ſcabris: ſummis lanceolatis, caule ſcabro. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 169.

erucoides. 10. S. ſiliquis lævibus æqualibus, foliis lyratis oblongis glabris, caule ſcabro. *Mant. p.* 429. *Jacq. h. Vindob.* 2. *t.* 170.

lævigata. 11. S ſiliquis lævibus patulis, foliis lyratis glabris: ſummis lanceolatis, caule lævi.

cernua. 12. S. ſiliquis lævibus patulis, folio radicali lyrato: lobo terminali maximo ovato inciſo-dentato. *Thunb. flor. jap. p.* 261.

japonica. 13. S. ſiliquis lævibus erectis, foliis inciſo-pinnatifidis glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 262.

fruteſcens. 14. S. ſiliquis lævibus linearibus, foliis inferioribus oblongis dentatis: ſuperioribus lanceolatis integerrimis, caule glabro fruteſcente. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 404.

millefolia. 15. S. foliis bipinnatis: pinnulis ovatis ſerratis. *Jacq. coll.* 1. *p.* 41. *p. rar. ic. cent.* 1. *t.* 57.

hiſpanica. 16. S. foliis duplicato-pinnatis; laciniis linearibus.

braſſicata. 17. S. foliis obovatis denticulatis lævibus. *Syſt. nat.* XII. 4. *p.* 631.

Harra. 18. S. foliis ovalibus ſinuatis calicibuſque hiſpidis, caule glabro. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 118.

juncea. 19. S. ramis faſciculatis, foliis ſummis lanceolatis integerrimis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 171.

822. RAPHANUS. *Cal.* clauſus erectus. *Glandulæ* melliferæ 2 inter ſtamina breviora & piſtillum, toridem inter ſtamina longiora & calicem. *Siliqua* ſ. potius *Pericarpium* loculamentoſum toroſum, ſubarticulatum, teres.

caudatus. 1. R. ſiliquis decumbentibus tota planta longioribus. *Mant. p.* 95. *Linn. dec.* 3. *t.* 10.

Raphaniſtrum. 2. R. ſiliquis teretibus articulatis lævibus unilocularibus. *Flor. dan. t.* 678. *Curt. flor. Lond. t.* 267. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 6. *an diſtincti generis?*

ſativus. 3. R. ſiliquis teretibus toroſis bilocularibus. *Blackw. herb. t.* 81. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 5.

ſibiricus. 4. R. ſiliquis teretibus toruloſis villoſis, foliis linearibus pinnatifidis. *Murray comm. Goett.* 1775. *t.* 11.

lyratus. 5. R. ſiliquis teretibus hiſpidis, foliis lyratis, caule baſi procumbente. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 119.

erucoides. 6. R. ſiliquis ovatis gibbis: roſtro longitudine ſiliquæ. *Suppl. p.* 299. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1016.

tenellus. 7. R. *Pallas it.* 1. *p.* 497. & 3. *t.* L. *f.* 3.

Erucaria. 8. R. ſiliqua biarticulata: articulo inferiori polyſpermo; ſuperiori ſubſterili. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 143. *f.* 9. *an diſtincti generis ?*

823. BUNIAS. *Silicula* ſ. potius *Drupa* decidua, 4-edra: angulis inæqualibus acuminatis, muricata: oſſiculo loculamentoſo.

ſpinoſa. 1. B. racemis ſpinaſcentibus. *Forsk. flor. æg. arab. ic. t.* 17. & 18. *f.* A. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

cornuta. 2. B. ſiliculis divaricato-bicornibus baſi ſpinoſis. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 3. *an diſtincti generis ? Oſſiculum, uti in plurimis reliquis,* 2*loculare.*

Erucago. 3. B. ſiliculis tetragonis: angulis bicriſtatis, oſſiculo quadriloculari. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 340. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

ægyptiaca. 4. B. ſiliculis tetragonis undique verrucoſo-muricatis, foliis runcinatis. *Syſt. nat.* XII. 4. *p.* 231. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 145. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

aſpera. 5. B. ſiliculis muricatis quadrangulis, foliis lanceolatis ſubdentatis: pilis furcatis. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 21.

orientalis. 6. B. ſiliculis ovatis gibbis verrucoſis. *Gmel. flor. ſib.* 3. *t.* 57. *Gaertn. de fr. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 2.

balearica. 7. B. ſiliculis hiſpidis, foliis pinnatis: foliolis ſubdentatis. *Mant. p.* 429. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 144.

myagroides. 8. B. ſiliculis biarticulatis ancipitibus ſuperne toruloſis, foliis pinnatis: ſinubus reflexis. *Mant. p.* 96.

Cakile. 9. B. ſiliculis ovatis lævibus ancipitibus biarticulatis. *Mant. p.* 430. *Lob. ic.* 223. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 141. *f.* 12. *an diſtincti generis ?*

cochlearioides. 10. B. ſiliculis cordato-ovatis lævibus inflexis. *Murray comm. Goett.* 1771. *t.* 3. *nonne potius genus hoc ad ſiliculoſas referendum ?*

824. ISATIS. *Silicula* ſ. *Pericarpium* ſimplex ovali-lanceolatum, compreſſum, ſtilo coronatum, 1loculare, 1ſpermum.

tinctoria. 1. I. foliis radicalibus crenatis: caulinis ſagittatis, ſiliculis oblongis. *Regn. bot. t.* 211. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 6. *β) Blackw. herb. t.* 246.

luſitanica. 2. I. foliis radicalibus crenatis: caulinis ſagittatis, pedunculis ſubtomentoſis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 5.

aleppica. 3. I. foliis radicalibus lyratis, caulinis ſagittatis, ſiliculis emarginatis villoſis incurvis. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 31. *t.* 16.

armena. 4. I. foliis integerrimis cordatis poſterius obtuſis, ſiliculis cordatis. *Buxb. cent.* 1. *t.* 4.

ægyptia. 5. I. foliis omnibus dentatis.

pinnata. 6. I. foliis carnoſis pinnatis ſubdentatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 121. *Totum genus potius ſiliculoſis inſerendum.*

825. CRAMBE. *Filamenta* 4 longiora, apice 2fida: altero antherifero. *Pericarpium* ſimplex, globoſum, deciduum, 2articulatum.

maritima. 1. Cr. foliis cauleque glabris. *Flor. dan. t.* 316. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 4.

caſpica. 2. Cr. foliis villoſis, baccis bilocularibus diſpermis. *S. G. Gmel. it.* 4. *p.* 184.

orientalis. 3. Cr. foliis ſcabris, caule glabro. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 93.

hiſpanica. 4. Cr. foliis cauleque ſcabris. *Jacq. obſ. bot.* 2. *t.* 41. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 142. *f.* 4.

Tataria. 5. Cr. foliis decompoſito-multifidis. *Jacq. miſc.* 2. *t.* 25.

fruticoſa. 6. Cr. fruticoſa, foliis ovatis pinnatifidis ſerratis canis, racemis in panicula eſtuſa dichotoma. *Suppl. p.* 299. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 50. *Nonne potius cum univerſo genere ad ſiliculoſas pertinet?*

826. CLEOME. *Glandulæ* nectariferæ 3, ad ſingulos calicis ſinus ſingulæ, excepto infimo. *Petala* omnia adſcendentia. *Siliqua* 2valvis. *Semina* reniformia, globoſa.

* *floribus hexandris.*

† *foliis ſeptenatis.*

gigantea. 1. Cl. caule inermi. *Syſt. nat.* XII. 4. *p.* 232. *Mant. p.* 430. *Jacq. obſ. bot.* 1. *t.* 76. *Receptaculum infra cum valvis ſiliquæ coalitum ?*

ſpinoſa. 2. Cl. foliis ſeptenatis quinatiſque, caule ſpinoſo. *Marcgr. braſ. t.* 34. *Jacq. coll.* 3. *p.* 216.

†† *foliis digitatis.*

anguſtifolia. 3. Cl. foliis ſeptenatis, ternatiſque filiformibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 120.

digitata. 4. Cl. foliis inferioribus digitatis : ſuperioribus ternatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 120.

††† *foliis ternatis.*

aculeata. 5. Cl. foliis integerrimis : ſtipulis ſpinaſcentibus. *Syſt. nat.* XII. 4. *p.* 232.

ſerrata. 6. Cl. foliolis lineari-lanceolatis ſerratis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 262. *f.* 73.

ornithopodioides. 7. Cl. foliolis ovali-lanceolatis. *Dill. h. Elth. t.* 266. *f.* 345.

arabica. 8. Cl. foliolis lanceolatis obtuſis, ſiliquis fuſiformibus viſcoſo-ſcabris. *Linn. dec.* 3. *t.* 8.

violacea. 9. Cl. foliis ternatis ſolitariiſque : foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Barr. pl. rar. ic.* 866.

†††† *foliis ſimplicibus.*

monophylla. 10. Cl. foliis ovato-lanceolatis petiolatis. *Burm. zeyl. t.* 100. *f.* 2.

procumbens. 11. Cl. foliis lanceolatis petiolatis: caulibus procumbentibus. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 181.

capenſis. 12. Cl. foliis ſeſſilibus lineari-lanceolatis, caule angulato.

guianenſis. 13. Cl. foliis ſeſſilibus linearibus, floribus ſolitariis axillaribus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 675. *t.* 273.

** *floribus dodecandris.*

dodecandra. 14. Cl. foliis ternatis. *Burm. zeyl. t.* 100. *f.* 1.

viſcoſa. 15. Cl. foliis quinatis ternatiſque. *Mant. p.* 430. *Martyn cent.* 25. *t.* 25.

*** *floribus polyandris.*

felina. 16. Cl. foliis ternatis cuneiformibus ſtrigoſis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis, ſiliquis linearibus compreſſis. *Suppl. p.* 300.

icoſandra. 17. Cl. foliis quinatis. *Burm. zeyl. t.* 99. *Stamina.* 24.

Chelidonii. 18. Cl. foliis quinatis ſeptenatiſve cuneiformibus ſcabris, racemis terminalibus, ſiliquis filiformibus. *Suppl. p.* 300.

**** *floribus gynandris.*

heptaphylla. 19. Cl. foliis ſubſeptenatis, caule aculeato.

pentaphylla. 20. Cl. foliis quinatis, caule inermi. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 24. *Recept. ſiliq. feneſtratum.*

triphylla. 21. Cl. foliis ternatis, caule inermi. *Herm. par. Lugdb. t.* 565.

fruticoſa. 22. Cl. foliis ſimplicibus, caule fruticoſo, floribus tetrandris. *Burm. ind. t.* 46. *f.* 3.

juncea. 23. Cl. aphylla, corymbis lateralibus: floribus octandris; genitalibus elongatis, ſiliqua lineari tomentoſa, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 300. *Sparrm. nov. act. Upſ.* 3. *p.* 192.

***** *floribus polygamis.*

polygama. 24. Cl. floribus ſuperioribus tetrandris maſculis, foliis ternatis: foliolis ſeſſilibus margine ſubaculeatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 124. *f.* 1.

****** *incertæ tribus.*

tenella. 25. Cl. foliis ternatis filiformibus linearibus. *Suppl. p.* 300.

CLAS-

CLASSIS XV.

MONADELPHIA.

DIANDRIA.

1278. GNETUM. *Flores* monoici. *Amentum* ex calicibus peltatis. *Cor.* o.
♀. *Stil.* 3fidus. *Drupa* 1ſperma.

1279. STILLINGIA. *Flores* monoici.
♂. *Cal.* multiflorus. *Cor.* 1petala.
♀. *Cal.* 1florus. *Stilus* 3fidus. *Germen* 3coccum inter calicem & corollam.

1088. HIPPOMANE. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 2fidus. *Antheræ* 2fidæ.
♀. *Cal.* 3fidus. *Stigma* 3plex. *Drupa* 1ſperma, aut *Capſ.* 3cocca.
* *Omphalea.*

TRIANDRIA.

1134. JUNIPERUS. *Flores* dioici.
♂. *Cal.* Amentum. *Cor.* o.
♀. *Cal.* 3partitus. *Cor.* 3petala. *Stil.* 3. *Bacca* infera, 3ſperma, calicina.

1410. APHYTEIA. *Cal.* magnus, infundibuliformis, ſemitrifidus. *Petala* 3, fauci calicis inſerta, illoque breviora.

GALAXIA. *Cor.* 1petala, 6fida.

GYMNANTHES. *Flores* diclini. *Amentum* nudum. *Cal.* o. *Cor.* o.
♂. *Pedicell.* 3partitus, antherifer.
♀. *Germen* pedicellatum. *Stilus* 3fidus. *Capſ.* 3cocca, 3locularis.
* *Siſyrinchium*, *Ferraria*, *Moreæ* multæ. *Myriſtica.*

TETRANDRIA.

1138. CISSAMPELOS. *Flores* dioici. *Cal.* o.
♂. *Cor.* 4petala.
♀. *Cor.* o. *Stigm.* 2. *Bacca* 1ſperma.

1078. THUJA. *Flores* monoici, amentacei. *Cor.* 0. ♀. *Ament.* ſtrobilaceum. *Piſt.* 2. *Nux* ala cincta.

1070. CUPRESSUS. *Flores* monoici, amentacei. *Cor.* 0. ♀. *Ament.* ſtrobilac. *Stigm.* 2. *Nux* angulata.

PENTANDRIA.

CAOUTCHOUA. *Flores* monoici. *Cor.* 0. ♂. *Cal.* ſemiquinquefidus, globoſo-campanulatus. ♀. *Cal.* ſubpyriformi-campanulatus, 5-dentatus, circumſciſſus. *Piſt.* 1. *Stigm.* 3. *Capſ.* oſſea, 3cocca, 3locularis, 2valvis. *Semina* ſolitaria.

KIRGANELIA. *Flores* monoici. *Cal.* 5partitus. ♀. *Bacca*, ſubtrilocularis, 6ſperma.

SECURINEGA. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* 5partitus. ♂. *Columna* filamentorum exterius corona crocea cincta.

ABRONIA. Monogyna. *Sem.* 1. imo calice tectum.

1318. LERCHEA. Monogyna. *Capſ.* 3locularis, polyſperma.

827. WALTHERIA. Monogyna. *Capſ.* 1locularis, 1ſperma.

1411. SYMPHONIA. Monogyna. *Cor.* globoſa. *Bacca* 5locularis.

MUTABEA. Monogyna. *Bacca* ſphærica, 3locularis, 3ſperma.

TICOREA. Monogyna. *Petala* 5 unguibus longiſſimis, in tubum conjuncta. *Capſ.* 5locularis.

828. HERMANNIA. Pentagyna. *Petala* cucullata, obliqua. *Capſ.* 5locularis, 1ſperma.

829. MELOCHIA. Pentagyna. *Capſ.* 5locularis, 1ſperma.

OCHROMA. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus. *Antheræ* connatæ anfractuoſæ. *Capſ.* 5locularis, polyſperma.

HEXANDRIA.

PHILESIA. *Cal.* 0. *Cor.* campanulata, 6partita: laciniis 3 interioribus duplo longioribus. *Stigm.* 3. *Bacca* ſubtrigona, polyſperma.

NOTHRIA. *Cal.* cylindr. 5angul. 5fidus. *Cor.* infundibulif. 5petala. *Stigm.* 3fidum.

* *Celoſia marilandica, margaritacea. Ayenia. Paſſiflora. Linum narbonenſe. Gerania multa. Byttneria. Mahernium. Xanthium.*

HEPTANDRIA.

1136. EPHEDRA. *Flores* dioici *Cor.* 0.
♂. *Amentum* 2fidum.
♀. *Cal.* imbricatus. *Piſt.* 2. *Bacca* 2ſperma, calicina.

* *Gerania multa.*

OCTANDRIA.

1080. PLUKENETIA. *Flores* monoici. *Cal.* 0. *Cor.* 4petala.
♀. *Stil.* 1. *Capſ.* 4cocca.

ALCHORNEA. *Flores* dioici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 3-5phyllus.
♀. *Cal.* 5dentatus. *Stilus* 2partitus. *Capſ.* baccata, 2cocca.

1412. AITONIA. *Cor.* 4petala. *Piſt.* 1. *Bacca* ſicca, 4angularis, inflata.

ENNEANDRIA.

DRYANDRA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* 5petala.

QUARARIBEA. *Cal.* 1phyllus. *Cor.* 5petala. *Stigma* 2lobum. *Capſ.* 2locularis. *Sem.* ſolitaria.

DECANDRIA.

830. CONNARUS. *Stam.* alterna, breviſſima. *Piſt.* 1. *Legumen* 1loculare.

832. GERANIUM. *Piſt.* 1. *Receptac. commune* roſtratum. *Cocculi* 5 cauda longiſſima tortili.

SERRA. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus; *interior* ſemiquinquepartitus. *Fructus* ovatus 10ſpermus.

CRINODENDRON. *Cal.* 0. *Capſ.* coriacea, obtuſe trigona, 1locularis, apice elaſtice dehiſcens, 3ſperma.

HUGONIA. *Stam.* in urceolum. *Piſt.* 5. *Drupa* baccata : putamine 10loculari.

ÆRVA. *Stamina* 5 ſterilia. *Cal.* 5phyllus inferus. *Capſ.* oblonga, 1ſperma.

PLAGIANTHUS. *Cor.* 5petala. *Cal.* 5fidus. *Germen* ovatum. *Stigma* clavatum. *Bacca.*

1084. JATROPHA. *Flores* monoici. *Cal.* 0.
♂. *Cor.* 5fida.
♀. *Cor.* 5petala. *Stil.* 3. *Capſ.* 3cocca.

SUTHERLANDIA. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* campanulatus 5dentatus.
♀. *Piſt.* 5. *Drupæ* exſuccæ 1loculares.

* *Kleinhovia. Styrax.*

ENDECANDRIA.

BROWNÆA. *Cal.* 5fidus. *Cor.* exterior 5fida : interior 5petala. *Piſt.* 1.

DODECANDRIA.

ACIOJA. *Stamina* inferne in membranam carnoſam coalita. *Piſt.* 1. *Drupa* ſicca, coriacea, fibroſa, 1locularis. *Nux* 1.

835. PENTAPETES. *Stam.* 5. elongata, colorata. *Piſt.* 1. *Capſ.* 5locularis, polyſperma.

WALCUFFA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata 5petala. *Stigma* 5fidum.

1083. CROTON. *Flores* monoici. *Cal.* 5phyllus.
♂. *Cor.* 5petala. *Stam.* 15.
♀. *Cor.* 0. *Stil.* 3. *Capſ.* 3cocca.

1082. ACALYPHA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 4phyllus.
♀. *Cal.* 3phyllus. *Stil.* 3. *Capſ.* 3cocca.

1086. STERCULIA. *Flores* monoici. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 0.
♂. *Stam.* circiter 15.
♀. *Piſt.* 1. *Capſ.* 5.

ALEURITES. *Flores* monoici. *Cor.* 5petala, calice triplo longior. *Nectarium* ſquamis 5. *Cal.* 3fidus.
♀. *Stil.* 0. *Stigm.* 2. *Bacca* globoſa, 2cocca.

LATANIA. *Flores* dioici.
♂. *Spatha* polyphylla : foliolis imbricatis. *Spadix* ramoſus : ramis apice digitato-ramuloſis ; ramulis amentiformibus, ſquamis 1floris. *Cal.* 6partitus.

* *Haleſia.*

ICOSANDRIA.

1087. HURA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 2phyllus. *Antheræ* ſeſſiles.
♀. *Cal.* cylindricus. *Piſt.* 1. *Capſ.* 10cocca.

1137. ADELIA. *Flores* dioici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 3partitus.
♀. *Cal.* 5partitus. *Stil.* 3. *Capſ.* 3cocca.

CROSSOSTYLIS. *Cal.* 4partitus. 4angularis. *Petala* 4. *Stigma* 4partitum. *Bacca* hemiſphærica, ſupera, 1locularis, polyſperma.

ASSONIA. *Cal.* 2plex : exterior apice 3crenatus ; interior profunde 5partitus. *Petala* 5. *Stil.* 5. *Capſ.* 5, 1loculares, 2ſpermæ, in globum aggregatæ.

CAVANILLA. *Cal.* 2plex : exterior 3phyllus, deciduus ; interior 5partitus perſiſtens. *Petala* 5. *Capſ.* 5 in orbem coalitæ, 2valves, 1loculares.

POLYANDRIA.

* *piſtillo uno.*

1414. GUSTAVIA. *Cal.* 0. *Petala* plura. *Bacca* multilocularis. *Semina* appendiculata.

SASSA. *Cal.* 0. *Cor.* 5fida. *Tub.* ſtamineus longiſſimus.

1344. GORDONIA. *Cal.* ſimplex, 5phyllus. *Capſ.* 5loculares. *Sem.* bina, alata.

642. MORISONIA. *Cal.* ſimplex, 2fidus. *Petala* 4. *Stil.* 1. *Bacca* corticata, pedicellata.

MYRODIA. *Cal.* ſimplex, 1phyllus. *Petala* 5. *Drupa* ſicca. *Nuces* binæ.

665. MESUA. *Cal.* ſimplex, 4phyllus. *Petala* 4. *Nux* 4gona, 1ſperma.

SOLANDRA. *Cal.* ſimplex. *Capſ.* toruloſa, 5locularis. *Sem.* multa, duplici ordine.

835. BOMBAX. *Cal.* ſimplex. *Stil.* indiviſus. *Capſ.* 5locularis. *Semina* multa, lanata.

836. ADANSONIA. *Cal.* ſimplex. *Capſ.* loculamentoſa polyſperma: pulpa farinacea.

1413. BARRINGTONIA. *Cal.* ſimplex, 2phyllus ſuperus. *Drupa. Nux* 1-vel 4locularis.

CURUPITA. *Cal.* ſimplex, 6partitus, ſuperus. *Capſ.* ſphærica, operculata, incluſa, 6locularis, polyſperma.

1415. CAROLINEA. *Cal.* ſimplex, tubuloſus, truncatus. *Petala* enſiformia. *Pomum* 5ſulcatum, 2loculare.

LAGUNA. *Cal.* ſimplex, 1phyllus, 5cuſpidatus. *Petala* 5, tubo ſtaminifero inſerta. *Stigma* peltatum. *Capſ.* 5valvis, 5locularis: loculis polyſpermis.

1081. DALECHAMPIA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 6phyllus. *Nectarium* lamellatum.
♀. *Cal.* 10phyllus. *Stil.* 1. *Capſ.* 3cocca.

1135. TAXUS. *Flores* dioici. *Cal.* 4phyllus. *Cor.* 0.
♂. *Antheræ* 8fidæ.
♀. *Stigm.* 1. *Bacca* 1ſperma, recutita.

845. GOSSYPIUM. *Cal.* exterior 3fidus. *Capſ.* loculamentoſa, polyſperma, coadunata.

844. URENA. *Cal.* exterior 5fidus. *Arilli* 1ſpermi, muricati quini.

CIENFUEGOSIA. *Cal.* exterior ſetulis 12 conſtans. *Stigm.* clavatum. *Capſ.* 3valvis, 3locularis: loculis 1ſpermis.

CAMELLIA. *Cal.* exterior imbricatus. *Stilus* indiviſus. *Capſ.* loculis polyſpermis.

PAVONIA. *Cal.* exterior polyphyllus. *Cor.* patens. *Stigm.* 8-10. *Capſ.* 5 in orbem poſitæ, 1loculares, 2valves, 1ſpermæ.

846. HIBISCUS. *Cal.* exterior polyphyllus aut multifidus. *Cor.* patens. *Stigm.* 5. *Capſ.* 5valvis, 5locularis: loculis polyſpermis, raro 1ſpermis.

MALVAVISCUS. *Cal.* exterior 8phyllus. *Cor.* tubuloſa: petalis baſi auriculatis. *Stilus* apice 10fidus. *Stigm.* globoſa. *Drupa* ſphærica, 5locularis: loculis 1ſpermis.

ANODA. *Cal.* ſimplex. ſemiquinquefidus. *Petala* 5. *Stil.* multifidus. *Capſ.* ſubtus hemiſphærica, ſupra ſtellato-plana, multilocularis: loculis 1ſpermis.

PALAVA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens. *Petala* 5. *Stilus* multifidus. *Capſ.* plures, 1ſpermæ receptaculo centrali conico glomeratim impoſitæ.

837. SIDA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens. *Petala* 5, baſi connata. *Germ.* ſtriatum. *Stil.* multifidus aut plures. *Capſ.* numero quatuor excedentes, in orbem poſitæ, 1loculares, 1-3ſpermæ.

CURATARI. *Cal.* --- *Cor.* --- *Piſt.* --- *Stam.* --- *Capſ.* oblonga, operculata, obtuſe 3gona, 3ſperma. *Semina* alata.

** *piſtillis duobus.*

1077. PINUS. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 4phyllus.
♀. *Amentum* ſtrobilaceum. *Nuces* 2 alatæ.

*** *piſtillis tribus.*

1085. RICINUS. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* 5partitus.
♀. *Cal.* 3partitus. *Capſ.* 3cocca.

**** *piſtillis quinque.*

847. STEWARTIA. *Cal.* ſimplex, patens. *Capſ.* loculamentoſa. *Sem.* ſolitaria.

MALACHODENDRON. *Cal.* ſimplex, 5-6partitus. *Cor.* 5-6petala patens. *Capſ.* 5 coadunatæ, 2valves, 1ſpermæ.

***** *ſtilis decem.*

RUIZIA. *Cal.* exterior 3phyllus, deciduus. *Petala.* 5falcata. *Capſ.* 10 in orbem poſitæ, membranaceæ, 1loculares, 2ſpermæ.

****** *piſtillis pluribus.*

838. NAPÆA.	*Flores* interdum dioici. *Cal.* ſimplex; 5fidus. *Cor.* 5petala. ♀. *Stam.*effœta. *Arilli* 10 in orbem poſiti.
842. LAVATERA.	*Cal.* exterior 3fidus. *Arilli* 1ſpermi, verticillati.
840. ALCEA.	*Cal.* exterior 6fidus. *Arilli* 1ſpermi, plures.
839. ALTHÆA.	*Cal.* exterior 9fidus. *Arilli* 1ſpermi, verticillati.
841. MALVA.	*Cal.* exterior 3phyllus. *Arilli* 1ſpermi, verticillati, plures.
843. MALOPE.	*Cal.* exterior 3phyllus. *Arilli* 1ſpermi, conglomerati.
1266. MALACHRA.	*Cal.* exterior 3phyllus. *Arilli* 5 monoſpermi.

Digitized by Google

DIANDRIA.

1278. GNETUM. *Flores* monoici. *Cor.* o. *Cal.* ſquama amenti.
♂. *Filamentum* 1 antheris 2.
♀. *Stigma* 3fidum. *Drupa* 1-ſperma.

Gnemon. 1. GNETUM. *Mant. p.* 125. *Rumpf amb.* 1. *t.* 71.

1279. STILLINGIA. *Flores* monoici.
♂. *Cal.* hemiſphæricus, multiflorus. *Cor.* tubuloſa, lacera.
♀. *Cal.* 1florus, inferus. *Cor.* ſupera. *Stigm.* 3. *Capſ.* 3cocca.

ſilvatica. 1. STILLINGIA. *Mant. p.* 126.

1088. HIPPOMANE. *Flores* monoici, amentacei. *Cor.* o.
♂. *Perianth.* 2partitum vel 4fidum.
♀. *Perianth.* 2-3fidum. *Stigmata* 3. *Drupa* vel *Capſ.* 3cocca.

Mancinella. 1. H. foliis ovatis crenatis baſi biglanduloſis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 238.

biglanduloſa. 2. H. foliis ovato-oblongis baſi biglanduloſis. *Jacq ſtirp. amer. pict. t.* 237.

ſpinoſa. 3. H. foliis ſubovatis dentato-ſpinoſis. *Pluckn. alm. t.* 196.

TRIANDRIA.

1134. JUNIPERUS. *Flores* diclini.

♂. *Cal.* ſquama amenti. *Cor.* o. *Drupa* ſucculenta, clauſa, polypyrena.

♀. *Cal.* 3partitus. *Petala* 3. *Piſt.* 3. calicis tuberculis 3 inæqualis, 1 locularis, glandulis balſamiferis ad baſin externam ſtipata.

thurifera. 1. J. foliis quadrifariam imbricatis acutis.

barbadenſis. 2. J. foliis omnibus quadrifariam imbricatis: junioribus ovatis, ſenioribus acutis. *Hort. angl. t.* 1. *f.* 1.

Sabina. 3. J. foliis oppoſitis erectis decurrentibus: oppoſitionibus pyxidatis. *Blackw. herb. t.* 214.

ſinenſis. 4. J. foliis decurrentibus imbricato-patentibus confertis: caulinis ternis; rameis quaternis. *Mant. p* 127.

bermudina. 5. J. foliis inferioribus ternis: ſuperioribus binis decurrentibus ſubulatis patulis acutis. *Herm. par. Lugdb. t.* 347.

virginiana. 6. J. foliis ternis: omnibus patentibus. *du Roi harbk. Baumz.* 1. *p.* 346.

caroliniana. 7. J. foliis ternis baſi adnatis: junioribus imbricatis: ſenioribus patulis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 660. Juniperus virginiana. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 157. *f.* 3.

communis. 8. J. foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. *Mill. ill. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* W. 8. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 3.

Oxycedrus. 9. J. foliis ternis patentibus mucronatis bacca brevioribus. *Mant. p.* 499. *du Hamel. arbr.* 2. *t.* 128.

phœnicea. 10. J. foliis ternis obliteratis imbricatis obtuſis.

lycia. 11. J. foliis ternis undique imbricatis ovatis obtuſis. *Lob. ic.* 221. (*ined.*)

1410. APHYTEIA. *Cal.* magnus, infundibuliformis, ſuperus ſemitrifidus. *Petala* 3 fauci tubi calicis inſerta, eoque breviora. *Antheræ* maximæ, perſiſtentes. *Stigm.* 3gonum. *Bacca* 1locularis.

Hydnora. 1. APHYTEIA. *Suppl. p.* 301. *Thunb. act. Stockh.* 1775. *t.* 2. & 1777. *t.* 4. *f.* 1. 2. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 137. *f.* 3.

GYMNANTHES. *Flores* diclini. *Amentum* nudum. *Cal.* 0. *Cor.* 0.
♂. *Pedicellus* 3partitus, antherifer.
♀. *Germen* pedicellatum. *Stigm.* 3ſubſeſſilia. *Capſ.* 3cocca, 3locularis.

elliptica. 1. G. dioica, ſtaminibus tripartitis, floribus femineis amentaceis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 96.

lucida. 2. G. monoica, ſtaminibus trichotomis, floribus femineis ſolitariis pedicellatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſpec. p.* 96.

GALAXIA. *Spatha* 1valvis. *Cor.* 1petala, 6fida.

ovata. 1. G. foliis ovatis. *Thunb. nov. pl. gen. p.* 51. *ic. Suppl. p.* 93. Ixia Galaxia.

graminea. 2. G. foliis lineari-filiformibus, tubo longiſſimo. *Suppl. p.* 94. Ixia fugaciſſima. *Jacq. collect.* 2. *p.* 366. *t.* 18. *f.* 2.

obſcura. 3. G. foliis ſubulato-canaliculatis, corollæ tubo brevi. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 341. *n.* 603. *t.* 189. *f.* 4.

TETRANDRIA.

1138. CISSAMPELOS. *Flores* dioici. *Cal.* o.
♂. *Cor.* 4petala. *Nectarium* rotatum.
♀. *Nectar.* extrorſum dilatatum. *Cor.* o. *Stil.* 3 *Bacca* 1ſperma.

Caapeba. 1. C. foliis baſi petiolatis integris. *Plum. ic.* 67. *f.* 2.

Pareira. 2. C. foliis peltatis cordatis emarginatis integriſque. *Plum. amer. t.* 93. *Swarts obſ. bot. t.* 10. *f.* 5.

ſmilacina. 3. C. foliis cordatis acutis angulatis. *Catesb. Car.* 1. *t.* 51.

fruticoſa. 4. C. foliis ovatis petiolatis integris, caule erecto fruticoſo. *Suppl. p.* 432.

capenſis. 5. C. foliis ovatis obtuſis petiolatis integris, caule volubili. *Suppl. p.* 432.

1078. THUJA. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* ſquama amenti.
♀. *Cal.* ſquama ſtrobili 2flora. *Piſt.* 1. *Nux* 1 1ocularis cincta ala emarginata.

occidentalis. 1. Th. ſtrobilis lævibus: ſquamis obtuſis. *Blackw. herb. t.* 210. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 2.

orientalis. 2. Th. ſtrobilis ſquarroſis: ſquamis acutis. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 6. *t.* 92. *f.* 2.

dolabrata. 3. Th. ſtrobilis ſquarroſis, foliis trifariam imbricatis ſubtus excavatis niveis. *Suppl. p.* 420. *Thunb. flor. jap. p.* 266.

aphylla. 4. Th. ſtrobilis quadrivalvibus, foliis turbinatis vaginantibus hinc mucronatis. *β)* Thuja cupreſſoides. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 633. *Mant. p.* 125.

1079. CUPRESSUS. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* ſquama 1flora.
♂. *Cal.* amenti ſquama. *Antheræ* ſeſſiles.
♀. *Cal.* ſtrobili ſquama. *Nux* angulata, 1locularis, evalvis.

ſempervirens. 1. C. foliis imbricatis, frondibus quadrangulis. *Regn. bot. t.* 373. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 5. β) *Blackw. herb. t.* 127.

luſitanica. 2. C. foliis imbricatis glandulofis, frondibus quadrangulis, ramis dependentibus. *Herit. ſtirp. nov. faſc.* 1. *p.* 15. *t.* 8.

thyoides. 3. C. foliis imbric. frond. ancipitibus. *Pluckn. mant. t.* 345. *f.* 1.

columnaris. 4. C. foliis imbricatis ſubulatis ſulcatis, ſtrobilis cylindricis elongatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 67.

diſticha. 5. C. foliis diſtichis patentibus. *Catesb. Car.* 1. *t.* 11.

japonica. 6. C. foliis quadrifariis falcatis compreſſis ſulcatis decurrentibus. *Suppl. p.* 421. *Banks ic. Kaempf. t.* 48. *Thunb. flor. jap. p.* 265? *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 5.

juniperoides. 7. C. foliis oppoſitis decuſſatis ſubulatis patulis.

pendula. 8. C. foliis oppoſitis ovatis, ramulis dichotomis pendulis. *Thunb. flor. jap. p.* 265.

PENTANDRIA.

CAOUTCHOUA *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Cal.* globoſo-campanulatus, ſemiquinquefidus. *Antheræ* infra apicem dorſo columnæ longitudinaliter adhærentes, ſubovatæ, 2loculares.
♀. ſolitar. terminal. *Cal.* ſubpyriformi-campanulatus, 5fidus, circumſciſſus. *Piſt.* 1. *Stigm.* 3 depreſſo-2loba. *Capſ.* 3cocca, oſſea, 3locularis: loculis 2valvibus, 1ſpermis.

elaſtica. 1. CAOUTCHOUA. *Suppl. p.* 422. *Aubl. pl. guj. p.* 871. *t.* 335.

KIRGANELLA. *Flores* monoici. *Cor.* o. *Cal.* 5-partitus.
♀. *Bacca* parva, ſubtrilocularis, 6ſperma.

virginea. 1. KIRGANELLA. *Juſſieu gen. plant. p.* 387.

SECURINEGA. *Flores* monoici. *Cal.* 5partitus. *Cor.* o.
♂. *Column.* filament. exterius corona crocea cincta.

duriſſima. 1. SECURINEGA. *Juſſieu gen. plant. p.* 388.

ABRONIA. *Cal.* tubuloſus: limbo hypocrateriformi 5partito; laciniis obcordatis. *Antheræ* incluſæ. *Sem.* 1. imo calice tectum.

californica. 1. ABRONIA. *Juſſieu gen. plant. p.* 449.

1318. LERCHEA. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* infundibuliformis, 5fido. *Antheræ* germinis tubo inſidentes. *Stilus* 1. *Capſ.* 3locularis, polyſperma.

longicauda. 1. LERCHEA. *Mant. p.* 257.

OCHROMA. *Cal.* duplex: exterior 3phyllus. *Antheræ* connatæ, anfractuoſæ. *Capſ.* 5locularis, polyſperma.

Lagopus. 1. OCHROMA. *Cavanil. diſſ. bot.* 5. *t.* 153. Bombax pyramidale.

827. WALTHERIA. Monogyna. *Capſ.* 1locularis, 2valvis, 1ſperma.

americana. 1. W. foliis ovatis plicatis dentato-crenatis tomentoſis, capitulis pedunculatis. *Cavan. diſſ. bot.* 6. *t.* 170. *f.* 1.

anguſtifolia. 2. W. foliis ovatis minimis plicatis ſerratis nudis, floribus axillaribus glomeratis. *Cavan. diſſ. bot.* 6. *t.* 180. *f.* 2.

indica. 3. W. foliis ovatis ſerratis plicatis, capitulis ſeſſilibus. *Jacq. plant. rar. ic.* 1. *t.* 65. *nonne ſpecie conjungenda cum americana ?*

caroliniana. 4. W. foliis ovatis nervoſis caulibuſque teretibus hirſutis, floribus ſolitariis. *Walt. flor. Carol. p.* 175.

ovata. 5. W. foliis lato-ovatis acuminatis ſerrato dentatis tomentoſis craſſis, floribus racemoſis congeſtis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 317. *n.* 456. *t.* 171. *f.* 1.

elliptica. 6. W. caule fruticoſo, foliis ellipticis oblongis ſerratis plicatis tomentoſis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 316. *n.* 454. *t.* 171. *f.* 2.

1411. SYMPHONIA. Monogyna. *Cor.* globoſa. *Bacca* 5locularis.

globulifera. 1. SYMPHONIA. *Suppl. p.* 302.

MUTABEA. Monogyna. *Bacca* ſphærica, 3locularis, 3ſperma. *Cal.* tubulatus, 5fidus : *Cor.* 5partita : tubo breviſſimo. *Filamentum* apice 5dentatum. *Stigma* capitatum.

guianenſis. 1. MUTABEA. *Aubl. plant. guj.* 2. *p.* 680. *t.* 274.

TICOREA. *Cal.* minimus, 5dentatus. *Petala* 5 unguibus longiſſimis : inferne in tubum conjuncta. *Filamenta* in tubum coalita, apice 5cuſpidatum. *Capſ.* 5locularis.

fœtida. 1. TICOREA. *Aubl. plant. guj.* 2. *p.* 689. *t.* 277.

828. HERMANNIA. Pentagyna. *Capſ.* 5locularis. *Petala* baſi ſemitubulata, obliqua.

althæifolia. 1. H. foliis ovatis plicatis crenatis tomentoſis, calicibus florentibus campanulatis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 179. *f.* 2.

incana. 2. H. foliis ovatis plicatis tomentoſo-incanis: ſtipulis parvis ſubulatis. *Cavanill. diſſ. bot. 6. p.* 328. *n.* 473.

plicata. 3. H. foliis cordato-ovatis denticulatis plicatis tomentoſis, calicibus florentibus oblongo-ovatis ſubcylindricis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 411.

odorata. 4. H. foliis oblongo-lanceolatis tomentoſis ſubtus rugoſis: inferioribus truncato-denticulatis, calicibus urceolatis anguloſis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 412.

ſalvifolia. 5. H. foliis ovatis integris rugoſis tomentoſo-hiſpidis, floribus cernuis. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 180. *f.* 2.

involucrata. 6. H. foliis ovatis acutis tomentoſis, floribus ſolitariis involucratis corollis revolutis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 328. *n.* 475. *t.* 177. *f.* 1.

candicans. 7. H. foliis ovatis ſubcordatis obtuſis tomentoſis, calicibus florentibus patulis ſubangulatis, ſtipulis ſubulatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 412.

ſcabra. 8. H. foliis lanceolato-ovatis dentatis ſcabris, pedunculis bifloris: calicibus brevibus. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 331. *n.* 481. *t.* 182. *f.* 2.

biſerrata. 9. H. foliis ovato-lanceolatis inæqualibus ſerratis glabris, floribus cernuis. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 200. *f.* 2. *an cum glabrata, pulchella & diffuſa Mahemiæ potius ſpecies?*

trifurca. 10. H. foliis lanceolatis integris tridentatiſque, racemis ſecundis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 178. *f.* 2.

hyſſopifolia. 11. H. foliis lanceolatis obtuſis ſerratis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 181. *f.* 3.

lavendulifolia. 12. H. foliis lanceolatis obtuſis integerrimis. *Dill. h. Elth. t.* 147. *f.* 176.

denudata. 13. H. foliis lanceolatis acutis lævibus ſuperne ſerratis. *Suppl. p.* 301. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 181. *f.* 1.

glabrata. 14. H. foliis lanceolatis acutis inciſo-ſerratis glabris, floribus cernuis. *Suppl. p.* 301. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 200. *f.* 1.

ciliaris. 15. H. foliis lanceolatis acutis integris ſerratiſque ciliatis. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 176. *f.* 1. *an eadem cum Mahemia verticillata?*

groſſularifolia. 16. H. foliis lanceolatis pinnatifidis. *Characterem augeant autoptæ.*

17. H.

pulchella. 17. H. foliis lanceolatis pinnatifidis : pinnis integris inciſiſque, caule erecto lævi. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 177. *f.* 3.

diffuſa. 18. H. foliis lanceolatis pinnatifidis : pinnis integris dentatiſque, pedunculis capillaribus bifloris, caule procumbente. *Suppl. p.* 302.

procumbens. 19. H. foliis inciſo-pinnatifidis : inferioribus ovatis ; ſuperioribus elongatis, floribus racemoſis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 329. *n.* 477. *t.* 177. *f.* 2.

veſicaria. 20. H. caule tomentoſo, foliis confertis pinnatifidis ſubtus piloſo-ſtellatis, capſulis magnis inflatis terminalibus. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 331. *n.* 483. *t.* 181. *f.* 2.

alnifolia. 21. H. foliis cuneiformibus lineatis plicatis crenato-emarginatis. *Mill. illuſtr. ic.*

capenſis. 22. H. foliis oblongis obtuſis inciſis ſeſſilibus, floribus axillaribus ſubſolitariis. *Paterſ. it. cap. p.* 60. *ic.*

linifolia. 23. H. foliis linearibus, pedunculis unifloris.

filifolia. 24. H. foliis lineari-triquetris integerrimis. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 180. *f.* 3.

trifoliata. 25. H. foliis ternatis ſeſſilibus plicatis retuſis tomentoſis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 182. *f.* 1.

triphylla. 26. H. foliis ternatis petiolatis planis obovatis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 178. *f.* 3.

829. MELOCHIA. Pentagyna. *Capſ.* 5 iloculares, iſpermæ.

depreſſa. 1. M. floribus ſolitariis, capſulis depreſſis pentagonis : angulis obtuſis ciliatis. *Mill. h. angl. t.* 3. *f.* 2.

venoſa. 2. M. pedunculis diſtinctis terminalibus multifloris, foliis ovatis ſerratis venoſis ſubtus tomentoſis, caule piloſo. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 97.

odorata. 3. M. paniculis pedunculatis compoſitis, foliis ovatis ſubcordatis ſublobatis, biſerratis glabris. *Suppl. p.* 302. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 173. *f.* 2.

concatenata. 4. M. racemis confertis terminalibus, capſulis globoſis ſeſſilibus. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 175. *f.* 2.

lupulina. 5. M racemis confertis axillaribus, calicibus inflatis membranaceis, foliis ovato-cordatis incifo-ſerratis ſubtus tomentoſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 97.

tomentoſa. 6. M. floribus umbellatis axillaribus, capſulis pyramidatis pentagonis: angulis mucronatis, foliis tomentoſis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 172. *f.* 2.

pyramidata. 7. M. floribus umbellatis, capſulis pyramidatis pentagonis: angulis inferne muricatis, foliis glabris. *Jacq. h. Vindob. t.* 30. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 113. *f.* 7.

ſupina. 8. M. floribus capitatis, foliis ovatis ſerratis, caulibus procumbentibus. *Pluckn. almag. t.* 132. *f.* 4.

caracaſſana. 9. M. floribus capitatis, foliis alternis cordatis crenatis villoſis petiolatis; caule erecto fruticoſo. *Jacq. Collect.* 2. *p.* 369. *plant. rar. ic.* 2. *t.* 63.

corchorifolia. 10. M. floribus capitatis ſeſſilibus, capſulis ſubrotundis, foliis ſubcordatis ſublobatis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *t.* 174. *f.* 2.

nodiflora. 11. M. floribus conglobatis axillaribus, capſulis globoſis, foliis ovatis acuminatis glabris. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 135. *f.* 2.

borbonica. 12. M. floribus axillaribus glomeratis, fructu quinquecapſulari, foliis ovato-lanceolatis cuſpidatis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 321. *n.* 462. *t.* 174. *f.* 1.

hirſuta. 13. M. ſpicis terminalibus denſis hirſutis, foliis ovatis inæqualiter ſerratis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 323. *n.* 465. *t.* 175. *f.* 1.

HEXANDRIA.

PHILESIA. *Cal.* o. *Cor.* regularis, campanulata, 6partita: laciniis 3 interioribus duplo longioribus. *Stigmata* 3. *Bacca* ſubtrigona, polyſperma.

magellanica. 1. PHILESIA. *Juſſieu gen. plant. p.* 41.

NOTHRIA. *Cal.* priſmat. 5angul. 5fidus. *Cor.* infundibuliformis, 5petala. *Stigm.* 3fidum. *Siliqua.*

capenſis. 1. NOTHRIA. *Berg. flor. cap. p.* 171.

HEPTANDRIA.

1136. EPHEDRA. *Flores* dioici amentacei. *Cor.* o.
♂. *Cal.* ſemibifidus. *Antheræ* 4 inferiores, 3 ſuperiores.
♀. *Cal.* 2partitus, 5plex. *Piſt.* 2. *Sem.* 2. calice baccato tecta.

diſtachya. 1. E. pedunculis oppoſitis: amentis geminis. *Cam. hort. t.* 46.

monoſtachya. 2. E. pedunculis pluribus: amentis ſolitariis. *Gmel. flor. ſib.* 1. *t.* 38. *f.* 1.

aphylla. 3. E. ramis patentiſſimis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 170.

OCTANDRIA.

1080. PLUCKNETIA. *Flores* monoici. *Cor.* 4petala.
♂. *Nectaria* 4barbata. *Cal.* o.
♀. *Cal.* 4phyllus. *Stilus* longiſſimus: ſtigmate peltato 4fido. *Capſ.* 4angularis, 4locularis.

volubilis. 1. PLUCKNETIA. *Suppl. p.* 421. *Rumpf amb.* 1. *t.* 79. *f.* 2.

ALCHORNEA. *Flores* dioici. *Cor* o.
♂. *Cal.* 3-5phyllus.
♀. *Cal.* 4-5dentatus. *Stilus* 2partitus. *Capſ.* baccata, 2cocca.

latifolia. 1. ALCHORNEA. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 98.

1412. AITONIA. *Cal.* 4partitus. *Cor.* 4petala. *Piſt.* 1. *Bacca* ſicca, 4angularis, 1locularis, polyſperma.

capenſis. 1. AITONIA. *Suppl. p.* 303. *Thunb. act. Lund.* 1. *p.* 166. *ic.*

ENNEANDRIA.

DRYANDRA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* 5petala.

cordata. 1. DRYANDRA. *Thunb. flor. jap. p.* 267. *t.* 27.

QUARARIBEA. *Cal.* 3-5dentatus, perſiſtens. *Cor.* 5petala. *Stil.* longiſſimus, tubo vaginatus. *Stigma* 2lobum. *Capſ.* coriacea, ovata, 2locularis. *Sem.* ſolitaria, ovata.

guianenſis. 1. QUARARIBEA. *Aubl. pl. guj. p.* 691. *t.* 278.

DECANDRIA.

830. CONNARUS. *Piſt.* 1. *Stigm.* ſimplex. *Capſ.* 2valvis, 1locularis, 1ſperma.

monocarpus. 1. C. foliis ovatis uninerviis ternatis. *Burm. zeyl. t.* 89.

africanus. 2. C. foliis ternatis ſubtus nervoſis, floribus paniculatis: petalis imberbibus. *Cavanill. diſſ. bot.* 7. *p.* 375. *t.* 221.

pentagynus. 3. C. foliis ternatis trinerviis, floribus pentagynis. *Cavanill. diſſ. bot.* 7. *p.* 376. *t.* 223.

pinnatus. 4. C. foliis ternatis aut quinato-pinnatis, petalis baſi bifetis. *Cavanill. diſſ. bot.* 7. *p.* 375. *t.* 222.

831. HUGONIA. *Cor.* 5petala. *Stili* 5. *Drupa* baccata: putamine ſtriato 10loculari.

Myſtax. 1. H. caule fruticoſo, foliis ovato-lanceolatis ſerratis glabris, ſpinis oppoſitis revolutis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 73. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 58. *f.* 7.

tomentoſa. 2. H. foliis ovatis tomentoſis obſolete dentatis baſi anguſtatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 73. *f.* 2.

832. GERANIUM. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala. *Piſt.* 1. *Stigm.* 5. *Receptac.* commune roſtratum. *Cocculi* 5 : cauda longiſſima tortili.

* *corollis regularibus ; glandulis 5.*

† *pedunculis unifloris.*

ſpinoſum. 1. G. caule carnoſo nodoſo, ſpinis ſubulatis, foliis cuneiformibus reflexis. *Mant. p.* 98. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 75. *f.* 2. *Paterſon journ. into Caffraria p.* 116. *ic.*

ſanguineum. 2. G. caule articulato rubro hiſpido, foliis orbiculatis, profunde ſubſeptempartitis : laciniis trifidis, pedunculis ſolitariis longiſſimis articulatis. *Bulliard herb. Franc. t.* 12.

proſtratum. 3. G. caule proſtrato nodoſo, foliis oppoſitis profunde quinquelobis : lobis trifidis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 196. *t.* 76. *f.* 3.

ranunculoides. 4. G. radice tuberoſa, foliis orbiculatis multifidis, pedunculis longiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 197. *n.* 271.

ſeſſiliflorum. 5. G. radice napiformi ſquamoſa, foliis ſubrotundis ſeptempartitis : laciniis trifidis, floribus ſubſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 198. *n.* 273. *t.* 77. *f.* 2.

emarginatum. 6. G. foliis emarginatis ovatis crenatis. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 193. *t.* 113. *f.* 1. *an monſoniæ potius ſpecies ?*

Reichardi. 7. G. foliis pleriſque oblongis inciſo-crenatis trilobis vel quinquelobis, ſcapis unifloris. *Murray comm. Goett.* 1780. *t.* 3. *Curtis bot. mag. t.* 18.

parvulum. 8. G. foliis cordatis obtuſis villoſis ſubtrilobis, ſcapis radicalibus nudis unifloris, floribus pentandris. *Scop. del. inſ.* 1. *t.* 3. *f.* B.

ſibiricum. 9. G. caule herbaceo villoſiſſimo, foliis oppoſitis quinquepartitis, pedunculis ſubunifloris. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 77. *f.* 1.

†† *pedunculis biſloris*, Batrachia.

† *petalis bifidis , inciſis aut emarginatis.*

arabicum. 10. G. foliis rotundis inciſis, pedunculis binis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 126.

tuberoſum. 11. G. foliis albicantibus multipartitis : laciniis linearibus ſubpinnatis obtuſis, pedunculis binis aut bifloris, petalis emarginatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 78. *f.* 1.

monta-num. 12. G. foliis petiolatis orbicularis ſubſeptemlobatis: lobis incifis venoſis calicibuſque piloſis, petalis emarginatis. *Hablizl ap. S. G. Gmel. it. 4. p. 173.*

diſſectum. 13. G. caule villoſo erectiuſculo, foliis quinquepartito-trifidis pedunculos excedentibus, petalis emarginatis. *Cavanill. diſſ. 4. t. 78. f. 2.*

columbi-num. 14. G. caule procumbente, foliis oppoſitis palmatis: laciniis pinnatis, pedunculis ſolitariis longiſſimis. *Cavanill. diſſ. 4. t. 82. f. 1.*

incanum. 15. G. caule procumbente, foliis palmatis ſubtus incanis: laciniis pinnato-linearibus, pedunculis longiſſimis, cocculis hirſutis. *Cavanill. diſſ. 4. t. 82. f. 2.*

puſillum. 16. G. caule herbaceo ramoſo, foliis ſubrotundo-lobatis: lobis trifidis, floribus pentandris. *Mant. p. 435. Cavanill. diſſ. 4. t. 83. f. 1.*

humile. 17. G. caule humili, foliis orbiculatis incifis lobatis, petalis bifidis æqualibus. *Cavanill. diſſ. 4. p. 202. n. 230. t. 83. f. 2.*

molle. 18. G. caule ſubereɫto, foliis orbiculatis ſubſeptemlobatis trifidis obtuſis: caulinis oppoſitis, ſuperioribus alternis. *Flor. dan. t. 679.*

pyrenai-cum. 19. G. caule herbaceo villoſo, foliis oppoſitis ſubpeltatis orbiculatis: lobis trifidis obtuſis. *Cavanill. diſſ. 4. t. 79. f. 2. Curt. flor. Lond. t. 159.*

cinereum. 20. G. radice craſſa, foliis orbiculatis cinereis profunde quinquelobis: radicalibus longiſſime petiolatis; caulinis oppoſitis. *Cavanill. diſſ. 4. t. 89. f. 1.*

lupinoi-des. 21. G. radice tuberoſa, foliis orbiculatis tomentoſis multipartitis: laciniis linearibus incifis, ſcapis radicalibus. *Burm. de geran. n. 65.*

argen-teum. 22. G. radice craſſa, foliis tomentoſo-ſericeis ſubpeltatis ſubſeptempartitis: laciniis trifidis, ſcapis radicalibus. *Jacq. pl. rar. ic. cent. 2. t. 65.*

bohemi-cum. 23. G. caule villoſo viſcoſo, foliis oppoſitis rugoſis glaucis viſcoſis, filamentis ciliatis. *Mant. p. 434. cent. 176. Cavanill. diſſ. 4. t. 81. f. 2.*

carolinia-num. 24. G. caule herbaceo dichotomo: geniculis inflatis rubeſcentibus, foliis oppoſitis quinquepartitis trifidis cocculis hirſutis. *Cavanill. diſſ. 4. t. 124. f. 2.* β) *Mant. p. 434. Cavanill. diſſ. 4. t. 84. f. 1.*

ſtriatum. 25. G. caule herbaceo decumbente, foliis quinquelobis: lobis dentatis medio dilatatis; petalis bilobis venoſo-reticulatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 79. *f.* 1. *Curtis bot. magaz. t.* 55.

nodoſum. 26. G. caule quadrangulari erecto, foliis ſubquinquelobis dentatis ſupra ſcabris ſubtus lucidis, petalis ſtriatis bifidis. *Mant. p.* 434. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 80. *f.* 1.

reflexum. 27. G. caule herbaceo, foliis alternis ſubſeptemlobis acutis, petalis reflexis laciniatis baſi hiantibus, calicibus muticis. *Mant. p.* 256. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 81. *f.* 1.

ibericum. 28. G. caule herbaceo dichotomo villoſo, foliis oppoſitis quinquepartitis inciſis, petalis trilobis: medio breviore cuſpidato. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 209. *t.* 124. *f.* 1.

ſilvaticum. 29. G. caule erecto, foliis ſubpeltatis quinquelobis inciſo-ſerratis, petalis emarginatis. *Flor. dan. t.* 124.

††*petalis integris.*

fuſcum. 30. G. caule herbaceo erecto, foliis alternis hirſutis palmato quinquelobis dentatis inciſis, floribus ſubſpicatis: calicibus mucronatis. *Mant. p.* 97. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 89. *f.* 2.

phæum. 31. G. caule erecto, pedunculis ſolitariis, calicibus ſubariſtatis, petalis undulatis. *Kniph. bot. or. cent.* 5. *t.* 35. *an vere diſtincta a fuſco ſpecies?*

pratenſe. 32. G. caule herbaceo erecto, foliis oppoſitis ſubpeltatis multipartitis rugoſis: lobis pinnatis acutis. *Curt. flor. Lond. t.* 250.

paluſtre. 33. G. foliis oppoſitis quinquelobis inciſis cauleque herbaceo villoſis, pedunculis longiſſimis declinatis. *Flor. dan. t.* 596.

batrachioides. 34. G. caule herbaceo erecto dichotomo, foliis oppoſitis quinquepartitis inciſis, calicibus inflatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 211. *n.* 295. *t.* 85. *f.* 2.

macrorhizum. 35. G. foliis oppoſitis quinquelobis, calicibus inflatis ſphæricis, piſtillo declinato longiſſimo. *Mant. p.* 434. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 85. *f.* 1.

maculatum. 36. G. caule erecto herbaceo, foliis oppoſitis quinquepartitis inciſis: ſummis ſeſſilibus, petalis integerrimis rotundatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 86. *f.* 2.

aſphodeloides. 37. G. radice tuberoſa, foliis multipartitis orbiculatis: laciniis acutis. *Burm. de geran. n.* 27.

lucidum. 38. G. caule herbaceo, foliis oppoſitis piloſis lucidis rotundato-lobatis, calicibus pyramidatis tranſverſim rugoſis. *Flor. dan. t.* 213.

rotundifolium. 39. G. caule proſtrato, foliis oppoſitis: inferioribus ſubrotundis; ſuperioribus ſubcuneatis, petalis integerrimis caule paulo longioribus. *Mant. p.* 434. *Regn. bot. t.* 214.

robertianum. 40. G. foliis ternatis pinnatis inciſis, calicibus decemſtriatis piloſis. *Flor. dan. t.* 694.

palmatum. 41. G. caule dichotomo: internodiis aphyllis longiſſimis, foliis radicalibus palmatis: lobis pinnatis; ſuperioribus haſtato-trilobis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 216. *n.* 302. *t.* 84. *f.* 2.

gruinum. 42. G. caule craſſo herbaceo erecto piloſo, foliis radicalibus cordatis ovatis indiviſis: caulinis oppoſitis ſubternatis; media longiſſima, floribus pentandris ſæpiſſime binis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 88. *f.* 2.

lacerum. 43. G. foliis runcinato-pinnatifidis: laciniis dentatis, *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 21.

Botrys. 44. G. caule ſupino, foliis cordatis oblongis ſinuato-pinnatifidis hirſutis, fructibus longis erectis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 218. *n.* 304. *t.* 90. *f.* 2.

præcox. 45. G. acaule, foliis pinnatis, ſcapis bifloris. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 272. *n.* 392. *t.* 126. *f.* 2.

bipinnatum. 46. G. caule decumbente, foliis oppoſitis inæqualibus bipinnatis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 273. *n.* 399. *t.* 126. *f.* 3.

maritimum. 47. G. caule procumbente, foliis cordatis ovatis crenatis inciſis ſcabris, floribus pentandris raro ternis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 88. *f.* 1.

††† *pedunculis multifloris*, Myrrhina.
† *foliis ſubintegris aut lobatis.*

craſſifolium. 48. G. caule humifuſo, foliis cordatis ſubrotundis rugoſis craſſis, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 219. *n.* 306. *t.* 90. *f.* 1.

malacoides. 49. G. caule herbaceo, foliis oppoſitis cordatis ſubovatis lobatis crenatis, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 91. *f.* 1.

heliotropioides. 50. G. caule fruticoſo, foliis oppoſitis incanis ſubrotundo-ovatis crenato-dentatis, floribus umbellatis, cucculorum cauda longiſſima. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 220. *n.* 308. *t.* 113. *f.* 1.

glaucophyllum. 51. G. foliis oblongis lineatis crenato-ſublobatis craſſis, floribus pentandris umbellatis, roſtris plumoſis. *Mant. p.* 433. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 92. *f.* 2.

murcicum. 52. G. caulibus gracilibus herbaceis ramoſis, foliis oppoſitis trilobis: lobo medio longiore obtuſo crenato. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 272. *n.* 397. *t.* 126. *f.* 1.

chium. 53. G. caule herbaceo erecto, foliis oppoſitis cordatis inciſis; ſuperioribus trilobis; lobis pinnatifidis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 92. *f.* 1.

littoreum. 54. G. caule, foliis cordato-ovatis ſubtrilobis crenatis. *Burm. de geran. n.* 60.

arduinum. 55. G. ſcapis radicalibus, floribus pentandris, foliis cordatis quinquelobis.

incarnatum. 56. G. foliis inciſis quinquelobis punctatis: petiolis longiſſimis, pedunculis trifloris. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 91. *f.* 2.

trifolium. 57. G. caule herbaceo craſſo ramoſo, foliis lobatis: radicalibus ternatis; caulinis ſimplicibus oppoſitis, petalis venoſis: ſuperioribus maculatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 223. *n.* 314. *t.* 97. *f.* 3.

triangulare. 58. G. foliis triangularibus ſubpinnatifidis dentatis ſubvilloſis. *Forſk. flor. æg. arab. p.* 123.

† † *foliis pinnatis.*

pulverulentum. 59. G. caulibus reclinato-erectis, foliis oppoſitis pinnatifidis: laciniis inciſis, pedunculis elongatis umbelliferis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 272. *n.* 396. *t.* 125. *f.* 1.

laciniatum. 60. G. caule herbaceo, foliis oppoſitis profundiſſime trifidis: laciniis pinnatis linearibus, pedunculis elongatis umbelliferis, receptaculo longiſſimo. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 228. *n.* 321. *t.* 113. *f.* 3.

ciconium. 61. G. caule herbaceo reclinato, foliis pinnatis: pinnulis inciſis, petalis duobus ſuperioribus latioribus. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 18.

moſchatum. 62. G. caule procumbente, foliis pinnatis: pinnulis ovatis inciſis, cotyledonibus pinnatifidis, floribus umbellatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 55.

chaerophyllum. 63. G. caule erectiuſculo, foliis oppoſitis pinnatis inciſis, cotyledonibus trilobis, pedunculis elongatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 226. *n.* 319. *t.* 95. *f.* 1.

cicutarium. 64. G. caule ramoſo proſtrato, foliis pinnatis: pinnulis ſubovatis, floribus pentandris. *Curt. flor. Lond. t.* 53.

romanum. 65. G. acaule, foliis bipinnatis hirſutis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 94. *f.* 2.

rupeſtre. 66. G. radice craſſa lignoſa, foliis inodoris bipinnatis ſupra tomentoſo-incanis, ſcapis ſubtrifloris. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 225. *n.* 316. *t.* 90. *f.* 3.

petræum. 67. G. ſubacaule, foliis oppoſitis numeroſis bipinnatis, ſcapis axillaribus. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 224. *n.* 315. *t.* 96. *f.* 2.

alpinum. 68. G. caule herbaceo, foliis bipinnatis, floribus umbellatis rugoſis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 229. *n.* 323. *t.* 96. *f.* 1.

hirtum. 69. G. foliis ſubbipinnatifidis caule ramoſo, floribus pentandris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 123.

glanduloſum. 70. G. acaule, foliis tripinnatis longiſſime petiolatis, petalis duobus latioribus maculatis plumoſis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 271. *n.* 395. *t.* 125. *f.* 2.

** *corollis irregularibus, cuniculo per pedunculum excurrente.*

† *foliis zona notatis.*

zonale. 71. G. caule fruticoſo, foliis orbiculatis crenatis obtuſe lobatis: zona nigricante, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 98. *f.* 2. *Martyn plat. t.* 10. *ill. Linn. ſyſt. t.* 22. *f.* 3.

marginatum. 72. G. caule fruteſcente, foliis rotundato-lobatis albo-limbatis vetuſtate ſcarioſis, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 230. *n.* 325.

tetragonum. 73. G. caule tetragono fruticoſo, foliis lobatis carnoſis, pedunculis bifloris, corollis tetrapetalis. *Suppl. p.* 305. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 99. *f.* 2. *Flores heptandri.*

peltatum. 74. G. caule fruticoſo, foliis quinquelobis integerrimis ſubpeltatis glabris. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 100. *f.* 1. *Mill. h. angl. t.* 140.

tabulare. 75. G. caule fruticoſo, foliis peltatis rotundatis anguloſis dentatis glabris. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 100. *f.* 2.

elongatum. 76. G. caule herbaceo proſtrato hiſpido, foliis longiſſime petiolatis quinquelobis, pedunculis elongatis erectis, fructibus cernuis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 233. *n.* 329. *t.* 101. *f.* 3.

alchimilloides. 77. G. caule herbaceo, foliis orbiculatis piloſis quinquepartitis: lobis trifidis, umbellis longiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 98. *f.* 1.

†† *foliis unicoloribus.*

† *integris vel ſubintegris.*

ciliatum. 78. G. acaule, radice tuberoſa, foliis ovatis ciliatis integerrimis, ſcapo umbellifero. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 234. *n.* 331. *t.* 98. *f.* 2.

glaucum. 79. G. acaule, foliis ovato-oblongis ſerratis incano-tomentoſis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 237. *n.* 336. *t.* 103. *f.* 2. *Curtis bot. magaz. t.* 56.

auritum. 80. G. acaule, foliis ovalibus ſimpliciuſculis, umbella compoſita diviſa. *Mant. p.* 433. *Commel. h. Amſt.* 2. *t.* 61.

longifolium. 81. G. acaule, foliis lanceolatis longiſſime petiolatis, ſcapo ramoſo, umbellis multifloris. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 235. *n.* 332. *t.* 102. *f* 1.

lanceolatum. 82. G. caule fruticoſo, ramis virgatis, foliis lanceolatis oppoſitis ſubintegerrimis glaucis, pedunculis axillaribus ſubunifloris. *Suppl. p.* 306. Geranium glaucum. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 102. *f.* 2.

œnotherae. 83. G. foliis oppoſitis lanceolatis ſerrato-dentatis molliſſime tomentoſis, umbella pauciflora. *Suppl. p.* 305.

oxaloides. 84. G. radice rapacea, foliis ovato-haſtatis carnoſis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 237. *n.* 337. *t.* 97. *f.* 2.

ovatum. 85. G. caule brevi ſuffruticoſo, foliis ovatis dentatis tomentoſis, pedunculis terminalibus paucifloris. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 66.

betulinum. 86. G. caule fruticoſo, foliis ovatis inæqualiter ſerratis planis. *Burm. afr. t.* 33. *f.* 1.

acetoſum. 87. G. caule fruticoſo, foliis cuneato-ovatis crenatis carnoſis, petalis ſuperioribus anguſtioribus. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 104. *f.* 3.

hybridum. 88. G. caule fruticoſo ſucculento, foliis alternis orbiculatis crenatis, umbellis elongatis. *Mant. p.* 97. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 105. *f.* 2.

cordifolium. 89. G. caule fruticoſo, foliis cordatis ſubrotundo acutis denticulatis tomentoſis, umbellis numeroſis terminalibus. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 240. *n.* 342. *t.* 117. *f.* 3.

hermanni-folium. 90. G. caule fruticoſo, foliis cuneiformibus plicatis ſcabris ſuperne ſerratis. *Mant. p.* 569.

cotyledonis. 91. G. foliis cordato-orbiculatis peltatis cucullatis crenatis pubeſcentibus. *Mant. p.* 569.

cucullatum. 92. G. caule fruticoſo, foliis cucullatis dentatis. *Mant. p.* 432. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 106. *f.* 1.

odoratiſſimum. 93. G. caule carnoſo brevi, ramis herbaceis longis, foliis cordatis molliſſimis fragrantiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 103. *f.* 1.

acerifolium. 94. G. caule erecto fruticoſo, foliis anguloſis acutis dentatis ſubcucullatis, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 243. *n.* 349. *t.* 112. *f.* 2.

althæoides. 95. G. caule herbaceo tomentoſo, foliis oppoſitis cordato-ovatis ſinuatis crenatis, umbella longiſſime pedunculata. *Mant. p.* 433. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 123. *f.* 2.

bifolium. 96. G. radice rapacea, foliis binis cordato-angulatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 254. *t.* 115. *f.* 3.

inquinans. 97. G. caule fruticoſo ſucculento, foliis cordatis orbiculatis lucidis ſublobatis crenatis. *Mill. illuſtr. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 19. a.

groſſularioides. 98. G. caule proſtrato lævi herbaceo, foliis cordatis ſubrotundis lobato-inciſis crenatis, pedunculis capillaribus. *Mant. p.* 432. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 119. *f.* 2. *Antheræ* 4-5.

biflorum. 99. G. radice craſſa nodoſa, foliis binis lobato-inciſis acutis, pedunculis terminalibus bifloris. *Burm. afr. p.* 95. *t.* 37. *f.* 1.

ſtipulaceum. 100. G. caule breviſſimo imbricato, foliis ſublobatis crenato-inciſis, ſtipulis reflexis lanceolatis apice bifidis, pedicellis longiſſimis. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 122. *f.* 3.

piloſum. 101. G. radice napiformi, ſcapis radicalibus proliferis, foliis ſubovatis ſubtrilobis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 273. *n.* 400. 6. *t.* 199.

africanum. 102. G. foliis alternis cordatis dentatis villoſis: inferioribus orbiculatis; ſuperioribus ſubtrilobis, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 242. *n.* 347. *t.* 104. *f.* 1.

†† *foliis diviſis.*

papilionaceum. 103. G. caule fruticoſo, foliis alternis cordatis lobatis rugoſis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 112. *f.* 1.

vitifolium. 104. G. caule fruticoſo, foliis oppoſitis cordatis rugoſis pubeſcentibus, floribus capitatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 111. *f.* 2.

capitatum. 105. G. caule diffuſo, foliis lobatis undatis villoſis, floribus capitatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 105. *f.* 1.

criſpum. 106. G. caule fruticoſo, foliis cordatis lobatis dentatis criſpis, ſtipulis cordatis, pedunculis ſubunifloris. *Mant.* *p.* 257. *Cavanill. diſſ.* *t.* 109. *f.* 2.

exſtipulatum. 107. G caule fruticoſo, ramis erectis, foliis alternis duplicato-trilobis crenatis glabris ſubexſtipulatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 253. *n.* 367. *t.* 123. *f.* 1. & 5. *p.* 271.

trifidum. 108. G. acaule, radice rapacea, foliis ternis trilobis trifidiſque. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 254. *n.* 371. *t.* 115. *f.* 1.

articulatum. 109. G. radice ſquamoſa lignoſa articulata, foliis radicalibus quinquelobis inciſis, umbella ſubquadriflora: radiis longiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 252. *n.* 365. *t.* 122. *f.* 1.

variegatum. 110. G. foliis alternis quinquelobis: lobis trifidis ſerrato-dentatis: ſtipulis latis cordatis, pedunculis ſubbifloris. *Suppl. p.* 305. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 118. *f.* 3.

viſcoſum. 111. G. caule fruticoſo, foliis cordatis quinquelobis acutis dentatis viſcoſis ſinuatis, floribus umbellatis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 85. *plant. rar. ic. cent.* 2. *t.* 35.

quercifolium. 112. G. caule fruticoſo, foliis ſinuatis: laciniis rotundatis crenatis oblongis, floribus umbellatis. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 119. *f.* 1.

terebinthinaceum. 113. G. caule arboreſcente, foliis duplicato-trifidis: laciniis latis inciſis crenatis, umbellis multifloris. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 250. *n.* 362. *t.* 114 *f.* 1. *an diſtinctum ſatis a quercifolio?*

ſcabrum. 114. G. caule fruticoſo exſucco, foliis cuneiformi-trifidis multifidiſque ſcabris; umbellis paucifloris. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 64.

hirſutum. 115. G. acaule, radice turbinata, foliis ovatis laciniatis rugoſis hirſutis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 247. *n.* 357. *t.* 101. *f.* 2.

hiſpidum. 116. G. foliis palmatis dentato-laceris, cauleque fruticoſo hiſpidis, umbellis compoſitis: involucris reflexis. *Suppl. p.* 304. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 110. *f.* 1.

bicolor. 117. G. caule brevi fruticoſo, ramis teretibus, foliis oppoſitis hirſutis tripartitis: laciniis criſpis dentatis, umbellis multifloris capitatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 39.

Digitized by Google

ſulgidum. 118. G. caule frut coſo ſucculento, foliis tripartitis inciſis: intermedio majore, umbellis geminis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 116. *f.* 2.

revolutum. 119. G. foliis multipartitis: laciniis revolutis, calicibus profundiſſime partitis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 84. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 33.

aculeatum. 120. G. foliis oblongis inciſo-lobatis, umbellis trifloris, caule ſpinoſo. *Paterſon journ. into Caffraria. p.* 67. *ic.*

††† *foliis ternatis.*

lobatum. 121. G. radice tuberoſa, foliis ternatis craſſis tomentoſis, ſcapis radicalibus diviſis umbelliferis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 114. *f.* 2.

ternatum. 122. G. caule fruticoſo hiſpido, foliis oppoſitis ternatis: foliolis cuneatis inciſo-trifidis ſerratis ſcabris. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 107. *f.* 2.

lævigatum. 123. G. caule fruticoſo glabro, foliis ternatis ſublinearibus trifidis glaucis, pedunculis bifloris. *Suppl. p.* 306. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 121. *f.* 1.

alceoides. 124. G foliis ternatis trifidis laciniatis, caule herbaceo hirto.

abrotanifolium. 125. G. caule fruticoſo, foliis ternatis trifidis: laciniis linearibus, floribus umbellatis. *Suppl. p.* 304. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 117. *f.* 1.

†††† *foliis pinnatis.*

gibboſum. 126. G. caule fruticoſo carnoſo: geniculis gibbis, foliis pinnato-lobatis glaucis. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 103. *f.* 1.

betonicum. 127. G. foliis ſubovatis lobato-pinnatis crenatis obtuſis, umbellis paucifloris. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 264. *n.* 391. *t.* 118. *f.* 1.

carnoſum. 127. G caule fruticoſo: articulis carnoſo-gibboſis, foliis alternis pinnatifidis laciniatis, petalis linearibus. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 99. *f.* 1.

arenarium. 129. G acaule, foliis pinnatifidis: laciniis oblongis inciſo-ſerratis. *Burm. de geran. n.* 63.

pinnatifidum. 130. G. acaule, radice turbinata, foliis duplicato-pinnatifidis: laciniis linearibus obtuſis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 260. *n.* 382. *t.* 120. *f.* 1.

pinnatum. 131. G, acaule, radice turbinata tuberoſa, pinnis ovatis ſubſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 257. *n.* 376. *t.* 115. *f.* 2.

aſtragalifolium. 132. G. radice craſſa, pinnis ovato-acuminatis incanis hirſutis, ſcapis ſubradicalibus elongatis umbelliferis. *Cavanill. diſſ.* 4 *p.* 257. *n.* 377. *t.* 104. *f.* 2.

capillare. 133. G. foliis oppoſitis: pinnis linearibus, pedunculis axillaribus ſolitariis ſubunifloris. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 258. *n.* 378. *t.* 97. *f.* 1.

proliferum. 134. G. radice turbinata, pinnis tri- & quinquepartitis linearibus. *Burm. de geran. n.* 70. *t.* 2.

minimum. 135. G. foliis radicalibus ceſpitoſis, caulinis oppoſitis, floribus terminalibus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 260. *n.* 384. *t.* 121. *f.* 3.

ferulaceum. 136. G. pinnis lobatis inciſis revolutis, petalo ſuperiore erecto; reliquis dependentibus. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 265. *n.* 392. *t.* 110. *f.* 2.

villoſum. 137. G. caule brevi hirto, foliis duplicato-pinnatis: pinnulis capillaribus, umbellis pluribus terminalibus elongatis. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 258. *n.* 379. *t.* 117. *f.* 2.

appendiculatum. 138. G. radice rapacea, foliis radicalibus tomentoſo-lanatis duplicato-pinnatis: ſtipulis longe decurrentibus apice dilatatis, umbellæ radiis ſcapo ſubæqualibus. *Suppl. p.* 304. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 121. *f.* 2.

ramoſiſſimum. 139. G. caule fruteſcente, foliis bipinnatis: pinnulis ſubrotundis glabris. *Burm. pl. afr. t.* 34. *f.* 2.

triſte. 140. G. radice tuberoſa, foliis longiſſimis bipinnatis hirtis, floribus umbellatis: corollis ſubæqualibus. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 19.

fruticoſum. 141. G. caule fruticoſo exſucco, foliis oppoſitis bipinnatis, pedunculis bifloris. *Cavanill. diſſ.* 4. *p.* 263. *n.* 389. *t.* 122. *f.* 2.

coriandrifolium. 142. G. ramis reclinato-erectis nodoſis, foliis bipinnatis linearibus, umbellis paucifloris. *Cavanill. diſſ.* 4. *t.* 116. *f.* 1.

myrrhifolium. 143. G. foliis bipinnatis: inferioribus cordatis lobatis, caule herbaceo, calicibus ſtrigoſis. *Mant. p.* 433. *Herm. par. Lugdb. t.* 281.

daucifolium. 144. G. foliis hirtis alternatim tripinnatis: foliolis pinnatifidis. *Murr. comm. Goett.* 1780. *t.* 4.

flavum. 145. G. foliis trifariam alternatim pinnatis: foliolis pinnatifidis, ſcapis hirtis. *Mant. p.* 257. *an ſatis diſtinctum a doucifolio ?*

SERRA. *Cal.* 2plex, perſiſtens: exterior 3phyllus; interior ſemiquinquepartitus. *Stil.* 5-partitus. *Stigm.* globoſa. *Capſula ?* 10ſperma.

incana. 1. SERRA. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 83. *t.* 35. *f.* 3.

CRINODENDRON. *Cal.* 0. *Cor.* campanulata, patens, 6petala. *Capſ.* coriacea, 1locularis, apice elaſtica vi dehiſcens, 3-ſperma.

Patagua. 1. CRINODENDRON. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 300. *n.* 435. *t.* 158. *f.* 1.

ÆRVA. *Flores* polygami. *Cal.* 5phyllus, patens. *Stamina* hermaphroditis 5 ſterilia. *Capſ.* oblonga, 1ſperma, calice vallata.

ægyptiaca. 1. ÆRVA. *Forsk. flor. ægypt. arab. p.* 170.

PLAGIANTHUS. *Cal.* 5fidus, brevis. *Cor.* 5petala. *Germen* ovatum. *Stigma* clavatum. *Bacca.*

divaricatus. 1. PLAGIANTHUS. *Forſt. char. gen. p.* 43. *t.* 43.

1084. JATROPHA. *Flores* monoici. *Cal.* 0.

♂. *Cor.* 1petala, infundibuliformis. *Stam.* alterna breviora.

♀. *Cor.* 5petala, patens, *Stil.* 3 2fidi. *Capſ.* 3cocca. *Sem.* ſubſolitaria.

moluccana. 1. J. foliis ovatis integerrimis ſubdentatis. *an diſtincti generis ?*

variegata. 9. J. caliculata, foliis lanceolatis integerrimis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 79. *t.* 21.

Curcas. 2. J. foliis cordatis quinqueangulatis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 63. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 108. *f.* 1.

ſpinoſa. 10. J. caliculata, foliis tripartitis: lobis ſurſum angulatis integerrimis, caule fruticoſo aculeato. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 79.

herbacea. 3. J. aculeata, foliis trilobis, caule herbaceo.

urens. 4. J. foliis palmatis dentatis aculeatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 21.

Manihot. 5. J. foliis palmatis: lobis lanceolatis integerrimis lævibus. *Merian. ſurin.* 4. *f.* 4. 5.

Janipha. 6. J. foliis palmatis: lobis integerrimis; intermediis utrinque ſinu lobatis. *Mant. p.* 126. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 77.

glanduloſa. 11. J. caliculata, foliis villoſis quinquelobis: lobis denticulatis glanduloſis, caule fruticoſo exſtipulato. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 80.

glauca. 12. J. caliculata, foliis quinquefidis trifidiſque ſerrato-dentatis: petiolis nudis, ſtipulis palmatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 78.

globoſa. 13. J. capſulis globoſis tetracoccis. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 109. *f.* 3. *utrum hujus, an diſtincti generis?*

goſſypifolia. 7. J. foliis quinquepartitis: lobis ciliatis petioliſque, ſetis glanduloſis ramoſis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 23.

multifida. 8. J. foliis multifidis lævibus: ſtipulis ſetaceis multifidis. *Dill. h. Elth. t.* 173. *f.* 213.

SUTHERLANDIA. *Flores* monoici. *Cor.* 0. *Cal.* campanulatus, 5dentatus.
♂. *Anth.* 5–10 in cylindr. connatæ.
♀. *Anth.* 10 geminæ. *Piſt.* 5. *Stigm.* clavatis. *Drupæ* exſuccæ, 1loculares, 1ſpermæ.

littoralis. 1. SUTHERLANDIA. *Rheed. h. malab.* 6. *p.* 37. *t.* 21.

ENDECANDRIA.

833. BROWNÆA. *Cal.* inæqualiter 2fidus. *Cor.* 2plex : exterior 5fida ; interior 5petala. *Legumen* 2-loculare.

coccinea. 1. Br. foliis ſimplicibus, floribus lateralibus. *Jacq. ſtirp. amer. t.* 121.

grandiceps. 2. Br. foliis pinnatis, ſpicis terminalibus. *Jacq. Collect.* 3. *p.* 287. *t.* 22. *f.* a-i. *an hujus generis quoque Palove Aubl. pl. guj. p.* 365. *t.* 141?

DODECANDRIA.

ACIOJA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala, inæqualis. *Filamenta* 11-12. *Drupa* ſicca, ovata, coriacea, fibroſa, 1locularis. *Nux* 1.

guianenſis. 1. ACIOJA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 698. *t.* 280.

834. PENTAPETES. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala. *Stamina* 20, quorum 5 caſtrata, longa. *Capſ.* lignoſa 5locularis : loculis 2valvibus. *Semina* alata.

acerifolia. 1. P. foliis cordatis repandis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 44. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 133. *f.* 2.

velutina. 2. P. foliis ovato-lanceolatis ſerratis, floribus pentandris. *Forsk. fl. æg. ar. p.* 64. Melhania velutina.

ſuberifolia. 3. P. foliis oblongis repandis apice ſinuatis acuminatis ſubtus incanis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 43. *f.* 2.

Erythroxylon. 4. P. foliis cordatis ſubcrenatis ſubtus tomentoſis ſubtus rugoſis, floribus ſubumbellatis decandris. *Pluckn. mant. p.* 6. *t.* 333. *f.* 1.

WALCUFFA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* campanulata 5-petala. *Stam.* 15. *Stigm.* 5fidum.

torrida. 1. WALCUFFA. *Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and Nub.* 5. *app. p.* 67. *ic.*

1083. **CROTON.** *Flores* monoici, rarius dioici.

♂. *Cal.* cylindricus, 5dentatus aut 5phyllus. *Cor.* 5petala aut o. *Glandul.* 5. *Stam.* 10-15.

♀. *Cal.* polyphyllus. *Cor.* o. *Stil.* 3. ſemibifidi. *Capſ.* 3cocca. *Sem.* ſolitaria.

variegatum. 1. Cr. foliis lanceolatis integerrimis glabris pictis petiolatis. *Rumpf amb.* 4. *t.* 25-27.

Caſcarilla. 2. Cr. foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis ſubtus tomentoſis, caule arboreo. *Catesb. Car.* 2. *t.* 46. *β?*) Croton lineare. *Jacq. amer.* 256. *t.* 162. *f.* 2.

caſtaneifolium. 3. Cr. foliis lanceolatis obtuſis ſerratis petiolatis glabris.

paluſtre. 4. Cr. foliis ovato-lanceolatis plicatis ſerratis ſcabris. *Mant. cent. t.* 38.

balſamiferum. 5. Cr. foliis ovato-lanceolatis ſcabris integerrimis ſubtus tomentoſis. *Mant. p.* 125. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 46.

obliquum. 40. Cr. foliis ovato-lanceolatis integerrimis, cauleque herbaceo tomentoſis. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 78.

plicatum. 41. Cr. foliis ovatis plicatis crenatis hirſutis, caule herbaceo. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 78.

cyanoſpermum. 42. Cr. capſulis globoſis glabris: ſeminibus glaberrimis violaceis. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6. *an diſtincta hujus generis ſpecies?*

cardioſpermum. 43. Cr. capſulis globoſis apice trituberculatis: ſeminibus cordiformibus. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

ſeſſiliflorum. 6. Cr. foliis ovatis acuminatis integerrimis glabris, floribus ſeſſilibus axillaribus dioicis pentandris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 100.

paliens. 7. Cr. foliis ovatis acuminatis integerrimis utrinque glabris, racemis ſolitariis erectis terminalibus, calicibus fructu majoribus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 100.

maturenſe. 8. Cr. foliis ovatis acuminatis integerrimis ſubtus candido-ſericeis baſi biglandulofis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 879. *t.* 338.

guianenſe. 9. Cr. foliis ovatis acuminatis ſerratis ſubtus ferrugineo-tomentoſis baſi biglandulofis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 882. *t.* 339.

acutum. 10. Cr. foliis ovatis ſerratis acuminatis biglandulofis, caule herbaceo. *Thunb. flor. jap. p.* 269.

Tiglium. 11. Cr. foliis ovatis glabris acuminatis ſerratis, caule herbaceo. *Rumpf amb.* 4. *t.* 42. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

hirtum. 12. Cr. foliis ovatis ſerratis baſi pilis glanduliferis, ſpicis ſeſſilibus, caule hiſpido. *Herit. ſtirp. nov.* 1. *p.* 17. *t.* 9.

lacciferum. 13. Cr. foliis ovatis tomentoſis ſerrulatis petiolatis, calicibus tomentoſis. *Rumpf amb.* 3. *t.* 127. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

lucidum. 14. Cr. foliis ovatis glabris, floribus ſpicatis, ſtilis multifidis depreſſo-pubeſcentibus, caule fruteſcente. *Mant. p.* 497. *Berg. act. angl.* 1768. *t.* 7.

punctatum. 15. Cr. foliis alternis ovatis integerrimis petiolatis coriaceis incanis punctatis, pedunculis extrichotomia erectis ſolitariis racemoſis. *Jacq. coll.* 1. *p.* 166.

maritimum. 38. Cr. foliis ovatis integerrimis obtuſis ſupra rugoſis, ſubtus petiolis calicibuſque tomentoſis; caule ſuffruticoſo. *Walt. flor. carol. p.* 239.

glabellum. 16. Cr. foliis ovatis obtuſiuſculis integerrimis lævibus, capſulis pedunculatis. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 174. *f.* 3. 4.

globoſum. 17. Cr. foliis ovatis obtuſis integris, pedunculis geminis, floribus dioicis, capſulis globoſis echinato-hiſpidis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 100.

populifolium. 18. Cr. foliis lato-ovatis acuminatis ſerrato-dentatis ſubhirtis: petiolis longitudine foliorum, racemis terminalibus erectis ſolitariis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 101.

Inophyllum. 19. Cr. foliis obovatis integerrimis, caule arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 67.

ſebiferum. 20. Cr. foliis rhombeo-ovatis acuminatis integerrimis glabris. *Pet. gaz. t.* 34. *f.* 3.

argenteum. 21. Cr. foliis cordato-ovatis ſubtus tomentoſis integris ſerratis. *Murray comm. Goett.* 1781. *t.* 4.

Ricinocarpos. 22. Cr. foliis ſubcordatis crenatis, pedunculis racemoſis oppoſitifoliis, caule herbaceo.

aſtroites. 39. Cr. foliis ovalibus ſubcordatis integerrimis utrinque ſtellato-tomentoſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 375.

aromaticum. 23. Cr. foliis cordatis ſcabris ſubſerratis petiolatis, caule arboreo. *Rumpf amb.* 3. *t.* 126. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

moluccanum. 24. Cr. foliis cordatis angulatis ſcabris ſubtus tomentoſis. *Pluckn. alm. t.* 220. *f.* 5.

humile. 25. Cr. foliis cordatis integerrimis ſcabris ſubciliatis ſubtus incanis caule fruticoſo.

flavens. 26. Cr. foliis cordatis oblongis integerrimis utrinque tomentoſis, ramulis denſius tomentoſis.

macrophyllum. 27. Cr. foliis cordato-ſubrotundis acuminatis integris craſſis tomentoſis ſubtus nervoſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 100.

nitens. 28. Cr. foliis cordato-ellipticis acuminatis ſubintegris glabris ſupra nitidis ſubtus punctato-argenteis, racemis axillaribus folio brevioribus erectis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 100.

nutans. 29. Cr. foliis rhombeo-ſubrotundis acuminatis undulatis glabris nutantibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 67.

tinctorium. 30. Cr. foliis rhombeis repandis capſulis pendulis, caule herbaceo. *Burm. ind. t.* 62. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 107. *f.* 6.

glandulosum. 31. Cr. foliis oblongis ſerratis baſi biglanduloſis, capſulis ſeſſilibus.

divaricatum. 32. Cr. foliis oblongis obtuſis ſerratis hirtis baſi biglanduloſis racemis terminalibus ſolitariis, caule fruticoſo, ramis dichotomis divaricatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 100.

laurinum. 33. Cr. foliis oblongis acutis integerrimis conſiſtentibus glabris ſubtus una cum petiolis ſcabris punctatis, racemis axillaribus longiſſimis patulis, caule arboreſcente. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 100.

capenſe. 34. Cr. foliis haſtatis indiviſiſque lanceolatis integerrimis glaberrimis. *Suppl. p.* 433.

japonicum. 35. Cr. foliis indiviſis trilobiſque ovatis acuminatis integris glabris. *Suppl. p.* 422. *Thunb. flor. jap. p.* 270. *t.* 28. 29.

lobatum. 36. Cr. foliis inermi ſerratis: inferioribus quinquelobis; ſuperioribus trilobis. *Mart. cent. t.* 46.

ſpinoſum. 37. Cr. foliis palmatis quinquelobis trilobiſque ſpinoſo-ſerratis, floribus cauli appreſſis ſubſeſſilibus. *Pluckn. alm. t.* 108. *f.* 3.

1082. ACALYPHA. *Flores* declini. *Cal.* 3-4phyllus. *Cor.* o.
♂. *Stam.* 8-16.
♀. *Stil.* 3. *Capſ.* 3ſulca, 3locularis valvis bifariam dehiſcentibus: *Sem.* ſolitaria.

* *caule fruticoſo.*

fruticoſa. 1. A. involucris femineis cordatis crenatis foliis ovatis acutis ſerratis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 161.

** *caule herbaceo.*

† *floribus monoicis.*

decidua. 2. A. involucris femineis cucullatis ſerratis deciduis, foliis lanceolato-ovatis petiolo ſeſquilongioribus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 161.

ſpicata. 3. A. involucris femineis cucullatis ſerratis, foliis lanceolatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 161.

ciliata. 4. A. involucris femineis urceolatis ciliatis ſpicis breviſſimis, foliis ovatis acuminatis petiolum æquantibus. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 77. *t.* 20.

auſtralis. 5. A. involucris femineis integerrimis, foliis lanceolatis obtuſis.

villoſa. 6. A. involucris femineis minimis dentatis villoſiſſimis, ſpicis elongatis, foliis ovatis acuminatis ſerratis petiolo longioribus. *Suppl. p.* 422. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 47.

indica. 7. A. involucris femineis cordatis ſubcrenatis, foliis ovatis petiolo brevioribus. *Rheed. h. malab.* 10, *t.* 81. 82.

virginica. 8. A. involucris femineis cordatis inciſis, foliis ovato lanceolatis petiolo longioribus.

Digitized by Google

carolinia-na. 20. A. ſpicis femineis involucris villoſis ſubcordatis crenatis : ſpicis maſculis baſi involucri inſertis, foliis ovatis ſerratis. *Walt. flor. carol. p.* 238.

virgata. 9. A. ſpicis femineis involucris cordatis ſerratis : maſculis diſtinctis aphyllis, foliis lanceolato-ovatis.

hercan-difolia. 10. A. ſpicis femineis longiſſimis: involucris cordatis ſerratis ; maſculis diſtinctis aphyllis, foliis ſubcordatis ſerratis : petiolis longiſſimis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

elliptica. 11. A. ſpicis femineis involucris germinibus brevioribus dentatis hirſutis : maſculis aphyllis laxis, foliis ellipticis acuminatis dentatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

lævigata. 12. A. ſpicis femineis involucris multipartitis : maſculis laxis aphyllis, foliis cuneato-ovatis acuminatis ſerrulatis glaberrimis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

tomento-ſa. 13. A. ſpicis femineis terminalibus ſolitariis involucris multipartitis : maſculis erectis, foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſcabris ſubtus villoſo-tomentoſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

corenſis. 14. A. floribus femineis terminalibus diſtinctis involucris triphyllis : ſpicis maſculis axillaribus involucratis, foliis ovatis ſerratis. *Jacq. ſtirp. amer. p.* 254. *t.* 161.

alopecu-roidea. 21. A. ſpicis ſolitariis : maſculis lateralibus patentiſſimis ; femineis terminalibus erectis : involucro ſetaceo tripartito. *Jacq. coll.* 3. *p.* 196.

anguſti-folia. 15. A. floribus femineis ſubſeſſilibus terminalibus involucris ſerratis : maſculis ſpicatis, foliis linearibus ſerratis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

reptans. 16. A. ſpicis terminalibus erectis androgynis : floribus femineis inferioribus involucris cordatis ſerratis ; maſculis aphyllis, foliis ovatis ſerratis, caule reptante. *Sloane hiſt. jam.* 1. *p.* 125. *t.* 82. *f.* 3.

ſupera. 17. A. amentis axillaribus maſculis flore femineo terminatis, foliis ovatis petiolo brevioribus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 162.

†† *floribus dioicis.*

ſcabroſa. 18. A. ſpicis femineis involucris cordatis inciſis, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ſcabris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 99.

betulæfolia. 19. A. floribus femineis axillaribus ſeſſilibus: involucris cordatis crenatis; maſculis ſpicatis, foliis ſubrotundis crenatis glabris. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 100.

1086. STERCULIA. *Flores* monoici. *Cor.* o. *Cal.* 5partitus. *Nectarium* columnæ cylindricæ inſidens, 5dentatum.
♂. *Filamenta* 15.
♀. *Germen* globoſum, 5-ſulcatum. *Capſ.* 5, 1loculares, polyſpermæ.

Balanghas. 1. St. foliis ovatis integerrimis alternis petiolatis, floribus paniculatis. *Cavanill. diſſ.* 5. *t.* 144. *an Crataevæ ſpecies?*

Ivira. 2. St. foliis ovatis integerrimis alternatim ſparſis, capſulæ baſi crinita. *Aubl. pl. guj. p.* 693. *t.* 279.

lanceolata. 3. St. foliis lanceolatis integerrimis, feminibus paucis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 287. *n.* 416. *t.* 143. *f.* 1.

cordifolia. 4. St. foliis cordatis latis acuminatis ſeptemnerviis venoſis, capſulis extrinſecus tomentoſis intus hiſpidis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 286. *n.* 414. *t.* 143. *f.* 2.

Fiorniana. 5. St. foliis cordatis lobatis, floribus paniculatis. *Suppl. p.* 423. Sterculia platanifolia. *Marſil. act. Pad.* 1. *p.* 106. *t.* 1. 2. *Cavanill. diſſ.* 5. *t.* 145.

fœtida. 6. St. foliis digitatis, floribus laxe racemoſis. *Sonner. it. ind.* 2. *t.* 132.

platanifolia. 7. St. foliis palmatis? paniculis terminalibus ramoſis aphyllis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 352. *n.* 417. *t.* 145.

ALEURITES. *Flores* monoici. *Cal.* ſubtrifidus. *Cor.* 5petala, calice triplo longior. *Nectarium* ſquamis 5 angulatis ad baſin petalorum.
♀. *Stil.* 2 2partiti. *Drupa* 2locularis, ſicca. *Sem.* ſolitaria.

triloba. 1. ALEURITES. *Forſt. char. gen. p.* 56. *t.* 56. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 125. *f.* 2.

LATANIA. *Flores* dioici.
♂. *Spatha* polyphylla, imbricata. *Spadix* ramoſus: ramis apice digitato-ramuloſis, ramulis amentiformibus imbricatim ſquamuloſis, ſquamulis unifloris. *Cal.* ſeſſilis, 6partitus. *Antheræ* oblongæ 2loculares.
♀. *Bacca* globoſa 1locularis, 3pyrena.

Commerſonii. 1. LATANIA. *Juſſieu gen. plant. p.* 39. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 120. *f.* 1.

ICOSANDRIA.

1087. HURA. *Flores* monoici. *Cor.* 0.
♂. *Amentum* imbricatum. *Cal.* truncatus. *Filamenta* cylindrica, apice peltata, cincta *antheris* geminatis.
♀. *Cal.* 0. *Stil.* infundibuliformis. *Stigm.* 12fidum. *Capſ.* 12locularis. *Sem.* ſolitaria.

crepitans. 1. HURA. *Trew Ehret. t.* 34. 35. *f.* 1.

1137. ADELIA. *Flores* dioici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 3partitus.
♀. *Cal.* 5partitus. *Stil.* 3. divaricatis. *Capſ.* 3cocca.

Bernardia. 1. A. foliis oblongis tomentoſis ſerratis.
Ricinella. 2. A. foliis obovatis integerrimis.
Acidoton. 3. A. ramis flexuoſis, ſpinis gemmaceis.

CROSSOSTYLIS. *Cal.* 4angularis, 4partitus, germini adnatus. *Cor.* 4petela. *Nectarium* corpuſculis circiter 20, inter ſtamina. *Stil.* perſiſtens. *Stigm.* patentiſſima 3fida. *Bacca* hemiſphærica, ſupera, 1-locularis, polyſperma.

biflora. 1. CROSSOSTYLIS. *Forſt. char. gen. p.* 44. *t.* 44.

ASSONIA. *Cal.* 2plex, perſiſtens: *exterior* apice 3-crenatus; interior 5partitus. *Filamenta* baſi in urceolum coalita, 5 ſterilia. *Stil.* 5. *Capſ.* 5 3quetræ, 1-loculares, 2ſpermæ in globum cortice tectum coalitæ.

populnea. 1. ASSONIA. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 120. *n.* 173. *t.* 42. *f.* 1.

CAVANILLA. *Cal.* 2plex : exterior 3phyllus, deciduus; interior 5partitus perſiſtens. *Filamenta* baſi in urceolum coalita. *Stil.* 1. *Stigm.* 5 recurva. *Capſ.* 5. 2valves, 1loculares, in orbem coalitæ.

* *calicis exterioris foliolis latis.*

palmata. 1. C. foliis cordatis palmatis ſeptemlobis: lobis acutis ferrato-crenatis, floribus corymboſis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 122. *n.* 174. *t.* 38. *f.* 1. Dombeya palmata. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 137. *f.* 1? Dombeya borbonica.

acerifolia. 2. C. foliis multipartitis calicibuſque interioribus tomentoſis. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 131. *f.* 1. *an diſtincta hujus generis ſpecies ?*

acutangula. 3. C. foliis cordatis ſubrotundo-tricuſpidatis crenatis, floribus racemoſis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 123. *n.* 175. *t.* 38. *f.* 2. Dombeya acutangula.

tiliæfolia. 4. C. foliis cordatis ſubrotundo-acutis crenatis, floribus racemoſo-corymboſis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 124. *n.* 177. *t.* 39. *f.* 2. Dombeya tiliæfolia.

tomentoſa. 5. C. foliis cordatis ſubrotundis crenatis tomentoſis venoſis: venis ſubcircularibus, floribus umbellatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 125. *n.* 178. Dombeya tomentoſa.

angulata. 6. C. foliis cordatis ſubrotundis ſupra angulatis ferrato-dentatis tomentoſis, umbellis numeroſis: pedunculis communibus petiolo brevioribus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 123. *n.* 176. *t.* 39. *f.* 1. Dombeya angulata.

** *calicis exterioris foliolis anguſtiſſimis.*

umbellata. 7. C. foliis cordatis ovato-oblongis acuminatis repandis glabris, floribus umbellatis globoſis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 127. *n.* 181. *t.* 41. *f.* 1. Dombeya umbellata.

punctata. 8. C. foliis ovato lanceolatis longis integerrimis ſubtus tomentoſis, ſupra punctato-ſcabris, floribus dioicis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 125. *n.* 179. *t.* 40. *f.* 1. Dombeya punctata.

decanthera. 9. C. foliis ovatis acuminatis repando-crenatis, floribus umbellatis: ſtaminibus quinque diantheris, quinque ſteri-

libus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 126. *n.* 180. *t.* 40. *f.* 2. Dombeya decanthera.

ovata, 10. C. foliis ovatis dentatis quinquenerviis tomentoſis, ſtilo minimo. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 127. *n.* 182. *t.* 41. *f.* 2. Dombeya ovata.

ferruginea. 11. C. foliis ovato-oblongis ſeptemnerviis ſubtus ferrugineis: petiolis, pedunculis calicibuſque tomentoſis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 128. *n.* 183. *t.* 42. *f.* 2. Dombeya ferruginea.

phœnicea. 12. C. foliis ſubhaſtatis elongatis anguſtis crenato-ſerratis, floribus cernuis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 456. Pentapetes phœnicea *Mill. illuſtr. ic. Trew rar.* 7. *t.* 5. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 134. *f.* 4.

POLYANDRIA.

1414. GUSTAVIA. *Cal.* 0. *Petala* 4-8. *Bacca* 4-6-locularis. *Sem.* appendiculata.

anguſta. 1. GUSTAVIA. *Suppl. p.* 313. *Aubl. pl. guj. t.* 192. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 138. *f.* 1. *β*) *Aubl. pl. guj. t.* 193.

SASSA. *Cal.* 0. *Cor.* 5fida. *Tubus* ſtamineus longiſſimus.

gummifera. 1. SASSA. *Bruce trav. in Eg. Arab. Ab. and Nub.* 5. *app. p.* 28. *ic.*

836. ADANSONIA. *Cal.* ſimplex, deciduus. *Stil.* longiſſimus. *Stigm.* plura. *Capſ.* lignoſa, 10locularis, polyſperma: pulpa farinacea.

digitata. 1. ADANSONIA. *Cavanill. diſſ.* 5. *t.* 157. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 5.

1413. BARRINGTONIA. *Cal.* 2phyllus, ſuperus. *Drupa* nuce 1-4locular i.

ſpecioſa. 1. BARRINGTONIA. *Suppl. p.* 312. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 362. Mammea aſiatica. *Forſt. char. gen. t.* 43.

CURATARI. *Cal.* - - - *Cor.* - - - *Capſ.* infera; operculata, 3gona, 3ſperma: *Sem.* alata, plana.

guianenſis. 1. CURATARI. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 724. *t.* 290.

1415. CAROLINEA. *Cal.* ſimplex, campanulatus, truncatus. *Petala* enſiformia. *Capſ.* ſulcata, 1-locularis multivalvis; ovata.

princeps. 1. C. foliis ſubquinatis: foliolis ovato-lanceolatis. *Suppl. p.* 314. *Aubl. pl. guj. t.* 291. 292.

inſignis. 2. C. foliis ſubſeptenatis: foliolis obovato-oblongis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 101. *Cavanill. diſſ. bot.* 5. *t.* 154. Bombax grandiflorum.

LAGUNA. *Cal.* ſimplex, 5cuſpidatus, deciduus. *Stil.* ſimplex. *Stigma* peltatum. *Capſ.* 5locularis, 5valvis.

aculeata. 1. LAGUNA. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 173. *n.* 258. *t.* 71. *f.* 1.

835. BOMBAX. *Cal.* 3-5fidus. *Petala* utplurimum 5. *Recept.* 5gonum. *Capſ.* lignoſa, 5locularis, 5valvis. *Semina* lanata.

pentandrum. 1. B. foliis ſeptenatis, floribus pentandris: antheris lunatis binis aut ternis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 182. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 133. *f.* 1.

Erianthos. 2. B. foliis ſeptenatis lanceolatis glabris, corollis exterius lanatis, antheris adnatis, caule aculeato. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 294. *n.* 427. *t.* 152. *f.* 1.

hepta- phyllum. 3. B. foliis ſeptenatis, ſtaminibus pentadelphis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 55. *Rheed. h. malab.* 3. *t.* 52.

globo- ſum. 4. B. foliis ſubſeptenatis glaberrimis, floribus faſciculatis: calice cyathiformi. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 353. *n.* 432.

Ceiba. 5. B. foliis quinatis, corollis monopetalis, fructus apice concavo, caule aculeato. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 54.

globiſe- rum. 6. B. foliis quinatis emarginatis, fructu globoſo. *Aubl. gl. guj. p.* 701. *t.* 281.

Goſſy- pium. 7. B. foliis quinquelobis acuminatis ſubtus tomentoſis, calicibus pentaphyllis. *Sonner. it. ind.* 2. *t.* 133.

ANODA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens, fructu maturo patentiſſimus. *Capſ.* multilocularis, ſupra hemiſphærica, ſubtus ſtellato-plana, loculis 1ſpermis.

Dilleniana. 1. A. foliis triangularibus: inferioribus lato-crenatis, ſuperioribus obſolete crenatis longe petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris longiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 40. *n.* 85. *t.* 11. *f.* 1.

haſtata. 2. A. foliis cordatis angulatis: ſuperioribus elongatis haſtatis, pedunculis longiſſimis axillaribus unifloris. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 458. Sida criſtata. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 11. *f.* 2.

triloba. 3. A. foliis inferioribus cordatis ſubangulatis crenatis: ſuperioribus trilobis, pedunculis axillaribus ſolitariis longiſſimis unifloris. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 39. *n.* 84. *t.* 10. *f.* 3. *Scop. del. inſubr.* 1. *t.* 9.

PALAVA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens. *Stil.* 1 multifidus. *Capſ.* plures 1ſpermæ, non dehiſcentes, receptaculo centrali conico glomeratim impoſitæ.

malviſolia. 1. P. caulibus declinatis ramoſiſſimis, foliis cordatis ſublobatis glabris pedunculis axillaribus unifloris petiolo longioribus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 40. *n.* 86. *t.* 11. *f.* 4. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 30.

moſchata. 2. P. foliis cordatis ovato-crenatis tomentoſis: ſtipulis lanceolatis parvis ſubnigris, pedunculis axillaribus unifloris longiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 41. *n.* 87. *t.* 11. *f.* 5.

837. SIDA. *Cal.* ſimplex, ſemiquinquefidus, perſiſtens. *Stili* plures, *vel* 1 multifidus. *Capſ.* plures, quam 4, *in orbem* diſpoſitæ, 1loculares, 1-3ſpermæ, dehiſcendo ſæpius 2roſtres.

* *capſulis monoſpermis.*

† *quinque.*

r *foliorum longitudine latitudinem æquante aut pauliſper ſuperante.*

puſilla. 1. S. caule fruticoſo reclinato, foliis ellipticis dentatis glabris. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 6. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 4. & *diſſ.* 5. *t.* 127. *f.* 1.

plumoſa. 2. S. foliis ovatis dentatis retuſis, floribus terminalibus glomeratis: bracteis linearibus ciliatis cancellatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 7. *n.* 2. *t.* 12. *f.* 4.

veronicæfolia. 3. S. caule hirto, foliis cordatis acutis inæqualiter dentatis, pedunculis longiſſimis ſuberectis piloſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 7. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 3.

humilis. 4. S. caule ſpithamæo ſcabro, foliis cordatis crenatis orbiculatis villoſis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 277. *n.* 402. *t.* 134. *f.* 2.

repens. 5. S. caule filiformi elongato proſtrato, foliis cordatis crenatis utrinque hiſpidis, pedunculis unifloris. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 7. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 2.

hederæfolia. 6. S. caule nodoſo radicante, foliis cordatis obtuſe crenatis ſubhirſutis, capſularum corniculis erectis longis hamatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 8. *n.* 5. *t.* 9. *f.* 3.

fœtida. 7. S. caule erecto atro-purpureo, foliis ovato-cordatis ſerratis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 349. *n.* 513. *t.* 196. *f.* 1.

ovata. 8. S. caule promato ramoſo, foliis ovato-cordatis crenatis; pedunculis axillaribus ſolitariis unifloris. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 350. *n.* 514. *t.* 196. *f.* 2.

radicans. 9. S. caule repente, furculis radicantibus, foliis cordatis acutis piloſis dentatis: dentibus ſeta terminatis. *Rheed. h. malab.* 10. *f.* 79.

Digitized by Google

morifolia. 10. S. foliis ſubrotundo-acutis cordatis lato-crenatis: crenulis acuminatis, pedunculis annulatis petiolo paulo longioribus, calicibus piloſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 9. *f.* 7. *t.* 1. *f.* 1.

borbonica. 11. S. caule erecto ramoſo hirto, foliis cordatis ſubrotundo-acutis dentatis, floribus ſolitariis axillaribus: pedunculis petiolo paulo longioribus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 9. *n.* 8. *t.* 10. *f.* 2.

calicina. 12. S. foliis cordatis crenatis, calice inſigni quinquepartito, corollis patentibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 9. *n.* 9. *t.* 8. *f.* 2.

Retzii. 13. S. foliis ſubrotundis cordatis ſerratis ſupra piloſis, capſulis ecornibus. *Retz. obſ. bot.* 1. *p.* 23. *n.* 76. *Herit. ſtirp. n.* 5. *t.* 56. *bis.*

piloſa. 14. S. caule ramoſo piloſo, foliis crenatis: inferioribus cordatis ſubrotundis; reliquis cordato-ovatis, pedunculis longis geniculatis piloſis, capſulis bicornibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 9. *n.* 10. *t.* 1. *f.* 8.

atro-ſanguinea. 15. S. foliis cordato-ovatis acutis ſerratis utrinque villoſis, pedunculis unifloris ſolitariis capillaribus, caule fruticoſo. *Jacq. collect.* 1. *p.* 49. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 29. *β*) Sida paniculata. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 458. *n.* 11.

ſapina. 16. S. foliis cordato-ovatis crenatis, caulibus filiformibus proſtratis. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *p.* 109. *bis. t.* 52. *bis. Cavanill. diſſ.* 6. *t.* 196. *f.* 2.

fragrans. 17. S. foliis cordatis rotundatis ligulato-acuminatis dentatis, pedunculis ſolitariis petiolo brevioribus. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *p.* 111. *t.* 53. *an eadem cum althæifolia?*

multicaulis. 18. S. caulibus tenuibus tomentoſo-incanis, foliis ſubrotundo-cordatis dentatis pulverulentis villoſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 10. *n.* 12. *t.* 1. *f.* 6.

javenſis. 19. S. caule reclinato, foliis cordatis acutis ſublobato-crenatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 10. *n.* 13. *t.* 1. *f.* 5.

pyramidata. 20. S. foliis cordatis ſubrotundis dentatis, panicula terminali numeroſiſſima. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 11. *n.* 15. 6. *t.* 194. *f.* 1.

ſpinoſa. 21. S. foliis cordato-oblongis ſerratis: ſtipulis ſetaceis, axillis ſubſpinoſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 1. *f.* 9.

fruteſcens. 22. S. foliis ovato-oblongis ſerratis ſubtus albicantibus: pedunculis erectis unifloris, folio duplo minoribus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 12. *n.* 17. *t.* 10. *f.* 1.

23. S.

alnifolia. 23. S. foliis ſerratis ſubvilloſis : inferioribus rotundatis cordatis; mediis ellipticis, ſuperioribus lanceolatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 12. *n.* 18. *t.* 1. *f.* 13.

verticillata. 24. S. caule piloſo, foliis cordatis acuminatis crenatis; floribus ſubverticillatis ſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 13. *n.* 19. *t.* 1. *f.* 12.

bivalvis. 25. S. foliis cordatis orbiculato-acuminatis tomentoſis; floribus ſubſeſſilibus, fructu pentagono depreſſo glabro patente. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 13. *n.* 20. *t.* 11. *f.* 3.

proſtrata. 26. S. caule proſtrato, foliis cordatis latis crenatis tomentoſis, floribus geminis, capſulis muticis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 13. *n.* 21. *t.* 13. *f.* 3.

† † *foliorum longitudine latitudinem duplo aut magis adhuc excedente.*

flaveſcens. 27. S. caule erecto, foliis cordatis oblongis crenatis tomentoſis, floribus geminis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 14. *n.* 22. *t.* 13. *f.* 2.

truncata. 28. S. foliis cordato-oblongis retuſis ſerratis, ſtipulis ſetaceis, geniculis ramorum ſubtriſpinoſis. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *p.* 107. *t.* 51.

viſcoſa. 29. S. foliis cordatis crenatis tomentoſis, floribus ſubſolitariis, capſulis ſeptemlocularibus rotundis depreſſis. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 53. *bis. vix hujus tribus.*

glutinoſa. 30. S. caule tomentoſo-glutinoſo, foliis cordatis oblongis acuminatis ſubtus tomentoſis, pedunculis capillaribus longiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 16. *n.* 28. *t.* 2. *f.* 8.

urens. 31. S. foliis cordatis acuminatis ſerratis hiſpidis, pedunculis multifloris axillaribus terminalibuſque. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 2. *f.* 7.

ulmifolia. 32. S. foliis crenatis cordatis oblongis: acumine producto, capſularum roſtris longis hamatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 15. *n.* 26. *t.* 2. *f.* 4.

jamaicenſis. 33. S. foliis ovatis ſerratis tomentoſis, floribus axillaribus ſubpedunculatis, capſulis biroſtratis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 2. *f.* 5.

glomerata. 34. S. foliis ovato-lanceolatis dentatis ſubſeſſilibus, floribus congiomeratis ſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 18. *n.* 32. *t.* 2. *f.* 6.

Digitized by Google

acuta. 35. S. foliis lineari-lanceolatis dentatis inferne integris, floribus ſubſeſſilibus ſolitariis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 15. *n.* 25. *t.* 2. *f.* 3.

anguſtifolia. 36. S. foliis lineari-lanceolatis ſerratis ſubtus tomentoſis, ſtipulis ſetaceis, axillis obtuſe triſpinoſis. *Murr. flor. Goett. p.* 220. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 2. *f.* 2. *Scop. del. inſ.* 1. *t.* 14. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 52.

linifolia. 37. S. foliis linearibus hirſutis integerrimis, floribus corymboſo-ſpicatis: ſpicis terminalibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 14. *n.* 23. *t.* 2. *f.* 1.

† † *capſulis ſeptem.*

triloba. 38. S. foliis inferioribus cordatis crenatis: ſuperioribus dentatis trilobatis: medio lanceolato. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 11. *n.* 14. *t.* 1. *f.* 11. & 5. *t.* 131. *f.* 1.

ciliaris. 39. S. foliis ovalibus retuſis ſerratis: ſtipulis linearibus ciliatis, capſulis muricatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 3. *f.* 9. & 5. *t.* 127. *f.* 2.

microphylla. 40. S. foliis ovatis dentat., caule erecto duro ramoſiſſimo, floribus axillaribus apicem verſus numeroſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 22. *n.* 44. *t.* 12. *f.* 2.

ſtipulata. 41. S. foliis lanceolatis dentatis acutis piloſis: ſtipulis longis linearibus ciliatis, flore longioribus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 22. *n.* 46. *t.* 3. *f.* 10.

† † † *capſulis octo.*

carpinifolia. 42. S. foliis bifariis ovato-lanceolatis ſerratis: ſerraturis arctatis, umbellis axillaribus. *Suppl. p.* 307. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 51.

palmata. 43. S. foliis palmatis quinquangulis ſerratis exſtipulatis, floribus ſubumbellatis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 67. *β*) Sida ricinoides. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *p.* 115. *t.* 55.

ricinoides. 44. S. foliis quinquelobis ſerratis acuminatis, capſulis biariſtatis. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *p.* 115. *t.* 55. *an eadem cum palmata?*

jatrophoides. 45. S. foliis palmatis peltatis: laciniis lanceolatis runcinato-lobatis. *Herit. ſtirp. nov. p.* 117. *t.* 56. *an ſatis diſtincta a ricinoide?*

††††. *capſulis novem.*

ſuberoſa. 46. S. foliis ovalibus ſubinciſo-dentatis, cortice ſuberoſo. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *p.* 113. *t.* 54.

retuſa. 47. S. foliis cuneiformibus retuſis ſerratis ſubtus tomentoſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 3. *f.* 4. & 5. *t.* 131. *f.* 2.

multiflora. 48. S. foliis ovatis dentatis tomentoſis, pedunculis axillaribus ſolitariis petiolo longioribus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 18. *n.* 34. *t.* 3. *f.* 3.

herbacea. 49. S. caule erecto piloſo ramoſo, foliis ſubcordatis crenato-dentatis, pedunculis petiolo paulo brevioribus, capſulis biroſtratis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 19. *n.* 36. *t.* 13. *f.* 1.

micans. 50. S. foliis ſubcordatis ovato-lanceolatis dentatis tomento molliſſimo micantibus, calicibus globoſis decemangulatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 19. *n.* 37. *t.* 3. *f.* 1.

maculata. 51. S. foliis ovatis ſerratis tomentoſis, floribus ſpicatis terminalibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 20. *n.* 38. *t.* 3. *f.* 7.

rotundifolia. 52. S. foliis ſubcordatis ſubrotundis crenatis tomentoſis, capſularum roſtris faſciculatis hirtis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 20. *n.* 39 *t.* 3. *f.* 6. & 6. *t.* 194. *f.* 2.

planicaulis. 53. S. foliis ovato-lanceolatis ſerratis, caule compreſſo, floribus ſubſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 24. *n.* 50. *t.* 3. *f.* 11.

rhombifolia. 54. S. foliis lanceolato-rhomboidibus ſerratis: axillis ſubſpinoſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 3. *f.* 12.

††††† *capſulis decem.*

alba. 55. S. foliis ovato-oblongis anguſtis ſerratis glabris: axillis inermibus, pedunculis longiſſimis erectis, ſtigmatibus purpureis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 22. *n.* 14. *t.* 3. *f.* 8.

orientalis. 56. S. foliis ovato-acutis inferne integris ſupra inæqualiter ſerratis: ſtipulis oblongis linearibus, capſulis muticis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 21. *n.* 41. *t.* 12. *f.* 1.

capenſis. 57. S. caule ramoſiſſimo, foliis ovato-lanceolatis dentatis: ſtipulis ciliatis, capſulis muticis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 23. *n.* 49. *t.* 12. *f.* 3.

caneſcens. 58. S. caule fruticoſo, foliis rhomboideis ſubſeſſilibus ſubtus villoſiſſimis: ſtipulis ſetaceis erectis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 23. *n.* 48. *t.* 8. *f.* 3.

cordifolia. 59. S. foliis cordatis ſubangulatis ſerratis villoſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 3. *f.* 2.

calyptrata. 60. S. caule herbaceo glabro, foliis cordatis ovato-lanceolatis oblongis dentatis, floribus ſolitariis, ſeminibus calyptratis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 57. *n.* 93. & 5. *t.* 133. *f.* 1.

†††††† *capſulis numerum denarium ſuperantibus.*

ſpicata. 61. S. foliis ſubcordatis acuminatis, floribus ſpicatis, pedunculis petiolum ſubæquantibus, capſulis penduiis obtuſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 24. *n.* 51. *t.* 8. *f.* 1.

exſtipulata. 62. S. foliis cordatis obtuſis acutis ſubtomentoſis exſtipulatis, pedunculis axillaribus ſolitariis unifloris petiolo brevioribus. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 56. *n.* 91. *t.* 14. *f.* 2.

ſilvatica. 63. S. caule arboreſcente, foliis tomentoſis cordatis cuſpidatis, pedunculis binis axillaribus unifloris. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 56. *n.* 92. & 5. *t.* 133. *f.* 2.

occidentalis. 64. S. foliis cordatis ſublobatis: ſtipulis patentibus, pedunculis petiolo brevioribus, capſulis pendulis obtuſis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 4. *f.* 3.

multifida. 65. S. caule proſtrato, foliis multifidis, floribus ſecundis, ſeminibus alatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 25. *n.* 53. *t.* 4. *f.* 2. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 57. *bis. an hujus generis?*

** *capſulis diſpermis.*

coronata. 66. S. fruticoſa, foliis cordatis ſerratis tomentoſis, pedunculis lateralibus unifloris. *Scop. del. inſ.* 3. *p.* 1. *t.* 1.

*** *capſulis triſpermis.*

† *quinque.*

triquetra. 67. S. foliis cordatis ſubtomentoſis, ramis triquetris. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 118. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 2. *t.* 134. *f.* 5.

periplocifolia. 68. S. foliis cordatis integerrimis ſubtus tomentoſo-incanis, caule paniculato. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 26. *n.* 55. *t.* 5. *f.* 2.

ſtellata. 69. S. foliis ſubrotundo-cordatis acutis integerrimis. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 5. *f.* 4. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 59.

excelſior. 70. S. foliis cordato-acuminatis integris ſubtus villoſis, floribus paniculatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 27. *n.* 57. *t.* 5. *f.* 3.

hermannioides. 71. S. foliis cordatis ſupeltatis acuminatis ſubintegris, pedunculis fructiferis productioribus. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *p.* 121. *t.* 58. *an hujus generis? an vere diſtincta ſpecies?*

††*capſulis ſex.*

ramoſa. 72. S. foliis ovatis acutis inæqualiter dentatis, pedunculis ramoſis, capſulis biroſtratis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 28. *n.* 58. *t.* 6. *f.* 1.

††† *capſulis ſeptem ad undecim.*

lignoſa. 73. S. foliis cordatis crenatis tomentoſis orbiculato-acuminatis, capſulis duriſſimis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 28. *n.* 59. *t.* 6. *f.* 2.

umbellata. 74. S. foliis cordatis ſubangulatis ſubtomentoſis, floribus umbellatis, capſulis biroſtratis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 56.

microſperma. 75. S. caule flexuoſo ramoſo, foliis cordatis orbiculato-acutis quinquenerviis, fructu vix calicem excedente. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 29. *n.* 61. *t.* 13. *f.* 4.

Sonnerati. 76. S. foliis cordatis crenatis acutis tomentoſis, pedunculis craſſis geniculatis erectis, folio duplo longioribus, fructu pilis ſtellatis ornato. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 29. *n.* 62. *t.* 6. *f.* 4.

terminalis. 77. S. foliis cordatis ſublobato-crenatis tomentoſis, ſcapo longiſſimo ſpica terminato. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 29. *n.* 63. *t.* 6. *f.* 6. & 6. *t.* 195. *f.* 2.

tricuſpidata. 78. S. foliis cordatis ſubrotundo-tricuſpidatis dentatis tomentoſo-incanis, calicum laciniis introrſum carinatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 30. *n.* 64. *t.* 6. *f.* 5. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 60.

molliſſima. 79. S. caule erecto tomentoſo, foliis cordatis orbiculato-acuminatis dentatis molliſſimis, floribus ſolitariis, calice fructifero decagono. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 49. *n.* 67. *t.* 14. *f.* 1. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 61.

†††† *capſulis pluribus quam undecim.*

criſpa. 80. S. foliis cordatis crenatis ſcabriuſculis, capſulis cernuis inflatis crenatis repandis. *Mant. p.* 445. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 7. *f.* 1. & 5. *t.* 135. *f.* 2.

indica. 81. S. foliis cordatis ſublobatis, ſtipulis reflexis, pedunculis petiolo longioribus, capſulis ſcabris calicem excedentibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 7. *f.* 10.

pubeſcens. 82. S. foliis cordatis ſublobatis valde tomentoſis, pedunculis erectis hirſutiſſimis unifloris, fructu tomentoſo-conico truncato. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 33. *n.* 71. *t.* 7. *f.* 6.

Digitized by Google

aſiatica. 83. S. foliis cordatis dentatis, pedunculis unifloris petiolo longioribus, fructu lanuginoſo calicem paulisper ſuperante *Cavanill. diſſ. 1. t. 7. f. 2. & 5. t. 128. f. 1.*

populifolia. 84. S. foliis cordatis crenatis ſubrotundo-acutis: ſtipulis ſpiralibus patulis. *Cavanill. diſſ. 1. p. 32. n. 69. t. 7. f. 9. & 5. t. 128. f. 2.*

hirta. 85. S. caule hirto, foliis cordatis ſubrotundis dentatis: ſtipulis horizontalibus corniformibus, floribus ſolitariis. *Cavanill. diſſ. 1. p. 33. n. 70. t. 7. f. 5. & 5. t. 129. f. 1.*

Abutilon. 86. S. foliis ſubrotundo-cordatis indiviſis pedunculos excedentibus, capſularum corniculis bifidis. *Kniph. bot. orig. cent. 4. n. 79. Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent. 8. t. 135. f. 1.*

obtuſa. 87. S. foliis ſubrotundo cordatis ſublobatis, pedunculis umbellatis. *Vogel apud Trew pl. rar. t. 89.*

planiflora. 88. S. foliis cordatis ſubrotundo-acuminatis dentatis tomentoſis, capſularum roſtris primum ſolitariis, tum binis longis villoſis. *Cavanill. diſſ. 1. p. 32. n. 68. t. 7. f. 4. & 5. t. 135. f. 1. Herit. ſtirp. nov. 5. t. 62.*

exſtipularis. 89. S. foliis cordato-acuminatis crenatis molliſſimis, pedunculis unifloris petiolo duplo brevioribus, ſtipulis capillaribus longis villoſis caducis. *Cavanill. diſſ. 1. p. 31. n. 67. t. 7. f. 3.*

craſſifolia. 90. S. foliis cordatis utrinque tomentoſis, pedunculis petiolo æqualibus, capſulis calice quinquangulo vix majoribus. *Herit. ſtirp. nov. 5. p. 123. t. 60. nonne eadem cum tricuſpidata?*

*** *capſulis pentaſpermis.*

veſicaria. 91. S. foliis cordatis dentatis ſubtrilobis, fructu inflato capſulis decem compoſito. *Cavanill. diſſ. 2. p. 55. n. 87. t. 14. f. 3.*

**** *capſulis polyſpermis.*

reflexa. 92. S. foliis ſubrotundo-cordatis acutis tomentoſis obſolete crenatis, corollis reflexis. *Cavanill. diſſ. 1. p. 36. n. 79. t. 7. f. 7. & 2. p. 54. Herit. ſtirp. nov. 5. t. 64.*

***** *capſularum ſeminumve numero aut nimis inconſtanti aut nondum definito.*

ſinenſis. 93. S. foliis ovalibus ſerratis ſubtus tomentoſis: ſtipulis filiformibus. *Retz. obſ. bot. 4. p. 29. n. 94.*

truncata. 94. S. foliis ſubovatis dentatis rugoſo-tomentoſis apice truncatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 35. *n.* 76. *t.* 6. *f.* 7.

lanceolata. 95. S. foliis lanceolatis ſerratis: ſtipulis linearibus acutis nervoſis. *Koenig apud Retz. obſ. bot.* 4. *p.* 28. *n.* 93.

perſica. 96. S. foliis inferioribus petiolatis cordatis acuminatis: ſuperioribus ſeſſilibus lanceolatis dentatis, pedunculis ſolitariis unifloris. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 35. *n.* 75. *t.* 4. *f.* 1.

arborea. 97. S. foliis cordatis ovatis acuminatis crenatis quinquenerviis molliſſime tomentoſis, pedunculis axillaribus unifloris. *Suppl. p.* 307.

biflora. 98. S. foliis cordatis crenatis tomentoſis acuminatis: inferioribus oblongis tricuſpidatis, floribus geminis axillaribus. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 37. *n.* 80. *t.* 9. *f.* 1.

mauritiana. 99. S. foliis cordatis acutis holoſericeis indiviſis, pedunculis petiolo longioribus, capſulis hirſutis, caule fruticoſo. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 352. *pl. rar. ic. cent.* I. *t.* 29.

dumoſa. 100. S. foliis cordatis acuminatis ſerratis utrinque glabris, floribus paniculatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 101.

virgata. 101. S. foliis cordatis ſerratis apice attenuatis, caule virgato, pedunculis axillaribus filiformibus unifloris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 101.

althaeifolia. 102. S. foliis cordatis ſubangulatis obtuſis ſerrato-crenatis utrinque tomentoſis, capſularum roſtris calice brevioribus. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 218. *t.* 136. *f.* 2.

procumbens. 103. S. foliis cordatis ovato-ſubrotundis ſerratis villoſis, caule procumbente villoſo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 101.

americana. 104. S. foliis cordatis oblongis indiviſis, fructibus longitudine calicis: capſulis lanceolatis. *Plum. ic.* 1. *t.* 2.

braſilienſis. 105. S. caule tomentoſo, foliis ſubcordatis ovato-acutis crenatis: crenulis acuminatis, floribus numeroſis breviter pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 37. *n.* 82. & 2. *t.* 34. *f.* 1.

peruviana. 106. S. foliis ſubrotundo-cordatis acutis crenatis tomentoſis: ſtipulis lanceolatis ciliatis patulis, pedunculis axillaribus unifloris longis. *Cavanill. diſſ.* 1. *p.* 36. *n.* 78. *t.* 7. *f.* 8. & 5. *p.* 276. *t.* 130. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 63. *an eadem cum arborea?*

arabica. 107. S. foliis ovato-oblongis ſerratis, pedunculis axillaribus ſolitariis unifloris petiolo brevioribus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 124.

bicuſpidata. 108. S. foliis ſerratis: inferioribus cordato-lanceolatis; ſuperioribus linearibus, capſulis bicuſpidatis. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 37. *n.* 73.

Phyllanthos. 109. S. foliis craſſis tomentoſis imbricatis duplicato trifidis: petiolis floriferis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 276. *n.* 401. *t.* 127. *f.* 4.

ternata. 110. S. foliis ternatis ſerratis. *Suppl. p.* 307. *an eadem cum triloba?*

838. NAPÆA. *Cal.* ſimplex, 5fidus. *Petala* 5. *Stamina* in aliis floribus interdum ſterilia, in aliis *ſtili*. *Capſ.* 10 in orbem diſpoſitæ, rotundato-3quetræ, dehiſcendo ſubbiroſtratæ, 1ſpermæ.

lævis. 1. N. pedunculis nudis lævibus, foliis lobatis glabris. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 459. Napæa hermaphrodita. *Cavanill.* 5. *t.* 132. *f.* 1.

ſcabra. 2. N. pedunculis involucratis angulatis, foliis palmatis ſcabris. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 459. Napæa dioica. *Ehret. pict. t.* 8. & *t.* 7. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent. t.* 136. *f.* 4. *an potius utraque ſpecies ſidis ſubjungenda?*

SOLANDRA. *Cal.* ſimplex. *Capſ.* oblonga, toruloſa, 5locularis. *Sem.* multa duplici ordine in loculamentis diſpoſita.

lobata. 1. S. foliis omnibus ſimplicibus. *Cavanill. diſſ.* 1. *t.* 11. & 5. *t.* 136. *f.* 1. *Herit. ſtirp. nov.* 5. *t.* 49.

ternata. 2. S. foliis inferioribus ternatis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 279. *n.* 405. *t.* 136. *f.* 2.

1266. MALACHRA. *Cal. communis* 3polyphyllus, multiflorus, major; *proprius* duplex. *Capſ.* 5. 1ſpermæ, in orbem poſitæ.

faſciata. 1. M. foliis ſerratis trilobis: infimis quinquelobis, involucro communi triphyllo ſubquinquefloro. *Jacq. coll.* 2. *p.* 352. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 68.

capitata. 2. M. foliis cordatis, calice communi triphyllo ſeptemfloro. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 33. *f.* 1.

alceæfolia. 3. M. foliis baſi cordatis quinquelobis, involucro communi pentaphyllo ſubdecemfloro. *Jacq. coll.* 2. *p.* 350.

radiata. 4. M. foliis palmatis, calice communi ſubhexaphyllo multifloro: floribus ebracteatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 33. *f.* 3.

bracteata. 5. M. foliis palmatis, calice communi polyphyllo multifloro: floribus minimis bractea munitis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 98. *n.* 168. *t.* 34. *f.* 2.

839. ALTHÆA. *Cal.* exterior 9fidus. *Capſ.* plures, 1ſpermæ, immarginatæ.

officinalis. 1. A. foliis indiviſis tomentoſis. *Flor. dan. t.* 530. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 3.

grandiflora. 2. A. foliis cordatis angulatis tomentoſis patulis, pedunculis ſubtrifloris. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 33. *t.* 17.

corymboſa. 3. A. foliis indiviſis cordatis angulatiſve glabris, pedunculis calicibuſque piloſis, floribus corymboſis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 101.

narbonenſis. 4. A. caule tomentoſo, foliis cordatis dentatis: inferioribus angulatis acutis; ſuperioribus ſubhaſtatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 94. *n.* 163. *t.* 29. *f.* 2.

hirſuta. 5. A. foliis cordatis piloſo-hiſpidis ſupra glabris, caulinis tri- & quinquelobis, pedunculis ſolitariis unifloris. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 170.

Ludwigii. 6. A. foliis quinquelobis utrinque nudis, pedunculis congeſtis unifloris. *Mant. p.* 98. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 30. *f.* 3.

cannabina. 7. A. foliis inferioribus palmatis dentatis : ſuperioribus haſtatis lacinia media longiſſima. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 101. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 3.

840. ALCEA. *Cal.* exterior 6fidus. *Capſ.* plures, 1ſpermæ, margine membranaceo, ſulcato cinctæ.

roſea. 1. A. foliis rugoſis cordatis quinque-vel ſeptangulis crenatis. *Mill. illuſtr. ic. Knorr del. hort.* 1. *t.* R. 15.

ſinenſis. 2. A. foliis cordatis ſcabris crenatis angulatis, caule inferne ramoſo. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 92. *n.* 158. *t.* 29. *f.* 3.

acaulis. 3. A. foliis numeroſis cordatis rotundo-lobatis, floribus ſpicatis, caule craſſo minimo. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 93. *n.* 160. *t.* 27. *f.* 3.

coromandeliana. 4. A. foliis ſubtriangularibus crenatis obtuſis quinquenerviis, ſubtrilobis, floribus ſolitariis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 93. *n.* 159.

ficifolia. 5. A. foliis inferioribus palmatis ſeptemlobis crenatis : ſuperioribus haſtatis. *Blackw. herb. t.* 54.

841. MALVA. *Cal.* duplex : exterior utplurimum 3phyllus. *Capſ.* 8 aut plures in verticillum diſpoſitæ, 1loculares, rarius 2loculares, 1ſpermæ, rarius polyſpermæ.

* *capſulis bilocularibus : loculis monoſpermis.*

caroliniana. 1. M. caule repente radicante, foliis ſuperioribus multifidis, fructu criſtato. *Dill. h. Elth. t.* 4. *f.* 4

proſtrata. 2. M. caule humifuſo angulato, foliis palmato-multifidis, fructu glabro. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 59. *n.* 95. *t.* 16. *f.* 3.

** *capſulis unilocularibus.*

† *polyſpermis.*

elegans. 3. M. foliis pinnatifidis criſpis cauleque tomentoſis, fructu globoſo : capſulis triſpermis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 59. *n.* 96. *t.* 16. *f.* 1. *Suppl. p.* 307. Malva abutiloides.

anguſtifolia. 4. M. foliis ovato-lanceolatis dentatis anguſtis, fructu globoſo tomentoſo; capſulis ſubtriſpermis, calice exteriore minimo ſetaceo. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 64. *n.* 104. *t.* 20. *f.* 3.

abutiloides. 5. M. caule fruteſcente, foliis angulatis planis tomentoſis, pedunculo axillari multifloro. *Dill. h. Elth. t.* 1. *f.* 1. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 16. *f.* 2.

┞ ┞ *capſulis monoſpermis.*
✝ *calice exteriore diphyllo.*

ægyptia. 6. M. caule erecto ſcabro, foliis palmatis dentatis, corollis calice brevioribus. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 65.

trifida. 7. M. foliis duplicato-trifidis, calicibus piloſo-ſcabris. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 280. *n.* 406. *t.* 137. *f.* 2.

ſpithamea. 8. M. caule ſpithameo, foliis ſubrotundis crenulatis, calice exteriore ſubmonophyllo. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 61. *n.* 99. *t.* 18. *f.* 3.

hiſpanica. 9. M. caule erecto villoſo, foliis crenato-dentatis: inferioribus ſemiorbiculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 19. *f.* 3.

ſtipulacea. 10. M. foliis inferioribus trilobis: ſuperioribus palmato-inciſis, ſtipulis longiſſimis, calice exteriore ſetaceo. *de Aſſo ſtirp. Arragon. p.* 90. *n.* 647. *t.* 5. *f.* 1.

Papaver. 11. M. caule hirſuto, foliis quinatis ternatiſque. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 64. *n.* 102. *t.* 15. *f.* 3.

cuneifolia. 12. M. foliis lato-cuneiformibus ſupra crenatis, floribus ſolitariis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 64. *n.* 103. *t.* 20. *f.* 1.

✝ ✝ *calice exteriori triphyllo.*
⊥ *foliolis anguſtiſſimis.*

ſcabra. 13. M. caule virgato ſcabro, foliis cordatis crenatis ſubrugoſis, pedunculis ſolitariis ſubbifloris. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 281. *n.* 408. *t.* 138. *f.* 1.

operculata. 14. M. foliis cordatis quinquelobis tomentoſis, floribus racemoſo-ſpicatis, fructu operculato. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 65. *n.* 105. *t.* 35. *f.* 1.

capitata. 15. M. caule arboreſcente, foliis ſinuatis quinquelobis: medio longiſſimo, floribus corymboſo-capitatis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 280. *n.* 407. *t.* 137. *f.* 1.

ſcoparia. 16. M. foliis ovatis crenato-ſerratis, floribus axillaribus confertis, caule fruticoſo, ramis virgatis. *Heritier ſtirp. nov.* 3. *p.* 53. *t.* 27.

coromandeliana. 17. M. ramis procumbentibus, foliis oblongis ſubſerratis, floribus ſubſpicatis, capſulis decem tricuſpidatis.

cretica. 18. M. caule hirſuto, foliis cordatis ſubrotundo-lobatis crenatis, floribus ſolitariis longe pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 67. *n.* 108. & 5. *t.* 138. *f.* 2.

Sherardiana. 19. M. caulibus proſtratis, foliis orbiculatis plicatis tomentoſis crenatis, pedunculis ſolitariis unifloris arcuatis. *Sp. pl.* 1674. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 142.

parviflora. 20. M. caule patulo, foliis angulatis, floribus axillaribus ſeſſilibus glomeratis; calicibus glabris patentibus. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 39.

peruviana. 21. M. caule erecto herbaceo, foliis palmatis, ſpicis ſecundis axillaribus, capſulis denticulatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 156.

limenſis. 22. M. caule erecto ſcabro ramoſiſſimo, foliis ſeptemlobis rugoſis, ſpicis axillaribus, capſulis lævibus. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 111.

bryonifolia. 23. M. caule fruticoſo tomentoſo, foliis pinnatis ſcabris, pedunculis multifloris.

lactea. 54. M. fruteſcens, foliis angulatis acutis cordatis villoſis, petalis obcordatis calice brevioribus, pedunculis paniculatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 448.

bonarienſis. 24. M. caule tomentoſo, foliis trilobis, floribus glomeratis axillaribus ſubſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 69. *n.* 114. *t.* 22. *f.* 1.

virgata. 25. M. caule fruteſcente, foliis baſi anguſtatis multiformibus partitis: laciniis inciſo-crenatis, pedunculis unifloris. *Murray comm. Goett.* 1779. *p.* 20. *t.* 6. β) *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 17. *f.* 3.

groſſulariæfolia. 26. M. caule hirſuto fruteſcente, foliis ſubſinuato-lobatis ſerratis rugoſis, floribus ſolitariis, fructu hirſuto. *Dill. h. Elth. t.* 169. *f.* 207. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 24. *f.* 2.

tridactylites. 27. M. caule fruteſcente ramoſiſſimo, foliis cuneiformibus ſupra trilobis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 73. *n.* 121. *t.* 21. *f.* 2.

verticillata. 28. M. caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis ſeſſilibus, calicibus ſcabris. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 40. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

rotundifolia. 29. M. caule proſtrato, foliis cordatis orbicnlatis plicatis quinquelobis ſeptemlobiſque, pedunculis fructiferis declinatis. *Flor. dan. t.* 721.

americana. 30. M. caule erecto ramoſo, foliis ovato-lanceolatis dentatis, floribus ſolitariis: terminalibus ſpicatis, capſulis tridentatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 22. *f.* 2.

⊥⊥ *foliolis calicis latioribus, ovatis aut lanceolatis.*

fragrans. 31. M. caule fruteſcente viſcoſo, foliis cordatis crenatis quinque-vel ſeptemlobis, pedunculis ſolitariis unifloris capillaribus folio brevioribus. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 33.

ſubhaſtata. 32. M. caule pilis adpreſſis, foliis ſubhaſtatis, floribus ſolitariis breviter pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 72. *n.* 119. *t.* 21. *f.* 3.

retuſa. 33. M. foliis ſublanceolatis retuſis dentato-crenatis obtuſe trilobis, floribus ſubſpicatis, fructu glabro. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 73. *n.* 120. *t.* 21. *f.* 1.

Tournefortiana. 34. M. caule decumbente, foliis pinnatifidis: laciniis linearibus ciliatis apice trifidis, pedunculis unifloris ſolitariis folio longioribus. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 17. *f.* 3.

criſpa. 35. M. caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 23. *f.* 1.

faſtigiata. 36. M. caule tomentoſo, foliis cordatis quinquelobis: lobis acutis; medio productiore, floribus faſtigiatis conglomeratis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 75. *n.* 124. *t.* 23. *f.* 2.

Alcea. 37. M. caule erecto glabro, foliis cordatis: ſuperioribus profunde quinquepartitis. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 48. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

moſchata. 38. M. caule erecto, foliis radicalibus reniformibus inciſis: caulinis quinquepartitis pinnato-multifidis. *Mill. h. angl. t.* 17. *Curt. flor. Lond. n.* 42. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

lobata. 39. M. foliis ſubcordatis quinquelobis crenatis tomentoſis, floribus axillaribus faſtigiatiſque. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 76. *n.* 127. *t.* 18. *f.* 4.

abulenſis. 40. M. caule ſcabro-tomentoſo, foliis inferioribus baſi concavo-arcuatis: ſuperioribus cuneiformibus, floribus breviter pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 76. *n.* 128. *t.* 34. *f.* 3.

ſinenſis. 41. M. caule herbaceo reclinato glaberrimo, foliis quinquelobis obtuſis crenatis, floribus axillaribus numeroſis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 77. *n.* 129. *t.* 25. *f.* 4.

mauritiana. 42. M. caule erecto ſubglabro, foliis cordatis crenatis quinquelobis; ſtipulis connatis, floribus numeroſis axillaribus pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 25. *f.* 2.

ſilveſtris. 43. M. caule ſcabro, foliis quinque-vel ſeptemlobis dentatis, calice exteriori ſubmonophyllo. *Curt. flor. Lond. t.* 89. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

nicæenſis. 44. M. caule decumbente calicibuſque glomeratis piloſis, foliis quinquelobis. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 79. *n.* 134. *t.* 25. *f.* 1.

polyſtachya. 45. M. caule fruticoſo, foliis ovato-acuminatis ſerraris ſcabris, floribus ſpicatis, capſulis glabris muticis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 281. *n.* 409. *t.* 138. *f.* 3.

ſpicata. 46. M. foliis ſubcordatis crenatis ſubtrilobis ſcabriuſculis, floribus axillaribus ſolitariis: terminalibus denſe ſpicatis. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 20. *f.* 4.

ovata. 47. M. caule tomentoſo, foliis ovatis dentatis, ſpica denſiſſima oblonga. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 138. *f.* 1. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 81. *n.* 137. *t.* 20. *f.* 2.

calicina. 48. M. foliis cordatis crenatis indiviſis piloſo-hiſpidis, floribus ſolitariis longe pedunculatis: calice exteriori maximo. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 81. *n.* 138. *t.* 22. *f.* 4.

tomentoſa. 49. M. foliis cordatis crenatis tomentoſis, floribus lateralibus congeſtis, caule fruticoſo.

gangetica. 50. M. foliis cordaris obtuſis ſcabris, floribus ſeſſilibus glomeratis, capſulis denis muticis crenulatis. *Pluckn. phyt.* 74. *f.* 6.

acaulis. 51. M. acaulis, foliis lobatis denticulatis, ſcapis bi-vel quadrifloris. *Cavanill. diſſ.* 2. *p.* 82. *n.* 141. *t.* 35. *f.* 2.

††† *calice exteriori tetraphyllo.*

capenſis. 52. M. caule fruticoſo, foliis glutinoſis crenato-dentatis quinquelobis: ſuperioribus trilobis, floribus binis cernuis, pedunculis fructiferis erectis petiolo longioribus. *Cavanill. diſſ.* 2. *t.* 24. *f.* 3. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 1.

pumila. 53. M. caule erecto, foliis quinquepartito-trifidis, calice exteriore filiformi. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 37.

842. LAVATERA. *Cal.* 2plex : exterior 3fidus. *Capſ.* plures in orbem poſitæ, 1ſpermæ, ſtigmatum numero reſpondentes.

* *caule arboreo.*

arborea. 1. L. foliis ſeptemangularibus tomentoſis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. *Cavanill. diſſ.* 5. *t.* 139. *f.* 2. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 2.

micans. 2. L. foliis ſeptemangularibus acutis crenatis plicatis tomentoſis, racemis terminalibus. *Moriſ. hiſt. pl.* 1. *t.* 17. *f.* 9.

** *caule fruticoſo.*

luſitanica. 3. L. foliis ſeptemangularibus tomentoſis plicatis, racemis terminalibus. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 55.

africana. 4. L. foliis incanis quinquelobis crenatis, floribus cernuis geminis. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 282. *n.* 410. *t.* 139. *f.* 1. *Mill. h. angl. t.* 161. *f.* 2.

olbia. 5. L. foliis dentatis : inferioribus quinquelobis; ſuperioribus trilobis acutis, medio duplo longiore, floribus ſolitariis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 73.

triloba. 6. L. foliis ſubcordatis ſubtrilobis rotundatis crenatis : ſtipulis cordatis, pedunculis aggregatis unifloris. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 74.

maritima. 7. L. foliis cordatis ſubrotundo-lobatis crenatis tomentoſis, floribus ſolitariis. *Gouan. illuſtr. t.* 25. *f.* 2.

americana. 8. L. foliis cordatis indiviſis crenatis acuminatis tomentoſis, pedunculis ſolitariis unifloris. *An potius ſidæ ſpecies?*

*** *caule herbaceo.*

thuringiaca. 9. L. foliis inferioribus cordatis crenatis ſubrotundo-lobatis; ſummis haſtatis, pedunculis longis ſolitariis unifloris. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 311. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 136. *f.* 2.

cretica. 10. L. caule erecto ſcabro, foliis cordatis ſeptemangulatis : ſuperioribus acutis, floribus confertis axillaribus : pedunculis erectis unifloris. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 41.

trimeſtris. 11. L. caule ſcabro, foliis inferioribus ſubrotundis: mediis quinquelobis; ſummis lobo medio longiore fructibus orbiculo tectis. *Jacq. h. Vind.* 1. t. 72. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. t. 136. f. 2.

843. MALOPE. *Cal.* 2plex: exterior 3phyllus, *Capſ.* plures in capitulum conglomeratæ, 1ſpermæ, ſubrotundæ.

malacoides. 1. M. foliis cordatis ovatis crenatis, floribus ſolitariis longiſſime pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. t. 32. f. 1.

multiflora. 2. M. foliis ſubrotundis crenatis villoſis, floribus ſubquaternis axillaribus. *Cavanill. diſſ.* 2. p. 85. n. 145.

trifida. 3. M. foliis craſſis trinerviis trifidis dentatis, floribus ſolitariis axillaribus longiſſime pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 2. p. 85. n. 144. t. 27. f. 2.

844. URENA. *Cal.* duplex: exterior 5fidus. *Capſ.* 5 1loculares, echinatæ, 1ſpermæ.

lobata. 1. U. foliis triglandulofis angulatis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. t. 185. f. 1. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. t. 135. f. 2.

tricuſpis. 2. U. foliis uniglandulofis ovato-angulatis: angulis acuminatis ſerratis, caule piloſo. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. p. 334. n. 489. t. 183. f. 1.

ſinuata. 3. U. foliis triglandulofis ſinuato-palmatis ſinubus obtuſis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. t. 185. f. 2.

procumbens. 4. U. foliis oblongis ſinuatis ſerratis, caule procumbente.

leptocarpa. 5. U. foliis lanceolatis ſerratis. *Suppl.* p. 308.

reticulata. 6. U. foliis ſinuato-ſerratis uniglandulofis reticulatis: inferioribus trilobis, reliquis lanceolatis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. p. 335. n. 491. t. 183. f. 2.

multifida. 7. U. foliis uniglandulofis ſinuato-multifidis: ſinubus rotundatis denticulatis, caule ramoſiſſimo. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. p. 336. n. 493. t. 184. f. 2.

americana. 8. U. foliis trifidis baſi integris. *Suppl.* p. 308. *nonne mera ſinuatæ varietas?*

9. U.

viminea. 9. U. foliis uniglandulofis, inferioribus rotundato-acutis ſublobatis, ſuperioribus lanceolaris ſerratis, calice exteriore majore. *Cavanill. diſſ. bot. 6. p. 335. n. 492. t. 184. f. 1.*

Typhalæa. 10. U. foliis lato-lanceolatis, capſularum mucronibus tribus retro denticulatis. *Mant. 258. Cavanill. diſſ. bot. 6. t. 197. an cum leptocarpa potius ad pavoniam amandanda?*

845. GOSSYPIUM. *Cal.* duplex, exterior 3fidus. *Capſ.* 3-4locularis. *Sem.* lana obvoluta.

arboreum. 1. G. foliis palmatis, lobis lanceolatis, caule fruticoſo. *Cavanill. diſſ. bot. 6. t. 165.*

rubrum. 2. G. foliis quinquelobis, venis rubentibus, caule fruticoſo. *Forsk. flor. æg. arab. p. 125. an diſtincta ſpecies?*

herbaceum. 3. G. foliis quinquelobis ſubtus uniglandulofis, caule herbaceo. *Regn. botan. t. 376.*

eglandulofum. 4. G. foliis quinquelobis eglandulofis, lobis tribus oblongis acuminatis, caule villoſo. *Cavanill. diſſ. bot. 6. p. 354. n. 518. an vere diſtinctum ab herbaceo?*

micranthum. 5. G. foliis quinquelobis uniglandulofis glaberrimis, calice corollam ſuperante. *Cavanil. diſſ. bot. 6. p. 311. n. 445. t. 193.*

peruvianum. 6. G. foliis quinquelobis acutis triglandulofis, calicibus exterioribus triphyllis triglandulofis. *Cavanill. diſſ. bot. 6. p. 313. n. 449. t. 168.*

hirſutum. 7. G. foliis ſubquinquelobis ſubtus uniglandulofis, ramulis petiolisque hirſutis. *Cavanill. diſſ. bot. 6. t. 167.*

vitifolium. 8. G. foliis quinquelobis palmatis uniglandulofis acutis, calice exteriori profunde laciniato. *Cavanill. diſſ. bot. 6. p. 311. n. 447. t. 166.*

indicum. 9. G. foliis ſubtrilobis, ſubtus eglandulofis, lobis cuneatis brevibus. *Cavanill. diſſ. bot. 6. p. 314. n. 451. t. 169.*

religioſum. 10. G. foliis ſuperioribus trilobis acutis ſubtus triglandulofis, ramulis nigro-punctatis. *Cavanill. diſſ. bot. 6. t. 164. f. 1. Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent. 8. t. 134. f. 1.*

barbadenſe. 11. G. foliis ſuperioribus trilobis integerrimis ſubtus triglandulofis. *Pluckn. alm. t. 188. f. 1.*

latifolium. 12. G. foliis acutis, infimis indiviſis, reliquis trilobis ſubtus uniglanduloſis. *Murray comm. Goett.* 1776. *p.* 32. *t.* 1.

CIENFUEGOSIA. *Cal.* 2plex, exterior 12phyllus. *Capſ.* globoſo-acuminata, 3valvis, 3locularis: loculis 1ſpermis.

digitata. 1. CIENFUEGOSIA. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 174. *n.* 259. *t.* 72. *f.* 2.

PAVONIA. *Cal.* 2plex, exterior polyphyllus. *Capſ.* 5 in orbem poſitæ, articulatim dehiſcentes, 2valves, 1loculares, 1ſpermæ.

* *capſulis ſpinoſis.*

ſpinifex. 1. P. caule arboreſcente, foliis ovato-lanceolatis inæqualiter dentatis, tubo ſtigmatibusque decumbentibus, capſulis ariſtatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 463. Hibiſcus ſpinifex. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 103.

ariſtata. 2. P. caule fruticoſo humili, foliis cordatis ovato-lanceolatis crenatis ſcabriuſculis, floribus ſolitariis, capſulis ariſtatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 133. *n.* 189. *t.* 45. *f.* 3.

** *capſulis muticis.*

† *calice interiori breviori, exteriore cancellato.*

zeylanica. 3. P. caule herbaceo hirto, foliis cordatis crenato-dentatis, inferioribus ſubrotundis, ſuperioribus profunde tri-vel quinquefidis, pedunculis elongatis geniculatis unifloris. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 134. *n.* 191. *t.* 48. *f.* 2.

cancellata. 4. P. caule debili hirto, foliis cordatis ſerratis, calicibus globoſis, radiis vicenis ſubulatis hirtis. *Suppl. p.* 311. Hibiſcus cancellatus.

paniculata. 5. P. caule hirto ramoſo, foliis cordatis ſubrotundis acuminatis crenato-dentatis ſæpe tricuſpidatis, floribus paniculatis, genitalibus declinatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 135. *n.* 193. *t.* 46. *f.* 2.

†† *calice interiore exteriorem ſuperante.*

ſpicata. 6. P. foliis cordatis ovato-acuminatis ſerratis hirtis rugoſis, thyrſo terminali. *Vogel apud Trew pl. rar. t.* 90. *an forſan altheæ potius ſpecies?*

Digitized by Google

urens. 7. P. caule fruticoſo ſuburente, foliis palmatis, floribus axillaribus glomeratis ſubſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 137. *n.* 195. *t.* 49. *f.* 1. & 5. *p.* 283.

haſtata. 8. P. foliis haſtatis crenato-dentatis ſupra punctatis, floribus ſolitariis longe pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 138. *n.* 196. *t.* 47. *f.* 2.

Columella. 9. P. foliis dentatis angulatis, inferioribus latis; ſuperioribus oblongis, floribus axillaribus ſolitariis: pedunculo brevi. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 138. *n.* 197. *t.* 48. *f.* 3.

cuneifolia. 10. P. caule fruticoſo, foliis obſolete cordatis ovato-truncatis crenatis, floribus ſolitariis erectis longe pedunculatis, calicibus glabris. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 139. *n.* 198. *t.* 45. *f.* 1.

præmorſa. 11. P. hirſuta, foliis ovatis baſi anguſtato-cordatis apice præmorſis crenatis, calicibus tomentoſis, capſulis tuberculatis. *Suppl. p.* 309. Hibiſcus præmorſus.

coccinea. 12. P. foliis cordatis ſubtrilobis pubeſcentibus, floribus ſolitariis revolutis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 140. *n.* 200. *t.* 47. *f.* 1.

papilionacea. 13. P. caule tereti tomentoſo, foliis cordatis dentatis ſubrotundo-acuminatis, floribus ſolitariis, genitalibus declinatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 140. *n.* 201. *t.* 49. *f.* 1.

MALVAVISCUS.

Cal. 2plex, exterior 8phyllus, interior 1phyllus, tubuloſus, 10ſtriatus, apice 5dentatus. *Petala* baſi auriculata. *Tubus* ſtamina ſuſtinens, longiſſimus, contortus. *Drupa* 5locularis, loculis 1ſpermis.

arboreus. 1. M. foliis ſcabriuſculis acuminatis, calicis exterioris foliolis erectis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 463. Hibiſcus Malvaviſcus. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 54.

piloſus. 2. M. foliis piloſis obtuſis acutiſque. *Swartz nov. pl. gen.* & *ſp. p.* 102. Achenia piloſa.

mollis. 3. M. foliis tomentoſis, calicis foliolis externis patulis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 459.

Digitized by Google

846. HIBISCUS. *Cal.* 2plex, exterior polyphyllus aut multifidus. *Capſ.* 5valvis, 5locularis, loculis polyſpermis, ramis 1ſpermis.

* *capſularum loculis monoſpermis.*

lævis. 1. H. inermis herbaceus glaber, foliis ovalibus trilobis, pedunculis ſolitariis articulatis unifloris. *Scop. del. inſ.* 3. *p.* 33. *t.* 17.

pentacarpos. 2. H. caule annuo glaberrimo, foliis cordatis ſubhaſtatis acuminatis ſerratis, floribus ſubnutantibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 66. *f.* 3.

militaris. 3. H. foliis ſerratis haſtatis acutiſſimis, floribus magnis, petalis bifidis. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 352. *n.* 399. *t.* 198. *f.* 2.

virginicus. 4. H. foliis inferioribus cordatis acuminatis ſerratis, ſuperioribus haſtatis. *Pluckn. phyt.* 6. *f.* 4. *an ſatis diſtinctus a pentacarpo?*

haſtatus. 5. H. foliis haſtatis ſerratis oblongis anguſtis, floribus ſolitariis, capſula tomentoſa. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 144. *n.* 203. *t.* 50. *f.* 1.

acuminatus. 6. H. caule tomentoſo, foliis cordatis ſubrotundo-acuminatis, capſula pentagona tomentoſa depreſſa. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 144. *n.* 204. *t.* 50. *f.* 2.

ovatus. 7. H. foliis ovatis integerrimis ciliatis trinerviis ſubtus villoſis, floribus axillaribus ſolitariis, pedunculis folio brevioribus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 143. *n.* 202. *t.* 50. *f.* 3.

** *capſularum loculis polyſpermis.*

† *caule aculeato.*

vitifolius. 8. H. caule herbaceo, foliis quinquangulis crenatis villoſis, floribus ſolitariis cernuis, capſula pentaptera. *Mant. p.* 569. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 58. *f.* 2. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 4.

ſtriatus. 9. H. caule ſulcato, foliis haſtatis glabris ſerratis, calice interiori ſtriato, inflato inermi. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 146. *n.* 207. *t.* 54. *f.* 1.

bifurcatus. 10. H. caule fruticoſo, foliis ſerratis, inferioribus trilobis, mediis haſtatis, ſuperioribus lanceolatis, calicis exterioris foliolis bifurcatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 146. *n.* 208. *t.* 51. *f.* 1.

trilobus. 11. H. caule arboreo, foliis trilobis ſerratis, floribus ſolitariis, pedunculis inermibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 147. *n.* 209. *t.* 53. *f.* 2.

ſinuatus. 12. H. foliis cordatis dentatis quinquelobis, calicibus deciduis, interioribus latere rumpendis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 147. *n.* 210. *t.* 52. *f.* 2.

ſpecioſus. 71. H. foliis glabris palmatis, laciniis lanceolatis ſerratis, caule pedunculis calicibusque lævibus. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 456.

ficulneus. 13. H. caule fruticoſo verrucoſo ramoſiſſimo, foliis quinquefido-palmatis, ſuperioribus oblongis ovato-lanceolatis, floribus ſubſpicatis terminalibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 51. *f.* 2.

cannabinus. 14. H. caule herbaceo glabro, foliis ſuperioribus palmatis quinquepartitis ſerratis uniglanduloſis, floribus ſeſſilibus, calicibus glanduloſis. *Ehret. pict. t.* 6. *f.* 1.

ſuratteníis. 15. H. aculeis recurvis, foliis digitatis, calicibus appendiculatis. *Mant. p.* 436. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 53. *f.* 1.

radiatus. 16. H. caule fruteſcente, foliis palmatis, lobis lanceolatis dentatis, floribus breviter pedunculatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 150. *n.* 214. *t.* 54. *f.* 2.

digitatus. 17. H. foliis digitatis, foliolis inæqualibus lanceolatis ſerratis, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus, calicibus monophyllis inermibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 151. *n.* 215. *t.* 70. *f.* 2.

diverſifolius. 18. H. caule arboreo, foliis inferioribus quinquelobis, ſuperioribus trilobis, ſummis indiviſis, pedunculis axillaribus ſolitariis unifloris. *Jacq. coll.* 2. *p.* 307.

domingenſis. 70. H. caule arboreo ſeneſcente inermi, foliis omnibus quinquelobis, pedunculis axillaribus ſolitariis unifloris. *Jacq. coll.* 3. *p.* 213.

††*caule inermi.*

ſſ *calice exteriori monophyllo.*

tiliaceus. 19. H. caule arboreo, foliis cordatis ſubrotundis indiviſis acuminatis crenatis, calice exteriori decemdentato. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 55. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 4.

tricuſpis. 20. H. caule arboreo, foliis trilobis, lobis acutis productis; ſtipulis magnis acutis, floribus racemoſis. *Suppl. p.* 310. Hibiſcus haſtatus. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 55. *f.* 2.

† † *calice exteriori polyphyllo.*
† *interiori hemiſphærico.*

populneus. 21. H. caule arboreo, foliis cordatis acuminatis integerrimis, calice exteriori triphyllo deciduo. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 56. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 135. *f.* 3.

liliiflorus. 22. H. caule arboreo, foliis lanceolato-ovatis oblongis trinerviis, paucis tripartitis, corolla inſigni, tubo longiſſimo. *Cavanill. diſſ.* 3 *p* 154. *n.* 219. *t.* 57. *f.* 1.

Lampas. 23. H. foliis ſubcordatis latis acuminatis trilobis ſupra punctatis, calice exteriori minimo ſetaceo, interiori laciniis longiſſimis anguſtiſſimis terminato. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 154. *n.* 220. *t.* 56. *f.* 2.

† † *calice interiori tubulato-dentato, aut ſemiquinquepartito.*

⊥ *foliis integris aut vix lobatis.*

micranthus. 24. H. foliis ſubrotundis ſerratis, corollis reflexis obliquis. *Suppl. p.* 308. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 66. *f.* 1.

æthiopicus. 25. H. caule fruticoſo minimo, foliis ovato-retuſis apice dentatis, floribus axillaribus terminalibusque. *Mant. p.* 258. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 61. *f.* 1.

rhombifolius. 26. H. caule fruticoſo glabro, foliis rhomboideis, lateribus ſuperioribus crenatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 156. *n.* 223. *t.* 69. *f.* 3.

rigidus. 27. H. ſuffruticoſus hirſutus, ramis ſimplicibus, foliis oblongis ſerratis, corollæ limbo reflexo, ſeminibus lanatis. *Suppl. p.* 310.

hirtus. 28. H. caule herbaceo ſcabro, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis, floribus ſolitariis, calice exteriori longiori. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 67. *f.* 3.

microphyllus. 72. H. foliis ovalibus hirtis anterius ſerratis, caule fruticoſo. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 50. *an hujus tribus?*

ovalifolius. 73. H. foliis ovalibus ſubangulatiſque, calicibus exterioribus pentaphyllis. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 50.

phœniceus. 29. H. caule fruticoſo hirſuto, foliis ſerratis acuminatis ſæpe ſubtrilobis, floribus rubris, ſeminibus lanatis. *Suppl. p.* 310. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 14.

unilateralis. 30. H. caule fruticoſo, foliis ovato-acutis mollibus, tubo ſtaminifero altera parte longitudinaliter nudo. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 158. *n.* 227. *t.* 67. *f.* F. 2.

Roſa ſinenſis. 31. H. caule arboreo, foliis ovatis acuminatis ſerratis glabris. *Rheed. h. malab.* 2. *t.* 16. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 69. *f.* 2.

membranaceus. 32. H. foliis cordatis oblongo-acuminatis obſolete denticulatis, calice interiori tubuloſo membranis quinque inſtructo. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 159. *n.* 229. *t.* 57. *f.* 2.

cordifolius. 33. H. arboreus tomentoſus, foliis cordatis ovatis ſerratis, floribus pedunculatis terminalibus, calice elongato. *Suppl. p.* 309.

laſiocarpos. 34. H. foliis ovato-lanceolatis crenato-ſerratis tomentoſis ſubtus incanis, capſula ovato-acuminata ſetoſa. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 159. *n.* 231. *t.* 70. *f.* 1.

ſororius. 35. H. foliis cordatis crenatis ſcabris, calice exteriori tereti apice dilatato. *Suppl. p.* 311.

ſenegalenſis. 36. H. foliis cordatis ſubanguloſis tomentoſis, calice interiori breviori, exteriori cancellato. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 160. *n.* 233. *t.* 68. *f.* 1.

tubuloſus. 37. H. caule fruteſcente hirſuto, foliis cordatis angulatis craſſis tomentoſis, floribus ſolitariis, calicis exterioris apicibus ſpatulatis recurvis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 161. *n.* 234. *t.* 68. *f.* 2.

urens. 38. H. tomentoſus, foliis reniformibus crenatis, calicibus lanatis corolla longioribus. *Suppl. p.* 309. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 67. *f.* 1.

ferrugineus. 39. H. caule tomentoſo-ferrugineo, foliis cordatis oblongis obtuſis ſcabris baſin verſus latioribus, floribus ſolitariis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 162. *n.* 236. *t.* 60. *f.* 1.

‡ ‡ *foliis angulatis aut lobatis.*

Moſcheutos. 40. H. foliis ovatis acuminatis ſerratis, petiolis floriferis, caule ſimpliciſſimo. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 65. *f.* 1.

paluſtris. 41. H. caule herbaceo ſimpliciſſimo, foliis ovatis ſubtrilobis ſubtus tomentoſis, floribus axillaribus. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 65. *f.* 2.

pedunculatus. 42. H. caule fruteſcente, foliis quinquelobis trilobisque hirſutis, pedunculis axillaribus unifloris elongatis. *Suppl. p.* 309. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 66. *f.* 2.

ſpicatus. 43. H. caule hirto, foliis cordatis quinque- vel ſeptemlobis valde tomentoſis, ſtipulis utrinque ſex, floribus ſpicatis ſubſeſſilibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 163. *n.* 240. *t.* 69. *f.* 1.

flaveſcens. 44. H. caule pilis aureis hirſuto, foliis palmato-quinquelobis hirſutis, floribus numeroſis terminalibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 164. *n.* 242. *t.* 70. *f.* 3.

braſilienſis. 45. H. foliis cordatis denticulatis, calicibus exterioribus duplo longioribus, caule fruticoſo, ramis hirtis.

mutabilis. 46. H. caule arboreo, foliis cordatis quinquangulis, acuminibus productis acutis, capſula obovata rugoſa. *Merian. ſurin. t.* 31.

clypeatus. 47. H. foliis cordatis angulatis, capſulis turbinatis truncatis hirſutiſſimis. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 58. *f.* 1.

columnaris. 48. H. foliis cordatis rotundato-angulatis ſubtomentoſis, calicibus monophyllis, tubo ſtamina ſuſtinente longiſſimo. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 166. *t.* 69. *f.* 2.

micans. 49. H. foliis cordatis latis quinquangulis tomento lucidis, calice exteriori monophyllo ſexpartito, corolla extrinſecus tomentoſa nervoſa. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 167. *t.* 60. *f.* 2.

Abelmoſchus. 50. H. foliis ſubpeltato-cordatis ſeptangulis, caule hiſpido. *Merian. ſurin. t.* 42.

palmatus. 51. H. radice craſſa alba fungoſa, foliis cordatis palmato-lobatis, pedunculis nutantibus. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 168. *n.* 249. *t.* 63. *f.* 1.

eſculentus. 52. H. caule herbaceo craſſo, foliis quinquelobis crenatis ſubpedatis, calice utroque deciduo, capſula corniculata. *Jacq. obſ. bot.* 2. *t.* 35.

ſyriacus. 53. H. caule fruticoſo, foliis cuneiformi-ovatis trilobis inæqualiter dentatis glabris ſubcordatis, ſeminibus zona hiſpida. *Knorr. del. hort.* 1. *t. K.* 2. a. & b.

Sabdariffa. 54. H. caule herbaceo glaberrimo, foliis crenatis, inferioribus ovatis, ſuperioribus tripartitis, floribus ſolitariis axillaribus ſubſeſſilibus. *Jacq. obſ.* 2. *t.* 35.

elatus. 55. H. foliis cordatis ſubrotundis integris, pedunculis breviſſimis unifloris, calice decemdentato. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 95. *t.* 134. *f.* 2. 3.

┴ ┴ ┴ *foliis profundius fiſſis.*

fraternus. 56. H. calicibus exterioribus radiis teretibus, apice mucronato-concavo, foliis trilobis. *Suppl. p.* 311. *Merian. ſurin. t.* 37. *an diſtinctus ſatis a Sabdariffa?*

Manihot. 57. H. foliis palmato-digitatis ſeptempartitis. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 56.

veſicarius. 58. H. caule herbaceo hiſpido urente, foliis imis ſubrotundo-crenatis indiviſis, reliquis quinquelobis obtuſis crenatis, calicibus inflatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 17. *n.* 253. *t.* 64. *f.* 2.

Trionum. 59. H. caule herbaceo ſcabro, foliis tripartitis dentato-ſerratis lobo medio longiſſimo lanceolato, calicibus inflatis. *Sabb. h. rom.* 1. *t.* 55. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 134. *f.* 6.

ternatus. 60. H. caule humili herbaceo, foliis ternatis, calicibus inflatis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 172. *n.* 255. *t.* 64. *f.* 3.

*** *tribus incertæ.*

calyphyllus. 61. H. foliis cordatis crenatis latis ſubtrilobis, calice exteriore folioſo maximo. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 283. *n.* 411. *t.* 140.

arenarius. 62. H. glutinoſus, foliis profunde trilobis, lobis lateralibus inæqualibus bilobis, calice exteriori foliolis ſetaceis glanduloſo-piloſis. *Scop. del. inſ.* 3. *t.* 2.

præcox. 63. H. caule ſuffruticoſo, capſula hiſpida. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 125. *n.* 92. *an diſtincta ſpecies?*

purpureus. 64. H. foliis cordato-oblongis acutis ſerratis, ſtigmatibus quinque longis apice capitatis, capſula ſuperne ſeptemalata. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 126.

tripartitus. 65. H. acauleato-hiſpidus, foliis tripartitis, lobis lanceolatis ſerratis, pedunculis axillaribus, capſulis piloſis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 126.

hiſpidulus. 66. H. caule hiſpido, foliis palmatis dentatis glabris, calicis exterioris laciniis linearibus. *Forks. flor. æg. arab. p.* 126.

trilobatus. 67. H. foliis trilobis ſerratis, caule aculeato. *Burm. amer. p.* 152. *t.* 159.

gujanenſis. 68. H. foliis ovato-oblongis denticulatis, capſulis aculeatis, aculeis recurvis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 708.

aculeatis. 69. H. piloſus, foliis infimis cordatis angulatis ſerratis, ſupremis palmatis lobatis, calicibus aculeatis. *Walt. flor. carol. p.* 177.

RUIZIA. *Cal.* 2plex, exterior 3phyllus, deciduus, interior perſiſtens, 5partitus. *Petala* 5 falcata. *Filamenta* baſi in urceolum coalita. *Stili* 10 *Capſ.* 10 in orbem poſitæ, dorſo lignoſæ, 1loculares, 2ſpermæ.

cordata. 1. R. foliis cordatis oblongo-acuminatis ſinuato-crenatis incanis ſubtus pulverulentis. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 117. *n.* 169. *t.* 36. *f.* 2.

lobata. 2. R. foliis cordatis oblongis crenatis tri-vel quinquelobis, lobo medio productiore acuminato. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 118. *n.* 170. *t.* 36. *f.* 1.

palmata. 3. R. foliis incanis palmatis incifis quinquepartitis, lobis acuminatis ſinuato-crenatis, medio productiore. *Cavanill. diſſ.* 3. *p.* 119. *n.* 171. *t.* 37. *f.* 1.

laciniata. 4. R. foliis ad petiolum uſque laciniatis, laciniis ſeptem anguſtiſſimis linearibus pinnatifidis, pinnulis decurrentibus. *Cavanill. diſſ. p.* 119. *n.* 172. *t.* 37. *f.* 2.

CURUPITA. *Cal.* ſimplex, 6partitus, ſuperus. *Cor.* 6fida, inæqualis. *Stigma* 6ſtriatum. *Capſ.* ampliſſima, ſphærica, includens alteram globoſam pulpa fartam, 6locularem, polyſpermam.

gujanenſis. 1. CURUPITA. *Aubl. pl. guj* 2. *p.* 708. *t.* 282.

347. STEWARTIA. *Cal.* ſimplex, 1phyllus, ſemiquinquefidus. *Germen* orbiculatum, hirſutum. *Stil.* ſimplex, filiformis. *Fructus* conicus lignoſus, in pyramides 5 3angulares partibilis, inter quarum ſuperficies *ſem.* 2.

virginica. 1. STEWARTIA. *Catesb. Car.* 3. *t.* 13.

MALACHODENDRON. *Cal.* ſimplex, 1phyllus, ſubquinquefidus. *Petala* lacero-fimbriata. *Filamenta* baſi in urceolum brevem connata. *Stil.* 5. *Capſ.* 5. coadunatæ 2valves, 1ſpermæ.

ovatum. 1. M. foliis glabris. *Cavanill. diſſ.* 5. *p.* 102. *n.* 437. *t.* 158. *f.* 2.

corchoroides. 2. M. foliis villoſis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 126. *n.* 98. Stewartia corchoroides.

1344. GORDONIA. *Cal.* ſimplex. *Stil.* 5gonus, apice 5fidus. *Capſ.* 5locularis. *Semina* bina, ala foliacea.

Laſianthus. 1. G. foliis utrinque glabris, floribus pedunculatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 509. Hypericum. Laſianthus. *Ellis act. angl. p.* 60. *ad ann.* 1770. *p.* 518. *t.* 11. *Catesb. Car.* 1. *t.* 44.

pubeſcens. 2. G. foliis ſubtus pubeſcentibus, floribus ſeſſilibus. *Cavanill. diſſ. bot.* 6. *p.* 308. *n.* 442. *t.* 162. *an cum. Laſiantho polyandriarum potius claſſi inſerenda?*

848. CAMELLIA. *Cal.* imbricatus, polyphyllus, foliolis interioribus majoribus.

japonica. 1. C. foliis acute ſerratis acuminatis. *Jacq. pl. ar. ic. bot.* 2. *t.* 43.

Saſanqua. 2. C. foliis ovatis obtuſe ſerratis emarginatis. *Thunb. flor. jap. p.* 263. *t.* 29.

665. MESUA. *Cal.* ſimplex, 4phyllus. *Cor.* 4petala. *Piſt.* 1. *Nux* 4gona, 1ſperma.

Ferrea. 1. M. foliis lanceolatis. *Rumpf. amd.* 7. *t.* 2.

glabra. 2. M. foliis orbiculato-retuſis crenatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 100. *n.* 9.

MYRODIA. *Cal.* ſimplex, 1phyllus. *Petala* 5. *Drupa* ſicca: *Nuces* binæ.

turbinata. 1. MYRODIA. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 102. *an diſtinctum a Quararibea genus?*

642. MORISONIA. *Cal.* ſimplex, 2fidus. *Cor.* 4petala. *Piſt.* 1. *Bacca* corticata, 1locularis, polyſperma, pedicellata.

americana. 1. MORISONIA. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 144. *Gærtn. de fr. & ſem. cent.* 5. *t.* 78. *f.* 1. *an capparidis forſan ſpecies?*

1081. DALECHAMPIA. *Flores* monoici. *Involucrum* commune exterius foliolis 4, interius foliolis 2 3fidis. *Cor.* 0.

♂. *Umbellula* 10flora: *involucello* 2phyllo; paleis numeroſis. *Perianthium proprium* 5phyllum.

♀. *Floſculi* 3: *involucello* 3phyllo. *Perianthium proprium* 11phyllum. *Stil.* filiformis. *Capſ.* 3cocca.

colorata. 1. D. foliis integerrimis. *Suppl. p.* 421.

ſcandens. 2. D. foliis trifidis ſerratis. *Mant. p.* 496. *Suppl. p.* 421. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 239.

1135. TAXUS. *Flores* dioici. *Cor.* o. *Cal.* gemmæ 4phyllus, *aut* 7phyllus.
♂. *Antheræ* peltatæ, 8fidæ.
♀. *Stil.* o. *Sem* 1. receptaculo baccante, integerrimo, ſeminudum.

verticillata. 1. T. foliis verticillatis linearibus falcatis. *Thunb. flor. jap. p.* 276.

baccata 2. T. foliis ſolitariis linearibus cuſpidatis approximatis, receptaculis maſculis ſubgloboſis. *Blackw. herb. t.* 572. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 6.

elongata. 3. T. foliis lineari-lanceolatis, receptaculis maſculis filiformi-cylindricis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 415.

nucifera. 4. T. foliis ſolitariis linearibus cuſpidatis remotis. *Kæmpf. amoen. exot.* 5. *p.* 814. 815. *ic. Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 6.

macrophylla. 5. T. foliis ſolitariis lanceolatis remotis. *Thunb. flor. jap. p.* 276. *Banks ic. Kaempf. t.* 24.

1077. PINUS. *Flores* monoici. *Cor.* o.
♂. *Cal.* gemmæ ſquamæ hiantes. *Antheræ* nudæ.
♀. *Cal.* ſtrobili: *Squama* 2flora. *Piſt.* 1. *Nux* ala membranacea excepta, 1locularis, evalvis.

* *foliis pluribus ex eadem vagina.*

ſilveſtris. 1. P. foliis geminis rigidis, ſtrobilis ovato-conicis ſubgeminis foliorum longitudine, ſquamis oblongis obtuſis. *Oelhaf. Abb. t.* 1-4. β) Pinus montana. *Brückn. ſpec.* 1. *f.* 1. γ) Pinus rubra. *du Hamel arbr.* 2. *t.* 30.

Pinaſter. 2. P. foliis geminis margine ſubaſperis, ſtrobilis oblongo-conicis folio brevioribus, ſquamis echinatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 367.

virginiana. 3. P. foliis geminis, ſtrobilis ſolitariis conicis longitudine foliorum oblongo, ſquamarum aculeis rectis. *du Roi harbk. Baumz.* 2. *p.* 35. *n.* 3. β) Pinus echinata.

reſinoſa. 4. P. foliis geminis, ſtrobilis ovato-conicis baſi rotundatis ſolitariis folio dimidio brevioribus, ſquamis inermibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 367.

halepenſis. 5. P. foliis geminis, ſtrobilis ovato-conicis baſi rotundatis folio ſubbrevioribus, ſquamis obtuſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 367. *Mill. h. angl. t.* 208.

glabra. 6. P. foliis geminis, ſtrobilis oblongo-ovatis brevibus, cortice glabro. *Walt. flor. carol. p.* 237.

Pinea. 7. P. foliis geminis primordialibus ciliatis, ſtrobilis ovatis obtuſis ſubinermibus folio longioribus lucidis, ſquamis oblongis obtuſis, nucibus duris ovatis ala deſtitutis. *Blackw. herb. t.* 189. *Regn. bot. t.* 276.

maritima. 8. P. foliis geminis, ſtrobilis pyramidatis, ſquamis oblongis obtuſis apice lucidis. *du Hamel arbr.* 2. *t.* 29. *β*) *du Hamel arbr.* 2. *t.* 28. *an mera varietas ſilveſtris?*

ſquarroſa. 9. P. foliis geminis glabris brevibus, ſtrobilis ovatis ſquarroſis, cortice ſcabro. *Walt. flor. carol. p.* 237.

lutea. 10. P. foliis ternis pedalibus, ſtrobilis ovato-ſubulatis, ſpinis rectis. *Walt. flor. Carol. p.* 237.

rigida. 11. P. foliis ternis, ſtrobilis pyramidatis confertis, ſquamis oblongis acutis. *du Roi harbk. Baumz.* 2. *p.* 46. *Hort. angl. t.* 16. *an mera tædæ varietas?*

Tæda. 12. P. foliis ternis, ſtrobilis oblongo-conicis folio brevioribus aggregatis, ſquamis oblongis obtuſis echinatis.

paluſtris. 13. P. foliis ternis longiſſimis, ſtrobilis ſubcylindricis echinatis, ramis ſtipulis ramentaceis aſperis.

occidentalis. 14. P. foliis quinis margine ſcabris longiſſimis, ſtrobilis oblongis, ſquamis apice truncatis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 103. *Plum. ic. t.* 161.

ſtrobus. 15. P. foliis quinis margine ſcabris, ſtrobilis cylindricis folio longioribus pendulis, ſquamis ovalibus planis laxis. *Hort. angl. t* 17.

Cembra. 16. P. foliis quinis, ſtrobilis ovatis obtuſis erectis, ſquamis appreſſis ovalibus concavis, nucibus duris cuneiformibus ala deſtitutis. *Pallas flor. roſſ. t.* 2. *Trew cedr. liban. mant. t.* 7.

Larix. 17. P. foliis faſciculatis mollibus obtuſiuſculis deciduis, ſtrobilis ovato-oblongis, bracteis extra ſquamas ovatas

ſubſcabra margine laceras exſtantibus. *Pallas flor. roſſ. t.* 1. *Blackw. herb. t.* 477.

laricina. 18. P. foliis faſciculatis deciduis, ſtrobilis ſubglobofis, ſquamis laxis orbiculatis glabris. *du Roi harbk. Baumz.* 2. *p.* 83. *t.* 3. *f.* 5-7.

pendula. 19. P. foliis faſciculatis mollibus obtuſiuſculis, ſtrobilorum ſquamis bracteas obtegentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 369.

Cedrus. 20. P. foliis faſciculatis perennibus, ſtrobilis ovatis obtuſis erectis, ſquamis appreſſis rotundis, cortice lævi. *Trew Ehret. t.* 1. 60. 61. & *Cedr. hiſt. apol. cum mant. t.* 1-4.

** *foliis ſolitariis baſi diſtinctis.*

Abies. 21. P. foliis planis emarginatis pectinatis, ſtrobilis oblongis erectis, ſquamis obtuſiſſimis appreſſis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 632. Pinus Picea. *Blackw. herb. t.* 203. *Gaert. de fr. et ſem. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 1.

Balſamea. 22. P. foliis planis emarginatis ſubpectinatis ſupra ſuberectis, ſtrobis ovato-oblongis erectis, florentis ſquamis reflexis acuminatis. *Hort. angl. t.* 6.

americana. 23. P. foliis obtuſis, ſtrobilis ſubrotundis, ſquamis ſubrotundis planis, cortice lævi. *Pluckn. alm.* 2. *t.* 121. *f.* 1. *Gaertn. de fr. et ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 1.

Picea. 24. P. foliis ſubtetragonis acutiuſculis diſtichis, ramis infra nudis, ſtrobilis ſubcylindricis, ſquamis ovalibus planis margine undulatis laceriſque. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 633. Pinus Abies. *Flor. dan. t.* 193. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 6. *t.* 91. *f.* 1.

alba. 25. P. foliis tetragonis lateralibus incurvis, ramis ſubtus nudiuſculis, conis ſubcylindricis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 371.

canadenſis. 26. P. foliis ſubulatis bifariam verſis, ramulis glabris, cicatricibus ſub foliis decurrentibus, ſtrobilis ovato-oblongis pendulis laxis, ſquamis ſubrotundis. *Miller hort. angl. t.* 1. *an eadem cum americana?*

mariana. 27. P. foliis ſubulatis bifariam verſis, ramulis pubeſcentibus, cicatricibus ſub foliis ſeſſilibus, ſtrobilis ovalibus pendulis, ſquamis ovalibus margine laceris undulatiſque. *Seligm. av.* 5. *t.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 91. *f.* 1.

arauca-na. 28. P. foliis turbinatis imbricatis hinc mucronatis, ramulis quaternis cruciatis, ſtrobilis globoſis pendulis, nucibus conicis hyalinis ala deſtitutis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 157. *utrum hujus, an diſtincti generis?*

cupreſ-ſoides. 29. P. foliis imbricatis acutis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 144. *an diſtincta ſpecies.*

1085. RICINUS. *Flores* diclini. *Cor.* o.
♂. *Cal.* 5partitus.
♀. *Cal.* 3partitus. *Stil.* 3. 2partiti.
Capſ. duplicatæ, aggregatæ.
Pericarpia intus nidulantia.

medicus. 1. R. foliis palmatis ſeptemlobis, lobis lanceolatis, infimis divaricatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 164.

inermis. 2. R. foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis, petiolis glandulofis, capſulis inermibus. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 28.

commu-nis. 3. R. foliis peltatis ſubpalmatis ſerratis cauleque coloratis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 27.

Tanarius. 4. R. foliis peltatis repandis. *Rumpf. amb.* 3. *t.* 121.

Mappa. 5. R. foliis peltatis indiviſis. *Rumpf. amb.* 3. *t.* 108.

dioicus. 6. R. foliis cordatis acuminatis. *Forſt. fl. auſtr. p.* 67.

CLAS-

CLASSIS XVI.

DIADELPHIA.

PENTANDRIA.

851. MONNIERIA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* ringens. *Filamentum* ſuperius antheris 2 : inferius 3. *Capſulæ* 5.

HEXANDRIA.

849. FUMARIA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* ringens baſi gibboſa, nectarifera. *Filamenta* antheris 3.

1267. SARACA. *Cal.* 0. *Cor.* 4fida. *Filamenta* utrinque 3 connexa.

OCTANDRIA.

850. POLYGALA. *Cal.* laciniæ 2 alæformes. *Cor.* vexillum cylindricum. *Stamina* connexa. *Capſ.* obcordata, 2locularis.

851. SECURIDACA. *Cal.* 3phyllus. *Vexillum* 0. *Legumen* 1ſpermum : ala ligulata.

1416. DALBERGIA. *Staminum filamenta* 2 apice 4fida. *Fructus* pedicellatus, non dehiſcens, leguminoſus membranaceo-compreſſus.

CUMARUNA. *Cal.* 3partitus. *Cor.* 5petala : petalis 3 erectis, 2 declinatis. *Legumen* 1 loculare, 1 ſpermum.

DECANDRIA.

* *ſtaminibus omnibus connexis.*

853. NISSOLIA. *Legumen* 1ſpermum terminatum ala ligulata.

VOLUBILES. *Phaſeolus. Dolichos. Clitoria. Glycine.*

PINNATÆ absque impari *Orobus, Piſum, Lathyrus, Vicia, Ervum, Arachis, Abrus.*

PINNATÆ cum impari. *Biſerrula, Aſtragalus, Phaca, Hedyſarum, Glycyrrhiza, Indigoſera, Galega, Colutea, Amorpha, Piſcidia, Müllera.*

TRIFOLIATÆ. *Trifolium, Lotus, Medicago, Erythrina, Geniſta, Cytiſus Ononis Trigonella, Phaſeolus, Dolichos Clitoria.*

UMBELLATÆ. *Lotus, Coronilla, Ornitopus, Scorpiurus, Hippocrepis.*

	GALEDUPA.	*Legumen* 1-2ſpermum ellipticum ſubfalcatum planum acuminatum.
	ANDIRA.	*Legumen* 1ſpermum pedunculatum carnoſum punctatum hinc ſulcatum.
	ZORNIA.	*Antheræ* alternatim oblongæ & globoſæ.
854.	PTEROCARPUS.	*Stamina* bina 3 anthera. *Legumen* foliaceum.
	AMERIMNON.	*Cal.* 2labiatus. *Legumen* compreſſo-foliaceum, 2valve, dehiſcens.
	TARALEA.	*Cal.* 5partitus $\frac{2}{3}$. *Cor.* 5petala: vexillo 2-petalo. *Germen* pedicellatum. *Legumen* ſubrotundum depreſſum, 2valve, 1loculare, 1ſpermum.
	MUTUCHI.	*Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala. *Car.* 2petala. *Germen* pedicellatum. *Legumen* rugoſum, compreſſum, alatum, 1loculare, 1ſpermum.
	DEGUELIA.	*Cal.* 2labiatus $\frac{1}{3}$. *Cor.* 5petala: vexillo 2-petalo. *Legumen* globoſum, 1loculare, 1ſpermum.
	ACUROA.	*Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala: petalis 2 inferioribus conniventibus. *Germen* pedicellatum. *Legumen* ſubrotundum, 1loculare: 1ſpermum.
	PARIVOA.	*Petalum* 1 tubi modo convolutum.
861.	AMORPHA.	*Alæ Carinaque* 0.
	TETRAMNUS.	*Carina* minima, calice recondita. *Stamina* alterna 5 ſterilia. *Stigma* ſeſſile, capitatum.
895.	EBENUS.	*Alæ* 0. *Legum.* 1ſpermum.
855.	ERYTHRINA.	*Alæ carinaque* breviſſimæ. *Cal.* poro mellifero.
1286.	ABRUS.	*Filamenta* 9 baſi infima connexa latere ſuperiori diſtincta. *Sem.* ſphærica.
858.	SPARTIUM.	*Filamenta* adhærentia germini. *Stigma* adnatum villoſum.
859.	GENISTA.	*Piſtillum* deprimens carinam. *Stigma* involutum.
865.	LUPINUS.	*Antheræ* alternæ rotundæ oblongæque. *Legumen* coriaceum.
864.	ANTHYLLIS.	*Cal.* turgidus, includens legumen.
856.	PISCIDIA.	*Legumen* alis 4 longitudinalibus.
857.	BORBONIA.	*Legumen* mucronatum. *Stigma* emarginatum.

881. ULEX.	*Cal.* 2phyllus. *Legumen* vix calice longius.
876. ARACHIS.	*Cor.* reſupinata. *Legumen* coriaceum.
860. ASPALATHUS.	*Legumen* muticum, ovatum, ſubdiſpermum.
863. ONONIS.	*Vexillum* ſtriatum. *Legumen* rhombeum, ſeſſile.
862. CROTALARIA.	*Legumen* pedicellatum, turgidum.
VATAIREA.	*Legumen* ſubrotundum, compreſſum, hinc rugoſum, marginibus membranaceis exaratum, 1loculare, 1ſpermum.

** *ſtigmate pubeſcente* (nec priorum ſequentiumve notæ.)

880. COLUTEA.	*Legumen* inflatum, ſupra baſin dehiſcens.
866. PHASEOLUS.	*Carina ſtiluſque* ſpirales.
867. DOLICHOS.	*Vexillum* baſi callis 2.
871. OROBUS.	*Stilus* linearis, tereiuſculus, ſupra villoſus.
870. PISUM.	*Stilus* ſupra carinatus villoſuſque.
872. LATHYRUS.	*Stilus* ſupra planus villoſuſque.
873. VICIA.	*Stilus* ſub ſtigmate barbatus.

*** *legumine ſubbiloculari* (nec priorum ſequentiumve notæ.)

892. ASTRAGALUS.	*Legumen* 2loculare, rotundatum.
893. BISERRULA.	*Legumen* 2loculare, planum, dentatum.
891. PHACA.	*Legumen* ſemibiloculare.

**** *legumine ſubmonoſpermo* (nec priorum sequentiumve notæ.)

894. PSORALEA.	*Cal.* punctis glanduloſis.
DIPHYSA.	*Legumen* 1loculare, polyſpermum, utrinque veſica membranacea inflata longitudinaliter aucta.
896. TRIFOLIUM.	*Flores* (sæpius) capitati. *Legumen* calice longius, 1-2ſpermum.
882. GLYCYRRHIZA.	*Cal.* 2labiatus: labio ſuperiori 3fido.

***** *legumine ſubarticulato.*

888. ÆSCHYNOMENE.	*Cal.* 2labiatus. *Legumen* articulis 1ſpermis.
STILOSANTHES.	*Cal.* tubuloſus, longiſſimus, corallifer. *Germen* infra corollam. *Legumen* articulis 2, hamatum.
887. HEDYSARUM.	*Carina* obtuſiſſima. *Legumen* articulis ſubrotundis, compreſſis.
883. CORONILLA.	*Legumen* iſthmis interceptum, rectum.
884. ORNITHOPUS.	*Legumen* articulatum, arcuatum.
886. SCORPIURUS.	*Legumen* iſthmis interceptum, teretiuſculum, involutum.

Zzz 2

PETAGNANA.	*Legumen* articulis diſtinctis 1ſpermis ſtilo connexis.
885. HIPPOCREPIS.	*Legumen* compreſſo-membranaceum : altera ſutura ſinubus ad medium exciſa.
899. MEDICAGO.	*Piſtillum* carinam deflectens. *Legumen* ſpirale, membranaceo-compreſſum.

****** *legumine uniloculari polyſpermo* (nec priorum ſequentiumve notæ.)

898. TRIGONELLA.	*Vexillum alæ*que patula, quaſi 3petala. *Carina* minuta.
868. GLYCINE.	*Carina* vexillum reflectens.
CYLISTA.	*Vexillum* baſi utrinque lobulo auctum. *Carina* baſi & apice fiſſa.
869. CLITORIA.	*Vexillum* amplum alas obtegens. *Corolla* reſupinata.
879. ROBINIA.	*Vexillum* reflexo-patens, ſubrotundum.
889. INDIGOFERA.	*Carina* utrinque denticulo.
875. CICER.	*Calicis* laciniæ 4 ſuperiores vexillo incumbentes.
874. ERVUM.	*Calix* 5partitus ſubæqualis, longitudine fere corollæ.
1319. LIBARIA.	*Calicis* lacinia infima elongata. *Alæ* inferius 2lobæ.
877. CYTISUS.	*Calix* 2labiatus. *Legumen* pedicellatum.
1417. MULLERA.	*Pericarpium* elongatum, carnoſum, moniliforme : *globulis* 1ſpermis.
890. GALEGA.	*Legumen* lineare ſtriis oblique tranſverſis.
FALCATA.	*Legumen* falcatum, compreſſum, utrinque acuminatum.
897. LOTUS.	*Legumen* teres, farctum ſeminibus cylindricis.
878. GEOFFROYA.	*Drupa* nucleo ligneo.

PENTANDRIA.

850. MONNIERIA. *Cal.* 5 partitus: lacinia ſuperiori longa. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2: ſuperius antheris connatis 2; inferius 3. *Capſulæ* 5 1ſpermæ.

trifolia. 1. MONNIERIA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 730. *t.* 293.

HEXANDRIA.

1267. SARACA. *Cal.* 0. *Cor.* infundibuliformis, 4fida. *Filamenta* 3 utrinque ad faucem. *Legumen* pedicellatum.

indica. 1. SARACA. *Mant. p.* 98. *Burm. ind. t.* 25. *f.* 2.

849. FUMARIA. *Cal.* 2phyllus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 2 membranacea: ſingula antheris 3. *Capſ.* 1locularis, 1ſperma.

* *corollis bicalcaratis.*

Cucullaria. 1. F. ſcapo nudo. *Mant. p.* 437. *Pluckn. alm. t.* 90. *f.* 3.

ſpectabilis. 2. F. floribus poſterius bilobis, caule folioſo. *Amœn. acad.* 7. *t.* 7.

fungoſa. 18. F. floribus baſi bigibbis, capſulis linearibus ancipitibus corolla fungoſo-inflata tectis, foliis ſcandentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 1.

** *corollis unicalcaratis.*

nobilis. 3. F. caulibus ſimplicibus bracteis flore brevioribus indiviſis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 116. *Gærtn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 2.

intermedia. 19. F. radice bulboſa, caulibus ſimpliciſſimis, bracteis ſubrotundis indiviſis. *Ehrh. Beytr.* 6. *p.* 146.

bulboſa. 4. F. radice bulboſa, caule ſimplici, bracteis ovato-lanceolatis integerrimis flore brevioribus. *Flor. dan. t.* 605. *β*) *Knorr del. hort.* 1. *t.* H. 9.

minor. 5. F. radice bulboſa ſolida, caule ſimplici, bracteis pinnatis longitudine florum.

Schangini. 6. F. radice tuberoſa, caule ſimplici folioſo, bracteis flore dimidio brevioribus. *Pallas act. Petrop. ad* 1779. 2. *p.* 267. *t.* 14. *f.* 1-3.

ſempervirens. 7. F. leguminibus linearibus paniculatis, caule erecto. *Mill. h. angl. t.* 78. *Siliqua receptaculo feneſtrato.*

acaulis. 17. F. ſcapis nudis longitudine foliorum, foliis pinnatis: pinnis trilobis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 203.

lutea. 8. F. leguminibus teretibus, caulibus diffuſis: angulis obtuſis. *Mant. p.* 258. *Mill. h. angl. t.* 136. *f.* 1. *Siliqua longa: receptaculo cum valvis infra coalito.*

ſibirica. 9. F. leguminibus ovalibus, caulibus patulis, foliolis oblongis. *Suppl. p.* 314. *Amm. rar. t.* 20.

capnoides. 10. F. leguminibus linearibus tetragonis, caulibus diffuſis acutangulis. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 46. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 3.

enneaphylla. 11. F. foliis triternatis: foliolis cordatis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 73.

officinalis. 12. F. leguminibus monoſpermis racemoſis, caule diffuſo. *Zorn pl. off. ic. t.* 14.

capreolata. 13. F. leguminibus monoſpermis racemoſis, foliis ſcandentibus ſubcirrhoſis. *Flor. dan. t.* 340. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 2.

ſpicata. 14. F. leguminibus monoſpermis ſpicatis, caule erecto, foliolis filiformibus. *β*) *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 12. *f.* 13.

claviculata. 15. F. leguminibus linearibus, foliis cirrhiferis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 12. *f.* 3.

veſicaria. 16. F. leguminibus globoſis acutis inflatis, foliis cirrhoſis. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 7. *t.* 115. *f.* 1. *Pluckn. alm. t.* 335. *f.* 3. *Capſul. duplicatae: ſeminibus intus nidulantibus.*

OCTANDRIA.

851. POLYGALA. *Cal.* 5phyllus: foliolis 2 majoribus alæformibus, ante maturitatem ſeminis coloratis. *Capſula* obcordata, 2locularis. *Semina* ſolitaria.

* *appendice florum penicilliformi*, criſtatæ.

aſpalatha. 1. P. floribus capitatis, caulibus ſimpliciſſimis, foliis ſetaceis ſparſis. *Mant. p.* 99.

braſilienſis. 2. P. floribus ſubſpicatis, caulibus ſimpliciſſimis, foliis lanceolatis ſparſis. *Mant. p.* 99.

incarnata. 3. P. floribus ſpicatis, caule herbaceo ramoſo erecto, foliis alternis ſubulatis. *Pluckn. mant. t.* 438. *f.* 5.

trichoſperma. 4. P. floribus ſpicatis, caulibus virgatis ſtriatis, foliis linearibus. *Mant. p.* 259. *Jacq. obſ. bot.* 3. *t.* 67.

amara. 5. P. floribus racemoſis, caulibus erectiuſculis, foliis radicalibus obovatis majoribus. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 412.

vulgaris. 6. P. floribus racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari-lanceolatis. *Flor. dan. t.* 516.

major. 7. P. floribus racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus ſuberectis, foliis lineari-lanceolatis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 413.

monſpeliaca. 8. P. floribus racemoſis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus acutis; *an mera vulgaris varietas ?*

bracteolata. 9. P. floribus racemoſis: bracteis triphyllis, foliis lineari-lanceolatis, caule fruticoſo. *Buxb. cent.* 3. *t.* 71.

paniculatá. 10. P. racemis nudis, caulibus herbaceis erectis ſuperne ramoſis, foliis linearibus. *Swartz obſerv. bot. t.* 6. *f.* 2.

ſibirica. 11. P. racemo laterali nudo, caulibus herbaceis, foliis lanceolatis. *Gmel. flor. ſibir.* 4. *t.* 32.

ſpinoſa. 12. P. floribus lateralibus, caule ſpinoſo fruticoſo, foliis ovalibus mucronatis. *Mant. p.* 437.

teretifolia. 13. P. floribus lateralibus, caule fruticoſo ramoſo, foliis filiformibus falcatis. *Suppl. p.* 316.

umbellata. 14. P. floribus ſubumbellatis, foliis linearibus ſubciliatis. *Mant. p.* 259. *Burm. afr. t.* 73. *f.* 5.

myrtifo- 15. P. floribus carina lunulata, caule fruticoſo, foliis lævibus lia. oblongis obtuſis. *Mill. illuſtr. ic.*

viola- 42. P. ſpicis terminalibus, foliis lanceolatis hirſutis. *Aubl.* cea. *pl. guj.* 2. *p.* 735. *t.* 294.

Timutu. 43. P. ſpica terminali, foliis lanceolatis: inferioribus ternis verticillatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 737. *t.* 295.

tincto- 44. P. villoſa, bracteis triphyllis, foliis obovatis, caule fruti- ria. coſo. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 5.

oppoſiti- 16. P. caule fruticoſo, foliis oppoſitis ovatis acutis. *Mant.* folia. *p.* 259.

** *florum appendice nulla*, Imberbes.

† *caule arboreo.*

Penæa. 17. P. floribus lateralibus ſolitariis, foliis obtuſis petiolatis. *Plum. ic.* 214. *f.* 1.

diverſi- 18. P. floribus axillaribus confertis, foliis ſenioribus oblongo- folia. ovatis: recentibus ſubovatis. *Brown. jam. t.* 5. *f.* 3.

Heiſte- 19. P. caule arboreſcente, floribus lateralibus, floribus tri- ria. quetris mucronato-ſpinoſis. *Pluckn. alm. t.* 229. *f.* 5.

†† *caule fruticoſo.*

theezans. 20. P. pedunculis unifloris, foliis alternis lanceolatis. *Mant.* *p.* 260. *Burm. zeyl. t.* 85.

triner- 21. P. pedunculis unifloris, caule angulato, foliis alternis via. cordatis cuſpidatis trinerviis. *Suppl. p.* 315.

micro- 22. P. floribus racemoſis, foliis minutiſſimis ellipticis. phylla.

æſtuans. 23. P. floribus racemoſis, foliis lanceolatis petiolatis. *Suppl.* *p.* 315.

Chamæ- 24. P. floribus ſparſis: carinæ apice ſubrotundo, foliis lan- buxus. ceolatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 233.

alopecu- 25. P. floribus ſeſſilibus, floribus confertis ovatis acutis cari- roides. natis piloſis. *Mant. p.* 260.

mixta. 26. P. floribus ſeſſilibus, foliis teretibus mucronatis confer- tiſſimis. *Suppl. p.* 316.

ſquarro- 27. P. foliis aggregatis lanceolatis patulis. *Suppl. p.* 315. ſa.

††† *caule ſuffruticoſo.*

ſinenſis. 28. P. floribus ſpicatis axillaribus, foliis ovalibus

ſtipulacea. 29. P. floribus lateralibus, foliis ternis linearibus acutis. *Mant. p. 260. Seb. muſ. 2. t. 62. f. 2.*

† † † † *caule herbaceo,*
† *ſimpliciſſimo.*

Senega. 30. P. floribus ſpicatis, caule erecto, foliis lato-lanceolatis. *Amæn. acad. 2. t. 2.*

lutea. 31. P. floribus oblongo-capitatis, caule erecto, foliis lanceolatis acutis. *Pluckn. amalth. t. 438. f. 6.*

virideſcens. 32. P. floribus globoſo-capitatis, caule erecto, foliis lanceolatis obtuſiuſculis.

triflora. 33. P. pedunculis ſubtrifloris, caule erecto, foliis linearibus alternis.

grandiflora. 39. P. caule ſubſimplici, foliis confertis ovato-lanceolatis. *Walt. flor. carol. p. 179.*

† † *caule ramoſo.*

polygama. 40. P. ſpicarum terminalium floribus corollatis, reliquarum apetalis. *Walt. flor. carol. p. 179.*

cymoſa. 41. P. caule ſubramoſo, cymis terminalibus, foliis ſubulatis. *Walt. flor. carol. p. 179.*

glaucoides. 34. P. pedunculis multifloris lateralibus, caulibus diffuſis, foliis acutis.

ciliata. 35. P. caule erecto, capſulis ciliato-dentatis.

ſanguinea. 36. P. pedunculis ſquarroſis, caule erecto. *Pluckn. mant. p. 437. f. 5.*

verticillata. 37. P. floribus ſpatio remotis, foliis linearibus verticillatis. *Pluckn. mant. t. 438. f. 4.*

cruciata. 38. P. foliis quaternis.

852. SECURIDACA. *Cal.* 3phyllus. *Cor.* papilionacea: vexillo 2phyllo intra alas. *Legumen* ovatum, 1loculare, 1ſpermum, deſinens in alam ligulatam.

erecta. 1. S. caule erecto. *Jacq. ſtirp. amer, pict. t. 261. f. 56.*

ſcandens. 2. S. caule ſcandente, foliis oblongis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 186.

virgata. 3. S. caule ſcandente: ramis virgatis, foliis ſubrotundis. *Plum. ic.* 144. *f.* 1.

1416. DALBERGIA. *Filamenta* 2, apice 4fida. *Fructus* pedicellatus, non dehiſcens, leguminoſus, membranaceo-compreſſus.

Lanceolaria. 1. D. foliis pinnatis ſubtus piloſis: pinnis ellipticis, fructibus lanceolatis. *Suppl. p.* 316.

Monetaria. 2. D. foliis ternatis glabris: foliolis ovatis, fructibus ovalibus aveniis. *Suppl. p.* 317.

CUMARUNA. *Cal.* turbinatus, 3partitus$\frac{1}{1}$. *Petala* 5, quorum 2 inferiora. *Legumen* 1loculare, 1ſpermum.

odorata. 1. CUMARUNA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 740. *t.* 296.

D E C A N D R I A.

853. NISSOLIA. *Cal.* 5dentatus. *Legumen* articulatum 1ſpermum, deſinens in alam ligulatam.

arborea. 1. N. caule arboreo erecto. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 60.

fruticoſa. 2. N. caule fruticoſo volubili. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 167. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 5.

TARALEA. *Cal.* 5partitus $\frac{1}{1}$. *Cor.* 5petala: petalis 2 inferioribus. *Germen* pedicellatum. *Legumen* 1loculare, 2valve, 1ſpermum.

oppoſitifolia. 1. TARALEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 745. *t.* 298. *an diſtincti generis?*

MUTUCHI. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala : carina 2petala. *Germen* pedicellatum. *Legumen* alatum, non dehiſcens, 1loculare, 1ſpermum.

ſuberoſa. 1. MUTUCHI. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 748. *t.* 299.

DEGUELIA. *Cal.* 2labiatus $\frac{\cdot}{1}$. *Cor.* 5petala : petalis 2 inferioribus. *Legumen* globoſum, 1loculare, 1ſpermum.

ſcandens. 1. DEGUELIA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 750. *t.* 300.

ACUROA. *Cal.* 5dentatus. *Petala* 5, quorum 2 inferiora. *Legumen* ſubrotundum, coriaceum, non dehiſcens, 1loculare, 1ſpermum.

violacea. 1. ACUROA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 753. *t.* 301.

VATAIREA. *Cal.* - - - *Cor.* - - - *Legumen* ſubrotundum coriaceum, compreſſum, non dehiſcens, margine membranaceum, uno latere rugoſum, 1loculare, 1ſpermum.

guianenſis. 1 VATAIREA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 755. *t.* 302.

PARIVOA. *Cal.* 3-4partitus. *Petal.* 1. convolutum margine undulatum. *Germen* pedicellatum. *Stilus* longiſſimus. *Legumen* oblongum, lignoſum, 2valve, 1loculare, 1ſpermum.

grandiflora. 1. P. foliis trijugis glabris. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 757. *t.* 303.

tomentoſa. 2. P. foliis tomentoſis ternis quinisque. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 759. *t.* 304.

GALEDUPA. *Cal.* cyathiformis, oblique truncatus integer. *Petala* unguiculata. *Legumen* ellipticum, ſubfalcatum planum, acuminatum. *Sem.* 1-2-compreſſa, reniformia.

Pungam. 1. GALEDUPA. *Rumpf herb. amb.* 2. *t.* 13.

ANDIRA. *Cal.* urceolatus ſubinteger, aut 5dentatus. *Car.* 2petala. *Legumen* carnoſum, punctatum ovoideum hinc ſulcatum, 1ſpermum.

Piſonis. 1. ANDIRA. *Juſſieu gen. plant. p.* 363. *An congener Vouracapoa Aubl. pl. guj. t.* 373?

1286. ABRUS. *Cal.* obſolete 4lobus: lobo ſuperiori latiori. *Filamenta* 9, baſi infima connata, dorſo hiantia. *Stigma* capitatum. *Semina* ſubgloboſa.

precatorius. 1. ABRUS. *Sp. pl. p.* 1025. Glycina. Abrus *Rheede h. malab.* 8. *t.* 39. *Gaertn. de fr & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 5.

854. PTEROCARPUS. *Cal.* 5dentatus. *Capſ.* falcata, foliacea, varicoſa. *Sem.* aliquot ſolitaria.

Draco. 1. Pt. foliis pinnatis, caule arboreo inermi. *Jacq. ſtirp. amer. t.* 264 *f.* 91. *Plum. ic.* 246. *f.* 1. 2. *an idem cum Mutuchi?*

lunatus. 2. Pt. foliis pinnatis, ſpinis ſtipularibus, fructibus lunatis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 317.

ſantalinus. 3. Pt. foliis ternatis ſubrotundis retuſis glaberrimis, petalis crenatis undulatis. *Suppl. p.* 318.

Ecaſtaphyllum. 4. Pt. foliis ſimplicibus ovatis acuminatis ſubtus ſericeis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 493. Hedyſarum Ecaſtaphyllum. *Brown. jam. t.* 32. *f.* 1.

buxifolius. 5. Pt. foliis ſimplicibus aggregatis obovatis aveniis. *Plum. ic. t.* 246. *f.* 1. *nonne idem cum Amerimno Ebeno?*

hemipterus. 6. Pt. capſula hinc ſutura tumida notata, inde in alam membranaceam extenuata. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 156. *f.* 2.

anterus. 7. Pt. capſula ſubcochleata nuda. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 156. *f.* 2. *an hujus generis?*

AMERIMNON. *Cal.* 2labiatus. *Legumen* compreſſo-foliaceum, 2valve, dehiſcens. *Sem.* aliquot ſolitaria.

Brownei. 1. A. inerme, foliis petiolatis alternis ſubcordato-ovatis, racemis compoſitis axillaribus lateralibuſque. *Jacq. ſtirp. amer. t.* 180. *f.* 58.

Ebenus. 2. A. ſpinoſum, foliis ſubſeſſilibus aggregatis obovato-oblongis, pedunculis bifloris. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 476. Aſpalathus Ebenus. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 175. *f.* 1.

855. ERYTHRINA. *Cal.* integer. *Cor.* vexillum longiſſimum, lanceolatum.

herbacea. 1. E. foliis ternatis, caulibus ſimpliciſſimis fruticoſo-annuis. *Mant. p.* 438. *Trew. Ehret. t.* 58.

carnea. 2. E. foliis ternatis glabris, caule arboreo aculeato, calicibus campanulatis truncatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 8.

Corallodendrum. 3. E. foliis ternatis inermibus, caule arboreo aculeato, calicibus truncatis quinquedentatis. *Commel. hort. Amſt.* 1. *t.* 108. β) Erythrina orientalis. *Murray comm. Goett.* 1777. *t.* 1.

picta. 4. E. foliis ternatis aculeatis, caule arboreo aculeato. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 77. *Bruce trav. in Eg. Ar. Ab. and Nub.* 5. *app. p.* 65. *ic?*

Criſtagalli. 5. E. foliis ternatis: petiolis ſubaculeatis glanduloſis, caule arboreo inermi. *Mant. p.* 99. *Jacq. obſ. bot.* 3. *t.* 51.

planiſiliqua. 6. E. foliis ſimplicibus oblongis. *Plum. ic.* 102. *f.* 1.

856. PISCIDIA. *Stigma* acutum. *Legumen* 4fariam alatum.

Erythrina. 1. P. foliolis ovatis. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 176. *f.* 45.

carthagenenſis. 2. P. foliolis obovatis. *Pluckn. alm. t.* 214. *f.* 4. *an varietas Erythrinæ ?*

857. BORBONIA. *Cal.* acuminato-ſpinoſus. *Stigma* emarginatum. *Legumen* mucronatum.

ericifolia. 1. B. foliis ſublinearibus acutis villoſis, capitulis terminalibus.

lævigata. 2. B. foliis lanceolatis enerviis glabris, involucris calicibuſque hirtis. *Mant. p.* 100.

trinervia. 3. B. foliis lanceolatis trinerviis integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 297. *f.* 4.

lanceolata. 4. B. foliis lanceolatis multinerviis integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 297. *f.* 3.

cordata. 5. B. foliis cordatis multinerviis integerrimis. *Mant. p.* 488. *Seb. muſ.* 1. *t.* 24. *f.* 3.

crenata. 6. B. foliis cordatis multinerviis denticulatis. *Breyn. cent. t.* 28.

858. SPARTIUM. *Cal.* deorſum productus, 2labiatus. *Filamenta* germini adhærentia. *Stigma* longitudinale, ſupra villoſum.

* *foliis nullis.*

aphyllon. 1. Sp. ramis virgatis alternis: ſenioribus angulatis elevatopunctatis, floribus terminalibus alternis. *Suppl. p.* 320. *Pall. it.* 3. *p.* 742. *t.* V. *f.* 3. a. b.

** *foliis ſimplicibus.*

contaminatum. 2. Sp. ramis teretibus, foliis alternis filiformibus baſi contaminatis. *Mant. p.* 268.

ſepiarium. 3. Sp. ramis ſcabris, foliis ſuperioribus confertis filiformibus. *Pet. gaz. t.* 83. *f.* 3.

junceum. 4. Sp. ramis oppoſitis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis. *Regn. bot. t.* 220. *Legumen nodoſum.*

monoſpermum. 5. Sp. ramis ſtriatis, racemis lateralibus, foliis lanceolatis.

Sphærocarpon. 6. Sp. ramis teretibus, foliis lanceolatis ſeſſilibus ſubtus pubeſcentibus. *Mant.* p. 571. *Renealm. ſp. t.* 33.

purgans. 7. Sp. ramis teretibus ſtriatis, foliis lanceolatis ſubſeſſilibus, pubeſcentibus. *Sp. pl. p.* 999. Geniſta purgans. *Bulliard herb. Franc. t.* 115.

Scorpius. 8. Sp. ramis ſpinoſis patentibus, foliis ovatis.

ferox. 9. Sp. ramis ſpinoſis ſtriatis, foliis ſparſis ſeſſilibus, racemis folioſis lateralibus. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 206.

*** *foliis ternatis.*

angulatum. 10. Sp. foliis ſimplicibus ternatiſque, ramis ſexangularibus apice floriferis.

ſcoparium. 11. Sp. foliis ternatis ſimplicibuſque, ramis inermibus angulatis. *Flor. dan. t.* 313. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 153. *f.* 4.

ſupranubium. 12. Sp. floribus axillaribus pluribus pedunculatis, ramis virgatis ſulcatis incanis, leguminibus glabris. *Suppl. p.* 319.

complicatum. 13. Sp. foliolis conduplicatis, caulibus inermibus proſtratis glabris, leguminibus ſcabris. *Pluckn. alm. t.* 86. *f.* 1.

radiatum. 14. Sp. foliis linearibus ſubverticillatis: petiolis perſiſtentibus, ramis oppoſitis tetragonis apice umbelliferis. *Mill. h. angl. t.* 259. *f.* 1.

cytiſoides. 15. Sp. foliis linearibus integerrimis petiolatis, ramis teretibus, racemis terminalibus. *Suppl. p.* 320. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 107.

ſericeum. 16. Sp. inerme ſericeum, foliis linearibus, racemis terminalibus, ramis angulatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 12.

ſpinoſum. 17. Sp. ramis angulatis ſpinoſis.

villoſum. 18. Sp. ramis ſpinoſis, calicibus leguminibuſque villoſis. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 207.

horridum. 19. Sp. foliis complicatis ſericeis, ramulis teretibus ſpinoſis oppoſitis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 51.

859. GENISTA. *Cal.* 2labiatus $\frac{2}{3}$. *Vexillum* oblongum, a piſtillo ſtaminibuſque deorſum reflexum. *Legumen* æquale.

* *Inermes.*

† *foliis ternatis.*

canarienſis. 1. G. foliis utrinque pubeſcentibus, ramis angulatis. *β*) *Seb. muſ.* 2. *t.* 4. *f.* 6. 7.

candicans. 2. G. foliis ſubtus villoſis, pedunculis lateralibus ſubquinquefloris foliatis, leguminibus hirſutis alatis. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 6.

linifolia. 3. G. foliis ſeſſilibus linearibus ſubtus ſericeis.

pendulina. 4. G. foliis ternatis ſimplicibuſque obovatis, ramis virgatis ſtriatis patentibus, floribus lateralibus geminis ſubpendulis. *la Mark dict. bot. n.* 24.

† † *foliis ſimplicibus.*

ſagittalis. 5. G. ramis ancipitibus membranaceis articulatis, foliis ovato-lanceolatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 209. *an cum tota inermium tribu ſpartiis adſcribenda ?*

tridentata. 6. G. ramis triquetris membranaceis ſubarticulatis, foliis tricuſpidatis.

tinctoria. 7. G. ramis ſtriatis teretibus erectis, foliis lanceolatis glabris. *Flor. dan. t.* 526. *Legumen cylindricum.*

ſericea. 8. G. ramis ſtriatis teretibus erectis, foliis lanceolatis ſubtus ſericeo-villoſis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 167.

ſibirica. 9. G. ramis æqualibus teretibus erectis, foliis lanceolatis glabris. *Mant. p.* 571. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 190. *Legumen cylindricum.*

florida. 10. G. ramis ſtriatis teretibus, foliis lanceolatis ſericeis, racemis ſecundis.

piloſa. 11. G. caule tuberculato decumbente, foliis lanceolatis obtuſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 208.

humifuſa. 12. G. ramis proſtratis ſtriatis villoſis, foliis lanceolatis ciliatis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 69.

** *Spinoſæ.*

* * *Spinoſæ.*

anglica. 13. G. ſpinoſiſſima glabra, foliis lanceolatis, ſpinis ſimplicibus compoſitiſque. *Flor. dan. t.* 619.

germanica. 14. G. ſpinoſiſſima hirſuta, foliis ovato-lanceolatis, ſpinis compoſitis & decompoſitis. *Tabern. Kraeuterb. p.* 1102.

hiſpanica. 15. G. ſpinis decompoſitis, ramis floriferis inermibus, foliis linearibus piloſis.

hirſuta. 18. G. ſpinis ternatis decuſſatis, foliis ſimplicibus lanceolatis, ſpicis terminalibus hirſutis. *Valh ſymb. bot.* I. *p.* 51.

luſitanica. 16. G. caule aphyllo, ſpinis decuſſatis.

aſpalathoides. 17. G. foliis lineari-lanceolatis ſubſericeis, ramis ſtriatis tuberculatis apice ſpinoſis, floribus axillaribus. *la Mark dict. bot. n.* 15.

860. ASPALATHUS. *Cal.* 5fidus: lacinia ſuperiore majore. *Legumen* ovatum, muticum, ſubdiſpermum.

* *foliis faſciculatis.*

ſpinoſa. 1. A. foliis linearibus nudis ſpinam gemmaceam circumſtantibus. *Pluckn. phyt.* 297. *f.* 6. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 144. *f.* 4.

capitata. 2. A. foliis linearibus acutis, floribus capitatis, bracteis nudis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 23. *f.* 6.

glomerata. 3. A. foliis linearibus acutis villoſis incurvatis, floribus capitatis, calicis laciniis ovatis, corollis glabris. *Suppl. p.* 321.

ericifolia. 4. A. foliis linearibus inermibus hirſutis, floribus alternis, calicibus linearibus. *Pluckn. mant. t.* 413. *f.* 6.

uniflora. 5. A. foliis linearibus inermibus glabris: ſtipulis acutis perſiſtentibus, floribus ſolitariis: calicum laciniis cymbiformibus. *Pluckn. mant. t.* 414. *f.* 7.

nigra. 6. A. foliis linearibus obtuſiuſculis, floribus capitato-ſpicatis pubeſcentibus. *Mant. p.* 262.

galioides. 7. A. foliis linearibus lævibus, pedunculis bifloris elongatis apice folioſis. *Mant. p.* 260.

verrucoſa. 8. A. foliis filiformibus, gemmis verrucoſis tomentoſis nudis.

Hyſtrix. 9. A filiis filiformibus rigidis ſpinoſis ſericeis, floribus lateralibus ſeſſilibus ſolitariis : corollis villoſis. *Suppl. p.* 322.

geniſtoi-des. 10. A. foliis filiformibus lævibus, calicibus ſubracemoſis pendulis, coroliſque glabris. *Mant. p.* 261.

ciliaris. 11. A foliis filiformibus ſcabris, floribus terminalibus ſeſſilibus : vexillis pubeſcentibus. *Mant. p.* 262.

carnoſa. 12. A foliis teretiuſculis obtuſis, calicibus ſubpubeſcentibus acutis, corollis glabris. *Mant. p.* 261.

araneoſa. 13. A foliis ſetaceis inermibus hiſpidis, floribuscapitatis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 23. *f.* 6.

aſparagoi-des. 14. A foliis ſetaceis piloſiuſculis, calicibus foliiformibus longitudine corollæ ſolitariis. *Suppl. p.* 321.

canefcens. 15. A. foliis ſubulatis tomentoſo-ſericeis, floribus lateralibus: vexillis pubeſcentibus. *Mant. p.* 262.

pedunculata. 16. A. foliis ſubulatis glabris, pedunculis filiformibus duplo brevioribus. *Herit. ſert. angl. p.* 21. *t.* 26.

retroflexa. 17. A. foliis ſubulatis glabris minimis, ramis filiformibus patentiſſimis ; floribus ſolitariis terminalibus.

thymifo-lia. 18. A foliis ſubulatis inermibus glabris breviſſimis ; floribus alternis. *Pluckn. mant. t.* 413. *f.* 1.

albens. 19. A. foliis ſubulatis ſericeis apice patulis, faſciculis floreis ſparſis. *Mant. p.* 261.

chenopo-da. 20. A. foliis ſubulatis mucronatis hirtis, floribus capitatis hirſutiſſimis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 23. *f.* 4.

aſtroites. 21. A. foliis ſubulatis mucronatis glabris, caule villoſo, floribus ſparſis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 24. *f.* 6,

ſericea. 22. A. foliis lanceolatis ſericeis, pedunculis terminalibus bifloris, vexillo nudiuſculo. *Suppl. p.* 321.

hetero-phylla. 23. A. foliis ramorum faſciculatis ; ramulorum ternatis linearibus hirtis, ſpicis terminalibus : calice corollaque villoſis. *Suppl. p.* 321.

** *foliis quinis quinatisve.*

quinque-folia. 24. A. foliis quinis ſeſſilibus, pedunculis ſpicatis. *Pluckn. mant. t.* 273. *f.* 4.

pinnata. 25. A. foliis pinnato-quinatis obcordatis, pedunculis capitatis.

indica. 26. A. foliis quinatis ſeſſilibus, pedunculis unifloris. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 37.

*** *foliis trinis, ternis, ternatiſve.*

candicans. 27. A. foliis trinis faſciculatiſque filiformibus ſericeis, floribus ſublateralibus: vexillis nullis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 17.

cretica. 28. A. foliis trinis cuneiformibus glabris: lateralibus brevioribus, ſtipulis obſoletis, floribus congeſtis. *Zanon hiſt. t.* 39.

tridentata. 29. A. foliis trinis lanceolatis glabris: ſtipulis tridentatis mucronatis, floribus capitatis.

anthyphyloides. 30. A. foliis trinis lanceolatis æqualibus ſubpubeſcentibus: ſtipulis nullis, capitulis terminalibus.

calloſa. 31. A. foliis trinis ſubulatis æqualibus: ſtipulis ſubrotundis calloſis, floribus ſpicatis glabris. *Pluckn. mant. t.* 345. *f.* 4.

argentea. 32. A. foliis trinis linearibus ſericeis: ſtipulis ſimplicibus mucronatis, floribus ſparſis tomentoſis.

laxata. 33. A. foliis ternis linearibus villoſis, floribus faſciculatis quinis, calicibus lanatis, caulibus proſtratis teretibus. *Mant. p.* 263.

piloſa. 34. A. foliis ternis linearibus villoſis, capitulis terminalibus piloſiſſimis, corollis pubeſcentibus. *Mant. p.* 263.

mucronata. 35. A. foliis ternis lævibus, ramis acuminatis, floribus racemoſis. *Suppl. p.* 320.

orientalis. 36. A. foliis ternatis lanceolatis pubeſcentibus, floribus faſciculatis quinis, calicibus pubeſcentibus, caulibus erectis angulatis. *Mant. p.* 263.

881. ULEX. *Cal.* 2phyllus. *Legumen* vix calice longius.

europæus. 1. U. foliis villoſis acutis, ſpinis ſparſis. *Flora dan. t.* 608. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 7.

capenſis. 2. U. foliis ſolitariis obtuſis, ſpinis ſimplicibus terminalibus. *Petiv. gaz. t.* 83. *f.* 9.

861. AMORPHA. *Corollæ* vexillum ovatum, concavum. *Alæ* 0. *Carina* 0.

fruticoſa. 1. AMORPHA. *du Hamel. arbr.* 1. *t.* 46. *Gaertn de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 144. *f.* 5. *Mill. h. angl. t.* 27.

TETRAMNUS. *Corollæ* carina minima, calice recondita. *Stamina* alterna, 5 ſterilia. *Stigma* ſeſſile, capitatum.

volubilis. 1. T. foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 482. Dolichos uncinatus. *Plum. ic.* 221.

uncinatus. 2. T. foliis oblongis obtuſis ſubtus ſericeis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 105.

862. CROTALARIA. *Filamenta* connata cum fiſſura dorſali. *Legumen* turgidum, inflatum, pedicellatum, ſimplex.

* *foliis ſimplicibus.*

perforata. 1. Cr. foliis perfoliatis cordatis denticulatis. *Mant. p.* 439.

perfoliata. 2. Cr. foliis perfoliatis cordato-ovatis. *Dill. h. Elth. t.* 102. *f.* 122.

amplexicaulis. 3. Cr. foliis caulinis amplexicaulibus cordatis alternis: floralibus oppoſitis reniformibus coloratis, floribus ſolitariis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 24. *f.* 5.

ſagittalis. 4. Cr. foliis lanceolatis alternis ſtipulis decurrentibus, bifidis *Pluckn. alm. t.* 169. *f.* 6. *β*) *Pluckn. alm. t.* 277. *f.* 2.

juncea. 5. Cr. foliis lanceolatis petiolato-ſeſſilibus, caule ſtriato. *Mant. p.* 439. *Trew. Ehret. t.* 47.

ſeſſiliflora. 6. Cr. foliis lanceolatis ſubſeſſilibus, floribus ſeſſilibus lateralibus, caule æquali.

ſericea. 7. Cr. foliis lanceolatis acutis ſubtus ſericeis, florum racemis elongatis. *Koenig. apud Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 26.

oppoſita. 8. Cr. glabra exſtipulata, foliis oblongis ſeſſilibus, pedunculis axillaribus diphyllis. *Suppl. p.* 322. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 474. Spartium capenſe.

retuſa. 9. Cr. foliis oblongis cuneiformibus retuſis. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 25. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 148. *f.* 2.

biflora. 10. Cr. foliis obtuſis, caulibus proſtratis herbaceis, pedunculis bifloris. *Mant. p.* 516. 570. & *p.* 273. Aſtragalus biflorus. *Burm. ind. t.* 48. *f.* 2.

bifaria. 11. Cr. pubeſcens diffuſa ſtipulata, foliis bifariis: inferioribus orbiculatis, ſuperioribus oblongis, pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 322.

cærulea. 12. Cr. foliis ovatis baſi attenuatis ſeſſilibus ſubretuſis: ſtipulis ſulcatis amplexicaulibus, caule tetragono. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 98.

verrucoſa. 13. Cr. foliis ovatis: ſtipulis lanatis declinatis, ramis tetragonis. *Burm. zeyl. t.* 34.

triflora. 14. Cr. foliis ovatis ſeſſilibus glabris, ramis angulatis, pedunculis ternis lateralibus unifloris. *Mant. p.* 440.

imbricata. 15. Cr. foliis ovatis acutis villoſis ſeſſilibus, floribus ſubſeſſilibus. *Pluckn. mant. t.* 388. *f.* 3.

ſinenſis. 16. Cr. foliis ovatis ſubpetiolatis: ſtipulis minutiſſimis.

rotundifolia. 27. Cr. foliis rotundatis integris piloſis ſparſis, caule ſub decumbente. *Walt. flor. carol. p.* 181. *an cum ſagittali diſtincti generis?*

floribunda. 28. Cr. foliis cuneiformibus, ramis pubeſcentibus, leguminibus pedicellatis glabris rugoſis compreſſis carinatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 19.

axillaris. 29. Cr. foliis ovato-ellipticis ſubtus piloſis, ſtipulis ſubulatis minutis, pedunculis axillaribus geminis unifloris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 20.

pallida. 30. Cr. foliis lanceolatis glabris, racemis terminalibus ſpiciformibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 20.

linifolia. 17. Cr. hirſuta exſtipulata, foliis linearibus obtuſis petiolatis, caule angulato, racemo terminali. *Suppl. p.* 322. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 96. *f.* 1.

** *foliis compoſitis.*

† *ternatis.*

heterophylla. 18. Cr. foliis ternatis ellipticis emarginatis: inferioribus ſimplicibus. *Suppl. p.* 323.

capenſis. 19. Cr. foliis obtuſis: ſtipulis foliaceis, ramis incanis: *Suppl. p.* 323. *Jacq. h. Vind.* 4. *t.* 64.

latifolia. 20. Cr. foliis oblongis glabris, floribus lateralibus ſubracemoſis, leguminibus ſeſſilibus. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *t.* 176. *f.* 1. 2.

microphylla. 31. Cr. foliis oblongis pedunculis lateralibus bifloris, caule filiformi decumbente. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 52.

Digitized by Google

lunaris. 21. Cr. foliis ovatis acutis : ſtipulis ſemicordatis lunatis.

laburnifolia. 22. Cr. exſtipulata, foliis ovatis acuminatis, leguminibus pedicellatis. *Burm. zeyl. t.* 35.

incana. 23. Cr. foliis ellipticis, ſtipulis ſubulatis, leguminibus villoſo-pubeſcentibus. *Mant. p.* 440. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 82.

cordifolia. 24. Cr. foliis obcordatis mucronatis, floribus corymboſis, caule fruticoſo *Mant. p.* 266.

gujanenſis. 25. Cr. foliis oblongis, legumine quadrangulari. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 761. *t.* 305.

⊢ ⊢ *foliis quinatis.*

quinquefolia. 26. Cr. *Rheede h. malab.* 9. *t.* 28.

ZORNIA. *Cal.* campanulatus 2labiatus $\frac{1}{1}$. *Cor.* infera. *Vexillum* cordatum, revolutum. *Antheræ* alternæ oblongæ, alternæ globoſæ. *Legumen* articulatum, hiſpidum.

bracteata. 1. ZORNIA. *Walt. flor. carol. p.* 181.

863. ONONIS. *Cal.* 5partitus : laciniis linearibus. *Vexillum* ſtriatum. *Filamenta* connata abſque fiſſura. *Legumen* turgidum, ſeſſile, ſimplex, 1loculare.

* *floribus ſubſeſſilibus.*

antiquorum. 1. O. floribus ſolitariis foliolo majoribus, foliis inferioribus ternatis, ramis læviuſculis ſpinoſis.

ſpinoſa. 2. O. floribus racemoſis ſolitariis, foliis ternatis ſimplicibuſque, ramis ſpinoſis *Flor. dan. t.* 783. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 6.

arvenſis. 3. O. floribus racemoſis geminatis, foliis ternatis : ſuperioribus ſimplicibus, ramis inermibus ſubvilloſis. *Zorn. pl. offic. ic. t.* 132.

repens. 4. O. caulibus diffuſis, ramis erectis, foliis ſuperioribus ſimplicibus: ſtipulis ovatis. *Dill. h. Elth. t.* 25. *f.* 28.

minutiſſima. 5. O. floribus lateralibus, foliis ternatis glabris: ſtipulis enſiformibus, calicibus ſcarioſis corolla longioribus. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 240.

mitiſſima. 6. O floribus ſeſſilibus ſpicatis: bracteis ſtipularibus ovatis ventricoſis ſcarioſis imbricatis. *Dill. h. Elth. t.* 24. *f.* 27.

alopecuroides. 7. O. ſpicis folioſis, foliis ſimplicibus obtius: ſtipulis dilatatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 8. *n.* 75.

flava. 8. O. foliis ternatis ſubrotundis, ſtigmate lævi. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 130. *an diſtincta hujus tribus ſpecies ?*

variegata. 9. O ſtipulis bracteiſque dentatis, foliis ſimplicibus ſtriatis, floribus ſubpedunculatis. *Bocc. ſic. t.* 38. *f.* 3.

alba. 10. O. floribus racemoſis, foliis ſimplicibus. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 210.

** *floribus pedunculatis.*

† *pedunculo mutico.*

┬ *caule herbaceo.*

capenſis. 11. O. racemis pedunculatis longis, foliis ternatis ſuborbiculatis.

proſtrata. 12. O. pedunculis unifloris longiſſimis, foliis ternatis acutis: ſtipulis ſubulatis, caulibus proſtratis. *Mant. p.* 266. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 504. Lotus proſtratus.

reclinata. 13. O. pedunculis unifloris, foliis ternatis ſubrotundis crenatis, leguminibus cernuis.

cenifia. 14. O. pedunculis unifloris, foliis ternis cuneatis: ſtipulis ſerratis, caulibus proſtratis. *Mant. p.* 267. *Allion. flor. pedem. t.* 10. *f.* 3.

geminata. 36. O. pedunculis bifloris lateralibus, foliis ternatis obovatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 23.

┬ ┬ *caule fruteſcente.*

ſerrata. 15. O. floribus ſubſeſſilibus ſolitariis, foliis inferioribus ternatis ſerrato-dentatis cuneiformibus apice ſubtridentatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 130. *an diſtincta ſpecies hujus tribus et cohortis ?*

hircina. 16. O. floribus geminis breviſſime pedicellatis, foliis ſuperioribus ſimplicibus: ſtipulis ſerratis, caulibus villoſis viſcidis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 93.

umbellata. 17. O. pedunculis umbellatis, foliis ternatis emarginatis, caulibus proſtratis. *Mant. p.* 266.

argentea. 18. O. volubilis, pedunculis umbellatis, foliis ternatis: foliolis ſeſſilibus argenteo-tomentoſis. *Suppl. p.* 324.

involucrata. 19. O. hirſuta proſtrata, pedunculis involucratis: involucro tetraphyllo, foliis ternatis cuneiformibus. *Suppl. p.* 324.

filiformis. 20. O. pedunculis ſubtrifloris, foliis ternatis ſubſeſſilibus: foliolis ovatis mucronatis. *Mant. p.* 266.

cernua. 21. O. racemis ſtrictis, foliis cuneiformibus, leguminibus cernuis linearibus recurvatis. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 82. *β*) Cytiſus æthiopicus. *Sp. pl.* 2. *p.* 1042.

pubeſcens. 22. O. pedunculis breviſſimis, foliis ſuperioribus ſimplicibus: ſtipulis ovato-lanceolatis integerrimis. *Mant. p.* 267.

rotundifolia. 23. O. foliis ternatis ovatis dentatis, calicibus triphyllo-bracteatis, pedunculis ſubtrifloris. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *app. t.* 49.

fruticoſa. 24. O. foliis ſeſſilibus ternatis lanceolatis ferratis: ſtipulis vaginalibus, pedunculis ſubtrifloris. *du Hamel arbr.* 1. *t.* 58. *Mill. h. angl. t.* 36.

tridentata. 25. O. foliis ternatis carnoſis ſublinearibus tridentatis, pedunculis bifloris. *Magn. h. monſp. t.* 16.

criſpa. 26. O. foliis ternatis undulatis ſubrotundis dentatis viſcoſo-pubeſcentibus, pedunculis unifloris. *Magn. h. monſp. t.* 17.

microphylla. 27. O. ſpinoſa, foliis minutis ternatis integerrimis, leguminibus recurvis. *Suppl. p.* 324.

mauritanica. 28. O. foliis quinatis obovatis ſubtus ſericeis: ſtipulis filiformibus, pedunculis racemoſis. *Mant. p.* 267. 453. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 504. Lotus mauritanicus.

† † *pedunculo ariſtato.*
† *caule fruticoſo.*

hiſpanica. 29. O. foliis ternatis canaliculatis recurvatis ferratis, pedunculis ſubunifloris. *Suppl. p.* 324.

Nutrix. 30. O. foliis ternatis viſcoſis: ſtipulis integerrimis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 40. *Mill. h. angl. t.* 37.

pinguis. 31. O. foliis ternatis lanceolatis: ſtipulis integerrimis, pedunculis unifloris. *An mera nutricis varietas? β*) *Pluckn. alm. t.* 135. *f.* 5.

† † *caule herbaceo.*

Cherleri. 32. O. pedunculis unifloris, foliis ternatis ſtipulis ſerratis.

ornithopodioides. 33. O. pedunculis bifloris, leguminibus linearibus cernuis.

viſcoſa. 34. O pedunculis unifloris, foliis ſimplicibus: infimis ternatis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1239.

vaginalis. 35. O. pedunculis unifloris ariſtatis, foliis ſeſſilibus ternatis ſtipuliſque vaginantibus dentatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 53.

864. ANTHYLLIS. *Cal.* ventricoſus. *Legumen* ſubrotundum, tectum.

* *Herbaceæ.*

tetraphylla. 1. A. foliis quaterno-pinnatis, floribus lateralibus. *Mill. h. angl. t.* 41. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 3.

Gerardi. 2. A. foliis pinnatis inæqualibus, pedunculis lateralibus folio longioribus, capitulis aphyllis. *Mant. p.* 100. *Gerard. flor. prov. t.* 18.

Cornicina. 3. A. foliis pinnatis inæqualibus, capitulis ſolitariis.

Vulneraria. 4. A. foliis pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. *Riv. tetrap. t.* 18. *β.*) *Dill. h. Elth. t.* 320. *f.* 413.

montana. 5. A. foliis pinnatis æqualibus, capitulo terminali ſecundo, floribus obliquatis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 334.

quinqueflora. 6. A. foliis ternatis linearibus, capitulo quinquefloro. *Suppl. p.* 325.

lotoides. 7. A. foliis tripartitis, calicibus priſmaticis faſciculatis leguminum longitudine.

involucrata. 8. A. ſubherbacea, foliis ternatis petiolatis ſtipulatis enſiformibus, floribus capitatis. *Mant. p.* 265.

* * *Fruticoſæ.*

viſciflora. 9. A. foliis digitato-pinnatis, calicibus hirſutis. *Suppl. p.* 325.

Barba jovis. 10. A. foliis pinnatis æqualibus tomentoſis, floribus capitatis. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 3. *Mill. h. angl. t.* 41. *f.* 2. *Pericarpium* 1*loculare.*

heterophylla. 11. A. foliis pinnatis: floralibus ternatis.

linifolia. 12. A. foliis ternatis feſſilibus enſiformibus, floribus capitatis. *Mant. p.* 265.

cytiſoides. 13. A. foliis ternatis inæqualibus, calicibus lanatis lateralibus. *Barr. pl. rar. ic.* 1182.

Hermanniæ. 14. A. foliis ternatis ſubpedunculatis, calicibus nudis. *Alp. exot. t.* 26.

Erinacea. 15. A. ſpinoſa, foliis ſimplicibus. *Cluſ. hiſp. t.* 214.

876. ARACHIS. *Cal.* 2labiatus. *Cor.* reſupinnata. *Filamenta* connexa. *Legumen* gibbum toruloſum venoſum, coriaceum.

hypogæa. 1. A. caule procumbente. *Ehret. pict. t.* 3. *f.* 3. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 8. *t.* 144. *f.* 2.

aprica. 2. A. caule erecto, foliis ternatis. *Walt. flor. carol. p.* 182.

895. EBENUS. *Cal.* dentes longitudine corollæ. *Cor.* alis ſubnullis. *Sem.* 1hirtum.

cretica. 1. Ebenus. *Mant. p.* 451. *Pluckn. alm. t.* 67. *f.* 5.

865. LUPINUS. *Cal.* 2fidus. *Antheræ* 5 oblongæ, 5 ſubrotundæ. *Legumen* coriaceum, inflatum, nodoſum.

perennis. 1. L. calicibus alternis inappendiculatis: labio ſuperiori emarginato; inferiori integro. *Mill. h. angl.* 170. *f.* 1.

albus. 2. L. calicibus alternis inappendiculatis: labio ſuperiori integro; inferiori tridentato. *Blackw. herb. t.* 282. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 4.

hirſutus. 3. L. calicibus alternis appendiculatis: labio ſuperiori bipartito; inferiori tridentato.

anguſtifolius. 4. L. calicibus alternis appendiculatis: labio ſuperiori bipartito; inferiori integro. *Knorr del. hort.* 2. *t.* L. 7. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 4.

Termis. 5. L. calicibus alternis appendiculatis: labio utroque integro acuto. *Forsk flor. æg. arab. p.* 131.

integrifolius. 6. L. calicibus alternis appendiculatis, foliis ſimplicibus oblongis villoſis.

varius. 7. L. calicibus ſemiverticillatis appendiculatis: labio ſuperioribifido; inferiori ſubtridentato. *Kniph. bot. orig. cent.* 7. *n.* 47. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 4.

piloſus. 8. L. calicibus verticillatis appendiculatis: labio ſuperiori bipartito; inferiori integro.

luteus. 9. L. calicibus verticillatis appendiculatis: labio ſuperiori bipartito; inferiori tridentato. *Kniph. bot. orig. cent.* 4. *n.* 47. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 4.

866. PHASEOLUS. *Carina* cum *ſtaminibus ſtylo*que ſpiraliter torta. *Legumen* (plurimis) nodoſum.

* *caule volubili.*

vulgaris. 1. Ph. floribus racemoſis geminis, leguminibus pendulis. *Loh. ic.* 59. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 3.

perennis. 21. Ph. floribus racemoſis geminis, bracteis minimis, leguminibus pendulis, radice perenni. *Walt. flor. carol. p.* 182.

alatus. 2. Ph. floribus laxe ſpicatis, alis longitudine vexilli. *Dill. h. Elth. t.* 235. *f.* 303.

helvolus. 3. Ph. floribus capitatis: calicibus bracteatis, alis expanſis maximis, foliolis deltoidibus oblongis. *Dill. h. Elth. t.* 233. *f.* 300.

vexillatus. 4. Ph. pedunculis petiolo craſſioribus capitatis, alis ſubfalcatis difformibus, leguminibus linearibus ſtrictis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 102.

farinoſus. 5. Ph. pedunculis ſubcapitatis, ſeminibus tetragono-cylindricis pulverulentis. *Niſſol. act. Pariſ.* 1730. *t.* 42. *Legumen* loculamentoſum, latum, ſimplex.

bipunctatus. 6. Ph. leguminibus acinaciformibus pubeſcentibus, ſeminibus ad hilum bipunctatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 100.

lunatus. 7. Ph. leguminibus acinaciformibus lævibus ſublunatis.

Pallas. 8. Ph. leguminibus cylindricis toruloſis pendulis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 108.

inamœnus. 9. Ph. florum vexillo revoluto calicibus concolore. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 66.

Caracalla. 10. Ph. vexillo carinaque ſpiraliter convolutis. *Trew rar.* 14. *t.* 10.

aconitifolius. 11. Ph. foliis ſubquinquepartitis. *Suppl. p.* 325. *Jacq. obſ. bot.* 3. *t.* 52. *an diſtinctus a glycine triloba ?*

Aſellus. 12. Ph. foliis ſagitatis, ſeminibus globoſis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 108.

* * *caule ſemivolubili.*

ſemierectus. 13. Ph. floribus ſpicatis: calicibus ebracteatis, alis expanſis majoribus, foliolis ovatis. *Mant. p.* 100. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 15.

hirtus. 14. Ph. leguminibus teretibus, carina ſiniſtrorſum cornuta. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 38.

* * * *caule erecto.*

Mungo. 15. Ph. caule flexuoſo tereti hirſuto, leguminibus capitatis hirtis. *Mant. p.* 101.

Max. 16. Ph. caule recto angulaſo hiſpido, leguminibus anguſtis pendulis hirtis. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 140.

nanus. 17. Ph. caule lævi, leguminibus pendulis compreſſis rugoſis.

radiatus. 18. Ph. caule tereti, floribus capitatis, leguminibus cylindricis horizontalibus. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 139. *f.* 2. *Legumen per ſepimenta loculamentoſum.*

ſphæroſpermus. 19. Ph. ſeminibus globoſis hilo tinctis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 117. *f.* 1. 3.

lathyroides. 20. Ph. foliolis oblongis acuminatis, pedunculis elongatis, leguminibus tereti ſubulatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 116. *f.* 1.

867. DOLICHOS. *Vexilli* baſis callis 2 parallelis, oblongis, alas ſubtus comprimentibus. *Legumen* (plurimis) anguſtum, per ſepimenta loculamentoſum.

† *caule volubili.*

benghalenſis. 1. D. fruteſcens, leguminibus longe mucronatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 124.

Fabaniigrita. 2. D. fruteſcens, leguminibus pendulis linearibus compreſſis mucronatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 132.

lignoſus. 3. D. caule perenni, peduuculis capitatis, leguminibus ſtrictis linearibus. *Hort. Cliff. t.* 20.

polyſtachyos. 4. D. caule perenni, ſpicis longiſſimis: pedicellis geminis, leguminibus acuminatis compreſſis.

ariſtatus. 5. D. pedunculis biſloris axillaribus, leguminibus linearibus compreſſis: ariſta terminali recta.

acinaciformis. 6. D. glaber, leguminibus craſſis compreſſis mucrone inflexo terminatis: ſeminibus membrana alba involutis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 114. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 44.

Lablab. 7. D. leguminibus ovato-acinaciformibus: ſeminibus ovatis hilo arcuato varſus alteram extremitatem. *Alp. æg. t.* 75. *Banks. ic. Kæmpf. t.* 25? *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 150. *f.* 2. *Legumen huic et bengalenſi latum alatum.*

ſinenſis. 8. D. leguminibus pendulis cylindricis torulofis, pedunculis erectis multiſloris. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 134.

luteolus. 9. D. leguminibus capitatis pluribus cylindricis: ſeminibus rotundatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 90.

tranquebaricus. 10. D. leguminibus capitatis paucis cylindricis: apice mucronato recto. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 70.

unguiculatus. 11. D. leguminibus capitatis ſubcylindricis: apice recurvo concavo. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 23.

ſesquipedalis. 12. D. leguminibus ſubcylindricis lævibus longiſſimis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 67.

luteus. 13. D. floribus ſuſpicatis, leguminibus ſubcylindricis glabris, foliolis ſubrotundo-rhombeis obtuſis integris glabris. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 105.

capenſis. 14. D. pedunculis ſubbiſloris, leguminibus ellipticis compreſſis, foliis glabris.

incurvus. 15. D. leguminibus ſolitariis incurvis tricarinatis. *Thunb. flor. jap. p.* 280.

tetragonolobus. 16. D. leguminibus membranaceo-quadrangulis. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 133.

gladiatus. 17. D. leguminibus oblongis cum mucrone obtuſis glabris ad ſuturam quadrimarginatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 276. *Banks ic. Kæmpf. t.* 39.

enſiformis. 18. D. leguminibus gladiatis dorſo tricarinatis: ſeminibus arillatis. *Reed. h. malab.* 8. *t.* 44.

repens. 36. D. caule repente, foliis pubeſcentibus ovatis, floribus racemoſis geminis, leguminibus linearibus teretibus.

Lubia. 37. D. caule diffuſo, pedunculis axillaribus longiſſimis apice racemoſis, leguminibus erectis polyſpermis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 133.

† † † *caule erecto.*

pugioniformis. 38. D. caule ſuberecto, leguminibus acinaciformibus tricarinatis: ſeminibus arillatis.

Soja. 39. D. caule flexuoſo, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis hiſpidis ſubdiſpermis. *Kaempf amœn. exot. p.* 838. *ic.*

Catianus. 40. D. leguminibus geminis linearibus erectiuſculis. *Rheed h. malab.* 3. *t.* 41.

biflorus. 41. D. caule perenni lævi, pedunculis bifloris, leguminibus erectis. *Pluckn. alm. t.* 213. *f.* 4.

868. GLYCINE. *Cal.* 2labiatus. *Corollæ* carina apice vexillum reflectens.

* *foliis ſimplicibus.*

monophylla. 1. Gl. foliis cordatis, caule pubeſcente triquetro. *Mant. p.* 101. *Pluckn. amalth. t.* 454. *f.* 8.

** *foliis ternatis.*

ſubterranea. 2. Gl. foliis radicalibus, caulibus procumbentibus flexuoſis, pedunculis bifloris. *Linn. dec.* 37. *t.* 17.

monoica. 3. Gl. foliis nudiuſculis, caulibus piloſis, racemis pendulis, floribus fructiferis apetalis.

debilis. 21. Gl. foliolis ovalibus ſubtus piloſis, leguminibus ſubſolitariis linearibus polyſpermis: ſtilo perſiſtente erecto. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 34.

reticulata. 4. Gl. foliolis oblongo-lanceolatis pubeſcentibus ſubtus reticulato-venoſis, racemis axillaribus ſubſeſſilibus, leguminibus oblongis compreſſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 105.

villoſa. 5. Gl. foliolis trilobis villoſos, racemis axillaribus. *Thunb. flor. jap. p.* 283.

phaſeoloides. 6. Gl. foliis ſubtus villoſis, racemis terminalibus. *Swarts. nov. pl. gen. & ſp. p.* 105.

tomentoſa. 7. Gl. foliis tomentoſis, racemis breviſſimis axillaribus, leguminibus diſpermis. *Dill. h. Elth. t.* 26. *f.* 29. *β?)* Dolichos pubeſcens. *Syſt. nat.* XII. *p.* 3. 483. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 101.

comoſa. 8. Gl. foliis hirſutis, racemis lateralibus.

ſtriata. 9. Gl. volubilis, foliolis oblongis molliſſime incanis, racemis axillaribus foliorum longitudine; leguminibus hirſutiſſimis. *Suppl. p.* 326. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 76.

labialis. 10. Gl. volubilis, foliolis obovatis ſubincanis, floribus axillaribus congeſtis, corolla ſubbilabiata. *Suppl. p.* 325.

ſuaveolens. 11. Gl. fruticoſa erecta incana, foliolis ovatis acutis, floribus axillaribus ſolitariis, leguminibus diſpermis. *Suppl. p.* 326.

lucida. 12. Gl. volubilis, foliolis ovatis acuminatis integerrimis, racemis axillaribus glandulofis: pedicellis ternis, leguminibus inflatis diſpermis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 51.

roſea. 13. Gl. volubilis, foliolis cordato-ovatis acutis integerrimis, pedunculis trifloris, leguminibus compreſſis carinatis monoſpermis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 50.

caribea. 14. Gl. foliolis rhombeis acutis, caulibus lignoſis glabris, racemis axillaribus elongatis multifloris patentibus. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 66.

numularia. 15. Gl. foliolis obtuſiſſimis, racemis floribus geminis, leguminibus ſeſſilibus ſuborbiculatis compreſſis. *Mant. p.* 571.

triloba. 16. Gl. foliolis lobatis, caule proſtrato, pedunculis bifloris. *Mant. p.* 516. *Burm. ind. t.* 50. *f.* 1.

javanica. 17. Gl. caule villoſo, petiolis hirſutis, bracteis lanceolatis minutis.

bituminoſa. 18. Gl. floribus racemoſis, leguminibus tumidis villoſis. *Herm. par. Lugdb. p.* 493. *ic. Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 5.

*** *foliis impari-pinnatis.*

Apios. 19. Gl. foliolis ſeptenis ovato-lanceolatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 9. *f.* 1.

frutescens. 20. Gl. caule perenni. *Hort. angl. t.* 15. *an diſtincti generis?*

CYLISTA. *Cor.* calice longior, perſiſtens. *Vexillum* baſi utrinque lobulo auctum. *Carina* apice baſique fiſſa. *Alæ* utroque breviores.

villoſa. 1. CYLISTA. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 36. 512.

869. CLITORIA. *Cor.* ſupinata, vexillo maximo patente alas obumbrante.

* *foliis pinnatis.*

ternatea. 1. Cl. foliis glabris. *Rheed. h. malab.* 8. 38. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 149. *f.* 3.

multiflora. 2. Cl. foliis oblongis ſubtus ſericeis, racemis axillaribus multifloris. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 106.

** *foliis ternatis.*

braſiliana. 3. Cl. calicibus ſolitariis campanulatis. *Breyn cent. t.* 32.

virginiana. 4. Cl. calicibus ſubternis campanulatis. *Dill. h. Elth. t.* 76. *f.* 87.

micrantha. 5. Cl. ſuffruticoſa volubilis, foliolis lanceolatis, pedunculis bifloris, flore altero ſterili. *Scop del. inſ.* 2. *p.* 1. *t.* 1.

mariana. 6. Cl. calicibus cylindricis.

Galactia. 7. Cl. fruticoſa volubilis, ſpicis aſcendentibus, floribus pendulis. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 6. *t.* 3.

aquilupienſis. 8. Cl. fruticoſa volubilis, foliolis ſubcordato-oblongis ſubperennantibus, ſpicis lateralibus folio longioribus patulis. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 4. *t.* 2.

870. PISUM. *Calicis* laciniæ 2 ſuperiores breviores. *Stilus* 3angulus, ſupra carinatus, pubeſcens. *Legumen* inflatum.

ſativum. 1. P. petiolis teretibus, ſtipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. *Blackw. herb. t.* 83. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 152. *f.* 2.

arvenſe. 2. P. petiolis tetraphyllis, ſtipulis crenatis, pedunculis unifloris. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 1. *f.* 4.

maritimum. 3. P. petiolis ſupra planiuſculis, caule angulato, ſtipulis ſagittatis, pedunculis multifloris. *Flor. dan. t.* 338.

Ochrus. 4. P. petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, pedunculis unifloris. *Kniph. bot. orig. cent.* 10. *n.* 71. *Legumen alatum.*

871. OROBUS. *Cal.* baſi obtuſus: dentibus ſuperioribus profundioribus, brevioribus. *Stilus* filiformis.

lathyroides. 1. O. foliis conjugatis ſubſeſſilibus, ſtipulis dentatis. *Amm. ruth. t.* 7. *f.* 2.

hirſutus. 2. O. foliis conjugatis petiolatis, ſtipulis integris. *Buxb. cent.* 3. *t.* 41.

anguſtifolius. 3. O. foliis bijugis enſiformibus ſubſeſſilibus, ſtipulis ſubulatis, caule ſimplici. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 14. *f.* 5.

albus. 4. O foliis bijugis enſiformibus petiolatis, ſtipulis ſimplicibus, caule ſimplici. *Suppl. p.* 327. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 39.

caneſcens. 5. O. foliis bijugis linearibus, ſtipulis ſemiſagittatis ſubulatis, caule ramoſo. *Suppl. p.* 327.

pyrenaicus. 6. O. foliis bijugis lanceolatis nervoſis, ſtipulis ſubſpinoſis, caule ramoſo. *Pluckn. phyt.* 210. *f.* 2.

tenuifolius. 7. O. foliis ſubtrijugis linearibus, ſtipulis ſemiſagittatis, caule inferne ramoſo quadrangulo, ſuperne alato. *Roth. Beytr.* 1. *p.* 78.

verſicolor. 8. O. foliis quadrijugis, ſtipulis ſemiſagittatis lanceolatis, pedunculis axillaribus angulatis. *Voy. ſuppl. pl. Ehr. ſel. t.* CVII. *f.* 2.

niger. 9. O. foliis ſexjugis ovato-oblongis, caule ramoſo. *Riv. tetrap. t.* 60. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 3.

ſilvaticus. 10. O. foliis ſubſeptemjugis, caule ramoſo hirſuto decumbente. *Mant. p.* 67. *Act. pariſ.* 1706. *t.* 90.

luteus. 11. O. foliis pinnatis ovato-oblongis, ſtipulis rotundato-lunatis dentatis. *Mant. p.* 442. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 4.

vernus. 12. O foliis pinnatis ovatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici. *Blackw. herb. t.* 208. *f.* 1. 2.

tuberoſus. 13. O. foliis pinnatis lanceolatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici. *Flor. dan. t.* 781.

871. LATHYRUS. *Cal.* laciniæ 2 ſuperiores breviores. *Stilus* planus ſupra villoſus, ſuperne latior. *Legumen* (plurimis) æquale latum.

* *pedunculis unifloris.*

Aphaca. 1. L. cirrhis aphyllis, ſtipulis ſagittato-coronatis. *Mill. h. angl. t.* 43.

Niſſolia. 2. L. foliis ſimplicibus, ſtipulis ſubulatis. *Buxb. cent.* 3. *t.* 45. *f.* 1.

ſativus. 3. L. cirrhis diphyllis tetraphyllisque, leguminibus ovatis compreſſis dorſo bimarginatis. *Rivin. tetrap. t.* 47. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 152. *f.* 1. *Legumen æquale alatum.*

Cicera. 4. L. cirrhis diphyllis, leguminibus ovatis compreſſis dorſo canaliculatis.

ſetifolius. 5. L. cirrhis diphyllis, foliolis ſetaceo-linearibus.

amphicarpos. 6. L. pedunculis calice longioribus, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 23. *f.* 1.

inconſpicuus. 7. L. pedunculis calice brevioribus, cirrhis diphyllis ſimplicibus, foliolis lanceolatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 86.

ſphæricus. 8. L. pedunculis ariſtatis, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis, foliolis enſiformibus. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 39. *n.* 79.

angulatus. 9. L. pedunculis ariſtatis, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis, foliolis linearibus. *Buxb. cent.* 3. *t.* 42. *f.* 2.

tomentoſus 10. L. pedunculis ternis, paniculis axillaribus terminalibusque, cirrhis nullis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 135.

articulatus. 11. L. pedunculis ſubunifloris, cirrhis poliphyllis, foliolis alternis. *Mill. h. angl. t.* 96. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 152. *f.* 1.

** *pedunculis bifloris.*

odoratus. 12. L. cirrhis diphyllis, foliolis ovato-oblongis, leguminibus hirſutis. *Curtis botan. magaz. t.* 60.

annuus. 13. L. cirrhis diphyllis, foliolis enſiformibus, ſtipulis bipartitis, leguminibus glabris. *Riv. tetr.* [illegible] *t.* 158.

tingitanus. 14. L. cirrhis diphyllis, foliolis alternis lanceolatis glabris, ſtipulis lunatis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 46. *Legumen huic & articulato nodoſum.*

Clymenum. 15. L. cirrhis polyphyllis, ſtipulis dentatis. *Pluckn. phyt.* 114. *f.* 6.

*** *pedunculis multifloris.*

hirſutus. 16. L. pedunculis ſubtrifloris, cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, leguminibus hirſutis, ſeminibus ſcabris. *Rivin. tetrap. t.* 41.

tuberoſus. 17. L. cirrhis diphyllis, foliolis ovalibus, internodiis nudis. *Riv. tetrap. t.* 42.

pratenſis. 18. L. cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis, foliolis lanceolatis. *Flor. dan. t.* 527.

ſilveſtris. 19. L. cirrhis diphyllis, foliolis enſiformibus, internodiis membranaceis. *Flor. dan. t.* 325.

latifolius. 20. L. cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *Mill. ill. ic. Rivin. tetrap. t.* 40.

heterophyllus. 21. L. cirrhis diphyllis tetraphyllisque, foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. *β*) Lathyrus. *Hacq. it. carp. ſept.* 1. *p.* 32.

paluſtris. 22. L. cirrhis polyphyllis, ſtipulis lanceolatis. *Flor. dan. t.* 399.

piſiformis. 23. L. cirrhis polyphyllis, ſtipulis ovatis foliolo latioribus. *Linn. dec.* 39. *t.* 20.

873. VICIA. *Stigma* latere inferiore tranſverſe barbatum. *Legumen* (multis) nodoſum.

* *pedunculis elongatis.*
† *multifloris.*

piſiformis. 1. V. petiolis polyphyllis, foliolis ovatis, infimis ſeſſilibus. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 364. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 1.

caroliniana. 30. V. petiolis polyphyllis, foliolis lanceolatis mucronatis, ſtipulis ovato-lanceolatis. *Walt. flor. carol. p.* 182.

bohemica. 2. V. foliolis ellipticis, ſtipulis integris, floribus racemoſis. *Mayer boehm. Abh.* 3. 1787. *p.* 316. *t.* 11. a. b.

dumetorum. 3. V. foliolis reflexis ovatis mucronatis, ſtipulis ſubdentatis. *Rivin. tetrap. t.* 50.

ſilvatica. 4. V. foliolis ovalibus, ſtipulis denticulatis. *Flor. dan. t.* 277.

Cracca. 5. V. foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris, floribus imbricatis. *Flor. dan. t.* 804.

caneſcens. 6. V. foliis ſuperioribus ſubcirrhoſis, foliolis ovali-oblongis lanuginoſis, ſtipulis ſemiſagittatis integris. *la Billardiere ic. pl. ſyr. rar. dec.* 1. *p.* 17. *t.* 7.

tenuifolia. 7. V. foliolis linearibus trinerviis acuminatis, ſtipulis linearibus integris, floribus imbricatis, caule erecto. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 309.

onobrychoides. 8. V. foliolis linearibus ſtipulis inferne denticulatis, floribus diſtantibus.

Gerardi. 9. V. foliolis oblongis ſubpubeſcentibus, ſtipulis integris, caule erecto. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 229.

niſſoliana. 10. V. foliolis oblongis, ſtipulis integris, leguminibus villoſis ovato-oblongis.

benghalenſis. 11. V. foliolis integerrimis, ſtipulis integris, leguminibus erectiuſculis. *Herm. par. lugdb. p.* 625. *ic.*

multiflora. 12. V. cirrhis polyphyllis, foliolis ovalibus pubeſcentibus, ſtipulis ſemiſagittatis integris, caule piloſo. *Leyſſ. flor. hal. p.* 725.

biennis. 13. V. petiolis ſulcatis ſubdodecaphyllis, foliolis lanceolatis glabris. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 11. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 1.

++ *pedunculis ſubſexfloris.*

caſſubica. 14. V. foliolis denis ovatis acutis, ſtipulis integris. *Flor. dan. t.* 98.

+++ *pedunculus uniflorus.*

monantha. 15. V. pedunculis ariſtatis, foliolis lanceolatis obtuſis, ſtipulis bifidis. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 39.

exſtipulata. 16. V. petiolis polyphyllis, foliolis ſeſſilibus cordato-reniformibus. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 307. *t.* 33. *f.* 2.

ſepium. 17. V. leguminibus ſubquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis, exterioribus decreſcentibus. *Flor. dan. t.* 699.

bithynica. 18. V. leguminibus ſolitariis erectis, foliolis quaternis ovali-lanceolatis, ſtipulis dentatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 147. *Huic & narbonenſi legumen loculamentoſum latum.*

Clymenum. 19. V. leguminibus ſubbinatis, foliolis retuſis, ſtipulis notatis. *S. G. Gmel. it.* 3. *p.* 307. *t.* 33. *f.* 1. *an diſtincta ſatis a ſativa.*

** *floribus axillaribus ſubſeſſilibus.*

ſativa. 20. V. leguminibus ſubbinatis erectis, foliolis omnibus oblanceolatis retuſis emarginatis, ſtipulis dentatis, feminibus compreſſis. *Flor. dan. t.* 522. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 1.

anguſtifolia. 21. V. leguminibus ſubbinatis patentibus, foliis imis ovatis retuſis emarginatis, ſuperioribus linearibus apice integerrimis, ſtipulis dentatis, ſeminibus globoſis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 310.

narbonenſis. 22. V. leguminibus ſubternis erectis, foliolis ſenis ſubovatis, ſtipulis denticulatis. *Knorr. del. hort.* 2. *t.* L. 1.

lathyroides. 23. V. leguminibus ſolitariis erectis glabris, foliolis ſubſenis, inferioribus obcordatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis. *Flor. dan. t.* 58.

globoſa. 24. V. leguminibus ſolitariis, foliolis ovatis, ſtipulis notatis quadrodentatis. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 39. *an diſtincta ſatis ab anguſtifolia ?*

lutea. 25. V. leguminibus reflexis piloſis ſolitariis pentaſpermis, corollæ vexillis glabris. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 21. *f.* 5.

hybrida. 26. V. leguminibus reflexis piloſis pentaſpermis, corollæ vexillis villoſis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 34. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 1.

peregrina. 27. V. leguminibus pendulis glabris tetraſpermis, foliolis linearibus emarginatis. *Pluckn. alm. t.* 233. *f.* 6.

Faba. 28. V. caule erecto, foliolis integerrimis, cirrhis nullis. *Blackw. herb. t.* 19.

ſerratifolia. 29. V. caule erecto, foliolis ſerratis, cirrhis nullis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *app. t.* 8.

874. ERVUM. *Cal.* 5partitus, longitudine corollæ.

monanthos. 1. E. pedunculis unifloris, corolla calicem ſuperante.

erectum. 2. E. pedunculis bifloris, caule erecto ſubdichotomo. *Walt. flor. carol. p.* 187.

ſolonienſe. 3. E. pedunculis ſubbifloris ariſtatis, petiolis acuminatis, foliolis obtuſis.

Lens. 4. E. pedunculis ſubbifloris, ſeminibus compreſſis convexis. *Flor. dan. t.* 95. *Legumen æquale latum.*

tetraſpermum. 5. E. pedunculis ſubbifloris, ſeminibus globoſis quaternis. *Curt. flor. Lond. t.* 41.

volubile. 6. E. pedunculis multifloris, floribus geminatis, caule volubili. *Walt. flor. carol. p.* 187.

hirſutum. 7. E. pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis binis. *Flor. dan. t.* 639.

Ervilia. 8. E. germinibus undato-plicatis, foliis impari-pinnatis. *Blackw. herb. t.* 208. *f.* 3. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 4.

875. CICER. *Cal.* 5partitus, longitudine corollæ, laciniis 4 ſuperioribus vexillo incumbentibus. *Legumen* rhombeum, turgidum, 2ſpermum.

arietinum. 1. CICER. *S. G. Gmelin it.* 3. *t.* 3. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 151. *f.* 2.

1319. LIPARIA. *Cal.* 5partitus, licinia infima elongata. *Cor.* alæ inferius 2lobæ. *Staminis* majoris dentes 3 breviores. *Legumen* ovatum.

ſphærica. 1. L. floribus capitatis, foliis lanceolatis nervoſis glabris. *Mant. p.* 268.

graminifolia. 2. L. floribus capitatis, calicibus villoſis, foliis linearibus acutis alternis ſeſſilibus. *Mant. p.* 268.

umbellata. 3. L. floribus umbellatis, foliis lanceolatis lævibus. *Nonne eadem cum Borbonia lævigata.*

villoſa. 4. L. floribus faſciculatis, foliis ovatis villoſo-tomentoſis. *Mant. p.* 438. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 474. Borbonia tomentoſa. *Seb. muſ.* 1. *t.* 24. *f.* 1. 2.

ſericea. 5. L. floribus ſubſpicatis, foliis ovatis villoſis tomentoſis.

876. CYTISUS. *Cal.* 2labiatus $\frac{2}{3}$. *Legumen* baſi attenuatum (plurimis) æquale, latum.

* *foliis compoſitis.*

glaber. 1. C. floribus ſolitariis lateralibus ſubſeſſilibus pendulis, foliis ternatis. *Suppl. p.* 328.

hirſutus. 2. C. pedunculis ſimplicibus lateralibus, calicibus hirſutis trifidis obtuſis ventricoſo-oblongis. *Jacq. obſ. bot. t.* 96.

purpureus. 3. C. floribus pedunculatis ſolitariis, foliis glabris, caulibus decumbentibus fruteſcentibus, leguminibus ſuperne falcatis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 48.

ſupinus. 4. C. floribus ſubbinatis pedunculatis, foliis villoſis, caulibus decumbentibus fruteſcentibus. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 20. β) Cytiſus glabreſcens. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 269.

argenteus. 5. C. floribus ſubbinatis ſubſeſſilibus, foliis tomentoſis, ſtipulis minutis, caulibus decumbentibus. *Lob. ic.* 2. *p.* 41.

auſtriacus. 6. C. floribus umbellatis terminalibus, caulibus erectis, foliolis lanceolatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 21.

capitatus. 7. C. floribus umbellatis terminalibus, ramis erectis, foliolis ovatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 33.

prolifer. 8. C. umbellis axillaribus ſeſſilibus proliferis, foliis ternatis petiolatis ſericeis, foliolis lanceolatis, bracteis filiformibus. *Suppl. p.* 328.

Cajan. 9. C. racemis axillaribus erectis, foliolis ſublanceolatis tomentoſis, intermedio longius petiolato. *Rheed. h. malab.* 6. *t.* 13. β) *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 119. *Legumen loculamentoſum ſimplex.*

ſeſſilifolius. 10. C. racemis erectis, calicibus bractea ſimplici, foliis floralibus ſeſſilibus.

Wolgericus. 11. C. canus, racemis ſimplicibus erectis, floribus ſecundis, foliis pinnatis, foliolis ſubrotundis, ſtipulis ſubulatis. *Suppl. p.* 327. *Pall. it.* 3. *t.* G. 9. *f.* 3. *flor. roſſ. t.* 47.

folioloſus. 17. C. racemis terminalibus erectis, calicibus villoſis, laciniis falcatis, foliolis obovato-oblongis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 49.

nigricans. 12. C. racemis terminalibus erectis, calicibus villoſis, foliolis ellipticis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 387. *Stamina monadelphia.*

Laburnum. 13. C. racemis ſimplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 306. *Stamina monadelphia.* β) Cytiſus alpinus. *du Roi harbk. Baumz.* 1. *p.* 208. *Legumen nodoſum.*

violaceus. 14. C. floribus ſpicatis, foliis ternatis, capſulis linearibus, leguminibus villoſis compreſſis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 760. *t.* 306.

** *foliis ſimplicibus.*

græcus. 15. C. foliis lanceolato-linearibus, ramis angulatis.

tener. 16. C. foliis lanceolatis, ramis teretibus. *Jacq. Coll.* 1. *p.* 40. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 88.

1417. MULLERA. *Pericarpium* elongatum, carnoſum, moniliforme, *globulis* 1ſpermis.

moniliformis. 1. MÜLLERA. *Suppl. p.* 329. *Merian. ſurin. t.* 35.

878. GEOFFROYA. *Cal.* ſemiquinquefidus. *Drupa* ovata. *Nucleus* compreſſus.

ſpinoſa. 1. G. ſpinoſa, foliolis oblongis obtuſis. *Jacq. ſtirp. am. pict. t.* 262. *f.* 58.

inermis. 2. G. inermis, foliolis lanceolatis. *Wright act. angl.* 1777. *p.* 512. *t.* X*.

879. ROBINIA. *Cal.* 4fidus. *Legumen* elongatum, (multis) æquale, cylindricum.

Pſeud-Acacia. 1. R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, ſtipulis ſpinoſis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 15. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 2. *Legumen nodoſum.*

violacea. 2. R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 262. *f.* 61.

ſepium. 3. R. racemis pedicellis bifloris, foliis impari pinnatis, pinnis ovatis acuminatis, caule inermi. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 106.

hiſpida. 4. R. racemis axillaribus, foliis impari-pinnatis, caule inermi hiſpido. *Mant. p.* 101. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 3. *Mill. h. angl. t.* 244.

Haloden-dron. 5. R. racemis axillaribus trifloris, petiolis ſpineſcentibus, foliis conjugatis petiolatis, foliis cuneiformibus ſpinoſis cuſpidatis. *Suppl. p.* 330. *Pall. it.* 2. *t.* W. *Flor. roſſ. t.* 46.

mitis. 6. R. racemis pedicellis ternis, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Pluckn. t.* 310. *f.* 3.

Panacoco. 7. R. panicula ſpicata terminali, foliis impari-pinnatis tomentoſis, ſtipulis ſubrotundis. *Aubl. pl. guj. p.* 768. *t.* 307. *β*) Robinia coccinea.

Nica. 8. R. ſpica axillari, foliis impari pinnatis, ramis ſcandentibus. *Aubl. pl. guj. p.* 771. *t.* 308.

veſicaria. 9. R. pedunculis axillaribus ſolitariis quinquefloris, foliis præter unicum ſimplex ovatum ſine impari pinnatis, leguminibus inflatis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 107.

Caragana. 10. R. pedunculis ſimplicibus, foliis abrupte pinnatis, petiolis inermibus. *Pallas flor. roſſ. t.* 42.

ſpinoſa. 11. R. pedunculis ſimplicibus, foliis abrupte pinnatis, ſtipulis petiolisque ſpineſcentibus. *Mant. p.* 269. *Pallas flor. roſſ. t.* 44.

fruteſcens. 12. R. pedunculis ſimplicibus, foliis quaternatis ſubpetiolatis terminatis ſpina inermi. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 8. *Pallas flor. roſſ. t.* 43.

pygmæa. 13. R. pedunculis ſimplicibus, foliis quaternatis ſeſſilibus. *Pallas flor. roſſ. t.* 45.

880. COLUTEA. *Cal.* 5fidus. *Legumen* æquale latum, plurimis. *Capſula* inflata.

* *caule arboreo.*

arboreſcens. 1. C. foliolis obcordato-oblongis, ſtipulis lanceolatis, racemis hirſutis, leguminibus apice clauſis. *Regn. bot. t.* 224. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 4. *β*) *Commel. rar. t.* 11.

orientalis. 2. C. foliolis obcordatis rotundatis ſubcarnoſis, ſtipulis minimis denticulatis, racemis glabris, leguminibus apice ſuperne hiantibus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 305.

** *caule fruticoſo.*

humilis. 3. C. foliolis obcordatis, carinæ apice truncato. *Scopol. Sel. inſ.* 2. *p.* 23. *t.* 12.

fruteſcens. 4. C. foliolis ovato-oblongis, caule inermi. *Mill. h. angl. t.* 99.

*** *caule herbaceo.*

perennans. 5. C. foliolis ovalibus, racemis approximatis. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 3.

fiſtuloſa. 6 C. foliolis ovatis complicatis ſubtus pubeſcentibus. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 40.

æſchynomeoides. 7. C. foliolis glabris lanceolatis obtuſis e nervo acuminatis. *Scopol del inſ.* 3. *p.* 22. *t.* 12.

herbacea. 8. C. foliolis linearibus glabris. *Murray comm. goett.* 1774. *p.* 40. *t.* 7. *f.* 12. 13. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 4.

DIPHYSA. *Cal.* campanulatus, ſemiquinquefidus ½. *Legumen* lineare, 1loculare, polyſpermum, utrinque longitudinaliter veſica membranacea inflata auctum.

carthageneníis. 1. Diphisa. *Jacq. ſtirp. amer. p.* 208. *t.* 180. *f.* 51.

882. GLYCYRRHIZA. *Cal.* 2labiatus ⅓. *Legumen* ovatum, compreſſum.

echinata. 1. Gl. leguminibus echinatis, foliis ſtipulatis, foliolo impari ſeſſili. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 95. *Gaertn. de fruct. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 148. *f.* 6.

hirſuta. 2. Gl. leguminibus hirſutis, foliolo impari petiolato.

glabra. 3. Gl. leguminibus glabris nodoſis, ſtipulis nullis, foliolo impari petiolato. *Regn. bot.*

aſperrima. 4. Gl. foliolis ellipticicis cuſpidatis, caule hiſpido ſcabro. *Suppl. p.* 330. *Pallas it.* 1. *t.* I. *f.* 3. *t.* G. *g. f.* 1. 2.

883. CORONILLA. *Cal.* 2labiatus $\frac{2}{3}$, dentibus ſuperioribus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* aliis, aliis *Pericarpium* articulatum.

* *Fruticoſæ.*

Emerus. 1. C. pedunculis ſubtrifloris, corollarum unguibus calice triplo longioribus, caule angulato. *Mill. h. angl. t.* 132. *f.* 1. *β*) *Mill. h. angl. t.* 132. *f.* 2. *Legumen anguſtum loculamentoſum.*

juncea. 2. C. foliis quinatis ternatisque lineari-lanceolatis ſubcarnoſis obtuſis. *Barr. pl. rar. ic.* 133.

glauca. 3. C. foliolis ſeptenis obtuſiſſimis, ſtipulis lanceolatis. *Mant. p.* 444. *Mill. ic. h. angl. t.* 106.

valentina. 4. C. foliolis ſubnovenis, ſtipulis ſuborbiculatis. *Rivin. tetrap.* 206. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 1.

coronata. 5. C. foliolis novenis obovatis, internis cauli approximatis, ſtipula oppoſitifolia bipartita. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 95.

argentea. 6. C. foliis undenis ſericeis, extimo majore.

minima. 7. C. ſuffruticoſa procumbens, foliolis novenis ovatis, ſtipula oppoſitifolia emarginata, leguminibus angulatis nodoſis. *Mant. p.* 444. *Jacq. fl. auſtr.* 3. *t.* 271.

** *Herbaceæ.*

ſecuridaca. 8. C. leguminibus falcato-gladiatis, foliolis plurimis. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 153. *f.* 3. *Mill. h. angl. t.* 232. *Capſula compoſita.*

varia. 9. C. leguminibus erectis teretibus toroſis numeroſis, foliolis plurimis glabris. *S. G. Gmelin. it.* 1. *t.* 21. *Mill. h. angl. t.* 101.

cretica. 10. C. leguminibus quinis erectis teretibus articulatis, foliolis undenis. *Mant. p.* 445. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 25.

ſcandens. 11. C. caule ſcandente flaccido. *Plum. ic.* 107. *f.* 3.

884. ORNITHOPUS. *Pericarpium* articulatum teres arcuatum.

perpuſillus. 1. O. foliis pinnatis, leguminibus incurvatis, bractea pinnata duplo majoribus. *Flor. dan. t.* 730.

intermedius. 2. O. caulibus repentibus longiſſimis, foliis pinnatis, bractea pinnata leguminibus incurvatis majore. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 319.

compreſſus. 3. O. foliis pinnatis, leguminibus recurvatis compreſſis rugoſis, bractea pinnata.

ſcorpioides. 4. O. foliis ternatis ſubſeſſilibus, impari maximo. *Rivin. tetrap. t.* 210. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 3.

tetraphyllus. 5. O. foliis quaternis, floribus ſolitariis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 116. *f.* 3.

repandus. 6. O. foliis ternatis quinatisque, impari majore, ſtipulis ſubreniformibus. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 215.

885. HIPPOCREPIS. *Pericarpium* multiloculare compreſſum, altera ſutura pluries emarginatum, curvum.

uniſiliquoſa. 1. H. leguminibus ſeſſilibus ſolitariis rectis. *Riv. tetrap. t.* 98. *Mill. h. angl. t.* 278. *f.* 1.

multiſiliquoſa. 2. H. leguminibus pedunculatis confertis circularibus, margine altero lobatis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 300. *Mill. h. angl. t.* 278. *f.* 2.

comoſa. 3. H. leguminibus pedunculatis confertis arcuatis margine exteriore repandis. *Mant. p.* 445. *Riv. tetrap. t.* 97.

balearica. 4. H. leguminibus pedunculatis confertis ſubarcuatis lanceolato-oblongis margine exteriori repandis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 305. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 5.

PETAGNANA. *Legumen* articulis diſtinctis 1ſpermis ſtilo connexis.

ſenſitiva. 1. PETAGNANA. *Ait. hort. Kew.* 1. *p.* 496. 512. *t.* 13.

bupleurifolium. 3. H. foliis lanceolatis acutis, ſtipulis ſcarioſis, caule inermi. *Pluckn. amalth. t.* 443. *f.* 4.

hirſutum. 4. H. foliis lanceolatis nervoſis hirſutis ſubtus incanis, nervis ferrugineis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 774.

Alhagi. 5. H. foliis lanceolatis obtuſis, caule fruticoſo ſpinoſo. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 29.

vaginale. 6. H. foliis cordato-lanceolatis, petiolis ſimplicibus, ſtipulis vaginalibus. *Burm. zeyl. t.* 49. *f.* 1.

imbricatum. 7. H. foliis cordatis ſeſſilibus ſtipulatis, ſuperioribus imbricatis floriferis. *Suppl. p.* 331.

ſtyracifolium. 8. H. foliis cordato-orbiculatis retuſis ſupra glabris ſubtus tomentoſis.

moniliferum. 9. H. foliis orbiculatis, leguminibus moniliformibus globoſo-articulatis. *Mant. p.* 102. *Burm. ind.* 1. 52. *f.* 3.

reniforme. 10. H. foliis reniformibus, caule tereti. *Burm. ind. t.* 52. *f.* 1.

ſororium. 11. H. foliis reniformibus emarginatis, caule triquetro. *Mant. p.* 270. *Burm. ind. t.* 50. *f.* 2.

veſpertilionis 12. H. foliis lunatis, lobis retrofalcatis, racemo terminali, leguminibus retrotractis calici inflato incluſis. *Suppl. p.* 331.

gangeticum. 13. H. foliis ovatis acutis ſtipulatis. *Burm. zeyl. t.* 49. *f.* 2.

maculatum 14. H. foliis ovatis obtuſis. *Dill. h. Elth. t.* 141. *f.* 161.

latebroſum. 15. H. foliis ovatis ſerrulatis, leguminibus occultatis bractea fornicata ſupina ſcarioſa. *Mant. p.* 270. *Pet. gaz. t.* 30. *f.* 11.

numularifolium. 16. H. foliis cuneiformibus. *Petiv. gaz. t.* 26. *f.* 4.

triquetrum. 17. H. foliis oblongis, petiolis alatis, ramis triquetris. *Burm. ind. t.* 49. *f.* 2.

ſtrobiliferum. 18. H. bracteis ſtrobilorum inflatis cordatis obtuſis. *Flor. zeyl. t.* 3.

** *foliis compoſitis.*

† *binatis.*

diphyllum. 19. H. foliis petiolatis, bracteis geminis ovatis acuminatis ſeſſilibus. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 82. *β) Burm. zeyl. t.* 50. *f.* 1.

†† *ter-*

‡ ‡ *ternatis.*

ſpartium. 20. H. foliis ternatis ſimplicibusque ſubtomentoſis, caule dichotomo, floribus geminis, leguminibus articulatis hiſpidis. *Burm. ind. t.* 51. *f.* 2.

canadenſe. 21. H. foliis ternatis ſimplicibuſque, caule lævi, floribus racemoſis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 11. *f.* 9. *Pericarpium articulatum.*

pulchellum. 22. H. bracteis geminis conjugatis orbiculatis lineatis. *Burm. ind. t.* 52.

umbellatum. 23. H. pedunculis umbelliferis, caule fruticoſo. *Rumpf. amb.* 4. *t.* 52.

heterocarpon. 24. H. floribus paniculato-ſpicatis, leguminibus articulatis, infimo monoſpermo, ſtipulis ſetaceis. *Burm. zeyl. t.* 53. *f.* 1.

retroflexum. 25. H. racemis erectis, leguminibus pendulis multiarticulatis. *Mant. p.* 103.

barbatum. 26. H. floribus terminalibus ſubſpicatis, leguminibus inflexis calicibus hirſutis.

lagopodioides. 27. H. racemis oblongis, leguminibus inflexis, calicibus hirſutis. *Burm. ind. t.* 53. *f.* 2.

nudiflorum. 28. H. ſcapo florifero nudo, caule folioſo angulato.

biarticulatum. 29. H. caule ſuffruticoſo, leguminibus biarticulatis. *Burm. zeyl. t.* 50. *f.* 2.

viſcidum. 30. H. caule ramiſque hiſpidis, leguminibus membranaceis lævibus integris. *Burm. zeyl. t.* 84. *f.* 1.

lineatum. 31. H. foliolis oblongis lineatis, racemis axillaribus pendulis. *Burm. ind. t.* 53. *f.* 1.

Scorpiurus. 32. H. foliolis oblongis ſubtus hirſutis, caulibus procumbentibus trigonis, racemis axillaribus, leguminibus teretiuſculis erectis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 107.

racemoſum. 33. H. foliolis oblongis ſtipulatis glabris, caule fruteſcente erecto, racemis axillaribus erectis longiſſimis, leguminibus glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 285.

caudatum. 34. H. foliolis oblongis glabris, caule herbaceo, panicula terminali, leguminibus tomentoſis. *Thunb. flor. jap. p.* 286.

ſtriatum. 35. H. foliolis oblongis ſtipulatis, caule herbaceo, floribus axillaribus ſolitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 289.

876. CYTISUS. *Cal.* 2labiatus $\frac{2}{3}$. *Legumen* baſi attenuatum (plurimis) æquale, latum.

* *foliis compoſitis.*

glaber. 1. C. floribus ſolitariis lateralibus ſubſeſſilibus pendulis, foliis ternatis. *Suppl. p.* 328.

hirſutus. 2. C. pedunculis ſimplicibus lateralibus, calicibus hirſutis trifidis obtuſis ventricoſo-oblongis. *Jacq. obſ. bot. t.* 96.

purpureus. 3. C. floribus pedunculatis ſolitariis, foliis glabris, caulibus decumbentibus fruteſcentibus, leguminibus ſuperne falcatis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 48.

ſupinus. 4. C. floribus ſubbinatis pedunculatis, foliis villoſis, caulibus decumbentibus fruteſcentibus. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 20. β) Cytiſus glabreſcens. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 269.

argenteus. 5. C. floribus ſubbinatis ſubſeſſilibus, foliis tomentoſis, ſtipulis minutis, caulibus decumbentibus. *Lob. ic.* 2. *p.* 41.

auſtriacus. 6. C. floribus umbellatis terminalibus, caulibus erectis, foliolis lanceolatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 21.

capitatus. 7. C. floribus umbellatis terminalibus, ramis erectis, foliolis ovatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 33.

prolifer. 8. C. umbellis axillaribus ſeſſilibus proliferis, foliis ternatis petiolatis ſericeis, foliolis lanceolatis, bracteis filiformibus. *Suppl. p.* 328.

Cajan. 9. C. racemis axillaribus erectis, foliolis ſublanceolatis tomentoſis, intermedio longius petiolato. *Rheed. h. malab.* 6. *t.* 13. *β) Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 119. *Legumen loculamentoſum ſimplex.*

ſeſſilifolius. 10. C. racemis erectis, calicibus bractea ſimplici, foliis floralibus ſeſſilibus.

Wolgericus. 11. C. canus, racemis ſimplicibus erectis, floribus ſecundis, foliis pinnatis, foliolis ſubrotundis, ſtipulis ſubulatis. *Suppl. p.* 327. *Pall. it.* 3. *t. G.* 9. *f.* 3. *flor. roſſ. t.* 47.

folioloſus. 17. C. racemis terminalibus erectis, calicibus villoſis, laciniis falcatis, foliolis obovato-oblongis. *Ait. hort. Kew.* 3 *p.* 49.

nigricans. 12. C. racemis terminalibus erectis, calicibus villoſis, foliolis ellipticis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 387. *Stamina monadelphia.*

Laburnum. 13. C. racemis ſimplicibus pendulis, foliolis ovato-oblongis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 306. *Stamina monadelphia.* β) Cytiſus alpinus. *du Roi harbk. Baumz.* 1. *p.* 208. *Legumen nodoſum.*

violaceus. 14. C. floribus ſpicatis, foliis ternatis, capſulis linearibus, leguminibus villoſis compreſſis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 760. *t.* 306.

** *foliis ſimplicibus.*

græcus. 15. C. foliis lanceolato-linearibus, ramis angulatis.

tener. 16. C. foliis lanceolatis, ramis teretibus. *Jacq. Coll.* 1. *p.* 40. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 88.

1417. MULLERA. *Pericarpium* elongatum, carnoſum, moniliforme, *globulis* 1ſpermis.

moniliformis. 1. Müllera. *Suppl. p.* 329. *Merian. ſurin. t.* 35.

878. GEOFFROYA. *Cal.* ſemiquinquefidus. *Drupa* ovata. *Nucleus* compreſſus.

ſpinoſa. 1. G. ſpinoſa, foliolis oblongis obtuſis. *Jacq. ſtirp. am. pict. t.* 262. *f.* 58.

inermis. 2. G. inermis, foliolis lanceolatis. *Wright act. angl.* 1777. *p.* 512. *t.* X*.

879. ROBINIA. *Cal.* 4fidus. *Legumen* elongatum, (multis) æquale, cylindricum.

Pſeud-Acacia. 1. R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, ſtipulis ſpinoſis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 15. *f.* 1. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 145. *f.* 2. *Legumen nodoſum.*

violacea. 2. R. racemis pedicellis unifloris, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 262. *f.* 61.

ſepium. 3. R. racemis pedicellis bifloris, foliis impari pinnatis, pinnis ovatis acuminatis, caule inermi. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 106.

hiſpida. 4. R. racemis axillaribus, foliis impari-pinnatis, caule inermi hiſpido. *Mant. p.* 101. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *t.* 3. *Mill. h. angl. t.* 244.

Haloden-dron. 5. R. racemis axillaribus trifloris, petiolis ſpineſcentibus, foliis conjugatis petiolatis, foliis cuneiformibus ſpinoſis cuſpidatis. *Suppl. p.* 330. *Pall. it.* 2. *t.* W. *Flor. roſſ. t.* 46.

mitis. 6. R. racemis pedicellis ternis, foliis impari-pinnatis, caule inermi. *Pluckn. t.* 310. *f.* 3.

Panacoco. 7. R. panicula ſpicata terminali, foliis impari-pinnatis tomentoſis, ſtipulis ſubrotundis. *Aubl. pl. guj. p.* 768. *t.* 307. *β*) Robinia coccinea.

Nica. 8. R. ſpica axillari, foliis impari pinnatis, ramis ſcandentibus. *Aubl. pl. guj. p.* 771. *t.* 308.

veſicaria. 9. R. pedunculis axillaribus ſolitariis quinquefloris, foliis præter unicum ſimplex ovatum ſine impari pinnatis, leguminibus inflatis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 107.

Caragana. 10. R. pedunculis ſimplicibus, foliis abrupte pinnatis, petiolis inermibus. *Pallas flor. roſſ. t.* 42.

ſpinoſa. 11. R. pedunculis ſimplicibus, foliis abrupte pinnatis, ſtipulis petiolisque ſpineſcentibus. *Mant. p.* 269. *Pallas flor. roſſ. t.* 44.

fruteſcens. 12. R. pedunculis ſimplicibus, foliis quaternatis ſubpetiolatis terminatis ſpina inermi. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 8. *Pallas flor. roſſ. t.* 43.

pygmæa. 13. R. pedunculis ſimplicibus, foliis quaternatis ſeſſilibus. *Pallas flor. roſſ. t.* 45.

880. COLUTEA. *Cal.* 5fidus. *Legumen* æquale latum, plurimis. *Capſula* inflata.

* *caule arboreo.*

arboreſcens. 1. C. foliolis obcordato-oblongis, ſtipulis lanceolatis, racemis hirſutis, leguminibus apice clauſis. *Regn. bot. t.* 224. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 4. *β*) *Commel. rar. t.* 11.

orientalis. 2. C. foliolis obcordatis rotundatis ſubcarnoſis, ſtipulis minimis denticulatis, racemis glabris, leguminibus apice ſuperne hiantibus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 305.

** *caule fruticoſo.*

humilis. 3. C. foliolis obcordatis, carinæ apice truncato. *Scopol. Sel. inſ.* 2. *p.* 23. *t.* 12.

frutefcens. 4. C. foliolis ovato-oblongis, caule inermi. *Mill. h. angl. t.* 99.

*** *caule herbaceo.*

perennans. 5. C. foliolis ovalibus, racemis approximatis. *Jacq. h. Vind.* 3. t. 3.

fiſtuloſa. 6 C. foliolis ovatis complicatis ſubtus pubeſcentibus. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 40.

æſchynomenoides. 7. C. foliolis glabris lanceolatis obtuſis e nervo acuminatis. *Scopol del inſ.* 3. *p.* 22. *t.* 12.

herbacea. 8. C. foliolis linearibus glabris. *Murray comm. goett.* 1774. *p.* 40. *t.* 7. *f.* 12. 13. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 154. *f.* 4.

DIPHYSA. *Cal.* campanulatus, ſemiquinquefidus ⅕. *Legumen* lineare, 1loculare, polyſpermum, utrinque longitudinaliter veſica membranacea inflata auctum.

carthagenenſis. 1. DIPHISA. *Jacq. ſtirp. amer. p.* 208. *t.* 180. *f.* 51.

882. GLYCYRRHIZA. *Cal.* 2labiatus ⅔. *Legumen* ovatum, compreſſum.

echinata. 1. Gl. leguminibus echinatis, foliis ſtipulatis, foliolo impari ſeſſili. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 95. *Gaertn. de fruct. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 148. *f.* 6.

hirſuta. 2. Gl. leguminibus hirſutis, foliolo impari petiolato.

glabra. 3. Gl. leguminibus glabris nodoſis, ſtipulis nullis, foliolo impari petiolato. *Regn. bot.*

aſperrima. 4. Gl. foliolis ellipticicis cuſpidatis, caule hiſpido ſcabro. *Suppl. p.* 330. *Pallas it.* 1. *t.* I. *f.* 3. *t.* G. *g. f.* 1. 2.

883. CORONILLA. *Cal.* 2labiatus ⅔, dentibus ſuperioribus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* aliis, aliis *Pericarpium* articulatum.

* *Fruticoſæ.*

Emerus. 1. C. pedunculis ſubtrifloris, corollarum unguibus calice triplo longioribus, caule angulato. *Mill. h. angl. t.* 132. *f.* 1. *β*) *Mill. h. angl. t.* 132. *f.* 2. *Legumen anguſtum loculamentoſum.*

juncea. 2. C. foliis quinatis ternatisque lineari-lanceolatis ſubcarnoſis obtuſis. *Barr. pl. rar. ic.* 133.

glauca. 3. C. foliolis ſeptenis obtuſiſſimis, ſtipulis lanceolatis. *Mant. p.* 444. *Mill. ic. h. angl. t.* 106.

valentina. 4. C. foliolis ſubnovenis, ſtipulis ſuborbiculatis. *Rivin. tetrap.* 206. *Gaertn. de fr. & ſem. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 1.

coronata. 5. C. foliolis novenis obovatis, internis cauli approximatis, ſtipula oppoſitifolia bipartita. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 95.

argentea. 6. C. foliis undenis ſericeis, extimo majore.

minima. 7. C. ſuffruticoſa procumbens, foliolis novenis ovatis, ſtipula oppoſitifolia emarginata, leguminibus angulatis nodoſis. *Mant. p.* 444. *Jacq. fl. auſtr.* 3. *t.* 271.

** *Herbaceæ.*

ſecuridaca. 8. C. leguminibus falcato-gladiatis, foliolis plurimis. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 153. *f.* 3. *Mill. h. angl. t.* 232. *Capſula compoſita.*

varia. 9. C. leguminibus erectis teretibus toroſis numeroſis, foliolis plurimis glabris. *S. G. Gmelin. it.* 1. *t.* 21. *Mill. h. angl. t.* 101.

cretica. 10. C. leguminibus quinis erectis teretibus articulatis, foliolis undenis. *Mant. p.* 445. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 25.

ſcandens. 11. C. caule ſcandente flaccido. *Plum. ic.* 107. *f.* 3.

884. ORNITHOPUS. *Pericarpium* articulatum teres arcuatum.

perpuſillus. 1. O. foliis pinnatis, leguminibus incurvatis, bractea pinnata duplo majoribus. *Flor. dan. t.* 730.

intermedius. 2. O. caulibus repentibus longiſſimis, foliis pinnatis, bractea pinnata leguminibus incurvatis majore. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 319.

compreſſus. 3. O. foliis pinnatis, leguminibus recurvatis compreſſis rugoſis, bractea pinnata.

ſcorpioides. 4. O. foliis ternatis ſubſeſſilibus, impari maximo. *Rivin. tetrap. t.* 210. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 3.

tetraphyllus. 5. O. foliis quaternis, floribus ſolitariis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 116. *f.* 3.

repandus. 6. O. foliis ternatis quinatisque, impari majore, ſtipulis ſubreniformibus. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 215.

885. HIPPOCREPIS. *Pericarpium* multiloculare compreſſum, altera ſutura pluries emarginatum, curvum.

uniſiliquoſa. 1. H. leguminibus ſeſſilibus ſolitariis rectis. *Riv. tetrap. t.* 98. *Mill. h. angl. t.* 278. *f.* 1.

multiſiliquoſa. 2. H. leguminibus pedunculatis confertis circularibus, margine altero lobatis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 300. *Mill. h. angl. t.* 278. *f.* 2.

comoſa. 3. H. leguminibus pedunculatis confertis arcuatis margine exteriore repandis. *Mant. p.* 445. *Riv. tetrap. t.* 97.

balearica. 4. H. leguminibus pedunculatis confertis ſubarcuatis lanceolato-oblongis margine exteriori repandis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 305. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 5.

PETAGNANA. *Legumen* articulis diſtinctis 1ſpermis ſtilo connexis.

ſenſitiva. 1. PETAGNANA. *Ait. hort. Kew.* 1. *p.* 496. 512. *t.* 13.

bupleuri-folium. 3. H. foliis lanceolatis acutis, ſtipulis ſcarioſis, caule inermi. *Pluckn. amalth. t.* 443. *f.* 4.

hirſutum. 4. H. foliis lanceolatis nervoſis hirſutis ſubtus incanis, nervis ferrugineis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 774.

Alhagi. 5. H. foliis lanceolatis obtuſis, caule fruticoſo ſpinoſo. *S. G. Gmelin it.* 2. *p.* 29.

vaginale. 6. H. foliis cordato-lanceolatis, petiolis ſimplicibus, ſtipulis vaginalibus. *Burm. zeyl. t.* 49. *f.* 1.

imbricatum. 7. H. foliis cordatis ſeſſilibus ſtipulatis, ſuperioribus imbricatis floriferis. *Suppl. p.* 331.

ſtyracifolium. 8. H. foliis cordato-orbiculatis retuſis ſupra glabris ſubtus tomentoſis.

moniliferum. 9. H. foliis orbiculatis, leguminibus moniliformibus globoſo-articulatis. *Mant. p.* 102. *Burm. ind. t.* 52. *f.* 3.

reniforme. 10. H. foliis reniformibus, caule tereti. *Burm. ind. t.* 52 *f.* 1.

ſororium. 11. H. foliis reniformibus emarginatis, caule triquetro. *Mant. p.* 270. *Burm. ind. t.* 50. *f.* 2.

veſpertilionis 12. H. foliis lunatis, lobis retrofalcatis, racemo terminali, leguminibus retroſtractis calici inflato incluſis. *Suppl. p.* 331.

gangeticum. 13. H. foliis ovatis acutis ſtipulatis. *Burm. zeyl. t.* 49. *f.* 2.

maculatum 14. H. foliis ovatis obtuſis. *Dill. h. Elth. t.* 141. *f.* 161.

latebroſum. 15. H. foliis ovatis ſerrulatis, leguminibus occultatis bractea fornicata ſupina ſcarioſa. *Mant. p.* 270. *Pet. gaz. t.* 30. *f.* 11.

numularifolium. 16. H. foliis cuneiformibus. *Petiv. gaz. t.* 26. *f.* 4.

triquetrum. 17. H. foliis oblongis, petiolis alatis, ramis triquetris. *Burm. ind. t.* 49. *f.* 2.

ſtrobiliferum. 18. H. bracteis ſtrobilorum inflatis cordatis obtuſis. *Flor. zeyl. t.* 3.

** *foliis compoſitis.*

† *binatis.*

diphyllum. 19. H. foliis petiolatis, bracteis geminis ovatis acuminatis ſeſſilibus. *Rheed. hort. malab.* 9. *t.* 82. β) *Burm. zeyl. t.* 50. *f.* 1.

†† *ter-*

‡ † *ternatis.*

ſpartium. 20. H. foliis ternatis ſimplicibusque ſubtomentoſis, caule dichotomo, floribus geminis, leguminibus articulatis hiſpidis. *Burm. ind. t.* 51. *f.* 2.

canadenſe. 21. H. foliis ternatis ſimplicibuſque, caule lævi, floribus racemoſis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 11. *f.* 9. *Pericarpium articulatum.*

pulchellum. 22. H. bracteis geminis conjugatis orbiculatis lineatis. *Burm. ind. t.* 52.

umbellatum. 23. H. pedunculis umbelliferis, caule fruticoſo. *Rumpf. amb.* 4. *t.* 52.

heterocarpon. 24. H. floribus paniculato-ſpicatis, leguminibus articulatis, infimo monoſpermo, ſtipulis ſetaceis. *Burm. zeyl. t.* 53. *f.* 1.

retroflexum. 25. H. racemis erectis, leguminibus pendulis multiarticulatis. *Mant. p.* 103.

barbatum. 26. H. floribus terminalibus ſubſpicatis, leguminibus inflexis calicibus hirſutis.

lagopodioides. 27. H. racemis oblongis, leguminibus inflexis, calicibus hirſutis. *Burm. ind. t.* 53. *f.* 2.

nudiflorum. 28. H. ſcapo florifero nudo, caule folioſo angulato.

biarticulatum. 29. H. caule ſuffruticoſo, leguminibus biarticulatis. *Burm. zeyl. t.* 50. *f.* 2.

viſcidum. 30. H. caule ramiſque hiſpidis, leguminibus membranaceis lævibus integris. *Burm. zeyl. t.* 84. *f.* 1.

lineatum. 31. H. foliolis oblongis lineatis, racemis axillaribus pendulis. *Burm. ind. t.* 53. *f.* 1.

Scorpiurus. 32. H. foliolis oblongis ſubtus hirſutis, caulibus procumbentibus trigonis, racemis axillaribus, leguminibus tereriuſculis erectis. *Swartz nov. pl. gen. et ſp. p.* 107.

racemoſum. 33. H. foliolis oblongis ſtipulatis glabris, caule fruteſcente erecto, racemis axillaribus erectis longiſſimis, leguminibus glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 285.

caudatum. 34. H. foliolis oblongis glabris, caule herbaceo, panicula terminali, leguminibus tomentoſis. *Thunb. flor. jap. p.* 286.

ſtriatum. 35. H. foliolis oblongis ſtipulatis, caule herbaceo, floribus axillaribus ſolitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 289.

tortuoſum. 36. H. foliis ovali-oblongis obtuſis glabriuſculis, racemis erectis axillaribus, leguminibus tortuoſis compreſsis pubeſcentibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 184. *t.* 116. *f.* 2.

volubile. 37. H. foliolis ovato-oblongis, caule volubili. *Dill. h. Elth. t.* 143. *f.* 170.

violaceum. 38. H. foliolis ovatis, floribus geminatis, leguminibus nudis venoſis articulatis rhombeis.

microphyllum. 39. H. foliolis ovatis villoſis, caule fruteſcente erecto glabro, floribus terminalibus paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 284.

ſpirale. 40. H. foliolis ovatis obtuſis glabris, caule ramoſiſſimo, ramis diffuſis, racemis laxis divaricatis, leguminibus ſpirali-tortuoſis. *Swartz nov. pl. gen. et ſp. p.* 107.

ſupinum. 41. H. foliolis ovatis obtuſiuſculis ſubtus incano-villoſis, caule ramoſo procumbente, racemis ſimplicibus erectis terminalibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 185. *t.* 118. *f.* 2.

canum. 42. H. foliolis ovatis acuminatis ſubtus incanis, caule tereti ramoſo erecto, racemis terminalibus erectis, leguminibus declinatis hirtis. *Plum. ic.* 149. *f.* 1.

piloſum. 43. H. foliolis ovatis acuminatis, caule decumbente hirto, racemis axillaribus. *Thunb. flor. jap. p.* 290.

trigonum. 44. H. foliolis ovatis acutis hirtis, caule adſcendente triquetro, racemis longiſſimis axillaribus, leguminibus tortuoſis inflexis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 107.

triangulare. 45. H. foliolis ovatis acutis lineatis, umbellis axillaribus, ramis triquetris flexuoſis. *Retz. obſ. bot.* 3. *p.* 40. *an diſtinctum ſatis a trigono.*

fruteſcens. 46. H. foliolis ſubovatis ſubtus villoſis, caule fruteſcente. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 89.

hirtum. 47. H. foliolis ovalibus, caule fruticoſo, ſpicis oblongis, fructibus monoſpermis calicibuſque hirſutis.

marilandicum. 48. H. foliolis ſubrotundis, caule fruteſcente ramoſiſſimo, leguminibus articulatis lævibus. *Dill. h. Elth. t.* 144. *f.* 171.

aſcendens. 49. H. foliolis ſubrotundis ſubtus pubeſcentibus, caule tereti, ramis delinatis aſcendentibus piloſis, racemis ſimplicibus erectis axillaribus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 106.

axillare. 50. H. foliolis rhombeo-ſubrotundis, petiolis erectis, ſcapis axillaribus folio longioribus, caule repente radicante. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 107.

Digitized by Google

virgatum. 51. H. foliolis cum acumine obtuſis, caule angulato piloſo, pedunculis capillaribus trifloris. *Thunb. flor. jap. p.* 290.

viridiflorum. 52. H. foliolis acutiuſculis, caule erecto, racemis longiſſimis erectis. *Pluckn. alm. t.* 308. *f.* 5.

junceum. 53. H. foliolis lanceolatis, pedunculis ſubumbellatis lateralibus, leguminibus uniarticulatis rhombeis. *Lin. dec.* 1. *t.* 4.

paniculatum. 54. H. foliolis lineari-lanceolatis, floribus paniculatis, leguminibus rhombeis. *Pluck. mant. t.* 432. *f.* 6.

repens. 55. H. foliolis obcordatis, caulibus procumbentibus, racemis lateralibus. *Dill. h. Elth. t.* 142. *f.* 169.

triflorum. 56. H. foliolis obcordatis, caulibus procumbentibus, pedunculis unifloris terminalibus. *Swarts obſ. bot. t.* 6. *f.* 1.

diſtortum. 57. H. caule fruticoſo, leguminibus tortuoſis. *Sloan. hiſt. jam.* 2. *p.* 184. *t.* 116. *f.* 2.

ſericeum. 58. H. foliolis emarginatis villoſis, caule fruteſcente erecto, floribus axillaribus ſolitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 287.

tomentoſum. 59. H. foliis ſubtus tomentoſis, caule angulato tomentoſo, racemis axillaribus. *Thunb. flor. jap. p.* 286.

caneſcens. 60. H. foliis ſubtus ſcabris, caule hiſpido, floribus racemoſis conjugatis.

gyrans. 61. H. foliolis lateralibus ſpontaneo motu gyratorio huc illuc agitatis. *Suppl. p.* 332.

lappaceum. 62. H. foliolis obcordatis, floribus axillaribus ſubſolitariis, leguminibus biarticulatis, ſetis hamoſis. *Forsk. flor. aeg. arab. p.* 136.

racemiferum. 63. H. foliolis ovatis, floribus racemoſis conjugatis. *Burm. amer. p.* 140. *t.* 149. *f.* 1.

gujanenſe. 64. H. fruteſcens, foliis ſubtus incanis, floribus congeſtis racemoſis, leguminibus hirſutis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 774.

grandiflorum. 84. H. foliolis ovalibus venoſis utrinque lævibus, racemis axillaribus erectis, leguminibus pendulis. *Walt. flor. carol. p.* 185.

†††*foliis pinnatis.*

argentatum. 65. H. foliis ſubtus ſericeis lucidis, leguminibus articulatis, ſcapo aphyllo. *Suppl. p.* 333. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 566. Aſtragalus grandiflorus. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 31.

fruticoſum. 66. H. foliolis alternis oblongis mollibus, ſtipulis ſubulatis, ramis axillaribus, leguminum articulis reticulatis. *Suppl. p.* 333. *Pallas it.* 3. *t.* F.

cornutum. 67. H. foliolis linearibus, leguminibus monoſpermis lævibus, caule fruticoſo, pedunculis perſiſtenti-ſpinoſis. *Tourneſ. it.* 2. *p.* 108. *ic.*

incanum. 68. H. foliis exſtipulatis ſubtus incanis, caule erecto, floribus racemoſis cernuis. *Thunb. flor. jap. p.* 289.

Criſta galli. 69. H. leguminibus monoſpermis aculeatis: criſtæ laciniis lanceolatis denticulatis. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 148. *f.* 5. *Capſula duplicata.*

Caput galli. 70. H. leguminibus monoſpermis, criſtæ dentibus ſubulatis, alis breviſſimis, caule diffuſo. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 44. *Capſula duplicata.*

ſaxatile. 71. H. leguminibus monoſpermis ſulcatis muticis, corollarum alis breviſſimis, ſcapis ſubradicatis.

Onobrychis. 72. H. leguminibus monoſpermis aculeatis, corollarum alis calicem æquantibus, caule elongato. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 38. *Capſ. potius duplicata: capſulis intus nidulantibus.*

pumilum. 73. H. leguminibus monoſpermis, caule ſuffruticoſo, corollarum alis, vexilloque carina brevioribus. *Mant. p.* 448.

crinitum. 74. H. leguminibus inflexis, racemis longis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 102.

alpinum. 75. H. leguminibus articulatis glabris pendulis, caule erecto. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 10. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 155. *f.* 5.

virginicum. 76. H. leguminibus articulatis glabris pedunculatis erectis, caule fruticoſo.

humile. 77. H. leguminibus articulatis aſperis, corollæ alis obſoletis, ſpicis hirſutis, caulibus depreſſis. *Mant. p.* 449.

ſpinoſiſſimum. 78. H. leguminibus articulatis aculeatis tomentoſis, caule diffuſo. *Pluckn. phyt.* 50. *f.* 2.

flexuoſum. 79. H. leguminibus articulatis aculeatis flexuoſis, caule diffuſo. *Riv. tetr. t.* 213.

coronarium. 80. H. leguminibus articulatis dentatis nudis rectis, caule diffuſo. *Gaertn. de fr. & ſem. pl. cent.* 9. *t.* 159. *f.* 5. *Kniph. bot. orig. cent.* 3. *n.* 45. *Pericarpium huic & flexuoſo articulatum.*

pictum. 81. H. leguminibus articulatim huc illuc flexuoſis rugoſis, caule erecto ſubſimpliciſſimo. *Jacq. coll.* 2. *p.* 262.

obſcurum. 82. H. ſtipulis vaginalibus, caule erecto flexuoſo, floribus pendulis. *Mant. p.* 447. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 168.

*** *incertæ tribus.*

immaculatum. 83. H. leguminibus conjugatis rectis exterius lobatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 214.

889. INDIGOFERA. *Cal.* patens. *Cor.* carina utrinque calcari ſubulato patulo. *Legumen* lineare.

* *foliis ſimplicibus.*

linifolia. 34. I. foliis linearibus canis, leguminibus globoſis. *Suppl. p.* 331. Hedyſarum linifolium.

ſericea. 1. I. foliis lanceolatis ſericeis, ſpicis ſeſſilibus, caule fruticoſo. *Mant. p.* 271.

ovata. 2. I. foliis ovatis, caule herbaceo. *Suppl. p.* 335.

oblongifolia. 3. I. foliis oblongis ſericeis, caule fruticoſo, racemis axillaribus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 137.

** *foliis ternatis.*

trifoliata. 4. I. floribus ſeſſilibus lateralibus.

mexicana. 5. I. panicula ramoſa ſpicata, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 335.

ſpinoſa. 6. I. foliis obovatis, pedunculis ſpineſcentibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 137.

pſoraloides. 7. I. foliis lanceolatis, racemis longiſſimis, leguminibus cernuis. *Sp. pl. p.* 1043. Cytiſus pſoraloides. *Rivin. tetrap.* 71. *f.* 135.

candicans. 32. I. foliis lanceolato-linearibus ſubtus ſericeis, ſpicis pedunculatis paucifloris, leguminibus cylindricis rectis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 67.

amœna. 33. I. foliis ovalibus piloſiuſculis, ramis teretibus, ſpicis pedunculatis, ſtipulis ſetaceis, calicibus laxis, caule fruteſcente. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 68.

ſarmentoſa. 8. I. foliis ovatis ſubſeſſilibus, pedunculis axillaribus ſubbifloris, caule proſtrato filiformi. *Suppl. p.* 334.

trita. 9. I. foliis ovatis acutis, racemis brevibus, caule erecto. *Suppl. p.* 335.

denudata. 10. I. foliis ovatis glabris, racemis pedunculatis folio longioribus, caule fruticoſo erecto. *Suppl. p.* 334.

procumbens. 11. I. foliis obovatis, caule herbaceo proſtrato, ſpicis pedunculatis. *Mant. p.* 271.

*** *foliis quinatis.*

filiformis. 12. I. foliis oblongis villoſis, floribus ſpicatis pedunculatis; pedunculis ramiſque filiformibus, caule erecto. *Suppl. p.* 334.

digitata. 13. I. foliis digitatis, racemis pedunculatis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 335.

**** *foliis pinnatis.*

cytiſoides. 14. I. foliis quinato-pinnatis ternatiſque, racemis axillaribus, caule fruticoſo. *Sp. pl. p.* 1076. Pſoralea cytiſoides. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 84.

glabra. 15. I. foliis pinnatis ternatiſque obovatis, racemis breviſſimis, leguminibus horizontalibus teretibus. *Rheed. h. malab.* 9. *t.* 67.

fragrans. 16. I. foliis quinato-pinnatis piloſis, foliolis ovatis, extimo majore, leguminibus tetragonis. *Koenig apud Retz. obſ. bot.* 4. *p.* 29.

pentaphylla. 17. I. foliolis ovalibus quinis, caulibus proſtratis, pedunculis bifloris.

ſemitrijuga. 18. I. foliolis obcordatis quinis, leguminibus ſubſpicatis torulosis pendulis, caule proſtrato ſuffruticoſo. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 137.

enneaphylla. 19. I. foliolis cuneatis ſeptenis, caulibus proſtratis, ſpicis lateralibus. *Mant. p.* 102. 272. 571. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 496 Hedyſarum proſtratum. *Burm. ind. t.* 53. *f.* 1.

ſpicata. 20. I. foliolis obovatis, floribus ſpicatis, leguminibus teretibus toruloſis pendulis, caule decumbente. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 138.

tinctoria. 21. I. foliolis obovatis, racemis brevibus, leguminibus rectis, caule ſuffruticoſo. *Mill. h. angl. t.* 34. *Blackw. herb. t.* 596.

fruteſcens. 22. I. foliolis ovatis glabris, racemis axillaribus pedunculatis, caule fruticoſo erecto. *Suppl. p.* 334.

diſperma. 23. I. foliolis ovalibus, racemis elongatis, leguminibus diſpermis. *Syſt. nat.* XII. 4. *p.* 232. *Trew. Ehret. t.* 55.

ſtricta. 24. I. foliolis oblongis glabris, racemis axillaribus vix pedunculatis, caule fruticoſo erecto. *Suppl. p.* 334.

Anil. 25. I. foliolis lanceolatis, racemis brevibus, caule ſuffruticoſo. *Mant. p.* 272. *Sloan. jam.* 2. *t.* 176. *f.* 3.

anguſtifolia. 26. I. foliolis linearibus, racemis elongatis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 272.

hirſuta. 27. I. hirſuta, caule erecto, floribus ſpicatis, leguminibus pendulis lanatis. *Rheed. h. malab.* I. *t.* 30.

dendroides. 28. I. foliolis oblongis, racemis axillaribus multifloris, caule erecto herbaceo. *Jacq. coll.* 2. *p.* 357. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 70.

hendecaphylla. 29. I. foliolis obovatis obtuſis integerrimis, ſpicis axillaribus ſolitariis pedunculatis, caulibus proſtratis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 359. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 71.

caroliniana. 30. I. leguminibus gibbis, racemis axillaribus folio longioribus, radice perenni. *Walt. flor. carol. p.* 187.

argentea. 31. I. foliis ſimplicibus ternatis pinnatisque ſericeis, leguminibus toruloſis pendulis. *Mant. p.* 273.

890. GALEGA. *Cal.* dentibus ſubulatis, ſubæqualibus. *Legumen* ſtriis obliquis, ſeminibus interjectis.

tinctoria. 1. G. leguminibus ſtrictis pendulis, ſpicis lateralibus pedunculatis, foliolis emarginatis ſubtus villoſis.

caribæa. 2. G. leguminibus ſtrictis glabris pendulis racemoſis, foliolis glabris mucronatis, caule fruticoſo. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 193.

cinerea. 3. G. leguminibus ſtrictis patentibus pedunculatis, racemis oppoſitifoliis, foliolis mucronatis ſubtus villoſis. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 72.

pallens. 4. G. leguminibus ſtrictis patentibus ciliatis, ſtipulis ſubulatis, foliolis oblongis acutis ſubtus pubeſcentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 70.

officinalis. 5. G. leguminibus ſtrictis erectis, foliolis lanceolatis ſtriatis nudis. *Mill. h. angl. t.* 133. *Blackw. herb. t.* 92.

maxima. 6. G. leguminibus ſtrictis aſcendentibus glabris, ſtipulis lanceolatis, foliolis oblongis glabris ſtriatis. *Burm. zeyl. t.* 108. *f.* 2.

purpurea. 7. G. leguminibus ſtrictis aſcendentibus glabris racemoſis terminalibus, ſtipulis ſubulatis, foliolis oblongis glabris. *Burm. zel. t.* 33.

piſcatoria. 8. G. leguminibus ſtrictis aſcendentibus ſubvilloſis, pedunculis ancipitibus, ſtipulis ſubulatis, foliolis oblongis obtuſis ſubtus ſubpiloſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 71.

ochroleuca. 9. G. leguminibus linearibus glaberrimis compreſſis erectis, foliolis obovatis integerrimis ſubpetiolatis, pedunculis axillaribus ſuperne racemoſis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 79.

ſtricta. 10. G. leguminibus rectis villoſis, racemis oppoſitifoliis, ſtipulis ſubulatis, foliolis villoſis oblongis, vexillis ſupra ſericeis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 70.

pulchella. 11. G. leguminibus rectis teretibus villoſis, ſtipulis linearibus, foliolis plurimis acuminatis, acumine reflexo. *Scop. del. inſ.* 1. *p.* 3. *t.* 2.

ſenticoſa. 12. G. leguminibus binis lateralibus glabris, foliolis emarginatis ſubtus ſericeis, caule fruticoſo.

littoralis. 13. G. villoſo-tomentoſa, leguminibus racemoſis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 192.

villoſa. 14. G. leguminibus retrofalcatis villoſis pendulis racemoſis lateralibus, foliolis ſubtus ſericeis cuneiformibus. *Pluckn. alm. t.* 59. *f.* 6. *β*) *Burm. zeyl. t.* 33.

daurica. 15. G. leguminibus retrofalcatis linearibus pubeſcentibus erectis ſpicatis, foliolis lanceolatis ſubpetiolatis albopiloſis. *Pallas it.* 3. *p.* 742. *t.* W. *f.* 1.

virginiana. 16. G. leguminibus retrofalcatis compreſſis villoſis ſpicatis, calicibus lanatis, foliolis ovali-oblongis acuminatis. *Pluckn. alm. t.* 23. *f.* 2.

ſpinoſa. 17. G. leguminibus retrofalcatis ſolitariis compreſſis, ſtipulis ſpineſcentibus, foliolis cuneiformibus canis, caule diffuſo. *Suppl. p.* 335.

coerulea. 18. G. racemis terminalibus multifloris coarctatis, foliolis ſubdecemjugis ellipticis, caule ſcabro. *Suppl. p.* 335.

capenſis. 19. G. racemis paucifloris oppoſitifoliis, leguminibus linearibus rectis villoſis, foliolis ſubquinquejugis oblongis integerrimis, caule procumbente ſuffruticoſo. *Jacq. coll.* 2. *p.* 292.

filiformis. 20. G. racemis axillaribus ſolitariis filiformibus, floribus ſubternis, leguminibus linearibus compreſſis retrofalcatis transverſim rugoſis, foliis ternatis integerrimis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 348. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 73.

longifolia. 21. G. racemis axillaribus ſolitariis erectiuſculis, floribus geminis, leguminibus linearibus compreſſis rectis villoſis, foliis ternatis integerrimis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 349.

ſpicata. 22. G. ſpicis longis terminalibus. *Walt. flor. carol. p.* 188.

FALCATA. *Cal.* 4dentatus. *Stilus* adſcendens. *Legumen* oblongum, compreſſum, falcatum, utraque acuminatum.

caroliniana. 1. FALCATA. *Walt. flor. carol. p.* 188.

891. PHACA. *Legumen* ſemibiloculare. *Filamentum* ſolitarium teres.

* *caulescentes.*

ſibirica. 1. Ph. foliolis quaternis lanceolatis obtuſis ſericeis, calice villoſo, dentibus ſetaceis. *Suppl. p.* 365. *Pallas it.* 3. *t.* Aa. *f.* 2.

trifoliata. 2. Ph. foliis ternatis ovalibus obtuſis, leguminibus ſemiorbiculatis. *Mant. p.* 270.

auſtralis. 3. Ph. caule ramoſo proſtrato, foliolis lanceolatis, corollarum alis ſemibifidis. *Mant. p.* 123. *Till. h. piſ. t.* 14. *f.* 1.

arenaria. 4. Ph. caule patulo glabro, leguminibus glabris ovato-inflatis, foliis pinnatis. *Pallas it.* 3. *p.* 748. *t.* Cc. *f.* 1. 2.

alpina. 5. Ph. caule erecto glabro, leguminibus oblongis inflatis ſubpiloſis. *Flor. dan. t.* 856.

ſalſula. 6. Ph. caule erecto caneſcente, foliis pinnatis, leguminibus pedunculatis globoſis cernuis. *Suppl. p.* 336. *Pallas it.* 3. *t.* Bb. *f.* 1. 2.

bœtica. 7. Ph. caule erecto piloſo, leguminibus tereti-cymbiformibus.

** *ſubacaules.*

oxyphylla. 8. Ph. leguminibus ovato-inflatis extrinſecus piloſis, foliolis tomentoſis ſubquaternis. *Pallas it.* 3. *p.* 743. *t.* X. *f.* 2.

ſilvatica. 9. Ph. leguminibus inflatis, fuſco-piloſis, foliis pinnatis longe piloſis. *Pallas it.* 3. *p.* 744. *t.* W. *f.* 2.

*** *acaules.*

veſicaria. 10. Ph. glabra, calicibus fructiferis ovalibus inflatis, foliolis lanceolatis. *Mant. p.* 123. *Schreb. dec.* 9. *t.* 7.

incana. 14. Ph. incana, calicibus fructiferis ovatis inflatis villoſis, foliolis oblongis obtuſis. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 57.

proſtrata. 11. Ph. foliolis binatis linearibus ſericeis, ſcapo procumbente, calice villoſo, dentibus lanceolatis brevibus. *Suppl. p.* 336. *Pallas it.* 3. *t.* Y. *f.* 2.

micro- phylla. 12. Ph. foliolis binatis ovatis obtuſis villoſis, calice imbricato piloſo, dentibus undique hiſpidis. *Suppl. p.* 337. *Pallas it.* 3. *t.* X. *f.* 1.

murica- ta. 13. Ph. foliolis ſubquaternis lineari-ſubulatis ſubtus muricatis, calice glabro, dentibus ciliatis. *Suppl. p.* 337. *Pallas it.* 3. *t.* Aa. *f.* 1.

892. ASTRAGALUS. *Capſula* (plurimis) 2locularis, gibba. *Filamentum* ſolitarium teres.

* *caulescentes.*

† *caule herbaceo.*

†† *erecto.*

alopecu- roides. 1. A. ſpicis cylindricis ſubſeſſilibus, calicibus leguminibusque lanatis. *Mill. h. angl. t.* 58.

melilotoi- des. 2. A. ſpicis terminalibus nudis, caulibus ſtriatis, leguminibus erectis didymo-ſubtriquetris tranſverſim ſtriatis. *Pallas it.* 3. *p.* 748. *t.* Dd. *f.* 1. 2.

bohemi- cus. 3. A. ſpicis laxis longe pedunculatis, caule ramoſo. *Jo. Mayer. bohem. Abh.* 3. 1787. *p.* 314. *t.* 1.

piloſus. 4. A. floribus ſpicatis, leguminibus ſubulatis cauleque piloſis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 51.

aſper. 5. A. floribus ſpicatis in pedunculis elongatis, caule ſtricto lævi ſubaſpero, leguminibus oblongis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 335. *ſl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 33.

carolinia- nus. 6. A. pedunculis ſpicatis, caule lævi, leguminibus ovato-cylindricis ſtilo acuminatis. *Dill. h. Elth. t.* 39. *f.* 45.

vireſ- cens. 62. A. pedunculis multifloris folio longioribus, foliolis lanceolatis acutis, leguminibus recurvatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 73.

uliginoſus. 7. A. floribus ſpicatis, leguminibus erectiuſculis nudis tumidis tereti-depreſſis, mucrone reflexo. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 17. 18.

Onobrychis. 8. A. floribus ſpicatis, vexillis duplo longioribus, ſtipulis ſolitariis, caule pubeſcente. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 38. β) Aſtragalus tenuifolius. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 499.

capitatus. 9. A. capitulis globoſis, pedunculis longiſſimis, foliolis emarginatis.

peregrinus. 63. A. ſpicis pedunculatis foliorum longitudine, leguminibus arcuatis lanuginoſis ſtilatis. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 57.

chriſtianus. 10. A. floribus glomeratis ſubſeſſilibus ex omnibus axillis foliaceis. *Tournef. it.* 2. *p.* 254. *ic.*

ſinenſis. 11. A. floribus racemoſis pendulis, caule ſtricto glabro, leguminibus ovatis inflatis utrinque mucronatis. *Linn. dec.* 1. *t.* 3.

galegiformis. 12. A. floribus racemoſis pendulis, caule ſtricto glabro, leguminibus triquetris utrinque mucronatis. *Legumen.*

falcatus. 64. A. glaber, leguminibus racemoſis pendulis falcatis. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 58.

ſulcatus. 13. A. caule glabro ſtricto ſtriato, foliolis lineari-lanceolatis acutis, leguminibus triquetris. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 40. *Legumen æquale.*

arenarius. 14. A. caule ramoſo tomentoſo albo, foliolis complicatis, pedunculis ſubquadrifloris. *Raj. angl.* 3. *t.* 12. *f.* 3.

deflexus. 15. A. ramis ſpiciferis nudis folio longioribus, foliolis leguminibuſque retrorſum vergentibus. *Pall. act. Petrop.* 1779. 2. *p.* 260. *t.* 15.

microphyllus. 16. A. caule erecto-patulo, foliolis ovalibus, calicibus tumidiuſculis, leguminibus ſubrotundis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 19.

†† *caule adſcendente.*

hians. 17. A. pedunculis erectis racemoſis, leguminibus pendulis villoſis anterius hiantibus. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 87.

††† *caule diffuſo.*

canadenſis. 18. A. leguminibus ſubcylindricis mucronatis, foliolis nudiuſculis. *Mant. p.* 449. *Dodart. mem. t.* 65.

annularis. 19. A. leguminibus ſubulatis incurvis glabris, foliolis obovatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 139.

barbatus. 65. A. hirſutiſſimus, floribus capitatis, pedunculis folia ſubæquantibus. *Vahl ſymb. botan.* 1. *p.* 58.

Stella. 20. A. capitulis pedunculatis lateralibus, leguminibus rectis ſubulatis mucronatis. *Pluckn. phyt.* 79. *f.* 4.

Glaux. 21. A. capitulis pedunculatis imbricatis ovatis, floribus erectis, leguminibus ovatis calloſis inflatis. *Cluſ. hiſt.* 2. *p.* 241. *ic.*

ſeſameus. 22. A. capitulis ſubſeſſilibus lateralibus, leguminibus erectis ſubulatis acumine reflexis. *Pluckn. alm. t.* 79. *f.* 3.

++++ *caule procumbente.*

hamoſus. 23. A. leguminibus ſubulatis recurvatis glabris, foliolis obcordatis ſubtus villoſis. *Mant. p.* 449. *Riv. tetrap. t.* 221.

contortuplicatus. 24. A. leguminibus contortuplicatis canaliculatis villoſis. *Haller act. goett.* 2. *t.* 11. *Legumen.*

bœticus. 25. A. leguminibus priſmaticis rectis triquetris apice uncinatis, ſpicis pedunculatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 9. *f.* 11.

Laxmanni. 26. A. leguminibus oblongis trigonis fuſco exaratis mucronatis villoſis, ſpicis elongatis. *Suppl. p.* 337. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 37.

alpinus. 27. A. leguminibus piloſis utrinque acutis, floribus pendulis racemoſis. *Flor. dan. t.* 51. *an ad phacam potius referendus ?*

hiſpidus. 78. A. leguminibus foliolisque ovato-oblongis hiſpidis, corollis calice brevioribus. *La Billardiere ic. pl. ſyr. rar. dec.* 1. *p.* 18. *t.* 8.

ſyriacus. 28. A. leguminibus ovato-oblongis tomentoſis, capitulis pedunculatis, floribus reflexis.

pentaglottis. 29. A. leguminibus capitatis replicatis compreſſis connniventibus criſtatis, acumine reflexo. *Mant. p.* 274. *Riv. tetrap.* 223. *f.* 2.

epiglottis. 30. A. leguminibus capitatis ſeſſilibus cernuis cordatis mucronatis replicatis nudis. *Mant. p.* 274. *Riv. tetrap.* 223. *f.* 1.

danicus. 31. A. decumbens hirtus, capitulis longe pedunculatis, leguminibus brevibus inflatis piloſis. *Flor. dan. t.* 614.

hypoglottis. 32. A. proſtratus, leguminibus capitatis ovatis replicatis compreſſis piloſis, acumine reflexo. *Mant. p.* 474.

Cicer. 33. A. proſtratus leguminibus ſubgloboſis inflatis mucronatis piloſis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 251.

Digitized by Google

glycyphyllos. 34. A. proſtratus, leguminibus ſubtriquetris arcuatis, foliolis ovalibus pedunculis longioribus. *Rivin. tetrap. t.* 103.

auſtriacus. 35. A. proſtratus glaber ſtriatus debilis, foliolis ſublinearibus emarginatis, leguminibus teretibus. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 195.

leontinus. 36. A. proſtratus leguminibus ovatis villoſis, floribus ſpicatis erectis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 59. *rar. pl. ic. cent.* 1. *t.* 37.

ſinuatus. 76. A. ſpicis pedunculatis, calicibus fructiferis ovalibus inflatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 59.

ſinicus. 37. A. umbellis pedunculatis, leguminibus erectis priſmaticis triquetris apice ſubulatis. *Mant. p.* 103.

† † *caule lignoſo.*

cornutus. 38. A. ſuffruticoſus ſtrictus, ſpica brevi terminali, leguminibus ſubtriquetro-teretibus acutis. *Pallas it.* 1. *p.* 500. *an phacæ potius ſpecies ?*

Ammodytes. 39. A. ſuffruticoſus, floribus geminis, leguminibus ovatis didymis lanatis. *Suppl. p.* 338. *Pallas it.* 2. *t.* X.

emarginatus. 79. A. ſcapis longiſſimis, capitulis globoſis, leguminibus capitatis. *La Billardiere ic. pl. rar. dec.* 1. *p.* 19. *t.* 9.

compactus. 40. A. fruteſcens, floribus glomerato-capitatis, petiolis ſpineſcentibus, foliolis mucronatis. *Vahl ſymb. bot. p.* 65.

lagopodioides. 67. A. fruteſcens, petiolis ſpineſcentibus, foliolis apice ſpinoſis, floribus ſpicatis. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *p.* 64.

Tragacantha. 68. A. fruteſcens, ſpicis pedunculatis longitudine foliorum, petiolis ſpineſcentibus. *Dalech. hiſt. pl.* 1478. *f.* 1.

Parterium. 69. A. fruteſcens, floribus axillaribus ſeſſilibus, petiolis ſpineſcentibus, leguminibus magnitudine calicis. *Moriſ. h. pl. univ.* 2. *p.* 113. *f.* 1. *t.* 13. *f.* 2.

Rauwolfii. 41. A. arboreſcens, petiolis ſpineſcentibus, floribus ſubſolitariis pedunculatis, calicibus fructiferis inflatis villoſis *Ruſſel h. nat. Alepp. tab.* 5.

** *ſubcauleſcentes.*

tragacanthoides. 42. A. floribus radicalibus numeroſis ſubſeſſilibus. *Buxb. cent.* 3. *t.* 38. *f.* 2.

trimeſtris. 43. A. ſcapis ſubbifloris, leguminibus hamatis ſubulatis bicarinatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 174.

laguroides. 52. A. ſcapis ſubſolitariis hiſpidis folia ſubæquantibus, floribus confertim ſpicatis, leguminibus falcatis piloſis. *Pallas it. 3. p. 750. t. Cc. f. 3.*

daſyanthus. 53. A. lanuginoſus, ſcapis folia æquantibus, floribus capitatis, leguminibus ſubtriquetris villoſis. *Pallas it. 3. p. 749. t. G. g*. f. 1. A. b.*

phyſodes. 54. A. ſcapis folia æquantibus, leguminibus inflatis ſubgloboſis nudis.

depreſſus. 55. A. ſcapis folio brevioribus, leguminibus cernuis, foliolis ſubemarginatis nudis.

lupulinus. 56. A. ſcapis ſulcato-angulatis folio brevioribus, floribus ſpicatis, calicibus hirſutiſſimis, leguminibus ovato-compreſſis. *Pallas it. 3. p. 750.*

lanatus. 80. A. ſcapo nudo longitudine foliorum villoſorum, leguminibus lanatis denſe ſpicatis ſemicordatis triquetris ſubulatis. *La Billardiere ic. pl. ſyr. rar. dec. 1. p. 21. t. 10.*

monſpeſſulanus. 57. A. ſcapis declinatis longitudine foliorum, leguminibus ſubulatis teretibus ſubarcuatis glabris. *Mant. p. 450.*

latifolius. 77. A. ſcapis declinatis foliis longioribus, leguminibus teretibus rectis, foliis ſimplicibus compoſitiſque. *Vahl ſymb. bot. 1. p. 61.*

incanus. 58. A. ſcapis declinatis, foliolis tomentoſis, leguminibus ſubulatis ſubarcuatis incanis apice incurvis. *Mant. p. 450.*

campeſtris. 59. A. ſcapo decumbente, calicibus leguminibuſque villoſis, foliolis lanceolatis acutis. *Haller hiſt. ſtirp. Helv. t. 13.*

leptophyllus. 60. A. ſcapis proſtratis, leguminibus pubeſcentibus inflatis ovato-mucronatis unilocularibus. *Pallas it. 3. p. 749. t. X. f. 3. B. Nonne potius phacæ ſpecies?*

ſpicatus. 61. A. ſcapis tomentoſis, floribus ſpicatis. *Pallas it. 2. p. 742. t. W. an diſtincta ſpecies?*

893. BISERRULA. *Capſula* 2locularis plana, diſſepimento contrario.

Pelecinus. 1. BISERRULA. *Giſeck. ic. faſc. 1. t. 17.*

894. PSORALEA. *Calix* punctis calloſis aſperſus, longitudine *leguminis* 1ſpermis.

* *foliis nullis.*

aphylla. 1. Pſ. ſtipulis mucronatis breviſſimis verſus flores ſubimbricatis. *Mant. p.* 450. *Breyn. cent. t.* 25.

** *foliis ſimplicibus.*

coryli-folia. 2. Pſ. foliis ovatis ſubdentatis, ſpicis ovatis. *Burm. ind. t.* 49. *f.* 2. *Semina nuda.*

rotundi-folia. 3. Pſ. foliis ovatis integerrimis, capitulis bracteiſque villoſis. *Suppl. p.* 33?.

*** *foliis ſimplicibus ternatiſque.*

capitata. 4. Pſ. foliolis linearibus, capitulo terminali. *Suppl. p* 339.

tenuifolia. 5. Pſ. foliis inferioribus ternatis, ſuperioribus ſimplicibus lanceolato-ſubulatis. *Mant. p.* 450.

**** *foliis ternatis.*

lutea. 6. Pſ. foliis faſciculatis, foliolis ovatis rugoſis, ſpicis pedunculatis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 139.

ſtachydis. 7. Pſ. foliis petiolatis, foliolis oblongis mucronatis, ſpicis terminalibus interruptis, calicibus villoſis. *Suppl. p.* 338.

ſpicata. 8. Pſ. foliolis oblongis obtuſis, ſpicis cylindricis. *Mant. p.* 264.

aculeata. 9. Pſ. foliolis cuneiformibus recurvo-mucronatis, capitulis terminalibus. *Mant. p.* 450.

decum-bens. 25. Pſ. foliolis cuneiformi-lanceolatis, mucrone recurvato, floribus axillaribus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 80.

bractea-ta. 10. Pſ. foliolis obovatis recurvato-mucronatis, ſpicis ovatis. *Mant. p.* 264. *Sp. pl. p.* 1085. Trifolium fruticans. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 106.

hirta. 11. Pſ. foliolis obovatis recurvato-mucronatis, floribus ternis ſubſeſſilibus.

repens. 12. Pſ. foliolis obovatis emarginatis, caule repente, floribus ſubumbellatis. *Mant. p.* 265.

palæſti-na. 13. Pſ. foliolis ovatis, petiolis pubeſcentibus, floribus capitatis. *Suppl. p.* 339. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 184.

14. Pſ.

americana. 14. Pſ. foliolis ovatis dentato-angulatis, ſpicis lateralibus. *Lol. ic. 2. p. 31. Pericarpium huic et 16. et 20. 1loculare.*

tetragonoloba. 15. Pſ. foliolis dentatis, caule flexuoſo, ſpicis lateralibus, leguminibus ſtriatis quadrangularibus. *Mant. p. 104. an hujus generis?*

glanduloſa. 16. Pſ. foliolis lanceolatis, petiolis ſcabris, floribus ſpicatis. *Regn. bot. t. 360. an. ſatis diſtincta ab americana?*

bituminoſa. 17. Pſ. foliolis lanceolatis, petiolis lævibus, floribus capitatis. β) *Besl. h. eyſt. æſt. t. 11. f. 2.*

axillaris. 18. Pſ. foliolis lanceolatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Suppl. p. 338.*

***** *foliis quinatis.*

pentaphylla. 19. Pſ. foliis digitatis, foliolis inæqualibus. *B. Juſſ. act. pariſ. 1744. t. 17.*

****** *foliis pinnatis.*

pinnata. 20. Pſ. foliolis linearibus, floribus axillaribus. *Herm. par. lugdb. p. 273. ic.*

leporina. 26. Pſ. foliolis oblongo-linearibus numeroſiſſimis, ſpicis ebracteatis villoſis lanceolatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 81.*

folioloſa. 27. Pſ. foliolis oblongis numeroſis, ſpicis terminalibus bracteatis globoſo-ovatis, calicibus compreſſis. *Ait. hort. Kew 3. p. 82.*

enneaphylla. 21. Pſ. ſpicis axillaribus. *Mant. p. 450. Pluckn. alm. t. 166. f. 2.*

Dalea. 22. Pſ. ſpicis cylindricis terminalibus. *Hort. Cliff. t. 22.*

lævigata. 23. Pſ. ſtipulis ſolidis ſubacutis minutiſſimis. *Suppl. p. 339.*

******* *foliis ſupradecompoſitis.*

proſtrata. 24. Pſ. foliis digitatis linearibus.

896. TRIFOLIUM. *Flores* ſubcapitati. *Capſula* vel *Legumen* vix calice longius, non dehiſcens, deciduum.

* *capſulis ſubpolyſpermis nudis*, *1locularibus*, Meliloti.

M. ornithopodioides. 1. Tr. capſulis octoſpermis ſubternis, calicibus duplo longioribus, caulibus declinatis. *Flor. dan. t.* 368.

M. indica. 2. Tr. capſulis racemoſis monoſpermis, caule erecto. *Pluckn. alm. t.* 45. *f.* 4. 5.

meſſanenſe. 3. Tr. capſulis racemoſis monoſpermis arcuato-ſtriatis ſemiovatis acutis, caule erecto. *Mant. p.* 275. *Suppl. p.* 339. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 16. *f.* 9.

M. polonica. 4. Tr. capſulis racemoſis diſpermis lanceolatis, caule erecto.

M. officinalis. 5. Tr. capſulis racemoſis ſubdiſpermis acutis rugoſis, caule erecto. *Blackw. herb. t.* 80.

M. italica. 6. Tr. capſulis racemoſis nudis diſpermis rugoſis obtuſis, caule erecto, foliolis integris. *Camer. hort. t.* 29.

M. cretica. 7. Tr. pericarpiis racemoſis diſpermis compoſitis membranaceis caule, erectiuſculo. *C. Bauh. prodr. th. bot. p.* 142. *ic.* P.

M. cærulea. 8. Tr. racemis ovatis, leguminibus ſeminudis mucronatis, caule erecto, ſpicis oblongis. *Blackw. herb. t.* 284.

* * *leguminibus polyſpermis*, *tectis*, Lotoidea.

Lupinaſter. 9. Tr. capitulis dimidiatis, foliis quinatis ſeſſilibus, leguminibus polyſpermis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 6. *f.* 1.

reflexum. 10. Tr. capitulis fructiferis reflexis, leguminibus ſubtriſpermis.

ſtrictum. 11. Tr. capitulis globoſis, leguminibus diſpermis, calicibus longitudine corollæ, foliolis ſerrulatis, ſtipulis rhombeis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 25. *f.* 7.

comoſum. 12. Tr. capitulis umbellato-globoſis imbricatis: vexillis deflexis perſiſtentibus, leguminibus tetraſpermis

---

Trifolii *character*, *utut genus habitu facillimum*, *difficillime eruitur. Infloreſcentia ejus varia: racemoſa*, *umbellata*, *faſciculata*, *capitata*, *ſpicata.*

ceſpitoſum. 13. Tr. capitulis umbellato-globoſis, leguminibus ſubtetraſpermis, ſurculis repentibus, foliis exſtipulatis. *Regnier Mag. Naturk. Helv. 2. p. 78. ic. an ſatis diſtinctum a repente?*

repens. 14. Tr. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente. *Curt. flor. Lond. t.* 193.

hybridum. 15. Tr. capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule adſcendente. *Rivin. tetrap. t.* 127. *f.* 3.

alpinum. 16. Tr. capitulis umbellaribus, ſcapo nudo, leguminibus diſpermis pendulis, foliolis lineari lanceolatis. *Pon. bald. p.* 340. *ic.*

hedyſarioides. 17. Tr. pedunculis ſubumbellatis ſerioribus ſubunifloris, foliis ſubtus pubeſcentibus ſpinula terminatis, calicibus fructiferis pungentibus. *Pall. it.* 3. *p.* 751. *t.* Dd. *f.* 3. A.

*** *calicibus villoſis*, Lagopoda.

ſubterraneum. 18. Tr. capitulis villoſis quinquefloris, coma centrali reflexa rigida fructum obvolvente. *Curt. flor. Lond. t.* 128.

globoſum 19. Tr. capitulis villoſis globoſis, calicibus ſuperioribus floſculo deſtitutis.

Cherleri. 20. Tr. calicibus villoſis globoſis terminalibus ſolitariis: calicibus omnibus fertilibus, caulibus procumbentibus, foliolis obcordatis. *Mant. p.* 451. *Barr. pl. rar. ic.* 859.

glaciale. 21. Tr. capitulis villoſis globoſis terminalibus bracteatis, foliolis cordato ovatis villoſis, ſtipulis cordatis, caule decumbente. *Regnier Mag. Naturk. Hel.* 2. *p.* 81. *an diſtinctum ſatis a Tr. Cherleri ?*

glomeratum. 22. Tr. capitulis ſeſſilibus hemiſphæricis rigidis, calicibus ſtriatis patulis æqualibus. *Curt. flor. Lond. t.* 227.

ſcabrum. 23. Tr. capitulis ſeſſilibus lateralibus ovatis, calicis laciniis inæqualibus rigidis recurvis. *Vaill. flor. pariſ. t.* 33. *f.* 1.

ſtriatum. 24. Tr. capitulis ſeſſilibus ſublateralibus ovatis, calicibus ſtrictis rotundatis. *Vaill. flor. pariſ. t.* 33. *f.* 2.

alexandrinum. 25. Tr. capitulis oblongis pedunculatis, caule erecto, foliis oppoſitis.

ſquarroſum. 26. Tr. ſpicis oblongis ſubpiloſis, calicum infimo dente longiſſimo reflexo, caule herbaceo erecto. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 13. *f.* 1.

incarnatum. 27. Tr. ſpicis oblongis obtuſis villoſis aphyllis, foliolis ſubrotundis crenatis. *Rivin. tetrap. t.* 77. *Mill. h. angl. t.* 267. *f.* 2.

anguſtifolium. 28. Tr. ſpicis conico-oblongis villoſis, dentibus calicinis ſetaceis ſubæqualibus, foliolis linearibus. *Barr. pl. rar. ic. t.* 698.

pannonicum. 29. Tr. ſpicis longis villoſis, corollis monopetalis, foliolis integerrimis cauleque erecto villoſiſſimis. *Mant. p.* 276. *Jacq. obſ. bot.* 2. *t.* 42.

rubens. 30. Tr. ſpicis longis villoſis, corollis monopetalis, caule erecto, foliolis ſerrulatis. *Jacq, flor. auſtr.* 4. *t.* 385.

arvenſe. 31. Tr. ſpicis ovalibus villoſis, calicis dentibus ſetaceis villoſis æqualibus. *Flor. dant. t.* 724.

albidum. 32. Tr. ſpicis ovalibus piloſis pedunculatis ebracteatis, calicibus patulis, caule diffuſo, foliolis ovatis. *Retz. obſ. bot.* 4. *p.* 30.

clypeatum. 33. Tr. ſpicis ovatis, calicibus patulis, lacinia infima maxima lanceolata, foliolis ovatis. *Alpin. exot. t.* 306.

ſtellatum. 34. Tr. ſpicis ovatis piloſis, calicibus patulis, caule diffuſo, foliolis obcordatis. *Barr. pl. rar. ic.* 755. & 860.

lappaceum. 35. Tr. ſpicis ſubovatis, calicis dentibus ſetaceis hiſpidis, caule patulo, foliolis ovatis.

flexuoſum. 36. Tr. ſpicis ſubgloboſis villoſis terminalibus, caule adſcendente flexuoſo ramoſiſſimo, foliolis ovato-lanceolatis ſerrulatis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 314.

alpeſtre. 37. Tr. ſpicis ſubgloboſis villoſis terminalibus, caule erecto, foliolis lanceolatis ſerrulatis. *Flor. dan. t.* 662. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 433.

pratenſe. 38. Tr. ſpicis globoſis ſubvilloſis cinctis ſtipulis oppoſitis membranaceis. *Blackw. herb. t.* 20. *β*?) Trifolium odoratum. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 286.

ochroleucum. 39. Tr. ſpicis villoſis, caule erecto pubeſcente, foliolis infimis obcordatis. *Jacq. flor. auſt.* 1. *t.* 40.

uniflorum. 40. Tr. acaule, pedunculis trifidis ſubtriflorifque ſtipula brevioribus. *Buxb. cent.* 3. *t.* 31. *f.* 12.

**** *calicibus inflatis ventricoſis*, Veſicaria.

bicorne. 41. Tr. capitulis globoſis pedunculatis axillaribus, caule repente, floribus reſupinatis, calicibus fructiferis inflatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 139.

tomen- toſum. 42. Tr. ſpicis ſeſſilibus globoſis tomentoſis, calicibus inflatis obtuſis. *Magn. monſp. p.* 264. *ic.*

reſupi- natum. 43. Tr. ſpicis ſubovatis, corollis reſupinatis, calicibus inflatis dorſo gibbis, caulidus proſtratis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 872.

ſpumo- ſum. 44. Tr. ſpicis ovatis, calicibus inflatis glabris quinquedentatis, involucris univerſalibus pentaphyllis.

læviga- tum. 45. Tr. ſpicis glabris pedunculatis ovalibus, dentibus calicis ſetaceis, caule foliiſque glaberrimis. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 219.

pſoralioi- des. 56. Tr. ſpicis ovatis bracteatis imbricatis, bracteis cordatis, leguminibus rotundatis. *Walt. flor. carol. p.* 184.

fragife- rum. 46. Tr. capitulis ſubrotundis, calicibus fructiferis reflexis, labio ſuperiore inflato bidentato, caule repente. *Curt. flor. Lond. t.* 95.

***** *vexillis corollæ inflexis*, Lupulina.

monta- num. 47. Tr. ſpicis ſubimbricatis ſubtribus, vexillis ſubulatis emarceſcentibus, calicibus nudis, caule erecto. *Rivin. tetrap. t.* 12.

agrarium. 48. Tr. ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calicibus ſubpubeſcentibus, ſtipulis cordatis ciliatis, foliolo impari petiolato, caule diffuſo. *Curt. flor. Lond. t.* 161.

aureum. 49. Tr. ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calicibus nudis, ſtipulis lanceolatis nudis, foliolo impari ſeſſili, caule erecto. *Pollich. flor. pal. n.* 708. *an diſtinctum ab agrario?*

ſpadi- ceum. 50. Tr. ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calicibus piloſis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic.* 1024.

procum- bens. 51. Tr. ſpicis ovalibus imbricatis multifloris, vexillis deflexis perſiſtentibus, caulibus procumbentibus firmis hirſutiſſimis. *Raj. angl.* 3. *t.* 14. *f.* 3.

filiforme. 52. Tr. ſpicis ovalibus ſubimbricatis paucifloris, vexillis deflexis perſiſtentibus, caulibus procumbentibus filiformibus pubeſcentibus. *Raj. angl.* 3. *t.* 14. *f.* 4.

ſuffoca- tum. 53. Tr. acaule exſcapum, floribus ſubſeſſilibus radicalibus. *Mant. p.* 276. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 60.

erectum. 54. Tr. ſpicis axillaribus, caule erecto foliiſque tomentoſis, leguminibus diſpermis. *Walt. flor. carol. p.* 184. *an hujus generis?*

ſimplici-folium. 55. Tr. capitulis rotundatis, leguminibus diſpermis, foliis ſimplicibus villoſis, caule decumbente. *Walt. flor. carol. p.* 184. *an hujus generis?*

897. **LOTUS.** *Cal.* tubuloſus. *Alæ.* ſurſum longitudinaliter conniventes. *Legumen* ſtrictum, (plurimis) loculamentoſum.

* *leguminibus tetragonis alatis latis.*

maritima. 1. L. leguminibus ſolitariis, foliis glabris, bracteis lanceolatis. *Flor. dan. t.* 800.

ſiliquoſa. 2. L. leguminibus ſolitariis, foliis ſubtus pubeſcentibus, caulibus procumbentibus. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 361. *Semina ſubgloboſa.*

tetragonoloba. 3. L. leguminibus ſolitariis, bracteis ovatis. *Commel. h. amſt.* 1. *t.* 26.

conjugata. 4. L. leguminibus conjugatis, bracteis oblongo-ovatis.

** *leguminibus cylindricis.*
† *paucioribus.*

tetraphylla. 5. L. leguminibus ſolitariis, foliis ternatis obcordato-cuneatis: ſtipula ſolitaria ſimili, bracteis monophyllis. *Suppl. p.* 340.

edulis. 6. L. leguminibus ſubſolitariis gibbis incurvis. *Alp. exot. t.* 268.

peregrina. 7. L. leguminibus ſubbinatis linearibus compreſſis nutantibus.

anguſtiſſima. 8. L. leguminibus ſubbinatis linearibus ſtrictis erectis, caule erecto, pedunculis alternis.

oligocarpos. 9. L. leguminibus binatis rectis ſtriatis villoſis albo-punctulatis. *Scop. del. inſ.* 1. *p.* 14. *t.* 6.

ornithopodioides. 10. L. leguminibus ſubternatis arcuatis compreſſis, caulibus diffuſis. *Cam. hort. t.* 25. *Legumen nodoſum.*

Jacobæa. 11. L. leguminibus ſubternatis, caule herbaceo erecto, foliolis linearibus. *Mill. h. angl. t.* 168.

cretica. 12. L. leguminibus ſubternatis, caule fruteſcente, foliis ſericeis nitidis. *Pluckn. alm. t.* 43. *f.* 1.

arabica. 13. L. leguminibus ariſtatis, caulibus proſtratis, pedunculis triſloris, bracteis monophyllis. *Mant. p.* 104. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 155.

glauca. 12. L. leguminibus ſubbinatis glabris, foliolis ſubcuneiformibus carnoſis incanis, ſtipulis foliiformibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 92.

⊢ ⊢ *leguminibus pluribus,*
umbellatis.

medicaginoides. 14. L. leguminibus arcuatis, foliolis obcordatis denticulatis. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 23.

arborea. 15. L. leguminibus quinatis, foliolis obcordatis, caule arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 52.

capitatis.

hirſuta. 16. L. capitulis ſubrotundis, caule erecto hirto, leguminibus ovatis. *Moriſ. hiſt. pl. t.* 18. *f.* 14.

græca. 17. L. capitulis ſubrotundis, caule erecto, foliis quinatis, leguminibus ovatis. *Mant. p.* 104.

recta. 18. L. capitulis ſubgloboſis, caule erecto lævi, leguminibus erectis glabris. *Riv. tetrap. t.* 192.

corniculata 19. L. capitulis depreſſis, caulibus decumbentibus herbaceis, leguminibus patentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 107.

citiſoides. 20. L. capitulis dimidiatis, caule diffuſo ramoſiſſimo, foliis tomentoſis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 1031.

Dorycnium. 22. L. capitulis aphyllis, foliis ſeſſilibus quinatis. *Lob. ic.* 51.

898. TRIGONELLA. *Vexillum* et *Alæ* ſubæquales, patentes, forma corollæ 3petalæ.

ruthenica. 1. Tr. leguminibus pedunculatis congeſtis pendulis linearibus rectis, foliolis ſublanceolatis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 8.

platycarpos. 2. Tr. leguminibus pedunculatis congeſtis pendulis ovalibus æqualibus compreſſis, caule diffuſo, foliolis ſubrotundis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 9.

ſtriata. 3. Tr. leguminibus pedunculatis congeſtis erectiuſculis diſtantibus, pedunculis folio longioribus. *Suppl. p.* 340.

polycerata. 4. Tr. leguminibus ſubſeſſilibus congeſtis erectis ſubrectis longis linearibus, pedunculis muticis.

hamoſa. 5. Tr. leguminibus pedunculatis racemoſis declinatis hamoſis teretibus, pedunculis ſpinoſis foliolo longioribus. *Alp. æg. t.* 124.

ſpinoſa. 6. Tr. leguminibus ſubpedunculatis congeſtis declinatis falcatis compreſſis, pedunculis ſpinoſis breviſſimis. *Breyn. cent. t.* 33. *f.* 1.

corniculata. 7. Tr. leguminibus æqualibus pedunculatis congeſtis declinatis ſubfalcatis: pedunculo longo ſubſpinoſo, caule erecto. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 16. *f.* 11.

ſtellata. 8. Tr. leguminibus axillaribus confertis ſeſſilibus rigidis arcuatis in ſtellam expanſis. *Forſk flor. æg. arab. p.* 140.

monſpeliaca. 9. Tr. leguminibus congeſtis ſeſſilibus arcuatis divaricatis inclinatis brevibus, pedunculo mucronato inermi. *Breyn. cent. t.* 33. *f.* 2.

laciniata. 10. Tr. leguminibus pedunculatis ſubumbellatis ellipticis, foliolis cuneiformibus dentatis, ſtipulis laciniatis.

Fœnum græcum. 11. Tr. leguminibus ſeſſilibus ſtrictis erectiuſculis ſubfalcatis acuminatis, caule erecto. *Zorn pl. off. ic. t.* 116. β) Silveſtris, caule baſi ramoſo-ſtolonifero. *Capſula potius ſimplex 1locularis.*

indica. 12. Tr. leguminibus ſeſſilibus ſubſolitariis ſubfalcatis, foliolis integerrimis, caule diffuſo. *Pluckn. alm. t.* 200. *f.* 7.

899. MEDICAGO. *Peſtillum* incurvatum e carina elaſtice exſiliens, eamque deflectens. *Legumen* vel *Pericarpium* compreſſum, arcuatum vel ſpirale.

virginica. 1. M. caule erecto ramoſiſſimo, floribus faſciculatis terminalibus.

arborea. 2. M. pericarpiis unilocularibus lunatis margine integerrimis, caule arboreo. *Lob. ic.* 2. *p.* 46. β) Medicago glabra. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 778.

falcata. 3. M. pedunculis racemoſis, leguminibus lunatis, caule proſtrato. *Flor. dan. t.* 233.

ſativa. 4. M. pedunculis racemoſis, leguminibus anguſtis æqualibus contortis, caule erecto glabro. *Regn. bot. t.* 346.

obſcura. 5. M. pedunculis racemoſis, leguminibus reniformibus integerrimis, caule diffuſo hirto. *Retz. obſ. bot.* 1. *p.* 24. *t.* 1.

circinata. 6. M. pericarpiis bilocularibus reniformibus margine dentatis, foliis pinnatis. *Rinvin. tetrap. t.* 201.

radiata. 7. M. pericarpiis quadrilocularibus reniformibus margine dentatis, foliis ternatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 16. *f.* 3.

lupulina. 8. M. ſpicis ovalibus, pericarpiis reniformibus unilocularibus monoſpermis, caulibus procumbentibus. *Curt. flor. Lond. t.* 120.

Karſtienſis. 9. M. pedunculis axillaribus ſubumbellatis, caule herbaceo erecto, leguminibus cochleatis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 86.

polymorpha. 10. M. pericarpiis duplicatis cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo. *Curt. flor. Lond. t.* 176.

orbicularis. α. M. pedunculis unifloris ariſtatis, leguminibus compreſſis rugoſis nudis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 1.

intertexta. β. M. pedunculis unifloris, leguminibus ſphæricis, ſpinis longioribus divaricatis recurvis. *Knorr del. hort. t.* M. 1. a.

coronata. γ. M. pedunculis ſubbifloris, leguminibus compreſſis ſubſpinoſis, ſtipulis ſubulatis integerrimis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 21.

marginata. δ. M. pedunculis ſubbifloris muticis, leguminibus depreſſis marginatis. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 23.

tuberculata. ε. M. pedunculis bifloris ariſtatis, leguminibus ovato-cylindricis, anfractibus quatuor bituberculatis. *Retz. obſ. bot.* 2. *t.* 23.

muricata. ζ. M. pedunculis multifloris, leguminibus ſubrotundis ſpinoſis incanis, foliis villoſis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 11.

nigra. η. M. pedunculis paucifloris, leguminum hamulis longitudine leguminum. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 19.

arabica. θ. M. pedunculis ſubtrifloris, leguminibus echinatis, foliolis obcordatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 27.

rigidula. ι. M. pedunculis multifloris, leguminibus intenſe aculeatis.

hirſuta. κ. M. pedunculis multifloris, leguminum ſpinulis hamatis, ſtipulis integris.

ſcutellata. λ. M. pedunculis multifloris, leguminibus globoſis inermibus nudis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 4.

ciliaris. μ. M. leguminibus congeſtis globoſis hiſpidis, ſtipulis ciliatis.

minima. ν. M. leguminibus ſubternatis, ſpinulis uncinatis, ſtipulis integris. *Flor. dan. t.* 211.

tornata. 8. M. leguminibus nudis cylindricis apice baſique planiuſculis. *Moriſ. hiſt. pl.* 2. *t.* 15. *f.* 11.

turbinata. 9. M. leguminibus inermibus ſubcylindricis, extremitatibus complanatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 20.

laciniata. 10. M. legumine echinato, foliis linearibus dentatis. *Mant. p.* 454. *Magnol. monſp. p.* 270. ic.

proſtrata. 11. M. leguminibus cochleatis inermibus, foliis ternatis cuneiformibus apice dentatis, ſtipulis ſetaceis integerrimis, caule diffuſo. *Suppl. p.* 340. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 89.

marina. 12. M. pedunculis racemoſis, leguminibus cochleatis ſpinoſis, caule procumbente tomentoſo. *Rivin. tetrap.* 205.

CLASSIS XVII.

POLYADELPHIA.

DECANDRIA.

900. THEOBROMA. *Cal.* 3-5phyllus. *Cor.* 5petala : nectariis 5. *Stam.* 5 : antheris 3. *Piſtill.* 3.

1418. ABROMA. *Piſt.* 5. *Capſ.* 5locularis, 1valvis apice dehiſcens. *Semina* reniformia : *receptaculo* hirſuto.

OMPHALOBIUM. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5. *Capſ.* leguminoſa, pedicellata, 1ſperma.

DODECANDRIA.

1268. MONSONIA. *Cal.* 5phyllus. *Cor.* 5petala. *Stamina* 5: antheris 3. *Piſtillum* 5fidum.

ICOSANDRIA.

901. CITRUS. *Cal.* 5dentatus. *Cor.* 5petala. *Stamina* 20, in cylindrum paſſim connata. *Piſtill.* 1. *Bacca* multilocularis: pulpa veſiculari.

POLYANDRIA.

OCOTEA. *Cal.* 6partitus. *Cor.* 0. *Capſ.* ſupera 4-6locularis polyſperma.

1269. MELALEUCA. *Cal.* 5dentatus, ſuperus. *Cor.* 5petala. *Capſ.* ſemiveſtita calice.

1270. HOPEA. *Cal.* 5fidus, ſuperus. *Cor.* 5petala. *Drupa* nucleo 2loculari.

MORONOBEA. *Cal.* 5partitus. *Cor.* 5petala. *Bacca* 1locularis.

APAMA. *Cal.* 3fidus *Siliqua?*

DURIO. *Cal.* 5fidus, urceolatus, inferus. *Cor.* 5petala, parva. *Stil.* 1. *Stamin.* phalanges 5 ex 7. *Pomum* 5loculare.

1320. GLABRARIA. *Cal.* 5fidus, inferus. *Cor.* 5petala. *Stil.* 1, *Staminum* phalanges 5 ex 6. *Drupa.*

1321. MUNCHHAUSIA. *Cal.* inferus, 6fidus. *Cor.* 6petala. *Capſ.* 2locularis.

677. SYMPLOCOS. *Cal.* 5fidus, ſuperus. *Cor.* 5-8petala. *Stamina* 4plici ſerie corollæ adnata.

902. HYPERICUM. *Cal.* 5partitus, inferus. *Cor.* 5petala. *Stil.* 1, 3, 5. *Capſ.* 3-5locularis.

903. ASCYRUM. *Cal.* 2phyllus, inferus. *Cor.* 4petala. *Stil.* 2. *Capſ.* 2valvis.

DECANDRIA.

900. THEOBROMA. *Cal.* 3-5phyllus. *Petala* 5 fornicata, 2cornia. *Nectarium* 5fidum, regulare. *Stamina* nectario innata, ſing. antheris 2-3. *Bacca* corticata, roſtrata.

Cacao. 1. Th. foliis integerrimis. *Cateſb. Car.* 3. *t.* 6. *Regn. bot. t.* 397.

gujanenſe. 2. Th. foliis ſubdentatis ſubtus tomentoſis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 683. *t.* 275.

Guazuma. 3. Th. foliis ſerratis. *Mant. p.* 455. *Trew Ehret.* 40. *t.* 76. *an monadelphiis accenſendum totum genus?*

1418. ABROMA. *Cal.* 5phyllus. *Petala* 5: unguibus ſuperne anguſtatis, canaliculatis, inferne dilatatis, fornicatis, conniventibus. *Nectarium* campanulatum, 5fidum: laciniis obcordatis erectis, apice recurvis. *Antheræ* 15 ſeſſiles, ternæ. *Stil.* 5. *Capſ.* 5alata, 5roſtrata, 5locularis, polyſperma.

auguſtum. 1. A. foliis cordatis ſeptangulis. *Suppl. p.* 341. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 1. *Gærtn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 64. *f.* 1.

Wheleri. 2. A. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſubdentatis. *Koenig ap. Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 27.

OMPHALOBIUM *Cal.* 5phyllus, perſiſtens, longitudine ſtaminum. *Petala* 5: *unguibus linearibus. Capſ.* leguminoſa, pedicellata 1-ſperma.

Indicum. 1. OMPHALOBIUM. *Gærtn de fr. & ſem. cent.* 3. *t.* 46. *f.* 3.

DODECANDRIA.

1268. MONSONIA. *Cal.* 5partitus, perſiſtens. *Cor.* 5petala. *Stamina* 15 ſubtus coalita in urceolum breviſſimum, in 5 lacinias oblongas partitum, ſingulas terminatas filamentis 3 antheriferis. *Stil.* 5fidus. *Capſ.* 5gona, 5locularis.

lobata. 1. M. foliis ovato-cordatis ſublobatis, calicibus muticis. *Montin act. gotheb.* 2. *t.* 1.

filia. 2. M. foliis ſimplicibus cordatis lobatis, *Suppl. p.* 341. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 74. *f.* 2.

ſpecioſa. 3. M. foliis quinatis foliolis bipinnatis. *Mant. p.* 105. *Suppl. p.* 342. *Cavanill. diſſ.* 3. *t.* 74. *f.* 1. *an hoc genus potius inter monadelphas militat?*

ICOSANDRIA.

901. CITRUS. *Cal.* 5fidus. *Petala* 5 oblonga. *Antheræ* 20, filamentis connatis in varia corpora. *Bacca* 9locularis.

chilenſis. 1. C. foliis ſeſſilibus acuminatis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 147.

ſpinoſa. 2. C. foliis ſubſeſſilibus utrinque inciſis, fructu oblongo rugoſo tuberculato. *S. G. Gmelin it.* 3. *p.* 108. *t.* 21-23.

Medica. 3. C. foliis petiolatis: petiolis linearibus. *Blackw. herb. t.* 361. *Regn. bot. t.* 232. *β) Knorr del. hort.* 1. *t.* C. 1.

Auranti-um. 4. C. petiolis alatis, foliis acuminatis. *Knorr. del. hort.* 1. *t.* P. 4.

decuma-na. 5. C. petiolis alatis, foliis obtuſis emarginatis. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 24. *f.* 2.

japonica. 6. C. petiolis alatis, foliis acutis, caule fruticoſo. *Thumb. flor. jap. p.* 292.

OCOTEA. *Cal.* 6partitus inæqualis. *Cor.* o. *Filamenta* 9 : ſingula antheris 4. *Capſ.* calice recta 4-6locularis polyſperma.

gujaneuſis. 1. OCOTEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 780. *t.* 310.

POLYANDRIA.

1320. GLABRARIA. *Cal.* 5fidus. *Petala* 5. *Nectarium* receptaculi ſetis longitudine calicis. *Stamina* 30 : 6ſemper connexis. *Drupa.*

terſa. 1. GLABRARIA. *Mant. p.* 276. *Rumpf. amb.* 3. *t.* 44.

APAMA. *Cal.* 3fidus. *Cor.* o. *Filam.* in 3 phalang. diviſa. *Siliqua?*

dubia. 1. APAMA. *la Mark encycl.* 1. *p.* 91.

1321. MUNCHHAUSIA. *Cal.* ſemi-ſex-fidus, toruloſus. *Petala* unguiculata. *Stamina* 6ies 4-5. *Piſtillum* ſuperum : ſtilo filiformi curvato.

ſpecioſa. 1. MÜNCHHAUSIA. *Man. p.* 243. *Münchh. Hausv.* 5. *p.* 356. *ic.*

DURIO. *Cal.* 5 lobus, deciduus. *Petala* 5 minora. *Filamenta* connata in corpora 5, partita ſingula in 7 ſubulata. *Stil.* ſetaceus. *Pomum* ſubrotundum, muricatum, 5loculare, 5fariam dehiſcens.

zibethinus. 1. Durio. *Rumpf. amb.* 1. *p.* 99. *t.* 29.

1269. MELALEUCA. *Cal.* 5dentatus, ſuperus. *Cor.* 5petala. *Filamenta* multa, connata in 5 corpora: *Stil.* 1. *Capſ.* ſemiveſtita calice, 3valvis, 3locularis.

* *foliis alternis.*

Leucadendron. 1. M. foliis lanceolatis falcatis acutis multinerviis, ſpica elongata. *Mant. p.* 105. *Suppl. p.* 342. *Houttuyn natural. Hiſt.* II. 3. *t.* 15.

latifolia. 2. M. foliis lanceolatis falcatis acutis trinerviis, ſpica elongata. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 17.

anguſtifolia. 3. M. foliis oblongis ſubfalcatis obtuſis glaucis multinerviis. *Rumpf. amb.* 2. *t.* 16.

trinervia. 4. M. foliis oblongis ſubfalcatis obtuſis glaucis trinerviis. *Gærtn. de fr. et ſem. cent.* 3. *t.* 35. *f.* 1.

ſcoparia. 5. M. foliis ovatis acutis trinerviis punctatis, floribus terminalibus foliariis. *Suppl. p.* 343. *Cook. it.* 2. *p.* 200. *ic.*

* * *foliis oppoſitis.*

diffuſa. 6. M. foliis ovatis acuminatis, pedunculis rameis cymoſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 37. *n.* 213.

lucida. 7. M. glabra, foliis ovatis venoſis, paniculis terminalibus, pedicellis oppoſitis bifloris. *Suppl. p.* 342.

villoſa. 8. M. tomentoſa, foliis ovatis venoſis, paniculis terminalibus, pedicellis ſubtrifloris. *Suppl. p.* 342.

æſtuoſa. 9. M. foliis ovatis obovatiſque ſubtrinerviis, pedunculis cymoſis terminalibus tomentoſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 38. *n.* 215. *an eadem cum lucida?*

10. M.

florida. 10. M. foliis oblongo-obovatis venoſis, pedunculis terminalibus cymoſis, calicibus turbinatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 37. *n.* 214.

perforata. 11. M. foliis ovali-ſubrotundis pellucido-punctatis, pedunculis axillaribus trifidis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 37. *n.* 212.

lucens. 12. M. foliis lanceolatis utrinque acuminatis avenis enerviis, floribus terminalibus congeſtis ſubſeſſilibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 38. *n.* 216.

virgata. 13. M. foliis linearibus enerviis, pedunculis axillaribus umbelliferis. *Suppl. p.* 343. *Forſt flor. auſtr. p.* 37. *n.* 211.

*** *foliis ſparſis.*

ciliata. 14. M. foliis ſparſis, ſuperioribus ſuboppoſitis oblongis obtuſis ciliaris aveniis enerviis, cymis corymbolis terminalibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 38. *n.* 217. *an eadem cum viloſa?*

**** *incerto foliorum ſitu.*

ſuaveolens. 15. M. calice fructus ſubhemiſphærico, margine repando. *Gærtn. de fruct. & ſem. cent.* 3. *t.* 35. *f.* 1.

viridiflora. 16. M. calice fructus hemiſphærico craſſo edentulo. *Gærtn. de fr. & ſem. cent* 3. *t.* 35. *f.* 1.

1270. HOPEA. *Cal.* 5fidus, ſuperus. *Cor.* 5petala. *Stamina* multa, connata in 5 corpora. *Stil.* 1. *Drupa* nuce 3loculari.

tinctoria. 1. Hopea. *Mant. p.* 105. *Catesb. Car.* 1. *t.* 54.

677. SYMPLOCOS. *Cal.* 5fidus, ſuperus. *Cor.* 5-8-petala. *Stamina* 4plici ſerie tubo corollæ adnata. *Drupa* 5locularis polyſperma.

martinicenſis. 1. S. corolis pentapetalis. *Jacq. ſtirp. amer, pict. t.* 261. *f.* 41.

octopetala. 2. S. corollis octopetalis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 109.

HYPERICON. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5. *Filamenta* multa baſi in 3-5 phalanges connata. *Capſ.* 3. aut 5locularis, polyſperma.

* *floribus pentagynis.*

† *caule arboreo.*

arboreum. 1. H. foliis ovatis. *Suppl. p.* 345.

gujanenſe. 2. H. foliis ovato-oblongis acuminatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 784. *t.* 311.

latifolium. 3. H. foliis cordatis ſubtus rufeſcentibus tomentoſis petiolatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 787. *t.* 312. *f.* 1.

ſeſſilifolium. 4. H. foliis cordatis ſubtus rufeſcentibus tomentoſis ſeſſilibus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 787. *t.* 312. *f.* 2.

† † *caule fruticoſo.*

balearicum. 5. H. foliis ramiſque cicatriſatis. *Mill. ic. angl. t.* 54.

Kalmianum. 6. H. foliis lineari-lanceolatis.

Brathys. 6 2. H. foliis ſubulatis imbricatis glabris, floribus monadelphis. *Smith pl. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 41. *Suppl. p.* 268. Brathys juniperina; *an revera hujus generis ?*

ſalicinum. 7. H. foliis oblongo-ovatis coriaceis, caule tetragono, floribus ſolitariis terminalibus. *Mant. p.* 106. *Giſeck. ic. faſc.* 1. *t.* 18. *Theca baccans.*

cayanenſe. 8. H. foliis ovatis, calicibus ſtriatis, corollis barbatis. *Mant. p.* 277. *Suppl. p.* 343.

bacciferum. 9. H. foliis ovatis, calicibus lævibus, corollis barbatis. *Mant. p.* 277. *Suppl. p.* 344.

guineenſe. 10. H. foliis ovatis acutis, ramis teretibus, floribus ſubumbellatis. *Suppl. p.* 344. *Linn. diſſ. de hyperic. p.* 4. *j.* 1.

patulum. 11. H. caule fructeſcente laxo, foliis ovatis margine revolutis, floribus ſolitariis terminalibus. *Thunb. flor. jap. p.* 295.

† † † *caule herbaceo.*

Aſigron. 12. H. caule tetragono erecto ſimplici, foliis lævibus integerrimis. *Gmel. flor. ſib.* 4. *t.* 69. *Martyn. plat. to ill. Linn. ſyſt. t.* 24.

pyrami-datum. 57. H. caule ſubtetragono ramoſo, floribus ſubpaniculatis, calicibus ovatis acutis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 103.

** *floribus trigynis.*

† *caule fruticoſo.*

Androſæ-mum. 13. H. fructibus baccatis, caule ancipiti. *Curt. flor. Lond.* *t.* 206. *Gærtn. de fr. & ſem. cent.* 4. *t.* 59. *f.* 2. *Theca baccans.*

olympi-cum. 14. H. calicibus acutis, ſtaminibus corolla brevioribus. *Dill. h. Elth. t.* 151. *f.* 183. *Mill. h. angl. t.* 151. *f.* 1.

canarienſe. 15. H. calicibus obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus.

floribun-dum. 58. H. calicibus ovatis acutis ſubciliatis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis laceolato-ellipticis. *Commel. hort. amſt.* 2. *t.* 68.

folioſum. 59. H. calicibus lanceolatis acutis, ſtaminibus longitudine corollæ, foliis ovali-oblongis ſeſſilibus glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 104.

alatum. 60. H. calicibus lanceolato-ovatis acutis, ſtaminibus corolla longioribus, foliis ovato-oblongis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 104.

hircinum. 16. H. calicibus lanceolatis acutis, ſtaminibus corolla longioribus, foliis oblongis, caule ancipiti. *Kniph. bot. orig. cent.* 8. *n.* 51.

petiola-tum. 17. H. caule tetragono compreſſo, foliis ovatis petiolatis integerrimis ſubtus tomentoſis.

prolifi-cum. 18. H. caule ancipiti, floribus primordialibus ſeſſilibus, foliis lanceolato-linearibus. *Mant. p.* 106. *Murray comm. Gœtt.* 1780. *t.* 7.

glandulo-ſum. 61. H. foliis oblongo-lanceolatis pellucido-punctatis margine glandulofis, calicibus acutis ſerrato-glandulofis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 107.

repens. 19. H. caule tereti repente, foliis lanceolato-linearibus obtuſis.

orientale. 20. H. foliis oblongis denticulato-crenatis, ſtipulis reflexis. *Tournef. it.* 2. *p.* 97. *ic.*

reflexum. 21. H. foliis lanceolatis ſeſſilibus approximatis reflexis, ramis tomentoſis, panicula terminali. *Suppl. p.* 346.

ſinenſe. 22. H. foliis ovato-caniculatis integerrimis, pedunculis axillaribus bifloris. *Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 27.

mexicanum. 23. H. foliis ovatis imbricatis, ramis ſimplicibus. *Suppl. p.* 345. *Linn. diſſ. de hyper. p.* 5. *f.* 2.

✝ ✝ *caule ſuffruticoſo.*

virginicum. 24. H. floribus enneandris, caule tereti, foliis ovatis amplexicaulibus. *Mant. p.* 255.

ſcabrum. 25. H. caule tereti muricato, foliis oblongis.

linarifolium. 63. H. caule tereti erecto, foliis linearibus obtuſis glabris, calicibus ſerrato-glanduloſis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 65.

ægyptium. 26. H. caulibus compreſſis, nectariis petalorum lanceolatis. *Linn. diſſ. de hyperic. f.* 3.

✝ ✝ ✝ *caule herbaceo.*

ericoides. 27. H. foliis linearibus imbricatis. *Pluckn. alm. t.* 93. *f.* 5.

canadenſe. 28. H. foliis lineari-lanceolatis, caule quadrangulo, pericarpiis coloratis.

lævigatum. 64. H. foliis ovatis ſubamplexicaulibus, calicis foliolis ovatis acutis, panicula trichotoma, flore intermedio ſeſſili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 106.

quadrangulare. 29. H. foliis ovatis pellucido-punctatis, caule quadrangulo. *Flor. dan. t.* 640.

japonicum. 30. H. foliis ovatis ſeſſilibus integris, caule tetragono baſi decumbente. *Thunb. flor. jap. p.* 295.

gramineum. 31. H. foliis oblongo-parabolicis, caule tetragono dichotomo. *Forſter. flor. auſtr. p.* 53. *n.* 281.

perforatum. 32. H. caule ancipiti, foliis obtuſis, petalis oblique truncatis crenulatis puncto atro inter crenas notatis. *Mill. ill. ic. Blackw. herb. t.* 15.

perfoliatum. 33. H. caule ſubancipiti, foliis amplexicaulibus ovatis, cyma floribus ſeſſilibus.

humifuſum. 34. H. caulibus ancipitibus proſtratis filiformibus, foliis glabris, floribus axillaribus ſolitariis. *Flor. dan. t.* 141. *Curt. flor. Lond. t.* 162.

criſpum. 35. H. caule tereti, foliis ſeſſilibus lanceolatis baſi undulato-dentatis. *Mant. p.* 106. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 12.

montanum. 36. H. caule tereti erecto, foliis ovatis glabris, calicibus ſerrato-glanduloſis. *Flor. dan. t.* 173.

hirſutum. 37. H. caule tereti erecto, foliis ovatis ſubpubeſcentibus, calicibus ſerrato-glandulоſis. *Mant. p.*456. *Flor. dan. t.*802.

erectum. 38. H. caule tereti, foliis amplexicaulibus lanceolatis acutis. *Thunb. flor. jap. p.* 296.

pulchrum. 39. H. caule tereti, foliis amplexicaulicibus cordatis glabris, calicibus ſerrato-glanduloſis. *Flor. dan. t.* 75. *Curt. flor. Lond. t.* 6.

elodes. 40. H. caule tereti repente foliiſque villoſis ſubrotundis.

tomentoſum. 41. H. caulibus proſtratis, foliis ſemiamplexicaulibus flexuoſis tomentoſis, calicibus ſerrato-glanduloſis.

barbatum. 42. H. calicibus & petalis ciliatis iiſdemque & foliis punctatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 259.

nummularium. 43. H. foliis cordato-orbiculatis glabris, calicibus ſerrato-glanduloſis. *Pluckn. alm. t.* 93. *f.* 4.

Coris. 44. H. foliis ſubverticillatis, calicibus ſerrato-glanduloſis. *Magaz. für. Botan.* 7. *t.* 4.

maculatum. 45. H. ramis trichotomis, foliis ſemiamplexicaulibus pellucido-punctatis glanduloſo-ciliatis, calicibus obtuſioribus. *Walt. flor. carol. p.* 189.

piloſum. 46. H. foliis ſubovatis appreſſis cauleque erecto piloſis, floribus terminalibus, calicibus integris. *Walt. flor. carol. p.* 190.

denticulatum. 47. H. caule erecto quadrangulo, foliis ſubamplexicaulibus ovatis, petalis dente laterali. *Walt. flor. carol. p.* 190.

quinquenervium. 48. H. caule quadrangulo, foliis ſemiamplexicaulibus quinquenerviis. *Walt. flor. carol. p.* 190.

nudicaule. 49. H. caulibus erectis ramoſiſſimis, foliis infimis ſubovatis, ſuperioribus breviſſimis. *Walt. flor. carol. p.* 190.

campanulatum. 50. H. foliis oblongis obtuſis ſeſſilibus, pedunculis trifidis axillaribus oppoſitis, corollis campanulatis patulis. *Walt. flor. carol. p.* 191.

tubuloſum. 51. H. foliis ſeſſilibus, corollis tubuloſis ſtaminum corporibus ultra medium connatis. *Walt. flor. carol. p.* 191.

Walteri. 52. H. foliis petiolatis, ſtaminum corporibus ad medium connatis. *Walt. flor. carol. p.* 191. *an. diſtincta ſpecies?*

*** *floribus digynis.*

muticum. 53. H. foliis ovatis ſeſſilibus.

ſetoſum. 54. H. foliis linearibus.

**** *foliis monogynis.*

monogy-num. 55. H. ſtaminibus corolla longioribus, calicibus coloratis, caule fruticoſo. *Mill. h. angl. t.* 151. *f.* 2.

revolutum. 56. H. ſtaminibus corolla brevioribus, foliis lineari-lanceolatis baſi revolutis. *Vahl ſymb. oct.* 1. *p.* 66.

903. ASCYRUM. *Cal.* 4phyllus. *Petala* 4. *Filamenta* multa, in 4 phalanges digeſta.

Crux Andreæ. 1. A. foliis ovatis caule tereti, panicula dichotoma.

hypericoides. 2. A. foliis lanceolato-obtuſis ancipitibus. *Plum. gen. t.* 152. *f.* 1.

villoſum. 3. A. foliis hirſutis, caule ſtricto. *Pluckn. alm. t.* 245. *f.* 6.

MORONOBEA. *Cal.* 5partitus. *Petala* 5, ab uno latere convoluta & imbricata. *Filamenta* in 5 phalanges diſpoſita. *Stigma* 5radiatum. *Bacca* ovata non dehiſcens, 1locularis. 2-5ſperma.

coccinea. 1. MORONOBEA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 789. *t.* 313.

CLASSIS XVIII.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

* *Flores ſemifloſculoſi* Tournef. *corollis omnibus ligulatis.*

922. SCOLYMUS.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, ſquamoſus.
921. CICHORIUM.	*Recept.* ſubpaleaceum. *Pappus* ſubquinque-dentatus. *Cal.* caliculatus.
920. CATANANCHE.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* 5ariſtatus, ſeſſilis. *Cal.* imbricatus, ſcarioſus.
917. SERIOLA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* ſubpiloſus. *Cal.* ſimplex.
918. HYPOCHŒRIS.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* ſubplumoſus. *Cal.* imbricatus.
904. GEROPOGON.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* plumoſus diſci, 5ariſtatus radii. *Cal.* ſimplex.
915. ANDRYALA.	*Recept.* villoſum. *Pappus* piloſus, ſeſſilis. *Cal.* ſubæqualis, rotundatus.
905. TRAGOPOGON.	*Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus. *Cal.* ſimplex.
907. PICRIS.	*Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus. *Cal.* caliculatus.
906. SCORZONERA.	*Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus. *Cal.* imbricatus, margine ſcarioſo.
912. LEONTODON.	*Recept.* nudum. *Pappus* ſtipitatus. *Cal.* imbricatus, ſquamis laxis.
914. CREPIS.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* caliculatus, ſquamis difformibus.
910. CHONDRILLA.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus, ſtipitatus. *Cal.* caliculatus, multiflorus.
911. PRENANTHES.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* caliculatus, ſubquinqueflorus.
909. LACTUCA.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus, ſtipitatus. *Cal.* imbricatus, margine ſcarioſo.
913. HIERACIUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus, ſeſſilis. *Cal.* imbricatus, ovatus.
908. SONCHUS.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus, ſeſſilis. *Cal.* imbricatus, gibbus.

919. LAMPSANA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* caliculatus.

916. HYOSERIS. *Recept.* nudum. *Pappus* caliculo coronatus. *Cal.* ſubæqualis.

VIREA. *Recept.* planum, alveolatum. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus. *Cal.* imbricatus, ſquamis laxis.

** *Flores capitati.*

930. ATRACTYLIS. *Corolla* radiata, corollulis radii 5dentatis.

1419. BARNADESIA. *Corolla* radiata. *Cal.* nudus, imbricatus, pungens. *Pappus radii* plumoſus, *diſci* ſetoſus retrofractus.

929. CARLINA. *Calix* radiatus, radiis coloratis.

926. CNICUS. *Calix* bracteis obvallatus.

923. ARCTIUM. *Calix* ſquamis apice incurvato-hamoſis.

931. CARTHAMUS. *Calix* ſquarroſus, ſquamis foliaceis. *Flores* diſcoidei.

STOKESIA. *Cal.* ſquamoſus, ſquamis foliaceis. *Cor.* radiata.

928. CYNARA. *Cal.* ſquarroſus, ſquamis canaliculatis ſpinoſis.

925. CARDUUS. *Cal.* ventricoſus, ſquamis ſpinoſis. *Recept.* piloſum.

927. ONOPORDON. *Cal.* ventricoſus, ſquamis ſpinoſis. *Recept.* favoſum.

924. SERRATULA. *Cal.* ſubcylindricus imbricatus, ſquamis acutiuſculis muticis.

*** *Flores diſcoidei.*

934. ETULIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* æqualis.

936. AGERATUM. *Recept.* nudum. *Pappus* 5ariſtatus. *Cal.* ſubæqualis. *Corollulæ* 4fidæ.

933. CACALIA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* caliculatus.

939. CHRYSOCOMA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* imbricatus. *Piſt.* breviſſima.

935. EUPATORIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* imbricatus. *Piſt.* longiſſima.

MARSHALLIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* coronata caliculo 5phyllo. *Cal.* polyphyllus perſiſtens. *Stigm.* 2.

942. SANTOLINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, hemiſphæricus.

941. CALEA. *Recept.* paleaceum. *Pappus.* piloſus. *Cal.* imbricatus.

943. ATHANASIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus.* paleaceus. *Cal.* imbricatus.

1287. SPILANTUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus.* 2dentatus. *Cal.* ſubæqualis.

932. BIDENS. *Recept.* paleaceum. *Pappus.* ariſtatus. *Cal.* imbricatus.

938. STÆHELINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* plumoſus ramoſus. *Antheræ* caudatæ.

PACURINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ſimplex piloſus. *Cal.* imbricatus.

937. PTERONIA. *Recept.* ſetis partitis. *Pappus* ſubplumoſus. *Cal.* imbricatus.

940. TARCHONANTUS. *Recept.* piloſum. *Pappus* piloſus veſtiens. *Cal.* turbinatus 1phyllus.

CHUQUIRAGA. *Recept.* villoſum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* turbinatus imbricatus ſquamis numeroſiſſimis.

* *Tanacetum?*

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Flores diſcoidei.*

945. ARTEMISIA. *Recept.* ſubnudum. *Pappus* o. *Cor.* radii o.

948. CARPESIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cor.* radii 5fidæ.

944. TANACETUM. *Recept.* nudum. *Pappus* ſubmarginatus. *Cor.* radii 3fidæ.

968. COTULA. *Recept.* ſubnudum. *Pappus* marginatus. *Cor.* diſci 4fidæ.

949. BACCHARIS. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* femineæ hermaphroditis miſtæ.

950. CONYZA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* radii 3fidæ.

946. GNAPHALIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* ſcarioſus ſquamis concavis.

947. XERANTHEMUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ſubſetaceus. *Cal.* ſcarioſus radio explanato.

969. ANACYCLUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Semina* marginata emarginata.

** *Flores ſemifloſculoſi, ſubbilabiati.*

960. PERDICIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* 3fidæ, exteriore majore 3loba.

*** *Flores radiati.*

962. BELLIS.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* ſimplex, ſquamis æqualibus.
967. MATRICARIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus ſquamis acutis.
966. CHRYSANTHEMUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* ſquamis intimis ſcarioſis.
1420. UNXIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* 5phyllus. *Flores radii diſcique* 5.
MADIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* 8phyllus. *Sem.* plano-convexa.
959. DORONICUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus, *radii* o.
958. ARNICA.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Stamina* radii caſtrata.
956. INULA.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Antheræ* baſi 2ſetæ.
951. ERIGERON.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* radii capillares.
955. SOLIDAGO.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cor.* radii ſubſenæ remotæ.
957. CINERARIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* æqualis ſimplex.
953. SENECIO.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* ſquamis apice ſphacelatis.
952. TUCILAGO.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* ſquamis ſubmembranaceis.
955. ASTER.	*Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* ſubſquarroſus.
1421. MUTISIA.	*Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* cylindricus imbricatus. *Cor. radii* ovali-oblongæ, *diſci* 3fidæ.
1322. BELLIUM.	*Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus 8phyllusque. *Cal.* ſimplex.
964. TAGETES.	*Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* 1. phyllus. *Radius* 5florus.
965. PECTIS.	*Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* 5. phyllus. *Radius* 5florus.
961. HELENIUM.	*Recept.* feminudum. *Pappus* 5ariſtatus. *Cal.* multipartitus. *Cor.* rad. 3fidæ.
BOLTONIA.	*Recept.* favoſum. *Pappus* obſolete dentatus, 2cornis. *Cor.* radiata.
963. LEYSERA.	*Recept.* ſemipaleaceum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* ſquarroſus.

973. SIGESBECKIA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Radius* dimidiatus.
1321. ECLIPTA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cor.* diſci 4fidæ.
970. ANTHEMIS.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* hemiſphæricus.
971. ACHILLEA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* oblongus. *Radius* ſubquinqueflorus.
977. BUPHTHALMUM.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* marginatus. *Stigma* hermaphrodit. ſimplex.
978. AMELLUS.	*Recept.* paleaceum. *Pappus.* piloſus. *Cal.* imbricatus.
972. TRIDAX.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* piloſus. *Cor.* radii 3partitæ.
975. VERBESINA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* ariſtatus. *Floſculi* radii circiter 5.
974. ZINNIA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* imbricatus. *Rad.* perſiſtens 5florus.

* *Tetragonotheca v. Polymniaca.*

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

SCLEROCARPUS.	*Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* ſulcatus.
982. GORTERIA.	*Recept.* nudiuſculum. *Pappus* piloſus. *Radius* corollæ ligulatus.
DIDELTA.	*Recept.* partim nudum partim ſetoſum, ſeparabile. *Pappus* ſimplex. *Cal.* 2plex.
984. CENTAUREA.	*Recept.* ſetoſum. *Pappus* piloſus. *Radius* corollæ tubuloſus.
1271. ZOEGEA.	*Recept.* ſetoſum. *Pappus* ſetaceus. *Radius* corollæ ligulatus.
GALARDIA.	*Recept.* paleaceum, planum. *Sem.* apice 8paleacea. *Radius* corollæ ligulatus.
TITHONIA.	*Recept.* paleaceum. *Sem.* apice 5paleacea. *Radius* corollæ ligulatus.
BASTERA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus.
980. RUDBECKIA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* marginatus. *Cal.* ſerie 2plici.
981. COREOPSIS.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* caliculatus.
979. HELIANTHUS.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* ſquarroſus.

983. OSMITES. *Recept.* paleaceum. *Pappus* obſoletus. *Cal.* imbricatus.

ENOELIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* paleæ membranaceæ conduplicatæ incluſa. *Cal.* polyphyllus æqualis.

POLYGAMIA NECESSARIA.

995. FILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Floſculi feminei* inter ſquamas calicis.

996. MICROPUS. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Floſculi feminei* ſquamis calicis vaginati.

985. MILLERIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Floſculus* femineus ſubſolitarius.

FLAVERIA. *Recept.* nudum. *Sem.* ſquamis calicis involuta. *Cal.* 3-4phyllus connivens æqualis.

1323. BALTIMORA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* cylindricus. *Radius* 5florus.

1224. HIPPIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Sem.* glabra compreſſo-marginata. *Radius* obſoletus.

992. OSTEOSPERMUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Sem.* globoſa oſſea.

990. CALENDULA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Sem.* membranacea.

993. OTHONNA. *Recept.* nudum. *Pappus* piloſus. *Cal.* 1phyllus.

991. ARCTOTIS. *Recept.* ſubpiloſum. *Pappus* 5phyllus. *Sem.* tomentoſa.

TRIXIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice villoſa. *Cor.* radii 3fidæ.

994. ERIOCEPHALUS. *Recept.* villoſum. *Pappus* o. *Floſculi* radii quini.

987. POLYMNIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* 5phyllus.

989. MELAMPODIUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* vulviformis. *Cal.* 5phyllus.

986. SILPHIUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 2ariſtatus. *Cal.* ſquarroſus.

988. CHRYSOGONUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 3ariſtatus. *Sem.* caliculis propriis.

BAILLIERIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice 2cornia.

POLYGAMIA SEGREGATA.

1001. STOEBE.	*Perianth.* 1florum. *Pappus* plumoſus. *Polyg.* æqualis.
1325. ŒDERA.	*Recept.* paleaceum. *Pappus* paleaceus. *Perianth.* proprium floſculis tubuloſis ligulatiſque.
999. ECHINOPS.	*Perianth.* 1florum. *Pappus* pubeſcens. *Polyg.* æqualis.
998. ELEPHANTOPUS.	*Perianth.* 4florum. *Pappus* ſetoſus. *Polyg.* æqualis.
TETRANTHUS.	*Cal.* comm. 4florus. *Perianth.* proprium 1phyllum. *Semina* coronata. *Polyg.* æqualis.
ROLANDRA.	*Floſculi* faſciculati in capitulum ſquamis, interjectis. *Perianth.* proprium 2valve 1florum. *Coroll.* hermaphroditæ. *Pappus* o.
1000. GUNDELIA.	*Recept.* 5florum. *Pappus* o. *Polyg.* fruſtranea.
1422. JUNGIA.	*Recept.* paleaceum. *Perianth.* comm. 3florum. *Floſculi* tubuloſi 2labiati, *labio exteriori* ligulato, *interiori* 2partito.
CRASPEDIA.	*Recept.* paleaceum. *Cal.* communis imbricatus. *Floſc.* tubuloſi, faſciculis aliquot depreſſis. *Perianth.* proprium o. *Pappus* plumoſus.
NASSAVIA.	*Receptac.* nudum. *Perianth.* comm. 4-5-florum. *Floſcul.* ſubbilabiati, hinc 3-dentati inde 2fidi. *Pappus* ſetis 3-4. caducis.
998. SPHÆRANTHUS.	*Recept.* multiflorum, *Pappus* o. *Polyg.* neceſſaria.

MONOGAMIA.

* *Strumpfia*, *ſeriphium Corymbium*, *Jaſione*, *Simbuleta*, *Lobelia*, *Viola*, *Impatiens*, *Solanum*, *Shawia*.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

904. GEROPOGON. *Receptaculum* ſetoſo-paleaceum. *Cal.* ſimplex. *Sem.* diſci pappo plumoſo, radii 5ariſtato.

glaber. 1. G. foliis glabris. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 33.

hirſutus. 2. G. foliis hirſutis. *Col. ecphr.* 1. *p.* 231. *ic.*

caliculatus. 3. G. calicibus caliculatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 106.

905. TRAGOPOGON. *Recept.* nudum. *Cal.* ſimplex. *Pappus* plumoſus.

pratenſis. 1. Tr. calicibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis. *Knorr. del. hort.* 2. *t.* T. 3.

mutabilis. 2. Tr. calicibus octophyllis corollæ radium æquantibus, foliis integris ſtrictis lanceolato-acuminatis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 316. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 20.

capenſis. 3. Tr. calicibus octophyllis ventricoſo-conicis corolla brevioribus, foliis runcinatis ſeſſilibus ſpinoſo-dentatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 320. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 74.

undulatus. 4. Tr. calicibus corollæ radium æquantibus, foliis integris ſublinearibus, caulinis maxime undulatis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 317. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 19.

villoſus. 5. Tr. calicibus corollæ radio ſeſquilongioribus, caule foliiſque villoſis.

major. 6. Tr. calicibus corollæ radio longioribus, foliis integris ſtrictis, pedunculis ſuperne incraſſatis, corollulis ad apicem rotundatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 29. *β?*) Tragopogon dubium. *Scop. fl. carn.* 2. *n.* 947.

porrifolius. 7. Tr. calicibus corollæ radio longioribus, foliis integris ſtrictis, pedunculis ſuperne incraſſatis, corollulis anguſtiſſimis truncatis. *Flor. dan. t.* 797.

crocifolius. 8. Tr. calicibus corollæ radio longioribus, foliis integris, radicalibus pedunculiſque baſi villoſis. *Col. ecphr.* 1. *p.* 230. *ic.*

orientalis. 9. Tr. calicibus corollæ radio brevioribus, foliis integris ſubundulatis. *Camer. epit. p.* 312. *ic.*

Dale-champii. 10. Tr. calicibus monophyllis corolla brevioribus inermibus, foliis runcinatis. *Barr. p. rar. ic. t.* 209.

picroides. 11. Tr. calicibus monophyllis corolla brevioribus aculeatis, foliis runcinatis denticulatis.

aſper. 12. Tr. calicibus corolla brevioribus hiſpidis, foliis integris, caulinis oblongis.

ruber. 13. Tr. glaberrimus, foliis amplexicaulibus integris, floribus ſolitariis terminalibus. *S. G. Gmelin. it.* 2. *p.* 198.

Dande-lion. 14. Tr. foliis enſiformibus integris lævibus, ſcapis radicalibus.

lanatus. 15. Tr. foliis enſiformibus undulatis villoſis, ſcapis radicalibus.

virgini-cus. 16. Tr. foliis radicalibus lyratis rotundatis, caulinis indiviſis.

906. SCORZONERA. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* imbricatus, ſquamis margine ſcarioſis.

tomentoſa. 1. Sc. foliis ovatis nervoſis tomentoſis integerrimis ſeſſilibus.

humilis. 2. Sc. foliis lato-lanceolatis nervoſis planis, caule ſubnudo unifloro. *Flor. dan. t.* 816. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 36.

lanata. 3. Sc. foliis lanceolatis nervoſis planis, caule ſimplici baſi lanato. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 306.

caricifo-lia. 4. Sc. foliis lanceolato-linearibus nervoſis carinatis, caule unifloro ſubfolioſo. *Pallas it.* 3. *p.* 757. *t.* li. *f.* 1.

hirſuta. 5. Sc. foliis linearibus cauleque unifloro hirſutis. *Mant. p.* 278. *Coll. ecphr.* 1. *p.* 233. *ic.*

laciniata. 6. Sc. foliis linearibus dentatis acutis, caule erecto, calicis ſquamis petalo-mucronatis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 356.

puſilla. 7. Sc. foliis linearibus apice circinatis, caulibus folioſis ſub-quadrifloris. *Pall. it.* 2. *p.* 744. *t.* L.

hiſpida. 8. Sc. foliis linearibus dentatis ciliatis, ſcapis unifloris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 215.

ciliata. 9. Sc. foliis retrorſum alternatim ſinuato-dentatis glabris, margine acute ciliatis, caule procumbente ramoſo ſcabro, pedunculis ſquamoſis. *Forsk. flor æg. arab. p.* 143.

parviflo-ra. 10. Sc. foliis lineari-enſiformibus integris, caulibus ramoſis, radio corollæ breviſſimo. *Jacq. fl. auſtr.* 4. *t.* 305.

gramini-folia. 11. Sc. foliis lineari-enſiformibus integris carinatis. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 100.

hiſpanica. 12. Sc. foliis amplexicaulibus integris ſerrulatis, caule ramoſo. *Blackw. herb. t.* 406.

tuberoſa. 13. Sc. foliis lineari-acuminatis carinatis ſubtus pubeſcentibus, radice ſubgloboſa, floribus terminalibus ante floreſcentiam nutantibus. *Pall. it.* 3. *p.* 757. *t.* Y. *f.* 3.

purpurea. 14. Sc. foliis lineari-ſubulatis integris caniculato-triquetris, pedunculis cylindricis. *Jacq. flor auſtr.* 1. *t.* 35.

anguſti-folia. 15. Sc. foliis ſubulatis integris, pedunculis incraſſatis, caulis baſi villoſa. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 1.

reſedi-folia. 16. Sc. foliis obtuſe dentatis, caule divaricato, calicibus apicibus tomentoſis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 800.

picroides. 17. Sc. foliis ſuperioribus amplexicaulibus integerrimis, inferioribus runcinatis, pedunculis ſquamoſis. *Pluckn. phyt.* 61. *f.* 5.

tingita-na. 18. Sc. foliis omnibus runcinatis amplexicaulibus. *Herm. par. lugdb. p.* 659. *ic.*

taraxati-folia. 19. Sc. foliis runcinatis petiolatis, ſcapo ramoſo aphyllo. *Jacq. coll.* 1. *p.* 52. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 91.

907. PICRIS. *Recept.* nudum. *Cal.* duplicatus. *Pappus* plumoſus. *Sem.* tranſverſim ſulcata.

echioides. 1. P. perianthiis exterioribus pentaphyllis interiori ariſtato majoribus. *Curt. flor. Lond. t.* 150. *β*) *Herm. par. lugdb. p.* 185. *ic.*

hieracioi-des. 2. P. perianthiis laxis, foliis integris, pedunculis ſquamatis in calicem.

ſcabra. 3. P. caule ſubunifloro, foliis undulatis hiſpidis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 143.

japonica. 4. P. perianthis hiſpidis, foliis dentatis, pedunculis ſubaphyllis hiſpidis. *Thunb. flor. jap. p.* 299.

aſplenioi-des. 5. P. foliis pinnatifidis, lobis alternis rotundatis.

908.

908. SONCHUS. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, ventricoſus. *Pappus* capillaris.

fruticoſus. 1. S. fruticoſus glaberrimus, foliis baſi attenuatis lyratis, lobis rotundatis obtuſis, calicibus florentibus ſquamoſis, pedunculis ſubſquamoſis. *Suppl. p.* 346.

pinnatus. 15. S. fruticoſus, foliis pinnatis, pinnis lineari-lanceolatis ſubdentatis, calicibus lævibus, pedunculis nudis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 116.

radicatus. 16. S. caule fruticoſo ſubnudo, foliis radicalibus utrinque lævibus lyratis, lobis triangulari-ovatis, pedunculis nudis calicibusque glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 116.

maritimus. 2. S. pedunculo nudo, foliis lanceolatis amplexicaulibus indiviſis retrorſum argute dentatis. *Pluckn. alm. t.* 62. *f.* 5.

plumieri. 3. S. pedunculis nudis, floribus paniculatis, foliis runcinatis.

tataricus. 4. S. pedunculis nudis, foliis lanceolatis dentatis runcinatis. *Mant. p.* 572. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 3.

tuberoſus. 5. S. foliis inferioribus runcinatis, ſuperioribus ſagittatis. *Suppl. p.* 246.

alpinus. 6. S. pedunculis ſquamoſis, floribus racemoſis, foliis runcinatis. *Flor. dan. t.* 182. *Smith. pl. ic. ined.* 1. *t.* 11.

floridanus. 7. S. pedunculis ſquamoſis, foliis lyrato-haſtatis.

ſibiricus. 8. S. pedunculis ſquamatis, foliis lanceolatis indiviſis ſeſſilibus. *Kniph. bot. orig. cent.* 10. *n.* 82.

canadenſis. 9. S. pedunculis hiſpidis, foliis runcinatis, floribus racemoſis.

arvenſis. 10. S. pedunculis calicibuſque hiſpidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi cordatis. *Flor. dan. t.* 606.

paluſtris. 11. S. pedunculis calicibuſque hiſpidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi ariſtatis.

oleraceus. 12. S. pedunculis tomentoſis, calicibus glabris. *Curt. flor. Lond. t.* 123. β) *Flor. dan. t.* 682. γ) *Flor. dan. t.* 843.

tenerrimus. 13. S. pedunculis tomentoſis, calicibus piloſis.

agreſtis. 14. S. pedunculis tomentoſis multifloris, calicibus glabris, caule ſtriato, foliis inciſo-ſerratis ſeſſilibus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 110.

909. LACTUCA. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. *Pappus* capillaris ſtipitatus. *Sem.* lævia.

quercina. 1. L. foliis runcinatis denticulatis acutis ſubtus lævibus, caule glabro.

intybacea. 2. L. foliis runcinatis dentato-ciliatis obtuſis amplexicaulibus, caule paniculato. *Jacq. coll.* 1. *p.* 53. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 96.

flava. 3. L. foliis radicalibus lyrato-ſinuatis margine ſpinuloſis, caulinis ſinuatis amplexicaulibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 143.

ſinuata. 4. L. foliis ſinuatis ciliato-aculeatis, racemis florum terminalibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 215. *an diſtincta ſatis a ſaligna?*

caroliniana. 15. L. foliis laciniatis denticulatis præmorſis ſubglaucis, coſta ſubtus carinata aculeata. *Walt. flor. carol. p.* 193.

tuberoſa. 5. L. foliis ſpinuloſo-denticulatis, caule ſubſimplici, radice tuberoſa multiplici. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 57.

Scariola. 6. L. foliis verticalibus carina aculeatis. *Regn. bot. t.* 345. *β*) *Herm. par. lugdb. p.* 191. *ic.*

viroſa. 7. L. foliis horizontalibus carina aculeatis dentatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 2. *f.* 16.

ſativa. 8. L. foliis rotundatis, caulinis cordatis, caule corymboſo. *Blackw. herb. t.* 88. *β*) *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 2. *f.* 2.

ſaligna. 9. L. foliis haſtato-linearibus ſeſſilibus carina aculeatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 250.

perennis. 10. L. foliis linearibus dentato-pinnatis, laciniis ſurſum dentatis. *Tabernæm. Kræuterb. p.*176.*ic.Mill.h. angl. t.*157.

inermis. 11. L. foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus retrorſum dentatis inermibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 144.

decorticata. 12. L. foliis lanceolatis dentato-ſinuatis glabris, appendice utrinque lineari. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 216.

canadenſis. 13. L. foliis lanceolato-enſiformibus amplexicaulibus dentatis inermibus.

indica. 14. L. foliis lanceolato-enſiformibus ſeſſilibus inæqualiter dentatis. *Mant. p.* 278.

910. CHONDRILLA. *Recept.* nudum. *Cal.* caliculatus. *Floſculi* multiplici ſerie. *Pappus* capillaris, ſtipitatus. *Sem.* muricata.

juncea. 1. Ch. foliis radicalibus runcinatis, caulinis linearibus integris. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 427.

crepoides. 2. Ch. foliis ſagittatis amplexicaulibus, caule ſimplici, floribus ſubſeſſilibus lateralibus. *An crepidis potius ſpecies?*

nudicaulis. 3. Ch. ſcapo nudo, floribus paniculatis. *Mant. p.* 278. *Murr. comm. goett.* 1772. *t.* 4.

911. PRENANTHES. *Recept.* nudum. *Cal.* caliculatus. *Pappus* capillaris, ſubſeſſilis. *Floſculi* ſimplici ſerie.

viminea. 1. Pr. foliorum ramentis cauli adnatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 9.

tenuifolia. 2. Pr. foliis linearibus integerrimis.

ſpinoſa. 3. Pr. foliis linearibus ſeſſilibus glabris, caule fruticoſo dichotomo ſpinoſo, pedunculis lateralibus ſolitariis unifloris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 144.

hiſpida. 4. Pr. foliis linearibus ſeſſilibus, ſpinis ſtipularibus, floſculis octonis, calice octophyllo ſpinuloſo. *Pall. it.* 1. *p.* 501. *n.* 126.

ſinenſis. 5. Pr. foliis lineari-enſiformibus integris dentatiſque. *Thunb. flor. jap. p.* 301.

integra. 6. Pr. foliis oblongis integris glabris, panicula coarctata. *Thun. berg. flor. jap. p.* 300.

dentata. 7. Pr. foliis oblongis dentatis glabris, caule paniculato. *Thunb. flor. jap. p.* 301.

debilis. 8. Pr. foliis ovatis integris, caule ſubnudo erecto. *Thunb. flor. jap. p.* 300.

chondrilloides. 9. Pr. foliis lanceolatis, radicalibus indiviſis ſubdentatis, floſculis denis, calicibus octofidis. *Mant. p.* 107. *Arduin. ſpec.* 2. *t.* 17.

purpurea. 10. Pr. foliis lanceolatis denticulatis, floſculis quinis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 307.

haſtata. 11. Pr. foliis haſtatis amplexiçaulibus dentatis, caule ramoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 301.

alba. 12. Pr. foliis haſtato-angulatis, floribus nutantibus ſubumbellatis, floſculis plurimis.

repens. 13. Pr. foliis trilobis, caule repente. *Amœn. acad.* 2. *p.* 360. *f.* 23. *an hieracii potius ſpecies ?*

altiſſima. 14. Pr. foliis trilobis, caule erecto, floſculis quinis. *Pluckn. alm. t.* 317. *f.* 2.

muralis. 15. Pr. foliis runcinatis, floſculis quinis. *Flor. dan. t.* 509.

multiflora. 16. Pr. foliis petiolatis runcinatis, lobis acutis dentatis, panicula faſtigiata diffuſa. *Thunb. flor. jap. p.* 303.

ſquarroſa. 17. Pr. foliis ſeſſilibus runcinatis, laciniis recurvis dentatis. *Thunb. flor. jap. p.* 303.

lyrata. 18. Pr. foliis runcinato-lyratis dentatis, panicula coarctata. *Thunb. fl. jap. p.* 303.

humilis. 19. Pr. foliis lyratis, lobis obtuſis, caule ſubnudo, floribus terminalibus ſubternis. *Thunb. flor. jap. p.* 302.

japonica. 20. Pr. foliis radicalibus lyratis, caule ſubnudo, floſculis quindenis. *Mant. p.* 107.

pinnata. 21. Pr. fruticoſa, foliis impari-pinnatis multijugis, foliolis linearibus integerrimis, panicula compoſita. *Suppl. p.* 347. *an Sonchi potius ſpecies !*

VIREA. *Recept.* ſubnudum. *Pappus* plumoſus, ſubſtipitatus radii ſeſſilis. *Cal.* imbricatus, ſquamis incumbentibus.

ſcabra. 1. VIREA. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 25. *t.* 13.

912. LEONTODON. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus, ſquamis interioribus parallelis æqualibus. *Pappus* capillaris, ſtipitatus.

* *pappo ſtipitato*, Taraxacon.

officinalis. 1. L. ſquamis calicinis exterioribus reflexis integris, foliis runcinatis acute dentatis glabris. *Flor. dan. t.* 574.

mucronatus. 2. L. ſquamis calicinis exterioribus apice recurvis integris, pedunculis ſquamoſis, foliis pinnatifidis undatis dentato-mucronatis. *Forſk. flor. æg. arab. p.* 144.

Taraxacon. 3. L. ſquamis calicinis exterioribus erectis appreſſis integris, foliis lanceolatis integerrimis denticulatiſve. *Wiggers prim. fl. holſp. p.* 56.

carolinianus. 17. L. ſquamis calicis apice bifidis, exterioribus reflexis. *Walt. flor. carol. p.* 192.

aſper. 4. L. foliis dentato-pinnatifidis calicibuſque hiſpidis, caulibus ſquamoſis. *Flor. æg. arab. p.* 145.

tomentoſus. 5. L. calice oblongo, foliis lanceolatis indiviſis ſubtus tomentoſis. *Suppl. p.* 347. *nonne potius tuſſilaginis ſpecies ?*

** *pappo ſeſſili.*

autumnalis. 6. L. caule ramoſo, pedunculis ſquamoſis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris, pappo ſubſeſſili. *Flor. dan t.* 501.

Haſtile. 7. L. ſcapo lævi, calicibus piloſis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 164. *an potius hieracii ſpecies ?*

hiſpidus. 8. L. calice toto erecto, foliis dentatis integerrimis hiſpidis, ſetis furcatis. *Flor. dan. t.* 862.

bulboſus. 9. L. foliis oblongo-ovatis ſubdentatis glabris, calice lævi, ſcapo ſuperne hirto. *Col. phyt. t.* 4.

alpinus. 10. L. calice toto erecto ſcapoque infra florem hiſpidis, foliis dentatis ſubpiloſis, ſetis ſimpliciſſimis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 93.

hirtus. 11. L. calice toto erecto, foliis dentatis hirtis, ſetis ſimpliciſſimis.

croceus. 12. L. calice erecto ovato hirſuto, ſcapo lævi, foliis lineari-lanceolatis acutis retrorſum dentatis ſupra ſubhirſutis. *Haënk. apud Jacq. coll.* 2. *p.* 26.

aureus. 13. L. foliis runcinatis, caule ſubunifolio, calice hiſpido. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. t.* 24.

tuberoſus. 14. L. foliis runcinatis ſcabris, calice acuto hirſuto. *Lob. ic.* 232.

megalorhizos. 15. L. ſcapo piloſo, ſquamis calicinis ad apicem gibbis, foliis ciliato-pinnatifidis glabris. *Forſk. flor. æg. arab. p.* 216. *an hujus generis et tribus ?*

danubia- 16. L. ſcapo unifloro, foliis pinnatifidis calicibuſque glabris.
iis. *Schranck. flor. bav. 2. p. 336.*

913. HIERACIUM. *Recept.* (ut plurimum) nudum. *Cal.* imbricatus, ovatus, interdum caliculatus. *Pappus* ut plurimum ſeſſilis, capillaris, (rarius plumoſus.)

* *ſcapo nudo.*

† *unifloro.*

⊢ *receptaculo villoſo, pappo plumoſo*, Apargia Scopoli.

incanum. 1. H. foliis integerrimis ſubdenticulatis lanceolatis ſcabris. *Jacq. flor. auſtr. 3. t. 287.*

⊢⊢ *receptaculo lævi, pappo ſimplici.*

venoſum. 2. H. foliis cuneiformibus hirtis, ſcapo craſſiſſimo erecto.

Piloſella. 3. H. foliis integerrimis ovatis ſubtus tomentoſis, ſtolonibus repentibus. *Blackw. herb. t. 365.*

alpinum. 4. H. foliis oblongis integris dentatis, ſcapo ſubnudo, calice piloſo. *Flor. dan. t. 27.*

taraxaconis. 5. H. foliis lanceolatis dentatis glabris, ſcapo ſubnudo, calice hirſuto. *Allion. flor. pedem. 1. t. 31. f. 1.*

alpeſtre. 6. H. foliis lanceolatis dentatis glabris, ſcapo ſubunifolio ſubunifloro, calice hirſuto cylindrico. *Jacq. flor. auſtr. 2. t. 191.*

pumilum. 7. H. foliis ovatis, petiolis dilatatis, ſcapis ſubunifloris. *Mant. p. 279. Gouan. ill. t. 22. f. 3. idem cum crepide pygmæa.*

†† *ſcapo multifloro.*

dubium. 8. H. foliis integris ovato-oblongis, ſtolonibus repentibus.

Auricula. 9. H. foliis integerrimis lanceolatis, ſtolonibus repentibus.

præmorſum. 10. H. foliis ovatis ſubdentatis, ſcapo ramoſo, floribus ſuperioribus primoribus. *Gmel. flor. ſib. 2. t. 13. f. 2.*

capenſe. 11. H. foliis oblongis dentatis ſcabris, pedunculis inferioribus altioribus.

ſanctum. 12. H. foliis lyratis obtuſis dentatis. *Tabernæm. Kræuterb. p.* 183.

cymoſum. 13. H. foliis lanceolatis integris piloſis, ſcapo ſubnudo baſi piloſo, floribus ſubumbellatis. *Flor. dant. t.* 810.

Gmelini. 14. H. caule paniculato, foliis radicalibus ovatis ſerratis glabris. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 8. *f.* 2.

aurantiacum. 15. H. foliis integris, caule ſubnudo ſimpliciſſimo piloſo corymbifero. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 410.

Gronovii. 16. H. foliis radicalibus obovatis integerrimis piloſis, caule paniculato ſubnudo.

lactucaceum. 44. H. foliis oblongis integris ſubdentatis, ſcapo ſimplici, floribus racemoſis caliculatis, ſquamis calicinis glabris. *J. G. Gmelin flor. ſib.* 2. *p.* 32. *t.* 13. *f.* 2.

ſtaticefolium. 17. H. foliis lanceolato-linearibus obſolete denticulatis obtuſis, ſcapo ramoſo, pedunculis longiſſimis unifloris ſuperne ſquamoſis. *Allion. flor. pedem. p.* 214. *t.* 81. *f.* 2.

incarnatum. 18. H. foliis hirſutis obovato-oblongis repando-denticulatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 127.

** *caule folioſo.*

† *pappo ſtipitato.*

ſtipitatum. 19. H. caule ſubunifolio ramoſo, foliis dentatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 293.

†† *pappo ſeſſili.*

pontanum. 20. H. caule ſubunifloro. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 526. Hypochæris montana. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 190.

humile. 21. H. caule paucifloro, foliis inferioribus hirſutis et inciſis vix altiore. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 189.

ſabaudum. 22. H. caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis ſemiamplexicaulibus. *Flor. dan. t.* 872.

hiſpidum. 23. H. foliis oblongo-lanceolatis ſubdentatis ſubtus caulеque erecto hiſpidis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 216.

echioides. 47. H. caule erecto, foliis ſparſis lanceolatis piloſis rigidis ſubdentatis, floribus ſubumbellatis. *Lomnizer flor. poſon. p.* 348. *n.* 782.

Kalmii. 24. H. caule erecto multifloro, foliis lanceolatis dentatis, pedunculis tomentoſis.

paniculatum. 25. H. caule erecto, foliis alternis lanceolatis nudis dentatis, panicula capillari.

paludoſum. 26. H. caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, calicibus hiſpidis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 47.

lyratum. 27. H. caule multifloro, foliis lyratis glabris, calice pedunculisque hiſpidis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 9.

porrifolium. 28. H. caule ramoſo, foliis lanceolato-linearibus ſubintegerrimis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 286.

chondrilloides. 29. H. caule ramoſo, foliis caulinis elongato-dentatis glabris, radicalibus lanceolatis integris. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 429.

murorum. 30. H. caule ramoſo, foliis radicalibus ovatis dentatis, caulino minori. *β) Blakw. herb. t.* 538.

Sprengerianum. 31. H. caule ramoſo, foliis ſemiamplexicaulibus oblongis repandis hiſpidis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 17.

aurimontanum. 45. H. caule paucifloro ſulcato, foliis amplexicaulibus laxe dentatis patulis baſi haſtatis, calicibus villoſis, ſquamis linearibus. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 332.

undulatum. 46. H. caule ramoſo, foliis ellipticis dentatis undulatis piloſis, pilis plumoſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 124.

villoſum. 32. H. caule ramoſo, foliis hirſutis, radicalibus lanceolato-ovatis dentatis, caulinis amplexicaulibus cordatis. *Jacq. fl. auſtr.* 1. *t.* 27.

amplexicaule. 33. H. caule ramoſo, foliis amplexicaulibus cordatis ſubdentatis, pedunculis unifloris hirſutis. *Kniph. bot. orig. cent.* 12. *n.* 56.

cerinthoides. 34. H. foliis radicalibus obovatis denticulatis, caulinis oblongis ſemiamplexicaulibus. *Gouan. illuſtr. t.* 22. *f.* 4.

pyrenaicum. 35. H. foliis amplexicaulibus obovato-lanceolatis retrorſum dentatis, caule ſimplici, calicibus laxis.

blattarioides. β) H. foliis lanceolatis dentatis, floribus ſolitariis. *Sp. pl. p.* 1130.

piloſum. γ) H. caule piloſo, foliis dentato-ſinuatis. *Sp. pl. p.* 1115. Picris pyrenaica. *Herm. parad. lugdb. p.* 184. *ic.*

auſtriacum. δ) H. foliis oblongis denticulatis, calicibus hiſpidis. *Jacq. fl. auſtr.* 5. *t.* 441.

helveticum. ε) H. foliis minute ſerratis acutis.

molle. 36. H. foliis lanceolatis ſubintegerrimis mollibus, inferioribus petiolatis, floribus pedunculatis ſubcorymboſis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 119.

umbellatum. 37. H. foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubumbellatis. *Flor. dant. t.* 680. β) Hieracium glabrum. *Krock. flor. ſileſ.* 2. 2. *p.* 316.

glutinoſum. 38. H. foliis lanceolatis runcinatis ſcabriuſculis, floribus umbellatis.

viroſum. 39. H. foliis ſeſſilibus cordato-lanceolatis ſubintegerrimis, caule ſimplici, thyrſo terminali. *Pallas it.* 1. *p.* 501. *n.* 125.

ſquamoſum. 40. H. foliis radicalibus pinnatis, caulibus ſulcatis, ramis ſquamatis. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 9.

flexuoſum. 41. H. foliis radicalibus oblongis acuminatis viſcido-tomentoſis, caule ſimplici lanato. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 9.

dichotomum. 42. H. foliis radicalibus oblongis acuminatis ſinuatis lanatis, caule teretiuſculo dichotomo. *S. G. Gmelin it.* 1. *p.* 9.

rhomboidale. 43. H. foliis radicalibus rhomboideis petiolatis lævibus, caulinis amplexicaulibus, pedunculis calicibuſque villoſis. *Lapeirouſe act. toloſ.* 1. *p.* 215. *t.* 18.

914. CREPIS. *Recept.* nudum. *Cal.* caliculatus, exterior deciduus. *Pappus* plumoſus, ſtipitatus.

alpina. 1. Cr. involucris ſcarioſis longitudine calicis, floribus ſolitariis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 5.

veſicaria. 2. Cr. involucris ſcarioſis longitudine calicis, floribus corymboſis, bracteis ovatis. β) *Col. ecphr.* 1. *p.* 237. *ic.*

barbata. 3. Cr. involucris calice longioribus, ſquamis ſetaceis ſparſis. *Curtis bot. magaz. t.* 30.

pygmæa. 4. Cr. foliis ovatis integris villoſis petiolatis, caule procumbente. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 14.

ſibirica. 5. Cr. foliis amplexicaulibus oblongis rugoſis inferne dentatis, caule hirto, calicibus carina ciliatis. *Gmel. fl. ſib.* 2. *t.* 10.

rhagadioloides. 6. Cr. foliis integris amplexicaulibus oblongis, calicibus interioribus toroſo-articulatis hiſpidis, foliolis cymbiformibus. *Mant. p.* 108.

pulchra. 7. Cr. foliis ſagittatis denticulatis, caule paniculato, floribus pyramidatis glabris. β) *Col. ecphr.* 1. *p.* 249. *ic.*

filiformis. 22. Cr. foliis lineari-filiformibus integerrimis glabris, pappo ſeſſili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 128.

rigens. 28. Cr. foliis oblongis duplicato-ſerratis ſetoſis, caule nudo ramoſo, floribus paniculatis, calicibus cylindricis glabris, pappo ſeſſili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 127.

aſpera. 8. Cr. foliis dentatis, inferioribus ovatis auriculatis, ſuperioribus ſagittatis, caule ſetis rigidis ſparſis.

radicata. 9. Cr. foliis ſinuatis dentatis ciliatis radicalibus, caulibus proſtratis multifloris. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 145.

tectorum. 10. Cr. foliis lanceolato-runcinatis ſeſſilibus lævibus, inferioribus dentatis. *Flor. dan. t.* 501.

rubra. 11. Cr. foliis amplexicaulibus lyrato-runcinatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 36.

Dioſcoridis. 12. Cr. foliis radicalibus runcinatis, caulinis haſtatis, calicibus ſubtomentoſis.

neglecta. 13. Cr. foliis amplexicaulibus runcinatis dentatis ſubpiloſis, caule paniculato, calicibus inermi-ſubſpinoſis. *Mant. p.* 107.

virens. 14. Cr. foliis runcinatis glabris amplexicaulibus, calicibus ſubtomentoſis.

biennis. 15. Cr. foliis runcinato-pinnatifidis ſcabris, baſi ſuperne dentatis, calicibus muricatis. *Bauh. hiſt. pl.* 2. *p.* 1025. *ic.*

burſifolia. 16. Cr. foliis pinnatifidis crenatis, ſcapo nudo paucifloro. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 106. & 112.

hieracioides. 17. Cr. caule ſimplici, foliis oblongis dentatis, ſuperioribus amplexicaulibus, inferioribus petiolatis, petiolis dentatis, pappo ſeſſili. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 24. *t.* 9.

ſucculenta. 23. Cr. foliis pinnatifidis dentatiſve ſubcarnoſis lævibus, calicibus ſubtomentoſis, pappo ſeſſili. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 128.

fœtida. 18. Cr. foliis runcinato pinnatis hirtis, petiolis dentatis, receptaculo piloſo, ſeminum radii pappo ſeſſili. *Magn. flor. monſp. p.* 128. *ic. an hujus generis?*

albida. 19. Cr. foliis runcinato-dentatis ſubincanis, pedunculis nudis unifloris, ſquamis calicis margine albidis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 81. *Allion. flor. pedem.* 1. *t.* 32. *f.* 3. *an hujus generis?*

arenoſa. 20. Cr. hirta, foliis elliptico-lanceolatis dentatis decurrentibus, caulinis ſeſſilibus, pappo ſimplici ſeſſili. *Scop. ann. hiſt. nat. 2. p. 59. an hujus generis?*

patula. 21. Cr. foliis inferioribus lyratis obtuſis, caule ſubnudo laxe ramoſo. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 227.*

915. ANDRYALA. *Recept.* villoſum. *Cal.* multipartitus, ſubæqualis, rotundatus. *Pappus* capillaris, calicis longitudine.

integrifolia. 1. A. foliis inferioribus runcinatis, ſuperioribus ovato-oblongis tomentoſis. β) Andryala ſinuata. *Sp. pl. p. 1137.*

cheiranthifolia. 2. A. foliis runcinatis, ſummis lanceolatis integris, villo glandulifero. *Herit. ſtirp. nov. 2. p. 35. t. 18.*

pinnatifida. 3. A. foliis tomentoſis pinnatifidis, calicibus tomentoſis piloſis, pilis rigidiuſculis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 129.*

crithmifolia. 4. A foliis pinnatis linearibus tomentoſis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 129.*

raguſina. 5. A. foliis lanceolatis indiviſis denticulatis acutis tomentoſis, floribus ſolitariis. *Mill. h. angl. t. 146. f. 2.*

lanata. 6. A. foliis oblongo-ovatis ſubdentatis lanatis, pedunculis ramoſis. *Mill. h. angl. t. 146. f. 1.*

nigricans. 7. A. foliis inferioribus lyrato-pinnatis, pedunculis ramoſis, tomento ſuperne nigricante. *Poir. voy. en Barb. 2. p. 228.*

uniflora. 8. A. foliis glabris integris dentatis oblongo-acutis, ſcapo unifloro. *Schranck flor. bav. 2. p. 342.*

916. HYOSERIS. *Recept.* nudum. *Cal.* ſubæqualis. *Pappus* ſeſſilis paleaceo-ariſtatus, capillari cinctus, aut ejus loco caliculus, capillarem pappum includens.

* *ſcapo nudo unifloro.*

fœtida. 1. H. foliis pinnatifidis, ſeminibus nudis. *Michel. nov. pl. gen. t. 28.*

radiata. 2. H. foliis glabris runcinatis, angulis dentatis, apice laciniatis. *Pluckn. alm. t.* 37. *f.* 2.

lucida. 3. H. foliis ſubcarnoſis runcinatis angulatis dentatis. *Mant. p.* 108. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 150.

virginica. 4. H. foliis lanceolatis lyratis glabris.

ſcabra. 5. H. foliis ſcabris, ſeminibus pappoſis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 106.

caliculata. 6. H. foliis runcinatis, ſcapis ſubhirſutis, calice caliculato. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 229.

carolinia-na. 7. H. foliis lyratis apice truncatis hirſutis. *Walt. flor. carol. p.* 194.

major. 8. H. foliis integris enſiformibus lævibus. *Walt. flor. carol. p.* 194.

minor. 9. H. foliis ovatis dentatis, ſcapo bifloro. *Walt. flor. carol. p.* 194.

pygmæa. 10. H. foliis ſpatulatis dentatis ciliatis, pappo ſtipitato plumoſo. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 130.

** *caule diviſo nudo.*

minima. 11. H. pedunculis incraſſatis. *Flor. dan. t.* 201.

*** *caule folioſo ramoſo.*

Hedypnois. 12. H. fructibus ovatis glabris. *Lob. ic. p.* 239.

rhagadio-loides. 13. H. fructibus ovatis piloſis. *Kniph. bot. orig. cent.* 5. *n.* 44.

cretica. 14. H. fructibus ovatis ſcabris. *Scop. del. inſ.* 1. *t.* 16.

917. SERIOLA. *Recep.* paleaceum. *Cal.* ſimplex. *Pappus* capillaris ſtipitatus.

lævigata. 1. S. læviuſcula, foliis obovatis dentatis.

æthnen-ſis. 2. S. hiſpida, foliis obovatis ſubdentatis *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 79. *Calix ſubcaliculatus. Pappus ſubplumoſus.*

urens. 3. S. urens, foliis dentatis, caule ramoſo.

cretenſis. 4. S. hirta, foliis runcinatis.

918. HYPOCHŒRIS. *Recept.* paleaceum. *Cal.* ſubimbricatus. *Pappus* plumoſus ſtipitatus.

helvetica. 1. H. caule ſimplici folioſo unifloro, foliis lanceolatis dentatis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 25. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 4.

maculata. 2. H. caule ſubnudo, ramo folitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Flor. dan. t.* 149.

glabra. 3. H. glabra, caule ramoſo nudo, foliis dentato-ſinuatis, calicibus oblongis imbricatis. *Flor. dan. t.* 424.

radicata. 4. H. caule ramoſo nudo lævi, foliis runcinatis obtuſis ſcabris, pedunculis ſquamoſis. *Flor. dan. t.* 150.

minima. 5. H. caule ſuperius ſquamoſo, foliis ſinuato-lyratis. *Cyrill. pl. rar. Neap. faſc.* 1. *t.* 10.

919. LAPSANA. *Recept.* nudum. *Cal.* caliculatus, ſquamis ſingulis interioribus canaliculatis.

communis. 1. L. calicibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis. *Flor. dan. t.* 500.

zacintha. 2. L. calicibus fructus toruloſis depreſſis obtuſis ſeſſilibus.

ſtellata. 3. L. calicibus fructus undique patentibus, radiis ſubulatis rectis, foliis caulinis lanceolatis indiviſis.

Kœlpinia. 4. L. calicibus fructus undique patentibus, radiis ſubulatis incurvis echinatis, foliis caulinis lanceolatis indiviſis. *Suppl. p.* 348. *Pallas it.* 3. *p.* 755. *t.* L I. *f.* 2.

Rhagadiolus. 5. L. calicibus fructus undique patentibus, radiis ſubulatis, foliis lyratis. *Kniph. bot. orig. cent.* 4. *n.* 36. *an mera varietas ?*

920. CATANANCHE. *Recept.* paleaceum. *Cal.* imbricatus. *Pappus* ariſtatus, caliculo 5 ſeto.

cærulea. 1. C. ſquamis calicis inferioribus ovatis.

lutea. 2. C. ſquamis calicis inferioribus lanceolatis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 7.

græca. 3. C. foliis inciſis. *Tournef. it.* 1. *p.* 223. *ic. an luteæ varietas ?*

921. CICHORIUM. *Recept.* ſubpaleaceum. *Cal.* caliculatus. *Pappus* ſubquinquedentatus, obſolete piloſus.

Intybus. 1. C. floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* W. 9.

Endivia. 2. C. floribus ſolitariis pedunculatis, foliis integris crenatis. *Regn. bot. t.* 238. *β*) Cichorium pumilum. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 80.

ſpinoſum. 3. C. caule dichotomo ſpinoſo, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Bauh. prodr. theatr. bot. p.* 62. *ic.*

922. SCOLYMUS. *Recept.* paleaceum. *Cal.* imbricatus ſpinoſus. *Pappus* o.

maculatus. 1. Sc. floribus ſolitariis. *Kniph. bot. orig. cent.* 9. *n.* 85.

hiſpanicus. 2. Sc. floribus congeſtis. *Mill. h. angl. t.* 229.

angioſpermus. 3. Sc. paleis receptaculi in membranacea ſeminum conceptacula abeuntibus.

923. ARCTIUM. *Cal.* globoſus, ſquamis apice hamis inflexis.

Lappa. 1. A foliis cordatis inermibus petiolatis. *Flor. dan. t.* 642.

Perſonata. 2. A. foliis decurrentibus ciliato-ſpinoſis, radicalibus pinnatis, caulinis oblongo-ovatis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 348. *an cardui potius ſpecies ?*

Carduelis. 3. A foliis pinnatifidis aculeatis. *Mant. p.* 108. *Scop. flor. carn. ed.* 2. *t.* 53.

924. SERRATULA. *Cal.* ſubcylindricus, imbricatus, muticus.

tinctoria. 1. S. foliis lyrato-pinnatifidis, pinna terminali maxima, floſculis conformibus. *Flor. dan. t.* 281.

coronata. 2. S. foliis lyrato-pinnatifidis, pinna terminali maxima, floſculis radii femineis longioribus. *Gmel. flor. jap. ſib.* 2. *t.* 20.

japonica. 3. S. foliis lyrato-pinnatifidis ſcabris, ſquamis calicis apice dilatatis membranaceis. *Thunb. flor. jap. p.* 305.

centauroides. 4. S. foliis pinnatifidis obliquis acutis glabris inermibus, ſquamis calicis mucronatis, interioribus ſcarioſis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 17.

ſpinoſa. 5. S. foliis glabris, caule dichotomo fruticoſo ſpinoſo. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 217.

alpina. 6. S. foliis indiviſis, calicibus ſubhirſutis ovatis. *Fl. dan. t.* 37.

caſpia. 7. S. foliis oblongis ſubacutis ſeſſilibus integerrimis carnoſis. *Pallas it.* 2. *p.* 743 *t.* Z.

glauca. 8. S. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis, floribus corymboſis, calicibus ſubrotundis. *Dill. h. Elth. t.* 262. *f.* 341.

noveboracenſis. 9. S. foliis lanceolato-oblongis ſerratis pendulis. *Dill. h. Elth. t.* 263. *f.* 342. *an cum glauca diſtincti generis?*

præalta. 10. S. foliis lanceolato-oblongis ſerratis patentibus ſubtus hirſutis. *Mill. h. angl. t.* 234.

amara. 11. S. foliis lanceolatis, ſquamis calicis apice ſcarioſis obtuſis patulis coloratis, floribus terminalibus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 29.

ſcarioſa. 12. S. foliis lanceolatis integerrimis, calicibus ſquarroſis pedunculatis obtuſis lateralibus. *Pluckn. alm. t.* 177. *f.* 4.

multiflora. 13. S. foliis lanceolatis ſubtus villoſis ſubdecurrentibus integerrimis, caule corymboſo, calicibus cylindricis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 28.

ciliata. 19. S. foliis lanceolatis integris ſeſſilibus ſpinuloſo-ciliatis ſubtus tomentoſis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 67.

ſalicifolia. 14. S. foliis lineari-lanceolatis alternis ſubtus incanis ſeſſilibus integerrimis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 27.

piloſa. 15. S. foliis linearibus piloſis, floribus axillaribus longe pedunculatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 138.

ſquarroſa. 16. S. foliis linearibus, calicibus ſquarroſis ſubſeſſilibus acuminatis lateralibus. *Dill. h. Elth. t.* 71. *f.* 82.

ſpicata. 17. S. foliis linearibus baſi ciliatis, floribus ſeſſilibus lateralibus ſpicatis, caule ſimplici. *Dill. h. Elth. t.* 72. *f.* 83. *an cum ſquarroſa diſtincti generis?*

auſtralis. 11. C. foliis runcinatis ſpinoſis, calicibus ſubſeſſilibus terminalibus. *Suppl. p.* 348.

argentatus. 12. C. foliis runcinatis ſpinoſis, pedunculis ſubtomentoſis unifloris, calicibus ovatis mucronatis inermibus. *Mant. p.* 280. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 192.

pectinatus. 13. C. foliis lanceolatis pinnatifido-pectinatis, pedunculis longiſſimis, floribus defloratis cernuis. *Mant. p.* 279.

canus. 14. C. foliis lanceolatis eroſo-dentatis ciliato-aculeatis utrinque arachnoideo-ſubvilloſis. *Mant. p.* 108. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 42. 43.

defloratus. 15. C. foliis lanceolatis ſerratis ſubſpinoſo-ciliatis nudis, pedunculis longiſſimis lanuginoſis unifloris. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 89.

monſpeſſulanus. 16. C. foliis lanceolatis ſubrepandis glabris inæqualiter ciliatis, pedunculis alternis, calicibus inermibus.

carlinæfolius. 46. C. foliis decurrentibus ſpinoſis glabris, pedunculis erectis unifloris inermibus. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 67.

carlinoides. 47. C. foliis decurrentibus pinnatifidis tomentoſis, laciniis palmatis ſpinoſis, floribus glomeratis. *Gouan. illuſtr. p.* 62. *t.* 23.

paniculatus. 48. C. foliis ſemidecurrentibus dentato-ſinuatis ſpinoſis glabris, floribus paniculatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 68.

diſſectus. 17. C. foliis lanceolatis, denticulis inermibus, calicibus ſpinoſis. *Lob. ic. p.* 583.

pannonicus. 18. C. foliis ſemidecurrentibus nudis indiviſis ciliatis, flore ſubſolitario. *Suppl. p.* 348. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 127.

nutans. 19. C. foliis ſemidecurrentibus ſpinoſis, floribus cernuis, ſquamis calicis ſuperne patentibus. *Flor. dan. t.* 675.

rhius. 20. C. foliis amplexicaulibus ſemipinnatifidis ciliato-ſpinuloſis, inferioribus ſemidecurrentibus, caule inermi, pedunculis unifloris. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 5.

tuberoſus. 21. C. foliis ſubdecurrentibus petiolatis ſubpinnatifidis ſpinoſis, caule inermi, floribus ſolitariis. *Mant p.* 401. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 29. *f.* 27. 28.

parviflorus. 22. C. foliis baſi adnatis lanceolatis nudis eroſis ciliato-ſpinuloſis inermibus. *Mant. p.* 279.

** *foliis ſeſſilibus.*

paniculatus. 44. C. foliis ſemidecurrentibus oblongo-lanceolatis inæqualiter ciliatis glabris, inferioribus lyratis undulatis, floribus paniculatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 143.

rigens. 45. C. foliis oblongo-lanceolatis glabris margine ſpinoſis pinnatifidis, laciniis obliquis lobatis, calicibus oblongis bracteatis. *la Chenal. act. helv.* 4. *p.* 294. *t.* 16.

linearis. 23. C. foliis linearibus ciliato ſpinoſis glabris, floribus terminalibus ſolitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 305.

Caſebonæ. 24. C. foliis lanceolatis integerrimis, margine ſpinis ternatis. *Lob. ic. p.* 486. *f.* 1.

flaveſcens. 25. C. foliis lanceolatis integris inermibus dentatis glabris, floribus aphyllis inermi-ſpinoſis.

ſtellatus. 26. C. foliis lanceolatis integris inermibus ſubtus tomentoſis, ſpinis ramoſis axillaribus, floribus ſeſſilibus lateralibus. *Triumf. obſ. p.* 96. *ic.*

virginianus. 27. C. foliis lanceolatis ſpinuloſis ſubtus tomentoſis, caule inermi folioſo unifloro. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 99.

rivularis. 28. C. foliis inferne pinnatifidis, laciniis oblongis, ſuperne integris ſerratiſque inermi-ſpinuloſis, caule inermi, floribus capitatis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 91.

mollis. 29. C. foliis pinnatifidis linearibus ſubtus tomentoſis, caule inermi unifloro. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 18.

altiſſimus. 30. C. foliis pinnatifidis ſinuatis ſerratis inermibus, caule ramoſiſſimo, calicibus villoſis ſubſerratis. *Dill. h. Elth. t.* 69. *f.* 80.

eriophorus. 31. C. foliis bifariam pinnatifidis, laciniis alternis erectis, calicibus globoſis villoſis. *Mill. h. angl. t.* 293. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 171.

Boujarti. 32. C. foliis bifariam pinnatifidis ſubtus tomentoſis ſpina terminatis, calicibus ovatis erectis terminalibus. *Dill. & Miterpach. it.* 1. *p.* 143. *t.* 13.

ſerratuloides. 33. C. foliis ſubamplexicaulibus lanceolatis integris, ſerraturis ſpinoſo-ſetaceis, pedunculis unifloris. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 36. *f.* 2.

ciliatus. 34. C. foliis ſemiamplexicaulibus pinnatifidis laciniatis ſpinoſis ſubtus tomentoſis, calicis ſquamis ciliatis Laſ reflexis. *Murray comm. Goett.* 1784. *p.* 35. *t.* 5.

marianus. 35. C. foliis amplexicaulibus haſtato-pinnatifidis ſpinoſis, calicibus aphylis, ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis. *Knorr. del. hort.* 1. *t.* M. 3.

ſyriacus. 36. C. foliis amplexicaulibus angulato-ſpinoſis, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus obvallatis, foliolis ſubquinis. *Camer. hort.* *t.* 10.

hetero-phyllus. 37. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis ciliatis integris laciniatiſque, caule ſubunifloro, calice inermi. *Flor. dan. t.* 109. *an cum helenioide in unam ſpeciem conjungendus?*

gnaphaloides. 46. C. foliis ſubverticillatis lanceolatis integerrimis ſubtus tomentoſis. *Cyrill. pl. rar. Neap. faſc.* 1. *t.* 9.

helenioides. 38. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis, ſpinulis inæqualibus ciliatis, caule inermi. *Hall. hiſt. ſtirp. helv. t.* 7. *Mill. h. angl. t.* 94.

tataricus. 39. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis, ſerraturis ſpinoſo-ſetaceis, floribus triphyllis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 90.

ſcaber. 40. C. foliis amplexicaulibus lanceolatis dentato-ſpinoſis ſupra ſcabris ſubtus tomentoſo-albis, calice inermi. *Poir. voy. en Barbar.* 2. *p.* 231.

acaulis. 41. C. acaulis, calice glabro. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 18.

926. CNICUS. *Cal.* ovatus, imbricatus ſquamis ramoſo-ſpinoſis, (ſæpe) obvallatus bracteis. *Corollulæ* æquales.

ſpinoſiſſimus. 1. Cn. foliis amplexicaulibus ſinuato-pinnatis ſpinoſis, caule ſimplici, floribus ſeſſilibus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 25.

oleraceus. 2. Cn. foliis amplexicaulibus pinnatifidis glabris, bracteis concavis integris ſubcoloratis. *Flor. dan. t.* 860.

Eriſithales. 3. Cn. foliis amplexicaulibus pinnatifidis ariſtato-ferratis, pedunculis cernuis, calicibus glutinoſis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 310.

dubius. 4. Cn. foliis pinnatifidis petiolatis, laciniis trilobis margine ſpinoſis, calice cylindrico glabro, caule villoſiſſimo folioſo. *Willden. prodr. fl. berol. n.* 801.

uniflorus. 5. Cn. foliis pinnatifidis, calice ſcarioſo villoſo. *Mant. p.* 572. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 38.

centauroides. 6. Cn. foliis pinnatifidis, calicibus ſcarioſis, ſquamis acuminatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 25. *f.* 2.

ferox. 7. Cn. foliis decurrentibus ligulatis dentato-ſpinoſis, caule ramoſo erecto. *Mant. p.* 109.

Acarna. 8. Cn. foliis decurrentibus lanceolatis indiviſis, calicibus pinnato-ſpinoſis.

pygmæus. 9. Cn. foliis ſeſſilibus ſublinearibus confertiſſimis, calice inermi. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 440.

cernuus. 10. Cn. foliis cordatis, petiolis criſpis ſpinoſis amplexicaulibus, floribus cernuis, calicibus ſcarioſis. *Gmel. flor. ſibri.* 2. *t.* 19. *Mill. h. angl. t.* 248.

927. ONOPORDON. *Recept.* favoſum. *Cal.* ventricoſus, ſquamæ mucronatæ.

Acanthium. 1. O. calicibus ſquarroſis, ſquamis patentibus, foliis ovato-oblongis ſinuatis. *Læſ. flor. pruſſ. t.* 82.

illyricum. 2. O. calicibus ſquarroſis, ſquamis inferioribus uncinatis, foliis lanceolatis pinnatifidis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 148.

græcum. 3. O. calicibus ſquarroſis arachnoideo-tomentoſis, foliis ſpinoſis ſubulato-lanceolatis ſinuatis tomentoſis. *Suppl. p.* 349.

deltoides. 4. O. calicibus ſquarroſis arachnoideo-tomentoſis, foliis petiolatis ovatis angulatis ſubtus tomentoſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 146.

arabicum. 5. O. calicibus imbricatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 149.

acaulon. 6. O. acaule.

928. CYNARA. *Cal.* ventricoſus, imbricatus ſquamis carnoſis emarginatis cum acumine.

humilis. 1. C. foliis ſpinoſis pinnatifidis ſubtus tomentoſis, calicis ſquamis ſubulatis. *Pluckn. alm. t.* 81. *f.* 2.

horrida. 2. C. foliis pinnatifidis ſubtus tomentoſis ſpinoſis, ſpinis baſeos foliorum pinnarumque baſi connatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 148.

Carduncu-lus. 3. C. foliis ſpinoſis pinnatifidis, calicis ſquamis ovatis.

Scolymus. 4. C. foliis ſubſpinoſis pinnatis indiviſiſque, calicis ſquamis ovatis. *Blackw. herb. t.* 458.

Digitized by Google

integrifolia. 5. C. foliis lanceolatis denticulatis, ſquamis calicinis lanceolato-acuminatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 68.

acaulis. 6. C. acaulis foliis pinnatis inermibus ſupra glabris. *Till. h. piſ. t.* 20.

929. CARLINA. *Cal.* radiatus, ſquamis marginalibus longis, coloratis.

acaulis. 1. C. caule unifloro flore breviore. *Knorr. del. hort.* 2. *t.* C. 1.

involucrata. 2. C. caule unifloro flore longiore, calice aureo foliis ſpinoſis obvallato. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 234.

lanata. 3. C. caule bifido, calicibus ſanguineis terminalibus, primo axillari ſeſſili. *Col. ecphr.* 1. *t.* 27. *f.* 2.

pyrenaica. 4. C. caule multifloro, foliis decurrentibus runcinatis.

vulgaris. 5. C. caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calicum radio albo.

corymboſa. 6. C. caule multifloro ſubdiviſo, floribus ſeſſilibus, calicum radio flavo. *Col. ecphr.* 1. *t.* 27. *f.* 1.

racemoſa. 7. C. floribus ſeſſilibus lateralibus pauciſſimis.

atractyloides. 8. C. caule ramoſo, calicibus ſpinis ciliatis.

Xeranthemoides. 9. C. fruticoſa ramoſa tomentoſa, foliis lineari-ſubulatis, ſerraturis ſpinaſcentibus, panicula terminali, radio flavo. *Suppl. p.* 349.

930. ATRACTYLIS. *Cor.* radiatæ, corollulis radii 5dentatis.

gummifera. 1. A. flore acauli. *Col. ecphr.* 1. *t.* 12.

humilis. 2. A. foliis dentato-ſinuatis, involucro patente, caule herbaceo. β) *Barr. pl. rar. ic. t.* 592.

cancellata. 3. A. involucris cancellatis ventricoſis linearibus dentatis, calicibus ovatis, floribus floſculoſis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 39. *f.* 16.

Lancea. 4. A. involucris pinnatis, foliis lanceolatis ciliatis glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 306.

ovata. 5. A. involucris pinnatis, foliis ovatis ciliatis glabris. *Thunb. flor. jap. p.* 306.

oppoſitifolia. 6. A. foliis oppoſitis. *Mant. p.* 477. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 571. Gorteria fruticoſa. *Pluckn. alm. t.* 273. *f.* 5.

purpurea. 7. A. foliis haſtatis runcinatis. *Suppl. p.* 349.

mexicana. 8. A. foliis oblongis integerrimis. *Suppl. p.* 349.

1419. BARNADESIA. *Cor.* radiata. *Cal.* nudus, imbricatus, pungens. *Pappus* radii plumoſus, diſci ſetoſus, retrofractus.

ſpinoſa. 1. Barnadesia. *Suppl. p.* 348.

STOKESIA. *Cor.* radiata. *Cal.* foliaceus, ſubimbricatus. *Recept.* nudum. *Pappus* deciduus, filamentoſus.

cyanea. 1. Stokesia. *Herit. ſert. angl. p.* 28. *t.* 38.

931. CARTHAMUS. *Cal.* ovatus, imbricatus, ſquamis apice ſubovato-foliaceis.

tinctorius. 1. C. foliis ovatis integris ſerrato-aculeatis. *Zorn. pl. off. ic. t.* 140.

dentatus. 11. C. foliis lanceolato-ovatis ſpinoſo-dentatis, ſquamis calicinis apice dilatatis ſerrato-ciliatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 69. *t.* 17.

carolinianus. 12. C. foliis ſemiamplexicaulibus integris ferrato-aculeatis, floribus ſolitariis. *Walt. flor. carol. p.* 194.

cæruleus. 2. C. foliis lanceolatis ſpinoſo-dentatis, caule ſubunifloro.

ſalicifolius. 3. C. fruticoſus, foliis lanceolatis integris ſubtus tomentoſis apice pungentibus, petiolis ſpinoſis, ramis unifloris. *Suppl. p.* 350.

arboreſcens. 4. C. foliis enſiformibus ſinuato-dentatis. *Mant. p.* 462.

mitiſſimus. 5. C. foliis inermibus, radicalibus dentatis, caulinis pinnatis.

Carduncellus. 6. C. foliis caulinis linearibus pinnatis longitudine plantæ. *Lob. ic.* 2. *p.* 20.

tingitanus. 7. C. foliis radicalibus pinnatis, caulinis pinnatifidis, caule unifloro. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 34. *f.* 19.

lanatus. 8. C. caule piloſo ſuperne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis, ſummis amplexicaulibus dentatis. *Blackw. herb. t.* 468.

creticus. 9. C. caule læviuſculo, calicibus ſublanatis, floſculis ſubnovenis, foliis inferioribus lyratis.

corymboſus. 10. C. floribus corymboſis numeroſis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 33. *f.* 17.

1287. SPILANTHES. *Recept.* paleaceum, conicum. *Pappus* ariſtis 2, altera minore. *Cal.* ſubhemiſphæricus, ſquamis duplici ſerie. *Cor.* uniformis, tuboloſa.

urens. 1. Sp. foliis lanceolatis integerrimis, caule proſtrato. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 194.

Pſeudo-acmella. 2. Sp. foliis lanceolatis ſerratis, caule erecto. *Mant. p.* 475. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 568. Verbeſina Pſeudo-acmella. *Seb. muſ.* 1. *t.* 10. 11.

uliginoſa. 3. Sp. foliis ovato-lanceolatis crenatis, caule erecto dichotomo, pedunculis ternis, floribus radiatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 110.

Acmella. 4. Sp. foliis ovatis ſerratis, caule erecto, floribus radiatis. *Mant. p.* 475. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 568. Verbeſina Acmella. *Seb. muſ.* 1. *t.* 9. 10.

ſalivaria. 5. Sp. foliis ovatis obſolete ſerratis, caule obliquo flexuoſo paniculato. *Murray comm. Goett.* 1783. *t.* 1. *Herit. ſtirp. nov.* 1. *t.* 4. *β*) Spilanthus indicans. *Jacq. coll.* 3. *p.* 229.

inſipida. 6. Sp. foliis obovatis ſubdentatis ſeſſilibus. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 261. *f.* 63.

atriplicifolia. 7. Sp. foliis alternis deltoidibus dentatis petiolatis ſtipulatis, caule paniculato. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 735. Bidens atriplicifolia.

oleracea. 8. Sp. foliis ſubcordatis ſerrulatis petiolatis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 135.

932. **BIDENS.** *Recept.* paleaceum. *Pappus* ariſtis erectis, ſcabris. *Cal.* imbricatus. *Cor.* rarius floſculo uno alterove radiante inſtructa.

* *foliis ſimplicibus.*

ſcandens. 1. B. foliis ovatis acuminatis ſerratis oppoſitis, caule ſcandente fruticoſo, floribus oppoſitis paniculatis ovatis.

nodiflora. 2. B. foliis oblongis integerrimis unidentatis, caule dichotomo, floribus ſolitariis ſeſſilibus. *Dill. h. Elth. t.* 44. *f.* 52.

verticillata. 3. B. foliis oblongis integris, inferne alternis ſuperne oppoſitis, floribus verticillatis.

hirſuta. 4. B. foliis ovato-lanceolatis integris tomentoſo-hirſutis oppoſitis, caule ſcandente fruticoſo, pedunculis oppoſitis divergentibus multifloris. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 110.

minima. 5. B. foliis lanceolatis integerrimis, flore recto ſolitario baſi involucrato bracteis duabus, radice repente. *Flor. dant. t.* 312.

cernua. 6. B. foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, ſeminibus erectis. *Flor. dan. t.* 841.

tenella. 7. B. foliis linearibus, pedunculis capillaribus, calicibus ſubtetraphyllis, ſeminibus erectis quinis.

nivea. 8. B. foliis ſimplicibus cordato-ovatis acuminatis ſerratis petiolatis, floribus hemiſphæricis pedunculis elongatis, ramis trichotomis. *Dill. h. Elth. t.* 47. *f.* 55. *n.* 3. β) *Dill. h. Elth. t.* 47. *f.* 55. γ) *Dill. h. Elth. t.* 46. *f.* 54.

tripartita. 9. B. foliis trifidis, calicibus ſubfolioſis, ſeminibus erectis. *Knorr. del. hort.* 2. *t.* B. 1. *f.* 2. β) Bidens pumila, caule ſimpliciſſimo unifloro, bracteis pluribus, foliis ſerratis, caule ſimplici. *Roth. fl. germ.* 1. *p.* 350.

** *foliis compoſitis.*

bullata. 10. B. foliis ovatis ſerratis, inferioribus oppoſitis, ſuperioribus ternatis, intermedio majore. *Arduin. ſpec.* 2. *t.* 18.

frondoſa. 11. B. foliis pinnatis ſerratis lineatis glabris, ſeminibus erectis, calicibus frondoſis, caule lævi. *Morriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 5. *f.* 21.

piloſa. 12. B. foliis pinnatis ſubpiloſis, caule geniculis barbatis, calicibus involucro ſimplici, ſeminibus divergentibus. *Dill. h.*

Elth. t. 43. *f.* 51. *β*) Agrimonia molucca. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 15. *f.* 2.

bipinnata. 13. B. foliis bipinnatis inciſis, calicibus involucratis, corollis ſemiradiatis, ſeminibus divergentibus. *Herm. parad. lugdb. p.* 123. *ic.*

933. CACALIA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris longiſſimus. *Cal.* cylindricus, oblongus, baſi tantum ſubcaliculatus.

* *fruteſcentes.*

papillaris. 1. C. caule fruticoſo obvallato ſpinis petiolaribus truncatis. *Dill. h. Elth. t.* 55. *f.* 63.

Klenia. 2. C. caule fruticoſo compoſito, foliis lanceolatis planis, petiolorum cicatricibus obſoletis. *Dill. h. Elth. t.* 54. *f.* 2.

odora. 3. C. caule fruticoſo a cicatricibus foliorum albo ſtriato ad apicem folioſo, foliis lanceolatis. *Forsk. fl. æg. arab. p.* 146.

pendula. 4. C. caulibus fruticoſis deſcendentibus aphyllis ſquamatis, pedunculis terminalibus erectis. *Forsk fl. æg. arab. p.* 145.

ſempervivа. 5. C. caule fruticoſo ſubdichotomo, foliis carnoſis ſeſſilibus lanceolatis confertis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 146.

laciniata. 6. C. caule fruticoſo, foliis carnoſis pinnatifide laciniatis, caule decumbente articulato. *Jacq. Coll.* 1. *p.* 77.

repens. 7. C. caule fruticoſo, foliis carnoſis depreſſis. *Mant. p.* 110.

carnoſa. 32. C. foliis teretiuſculis carnoſis incurvis, pendunculis terminalibus unifloris nudis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 156.

Ficoides. 8. C. caule fruticoſo, foliis carnoſis compreſſis. *Commel. rar. t.* 40.

cuneifolia. 9. C. caule fruticoſo, foliis carnoſis cuneiformibus. *Mant. p.* 110.

Anteuphorbium. 10. C. caule fruticoſo, foliis ovato-oblongis planis, petiolis baſi linea triplici deductis. *Dill. h. Elth. t.* 55. *f.* 2. 3.

laurifolia. 11. C. fruticoſa glabra, foliis petiolatis ovatis triplinerviis obtuſis integerrimis glaberrimis, thyrſo terminali, calice tetraphyllo glabro. *Suppl. p.* 351.

appendiculata. 12. C. fruticoſa, tomentoſa, foliis cordatis ovatis acutis angulatis ſubtus tomentoſis, petiolis appendiculate foliosis. *Suppl. p.* 352. *an potius Cinerariæ ſpecies?*

tomentoſa. 13. C. fruticoſa tomentoſa, foliis lanceolatis dentatis ſeſſilibus ſubtus tomentoſis. *Suppl. p.* 353.

aſclepiadea. 14. C. fruticoſa tomentoſa, foliis petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis ſupra glaberrimis ſubtus tomentoſis margine revolutis, paniculis terminalibus. *Suppl. p.* 352.

cordifolia. 15. C. fruteſcens hirſuta, foliis petiolatis cordato-ovatis nervoſis acutis ſcabris, calice tetraphyllo quadrifloro pubeſcente. *Suppl. p.* 351.

ſuffruticoſa. 16. C. caule ſuffruticoſo ramoſo, foliis linearibus planis ſparſis. *Mant. p.* 109. *Ard. ſpec.* 2. *t.* 19.

** *herbaceæ.*

Porophyllum. 17. C. caule indiviſo, foliis ellipticis ſubcrenatis. *Pluckn. alm. t.* 161. *f.* 1. *cum ruderali habitu & calice ſubturbinatis a congeneribus diſtincta.*

radicans. 18. C. caule repente radicante, foliis tereti-ovatis carnoſis. *Suppl. p.* 354.

villoſa. 19. C. caule erecto, foliis lyratis, infimis longe petiolatis, ſubſequis dentatis amplexicaulibus, ſummis ſublanceolatis inciſo-ſerratis, floribus erectis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 347. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 75.

ſonchifolia. 20. C. foliis lyratis amplexicaulibus dentatis. *Mant. p.* 463. *Murray comm. Goett.* 1772. *t.* 7.

haſtata. 21. C. foliis trilobis acuminatis ſerratis, floribus nutantibus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 66.

ſcandens. 33. C. caule ſcandente, foliis ſagittatis dentatis, petiolis ſimplicibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 157.

ſuaveolens. 22. C. erecta, foliis haſtato-ſagittatis denticulatis, petiolis ſuperne dilatatis.

incana. 23. C. foliis lanceolatis dentatis.

ſaracenica. 24. C. foliis lanceolatis ſerratis decurrentibus.

atriplicifolia. 25. C. foliis ſubcordatis dentato-ſinuatis, calicibus quinquefloris. *Pluckn. alm. t.* 101. *f.* 2.

echinata. 26. C. foliis reniformi-cordatis angulato-dentatis ſubtus tomentoſis, calicis foliolis tuberculatis. *Suppl. p.* 353. *an potius cinerariæ ſpecies?*

alpina. 27. C. foliis reniformi-cordatis acutis denticulatis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 234.

albifrons. 28. C. foliis cordatis biſerratis acutis ſubtus tomentoſis, ſtipulis oblongis rotundatis. *Suppl. p.* 353. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 235.

ovata. 29. C. foliis ovatis nervoſis utrinque viridibus, calicibus ſubquadrifloris. *Walt. flor. carol. p.* 196.

bipinnata. 30. C. foliis bipinnatis linearibus. *Suppl. p.* 353.

acaulis. 31. C. acaulis, foliis ſemiteretibus, ſcapis unifloris. *Supp. p.* 353.

934. ETHULIA. *Recept.* nudum. *Pappus.* o.

conyzoides. 1. E. floribus paniculatis. *Linn. fil. dec.* 1. *t.* 1.

Sparganophora. 2. E. floribus ſeſſilibus lateralibus.

ſtruchium. 3. E. floribus ſeſſilibus axillaribus, omnibus trifidis. *Brown. jam. p.* 312. *t.* 34. *f.* 2.

bidentis. 4. E. racemulis ſecundis, calicibus ſubquinquefloris, foliis lanceolatis oppoſitis. *Mant. p.* 110.

divaricata. 5. E. foliis linearibus dentatis decurrentibus, pedunculis oppoſitifoliis unifloris, caule divaricato. *Mant. p.* 110. & 572. *Burm. ind. t.* 58. *f.* 1. *an diſtincti generis?*

tomentoſa. 6. E. ſuffruticoſa, foliis linearibus integerrimis tomentoſis. *Mant. p.* 110.

uniflora. 7. E. caule unifloro, foliis linearibus verticillatis. *Walt. flor. carol. p.* 195.

935. EUPATORIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus *Cal.* imbricatus, oblongus. *Stilus* ſemibifidus, longus.

* *calicibus trifloris.*

parviflorum. 1. Eu. fruticoſum, foliis ovato-lanceolatis ſerratis glabris, corymbis patentibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 111.

triflorum. 2. Eu. fruticoſum, foliis ſubcordatis ſubtus incanis, capitulis ſeſſilibus racemoſis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 795. *t.* 314.

** *calicibus quadrifloris.*

Dalea. 3. Eu. fruticoſum, foliis lanceolatis venoſis obſolete ferratis glabris. *Brown. jam. t.* 34. *f.* 1.

ſcandens. 4. Eu. caule volubili, foliis cordatis dentatis acutis. *Pluckn. alm. t.* 163. *f.* 3.

micranthon. 5. Eu. caule volubili, foliis cordatis integerrimis, calicibus tetrapyliis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 797. *t.* 315.

Houſtonis. 6. Eu. caule volubili, foliis ovatis integerrimis.

hyſſopifolium. 7. Eu. foliis lanceolato-linearibus trinerviis ſubintegerrimis. *Dill. h. Elth. t.* 114. *f.* 150.

*** *calicibus quinquefloris.*

lineari-folium. 46. Eu. foliis linearibus integris ſubverticillatis, calicibus ſubquinquefloris. *Walt. flor. carol. p.* 199.

rotundifolium. 8. Eu. foliis ſeſſilibus diſtinctis ſubrotundo-cordatis. *Pluckn. alm. t.* 88. *f.* 4.

haſtatum. 9. Eu. foliis cordato-haſtatis ſubdentatis nudis, caule volubili, floribus ſpicatis. *Brown. jam. t.* 34. *f.* 3.

zeilanicum. 10. Eu. foliis ovato-haſtatis petiolatis dentatis. *Burm. zeyl. t.* 21.

Murrubium. 40. Eu. foliis ovato-deltoidibus obtuſe ferratis pubeſcentibus ſeſſilibus. *Walt. flor. carol. p.* 199.

fuſco-rubrum. 41. Eu. foliis ovatis utrinque acuminatis petiolatis ſenis, caule maculato. *Walt. flor. carol. p.* 199.

ſinenſe. 11. Eu. foliis ovatis petiolatis ferratis.

piloſum. 42. Eu. foliis lanceolato-ovatis baſi obtuſis ferratis ſeſſilibus, calicibus piloſis. *Walt. flor. carol. p.* 199.

ſeſſilifolium. 12. Eu. foliis ſeſſilibus amplexicaulibus diſtinctis lanceolatis.

chilenſe. 13. Eu. foliis oppoſitis amplexicaulibus lanceolatis denticulatis. *Molin. hiſt. nat. chil. p.* 188.

album. 14. Eu. foliis lanceolatis ferratis, calicis foliolis lanceolatis apice ſcarioſis coloratis. *Mant. p.* 111. *Banks ic. Kæmpf. t.* 26.

altiſſimum. 15. Eu. foliis lanceolatis nervoſis, inferioribus apice ſubſerratis, caule ſuffruticoſo. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 164.

compoſitifolium. 43. Eu. foliis compoſitis ſublanceolatis. *Walt. flor. carol. p.* 199.

fœniculoides. 44. Eu. foliis compoſitis linearibus. *Walt. flor. carol. p.* 199.

trifoliatum. 16. Eu. foliis ternis.

japonicum. 17. Eu. foliis indiviſis trilobiſque ſerratis, caule ſcabro. *Thunb. flor. jap. p.* 308.

ſyriacum. 18. Eu. foliis oppoſitis ſubſeſſilibus ternatis. *Jacq. miſc.* 2. *p.* 349. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 35.

cannabinum. 19. Eu. foliis digitatis. *Flor. dan. t.* 745.

**** *calicibus ſeptemfloris.*

cinereum. 20. Eu. foliis oppoſitis lanceolatis tomentoſis. *Suppl. p.* 354.

***** *calicibus octofloris.*

maculatum. 21. Eu. foliis quinis ſubtomentoſis lanceolatis æqualiter ſerratis venoſis petiolatis. *Herm. par. bot. p.* 158. *ic.*

purpureum. 22. Eu. foliis quaternis ſcabris lanceolato-ovatis inæqualiter ſerratis petiolatis rugoſis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 13. *f.* 4.

ſcabrum. 23. Eu. villoſum, foliis oppoſitis petiolatis ovatis integriuſculis rugoſis ſupra ſcabris. *Suppl. p.* 354.

rigidum. 24. Eu. foliis petiolatis ovatis acutis ſerrato-dentatis rigidis ſubtus ſcabris, caule ſubherbaceo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 111.

nervoſum. 25. Eu. foliis elliptico-lanceolatis attenuatis dentatis triplinerviis utrinque glabris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 111.

****** *calicibus quindecim pluribuſve floſculis.*

villoſum. 26. Eu. foliis oppoſitis decuſſatis ovatis acutis ſubſerratis ſubtus villoſo-tomentoſis, caule fruticoſo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 257. *t.* 161. *f.* 2. *Floſculi* 8.-15.

perfoliatum. 27. Eu. foliis connato-perfoliatis tomentoſis. *Pluckc. alm. t.* 87. *f.* 6.

microphyllum. 28. Eu. foliis triangulari-ovatis novemcrenatis ſubtus tomentoſis fuſco-venoſis, panicula conglomerata terminali, pedunculo elongato. *Suppl. p.* 355.

aromaticum. 29. Eu. foliis ovatis obtuſe ſerratis petiolatis trinerviis, calicibus ſimplicibus. *Pluckn. alm. t. 88. f. 3.*

Ageratoides. 30. Eu. foliis ovatis ſerratis petiolatis, caule glabro. *Suppl. p. 355. Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 537. Ageratum altiſſimum. *Morſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 18. *f.* 11.

cæleſtinum. 31. Eu. foliis cordato-ovatis obtuſe ſerratis petiolatis. *Dill. h. Elth. t.* 114. *f.* 139.

incarnatum. 45. Eu. foliis cordato-haſtatis trinerviis obtuſe ſerratis lævibus venoſis petiolatis. *Walt. flor. carol. p.* 200.

molle. 32. Eu. foliis cordatis acutis ſubſerratis petiolatis pubeſcentibus, caule herbaceo tomentoſo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 111.

montanum. 33. Eu. foliis cordatis acutis denticulatis petiolatis ſcabris ſubtus hirſutis, corymbis patentibus, caule fruticoſo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 111.

urticæfolium. 34. Eu. hiſpidum, foliis cordatis petiolatis inciſo-ſerratis, panicula terminali, calicibus ſubulatis ſubpungentibus. *Suppl. p.* 354.

cordifolium. 35. Eu. foliis cordatis ſerratis ſubtus tomentoſo-hirſutis, petiolis breviſſimis, corymbis ſubſeſſilibus, calicibus ſquarroſis, caule fruticoſo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 111.

odoratum. 36. Eu. foliis deltoidibus ſerratis pubeſcentibus. *Pluckn. phyt.* 177. *f.* 3.

iyæfolium. 37. Eu. foliis lineari-lanceolatis trinerviis ſerratis, calicibus ſquarroſis.

ſtœchadifolium. 38. Eu. tomentoſum, foliis petiolatis linearibus crenatis tomentoſis ſubtus canis, panicula terminali. *Suppl. p.* 355.

myoſotifolium. 39. Eu. ſubvilloſum, foliis lanceolatis ſubintegerrimis, pedunculis terminalibus axillaribuſque ramoſis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 341. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 45.

936. AGERATUM. *Recept.* nudum. *Pappus* 5ariſtatus. *Cal.* oblongus, ſubæqualis. *Corollulæ* 4fidæ.

conyzoides. 1. A. foliis ovatis, caule piloſo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 152. *f.* 2.

ciliare. 2. A. foliis ovatis crenatis obtuſis, caule glabro. *Pluckn. alm. t.* 81. *f.* 4.

gujanenſe. 3. A. foliis cordatis ſerratis petiolatis. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 800.

PACURINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ſimplex, piloſus. *Cal.* ovatus, imbricatus. *Corollul.* 5fidæ.

edulis. 1. PACURINA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 800. *t.* 316.

937. PTERONIA. *Recept.* paleis multipartitis. *Pappus* ſubplumoſus. *Cal.* imbricatus.

camphorata. 1. Pt. foliis ſparſis ciliatis, calicis foliolis ſerrulatis. *Mant. p.* 464. *Pluckn. mant. t.* 345. *f.* 56. *n.* 2.

ſtricta. 2. Pt. foliis ſparſis baſi ſubciliatis, calicis foliolis integerrimis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 162.

oppoſitifolia. 3. Pt. foliis oppoſitis, ramis dichotomis divaricatis. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 17. *f.* 3.

flexicaulis. 4. Pt. foliis filiformibus glabris, calicibus obtetragonis, ramis brevibus rigidis. *Suppl. p.* 355.

pallens. 5. Pt. foliis filiformibus glabris, calicibus teretibus ovatis, caule ramiſque incurvis teretibus. *Suppl. p.* 357.

minuta. 6. Pt. foliis linearibus vagis, floribus axillaribus. *Suppl. p.* 357.

Cephalotes. 7. Pt. foliis ſubulatis conduplicatis carinatis ſerrulatis, calicibus oblongis terminalibus minutiſſime laceris. *Suppl. p.* 358.

ſpinoſa. 8. Pt. foliis ſubulatis ſpinaſcentibus pungentibus. *Suppl. p.* 357.

cinerea. 9. Pt. foliis oblongis tomentoſis, calicis ſquamis ovatis membranaceis. *Suppl. p.* 356.

villoſa. 10. Pt. foliis lanceolatis obtuſis piloſis, ſquamis calicis ovatis membranaceis. *Suppl. p.* 356.

hirſuta. 11. Pt. foliis lanceolatis patentibus piloſis, caule procumbente, ſquamis calicis integris. *Suppl. p.* 346.

glabrata. 12. Pt. foliis lanceolatis glabris, ſquamis calicis ovatis membranaceis. *Suppl. p.* 356.

glomerata. 13. Pt. foliis ovato-triquetris glabris, caule tetragono. *Suppl. p.* 356.

retorta. 14. Pt. foliis ovatis reflexis glabris margine ciliatis ſcabris, caule erecto, ſquamis calicis integris. *Suppl. p.* 356.

inflexa. 15. Pt. foliis ovatis piloſis, ſquamis calicis ſubarticulatis membranaceis, pedunculo inflexo. *Suppl. p.* 356.

membranacea. 16. Pt. foliis ovatis pulverulento-tomentoſis, ſquamis calicis ſubulatis margine ſcarioſis. *Suppl. p.* 357.

ſcarioſa. 17. Pt. foliis ovalibus, calicibus ſcarioſis, ramis ſpinoſis. *Suppl. p.* 356.

faſciculata. 18. Pt. floribus faſciculatis unifloſculoſis. *Suppl. p.* 357.

caroliniana. 19. Pt. foliis radicalibus agregatis gramineis piloſis, paleis receptaculi ſetis ſimplicibus. *Walt. flor. carol. p.* 202.

938. STÆHELINA. *Recept.* breviſſime paleaceum. *Pappus* ramoſus. *Antheræ* caudatæ.

gnaphalioides. 1. St. foliis filiformibus tomentoſis, ſquamis calicis apice membranaceis reflexis. *Pluckn. alm. t.* 302. *f.* 3.

dubia. 2. St. foliis linearibus denticulatis, ſquamis calicis lanceolatis, pappo calicibus duplo longiore. *Gerard. flor. prov. t.* 6.

Chamæpeuce. 3. St. foliis linearibus confertis longiſſimis revolutis. *Sup. pl. p.* 1147. Serratula Chamæpeuce. *Pluckn. alm. t.* 94. *f.* 3.

elegans. 11. St. foliis lineari-lanceolatis caule erecto tomentoſo, floribus ſpicatis, calicibus quinquefloris. *Swarts flor. carol. p.* 202.

imbricata. 4. St. foliis ſubulatis erectis tomentoſis. *Mant. p.* 281.

corymboſa. 5. St. foliis cuneatis præmorſis, floribus corymboſis. *Sup. p.* 359.

fruticoſa. 6. St. foliis lanceolatis obtuſis. *Sp. pl. p.* 1286. centaurea fruticoſa. *Lob. ic.* 548.

ilicifolia. 7. St. foliis oppoſitis breviſſime petiolatis cordatis dentatis ſupra lucidis ſubtus tomentoſis. *Suppl. p.* 358.

arboreſcens. 8. St. foliis ovalibus. *Mant. p.* 111. *Schreb. dec.* 1. *t.* 1.

haſtata. 9. St. fruticoſa, foliis haſtatis incanis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 70.

ſpinoſa. 10. S. foliis ſubulatis ſpinaſcentibus, baſi utrinque ſpinula, *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 69.

939.

939. CHRYSOCOMA. *Recept.* nudum. *Pappus* papillaris ſeſſilis. *Cal.* hemiſphæricus, imbricatus. *Stilus* vix floſculis longior.

* *fruticoſæ.*

dichotoma. 1. Chr. prolifera dichotoma glabra, foliis linearibus planis ſerratis ſcabriuſculis, pedunculis corymboſis ſquamoſis hirtis. *Suppl. p.* 359. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 78.

ſericea. 2. Chr. albo-ſericea, foliis linearibus canaliculatis, ramulis apice paniculatis. *Suppl. p.* 360.

cernua. 3. Chr. foliis linearibus recurvis ſubſcabris, floribus nubilibus cernuis. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 45.

Coma aurea. 4. Chr. foliis linearibus rectis glabris dorſo decurrentibus. *Pluckn. alm. t.* 327. *f.* 2.

fruticoſa. 22. Chr. foliis cuneiformibus ſuperne ſubſerratis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 280. *t.* 22. *f.* 2.

montana. 23. Chr. foliis oblongis integerrimis, floribus ſolitariis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 70.

oppoſitifolia. 5. Chr. foliis oppoſitis obovatis, floribus faſciculatis pedunculatis. *Breyn. ic. t.* 17. *f.* 2.

** *ſuffruticoſæ.*

ſcabra. 6. Chr. foliis lanceolato-ovatis recurvis denticulato-ſerratis, pedunculis pubeſcentibus. *Dill. h. Elth. t.* 88. *f.* 103.

ciliata. 7. Chr. foliis linearibus rectis ciliatis, ramis pubeſcentibus. *Commel h. amſt.* 2. *t.* 48.

patula. 8. Chr. foliis linearibus glabris, ramis divaricatis. *Mant. p.* 280.

tomentoſa. 9. Chr. foliis ramiſque tomentoſis.

*** *herbaceæ.*

Linoſyris. 10. Chr. foliis linearibus glabris, calicibus laxis. *Col. ecphr.* 1. *p.* 82. *ic.*

piloſa. 11. Chr. foliis lineari-aceroſis cauleque ſimplici piloſis, floribus ſeſſilibus ſubimbricatis ſpicatis. *Walt. flor. carol. p.* 197.

gramini-folia. 12. Chr. foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus corymboſis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 556. *n.* 13. Solidago lanceolata.

biflora. 13. Chr. paniculata, foliis lanceolatis trinerviis punctatis nudis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 82. *f.* 1.

villoſa. 14. Chr. foliis lanceolatis villoſis, calicibus arctis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 82. *f.* 2.

ramoſa. 15. Chr. foliis lanceolatis, caule ſubramoſo pubeſcente, floribus ſubſeſſilibus ſpicatis. *Walt. flor. carol. p.* 198.

panicu-lata. 16. Chr. foliis lanceolatis aſcendentibus cauleque viſcoſo ſimplici piloſis, panicula terminali. *Walt. flor. carol. p.* 198.

uniflora. 17. Chr. foliis lanceolatis, pedunculis terminalibus unifloris, caule ramoſo. *Walt. flor. carol. p.* 198.

purpu-rea. 18. Chr. foliis elliptico-lanceolatis ſubſerratis pubeſcentibus, panicula terminali corymboſa. *Forſt. flor. auſt. p.* 54.

gigan-tea. 19. Chr. foliis confertis ſeſſilibus ovato-lanceolatis ſerratis rugoſis utrinque lævibus. *Walt. flor. carol. p.* 196.

odoratiſ-ſima. 20. Chr. foliis radicalibus obovato-oblongis, caulinis oblongo-lanceolatis lævibus, floribus corymboſis. *Walt. flor. carol. p.* 198.

acaulis. 21. Chr. ſubacaulis, foliis dentatis, radicalibus planis ſubovatis, floralibus alternis, remotis lanceolatis. *Walt. flor. carol. p.* 196.

940. TARCHONANTHUS. *Recept.* piloſum. *Pappus* piloſus. *Cal.* 1phyllus, ſemiſeptemfidus, turbinatus.

campho-ratus. 1.' T. foliis oblongis planis, calice quinquefido. *Suppl. p.* 361. *Pluckn. alm. t.* 174. *f.* 1.

glaber. 2. T. foliis glabris integris dentatiſque. *Supp. p.* 361.

ericoides. 3. T. foliis aceroſis, calicibus tetraphyllis. *Suppl. p.* 360. *an hujus generis?*

CHUQUIRAGA. *Recept.* villoſum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* turbinatus, imbricatus polyphyllus.

Juſſieui. 1. CHUQUIRAGA. *Juſſieu gen. plant. p.* 178.

941. CALEA. *Recep.* paleaceum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus.

jamaicenſis. 1. C. floribus ſubternis pedunculatis, foliis ovato-oblongis ſubſerratis petiolatis. *Sloan. jam.* 1. *t.* 151 *f.* 3.

leptophylla. 2. C. floribus terminalibus ternis quinisve congeſtis, foliis oblongis imbricatis integerrimis ſeſſilibus, caule fruticoſo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 55.

pinifolia. 3. C. pedunculis terminalibus congeſtis, foliis linearibus aceroſis, caule fruticoſo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 55.

oppoſitifolia. 4. C. corymbis congeſtis, pedunculis longiſſimis, foliis lanceolatis caule herbaceo.

Amellus. 5. C. floribus ſubpaniculatis, calicibus brevibus, ſeminibus nudis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis.

carolinia-na. 6. C. floribus paniculatis, foliis alternis lanceolatis ſubſerratis ſeſſilibus. *Walt. flor. carol. p.* 203.

ſcoparia. 7. C. caule fruticoſo, ramis ſuboppoſitis tetraquetris.

aſpera. 8. C. aſpera, pedunculis terminalibus cauleque tetragonis, foliis petiolatis oppoſitis ſerratis deltoideis lanceolatiſque. *Jacq. coll.* 2. *p.* 290. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 46.

942. SANTOLINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, hemiſphæricus.

Chamæcypariſſus. 1. S. pedunculis unifloris, foliis quadrifariam dentatis. *Blackw. herb. t.* 346.

roſmarinifolia. 2. S. pedunculis unifloris, foliis linearibus margine tuberculatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 22.

tinctoria. 3. S. pedunculis unifloris, foliis linearibus integerrimis, caulibus ſtriatis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 119.

alpina. 4. S. pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caulibus ſimplicibus. *Mich. nov. pl. gen. t.* 27.

anthemoides. 5. S. pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caule ramoſiſſimo villoſo.

flagrantiſſima. 6. S. corymbis faſtigiatis, caule fruticoſo diffuſo tomentoſo, foliis ovatis crenulatis ſeſſilibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 147.

943. ATHANASIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* paleaceus, breviſſimus. *Cal.* imbricatus.

* *corolla æquali.*

crenata. 1. A. floribus ſolitariis terminalibus, foliis linearibus.

capitata. 2. A. floribus terminalibus ſubſeſſilibus, foliis lanceolatis hirſutis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 48.

trinervia. 29. A. floribus terminalibus, foliis caulinis alternis ovato-lanceolatis trinerviis. *Walt. flor. carol. p.* 201.

graminifolia. 30. A. pedunculis unifloris, ſcapo paucifloro, foliis radicalibus gramineis. *Walt. flor. carol. p.* 200.

maritima. 3. A. pedunculis bifloris, foliis lanceolatis crenatis obtuſis tomentoſis. *Mill. h. angl. t.* 135. *nonne potius ob ſemina nuda ſantolinæ ſpecies?*

obovata. 31. A. pedunculis prælongis, foliis radicalibus obovato-oblongis. *Walt. flor. carol. p.* 201.

haſtata. 32. A. caule erecto, foliis haſtatis ſcabris rugoſis. *Walt. flor. carol. p.* 201.

paniculata. 33. A. caule erecto, panicula terminali, foliis lanceolatis decurrentibus. *Walt. flor. carol. p.* 201.

pubeſcens. 4. A. corymbis ſimplicibus, foliis lanceolatis indiviſis villoſis. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 47.

annua. 5. A. corymbis ſimplicibus coarctatis, foliis pinnatifidis dentatis. *Herm. par. Lugdb. p.* 227. *ic.* *β*) Achillea inodora. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 566.

trifurcata. 6. A. corymbis ſimplicibus, foliis trilobis cuneiformibus. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 49.

crithmifolia. 7. A. corymbis ſimplicibus, foliis ſemitrifidis linearibus. *Mill. h. angl. t.* 227. *f.* 2.

linifolia. 8. A. corymbo ſimplici, foliis linearibus. *Suppl. p.* 361.

dentata. 9. A. corymbis compoſitis, foliis recurvis, inferioribus linearibus dentatis, ſuperioribus ovatis ſerratis. *Commel. rar. t.* 41. β) Athanaſia lævigata. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 541.

parviflora. 10. A. corymbis compoſitis, foliis pinnatis linearibus. *Mant. p.* 464. *Syſt. nat.* XII. 3. 541. Tanacetum crithmifolium. *Burm. afr. t.* 68. *f.* 4.

pinnata. 11. A. corymbis compoſitis denſis, foliis pinnatis linearibus tomentoſis. *Suppl. p.* 361.

pectinata. 12. A. corymbo compoſito, foliis pinnatis glabris. *Suppl. p.* 361.

ſerrata. 13. A. corymbo compoſito, foliolis lanceolatis dentato-ſerratis. *Suppl. p.* 361.

filiformis. 14. A. corymbo compoſito, foliis linearibus glabris, patulis. *Suppl. p.* 361.

cinerea. 15. A. corymbo compoſito, foliis linearibus tomentoſis integris. *Suppl. p.* 361.

** *corolla radiata*, Relhaniæ.

† *floribus aggregatis.*

ſquarroſa. 16. A. foliis oblongis acuminatis enervibus apice recurvis. *Herit. ſert. angl. p.* 22. *t.* 29.

geniſtifolia. 17. A. foliis lanceolatis acuminatis uninerviis ſubimbricatis. *Mant. p.* 464.

microphylla. 18. A. foliis linearibus enervibus confertiſſimis, floribus pedicellatis. *Herit. ſert. angl. p.* 22.

paſſerinoides. 19. A. foliis linearibus enervibus, floribus ſubſeſſilibus. *Herit. ſert. angl. p.* 23.

viſcoſa. 20. A. foliis linearibus triquetris ſubcarnoſis viſcidis. *Herit. ſert. angl. p.* 23.

†† *floribus ſolitariis.*

laxa. 21. A. foliis linearibus villoſis remotis, floribus longius pedunculatis, caule erecto. *Herit. ſert. angl. p.* 23.

pumila. 22. A. foliis linearibus villoſis, floribus pedunculatis, caulibus diffuſis. *Suppl. p.* 362. *an eadem cum Zoega capenſi?*

ſeſſiliflora. 23. A. foliis linearibus villoſis, pedunculis lateralibus folio brevioribus. *Suppl. p.* 362.

virgata. 24. A. foliis linearibus glabris, acumine recurvo folio breviore, floribus ſeſſilibus. *Herit. ſert. angl. p.* 23.

pungens. 25. A. foliis linearibus ſubpungentibus ſubtus ſtriatis, floribus ſeſſilibus. *Herit. ſert. angl. p.* 24.

ſantolinoides. 26. A. foliis linearibus triquetris ſubtus turionibuſque incanis calicibus globoſis ſubpetiolatis. *Herit. ſert. angl. p.* 24.

decuſſata. 27. A. foliis linearibus triquetris decuſſatis acutis, floribus ſeſſilibus. *Herit. ſert. angl. p.* 24.

uniflora. 28. A. foliis obovatis glabris, floribus ſeſſilibus. *Suppl. p.* 362.

MARSHALLIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* coronata calic. 5phyllo. *Cal.* polyphyllus perſiſtens. *Stigm.* 2.

Schreberi. 1. MARSHALLIA. *Schreb. nov. Linn. gen. plant. ad* 2. *p.* 810.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

944. TANACETUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, hemiſphæricus. *Cor.* radii 3fidæ, lineari-ligulatæ, interdum o.

annuum. 1. T. foliis bipinnatifidis linearibus acutis, corymbis tomentoſis. *Mill. h. angl. t.* 227. *f.* 1.

vulgare. 2. T. foliis bipinnatis inciſis ſerratis. *Flor. dan. t.* 871.

incanum. 3. T. foliis bipinnatis tomentoſis, corymbo ovato compoſito.

myriophyllum. 4. T. foliis bipinnatis tomentoſis, pinnulis caulinorum dentatis, radicalium integerrimis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 566. Achillea bipinnata.

monanthon. 5. T. caulibus ſimpliciſſimis unifloris longitudine foliorum. *Mant. p.* 111.

argenteum. 6. T. foliis pinnatis tomentoſis, pinnis lanceolatis, floribus cymoſis. *Willden. de achil. t.* 2.

ſibiricum. 7. T. foliis pinnatis, pinnis lineari-filiformibus, corymbis glabris, caule herbaceo. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 65. *f.* 2.

angulatum. 8. T. foliis pinnatifidis, laciniis inciſo-dentatis, calice angulato. *Willden. de achilleis t. 2.*

ſuffruticoſum. 9. T. foliis pinnato-multifidis, laciniis linearibus ſubdiviſis acutis, caule ſuffruticoſo. *Mant. p.* 465.

cotuloides. 10. T. foliis dentato-pinnatis acuminatis, caule ramoſiſſimo, floribus ſubpaniculatis. *Mant. p.* 282.

flabelliforme. 11. T. foliis deltoidibus apice ſerratis, corymbis ſimplicibus. *Herit. ſert. angl. p.* 21. *t.* 27.

Balſamita. 12. T. foliis ovatis integris ſerratis. *Blackw. herb. t.* 98.

945. ARTEMISIA. *Recept.* ſubvilloſum vel nudiuſculum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus: ſquamis rotundatis conniventibus. *Cor.* radii o.

* *fruticoſæ erectæ.*

vermiculata. 1. A. foliis aceroſis confertis minimis, panicula racemoſa, floribus ſeſſilibus. *Mant. p.* 281. *Breyn. cent. p.* 24. *t.* 12.

capillaris. 2. A. foliis ſimplicibus capillaceis. *Thumb. flor. jap. p.* 309.

Abrotanum. 3. A. foliis ſetaceis ramoſiſſimis. *Blackw. herb. t.* 555.

laricifolia. 4. A. foliis faſciculatis indiviſis fiſſiſque, ramis deflexis, floribus oblongis cernuis. *S. G. Gmel. it.* 2. *p.* 3.

Lerchii. 5. A. incana, foliis ſuperioribus linearibus indiviſis, inferioribus pinnatis brevibus tenuiter diviſis, pinnis palmatis, corymbis ſeſſilibus copioſiſſimis ſpicatis oblongis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 114. *n.* 99. *t.* 50. *f.* 2. 3. *β*) *Gmel. flor. ſib. p.* 112. *n.* 97. *t.* 49. *f.* 2.

nitroſa. 6. A. ſubincana, foliis ſuperioribus integris obtuſis, inferioribus tenuiter multifidis, corymbis erectis incurvis oblongis ſpicatis ſeſſilibus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 113. *n.* 98.

arboreſcens. 7. A. foliis compoſitis multifidis linearibus, floribus ſubgloboſis. *Lob. ic.* 753.

Gmelini. 8. A. foliis duplicato-pinnatis obtuſis linearibus ſubtus incanis, corymbis ſubrotundis nutantibus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 121. *n.* 106.

argentea. 9. A. ſericea, foliis ſubpalmatis pinnatifve, laciniis lato-linearibus remotis. *Herit. ſert. angl. p.* 22. *t.* 28.

æthiopica. 10. A. foliis palmatis linearibus minutiſſimis, floribus racemoſis pedunculatis. *Mant. p.* 283.

Contra. 11. A. foliis palmatis linearibus minutis, panicula racemoſa, floribus ſeſſilibus. *Mant. p.* 282.

judaica. 12. A. foliis obovatis obtuſis lobatis parvis, floribus paniculatis pedicellatis. *Mant. p.* 111. 281. *Pluckn. alm. t.* 73. *f.* 2.

pauciflora. 13. A. ramis virgatis filiformibus, corymbis ſecundis ſpicatis ſubſeſſilibus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 116. *n.* 101.

** *ſuffruticoſæ.*

Meſſerſchmidii. 14. A. tomentoſa, caule erecto, foliis linearibus multifidis, racemis erectis tenuibus laxis. *Weber apud Stechmann de artemiſ. p.* XIX. *n.* IX.

humilis. 15. A. foliis ſetaceis pinnatifidis, caule decumbente. *Lob. ic.* 769. *Mill. h. angl. t.* 2. *f.* 1.

hiſpanica. 16. A. foliis laxe pinnatis, pinnis longis linearibus, ſpicis denſiſſimis calicibus oblongis. *Weber apud Stecmann de artemiſ. p.* XXX. *n.* XXIV.

italica. 17. A. foliis tomentoſis laxe pinnatis, pinnis longis linearibus, radicalibus punctaris, ſpicis denſis, floribus erectis. *Haller. flor. Goett. p.* 373.

tatarica. 18. A. tomentoſa, foliis inferioribus bipinnatis, pinnis æqualibus, ſuperioribus pinnatis linearibus, racemis erectis laxis multifloris. *Weber ap. Stechmann artemiſ. p.* XIX. *n.* X.

*** *herbaceæ.*

† *procumbentes ante floreſcentiam.*

campeſtris. 19. A. foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. β) Artemiſia Mutellina. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 159. γ) Artemiſia incana. *Mill. h. angl. t.* 2. *f.* 2.

anethifolia. 20. A. foliis multifidis tenuiſſime diviſis, corymbis ſubrotundis nutantibus ſecundis laxe ſpicatis, caule aſcendente. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 119. *n.* 103.

crithmifolia. 21. A. foliis compoſitis divaricatis linearibus carnoſis glabris, caule aſcendente paniculato.

glacialis. 22. A. foliis palmatis multifidis ſericeis, caulibus aſcendentibus, floribus glomeratis faſtigiatis. *Jacq. flor. auſtr. 5. app. t. 35. coll. 2. t. 7. f. 1. 3.*

maritima. 23. A. foliis multipartitis tomentoſis, racemis cernuis, floſculis femineis ternis.

ſantonica. 24. A. foliis caulinis linearibus pinnato-multifidis, rameis indiviſis, ſpicis ſecundis reflexis, floribus quinqueflorіs. *Gmel. flor. ſib. 2. t. 51.*

paluſtris. 25. A. foliis linearibus pinnatis integerrimis, floribus glomeratis ſubſeſſilibus. *Gmel. flor. ſib. 2. t. 55.*

rupeſtris. 26. A. foliis pinnatis, caulibus aſcendentibus, floribus globoſis cernuis, receptaculo papposo. *Flor. dan. t. 801.*

ſpicata. 27. A. foliis radicalibus biternatis, caule aſcendente ſpicato, floribus erectis. *Jacq. flor. auſt. 5. app. t. 34.*

†† *erectæ.*

† *foliis compoſitis aut diviſis.*

filaginoides. 28. A. tomentoſa, foliis multifidis, floribus ſubſpicatis ſubſeſſilibus. *Haller hiſt. ſtirp. Helv. 1. p. 55. n. 128.*

ſericea. 29. A. foliis multifidis lineari-lanceolatis, floribus ellipticis pendulis. *Gmel. flor. ſib. 2. p. 131. n. 113.*

tenella. 30. A. caule lanato, foliis tenuiſſime multifidis brevibus, paniculis tenuibus laxis folioſis. *Weber ap. Stoehm. de artmiſ. p.* XXVI. *n.* XX.

Semſek. 31. A. foliis multifidis filiformibus ſubvilloſis, petiolis triquetris. *Forsk. flor. æg. arab. p. 218.*

Abſinthicum. 32. A. foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis, receptaculo villoſo. *Knorr del. hort. 2. t.* A. 17.

inodora. 33. A. foliis compoſitis multifidis tomentoſis, floribus ſubgloboſis, receptaculo villoſo, *an ſatis diſtincta ab Abſinthio?*

pontica. 34. A. foliis multipartitis ſubtus tomentoſis, floribus ſubrotundis nutantibus, receptaculo nudo. *Jacq. flor. auſtr. 1. t. 99.*

auſtriaca. 35. A. foliis multipartitis tomentoſis incanis, floribus oblongis nutantibus, receptaculo nudo. *Jacq. flor. auſtr. 1. t. 100.*

vulgaris. 36. A. foliis pinnatifidis planis inciſis ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus recurvatis, floribus radio quinquefloro. *Blackw. herb. t. 431.*

borealis. 37. A. foliis pinnato-ſubſeptemfidis villoſis linearibus, floribus conglomeratis. *Pallas it.* 3. *p.* 755. *t.* Hh. *f.* 1.

Jacquini. 38. A. foliis pinnatis, pinnis lanceolatis inæqualiter inciſis, inferioribus integerrimis, floribus globoſis axillaribus ſubgeminis. *Jacq. Colled.* 1. *p.* 98.

pectinata. 39. A. foliis pinnatis pectinatis glabris ſeſſilibus, floribus axillaribus foliariis ſeſſilibus quadrifloris. *Suppl. p.* 362. *Pallas it.* 3. *p.* 755. *t.* Hh. *f.* 2.

tanacetifolia. 40. A. foliis bipinnatis ſubtus tomentoſis nitidis, pinnis tranſverſis, racemis ſimplicibus. *Allion. pedem. t.* 2. *f.* 1.

annua. 41. A. foliis triplicato-pinnatis utrinque glabris, floribus ſubgloboſis nutautibus, receptaculo glabro conico. *Amm. ruth. t.* 193. *f.* 23.

† † *foliis ſimplicibus & indiviſis.*

cærulescens. 42. A. foliis caulinis lanceolatis integris, radicalibus multifidis, floſculis femineis ternis. *Du Hamel arbr.* 1. *t.* 24. *f.* 5.

japonica. 43. A. foliis glabris, rameis lanceolatis integris, caulinis oblongis trifidis, floribus racemoſis cernuis. *Thumb. flor. jap. p.* 310.

Dracunculus. 44. A. foliis lanceolatis glabris integerrimis. *Black. herb. t.* 116.

integrifolia. 45. A. foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis integerrimis dentatiſque, floſculis femineis quinis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 48. *f.* 1.

ſinenſis. 46. A. foliis tomentoſis obtuſis lanceolatis, inferioribus cuneiformibus trilobis. *Pluckn. amalth.* 3. *t.* 153. *f.* 5.

minima. 47. A. foliis cuneiformibus repandis, caule procumbente, floribus axillaribus ſeſſilibus. *Burm. ind. t.* 58. *f.* 3. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 88.

littoralis. 48. A. procumbens ſtrigoſa, foliis ſpatulatis ſerrato-dentatis, calicibus nudis pedicellatis. *Retz obſ. bot.* 5. *p.* 28.

maderaſpatana. 49. A. foliis lyrato-ſinuatis, caulibus procumbentibus, floribus pedunculatis ſolitariis globoſis oppoſitifoliis. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 49.

946. GNAPHALIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus vel capillaris. *Cal.* imbricatus ſquamis marginalibus rotundatis, ſcarioſis, coloratis.

* *Fruticoſa.*

† *Argyrocoma.*

eximium. 1. Gn. foliis ſeſſilibus ovatis confertis erectis tomentoſis, corymbo ſeſſili. *Mant. p.* 573. *Edw. av. t.* 183. *Mill. an var. ſubj. t.* 3. *f.* 1.

trinerve. 2. Gn. foliis ſeſſilibus lanceolatis trinerviis ſubtus argenteis, panicula corymboſa terminali laxa. *Forſt. flor. auſtr. p.* 55.

appendiculatum. 3. Gn. foliis ſeſſilibus imbricatis lanceolatis lanatis apice membrana ſcarioſa appendiculatis. *Suppl. p.* 363.

coronatum. 4. Gn. foliis ſeſſilibus lanceolatis, corymbis compoſitis ſeſſilibus, pedunculis aphyllis, calicibus coronatis. *Burm. afr. t.* 69. *f.* 3.

diſcolorum. 5. Gn. foliis ſeſſilibus lanceolatis, calicibus albis, ſquamis inferioribus incarnatis. *Burm. afr. t.* 79. *f.* 4.

arboreum. 6. Gn. foliis ſeſſilibus linearibus ſupra glabris margine revolutis, floribus ſubcapitatis, pedunculis elongatis.

ericoides. 7. Gn. foliis ſeſſilibus linearibus, calicibus exterioribus rudibus, interioribus incarnatis.

grandiflorum. 8. Gn. foliis amplexicaulibus ovatis trinerviis utrinque lanuginoſis. *Burm. afr. t.* 76. *f.* 1.

fruticans. 9. Gn. foliis amplexicaulibus ovatis, caule rigente, cyma ſeſſili. *Mant. p.* 282.

undatum. 10. Gn. foliis ſubtus tomentoſis ſupra ſcabris, radicalibus petiolatis oblongis, caulinis amplexicaulibus undulatis. *Suppl. p.* 363.

teretifolium. 11. Gn. foliis confertis teretiuſculis, corymbis ramoſis; calicibus exterius ferrugineis. *Burm. afr. t.* 77. *f.* 3.

muricatum. 12. Gn. foliis ſubulatis mucronatis, umbella compoſita, calicibus ſubtrifloris cylindricis. *Burm. afr. t.* 79. *f.* 1. 2. 3.

†† *Chryſocoma.*

mucronatum. 13. Gn. foliis ſubulatis mucronatis, calicum ſquamis ſubrotundis. *Mant. p.* 283. *Burm. afr. t.* 66. *f.* 3.

umbellatum. 14. Gn. foliis ſubulatis tortis faſciculatis, umbellis ſimplicibus terminalibus ſeſſilibus. *Suppl. p.* 363.

repens. 15. Gn. foliis linearibus, caule repente recto, ramis erectis ſimpliciſſimis. *Mant. p.* 283.

ſtœchas. 16. Gn. foliis linearibus, corymbo compoſito, ramis virgatis. *Blackw. herb. t.* 438.

hiſpidum. 17. Gn. foliis linearibus ſemiteretibus ſulcatis hiſpidis, capitulis terminalibus ſimplicibus. *Suppl. p.* 363.

Forſkåhlii. 18. Gn. foliis linearibus amplexicaulibus, corymbis terminalibus. *Forsk. Flor. æg. arab. p.* 218.

igneſcens. 19. Gn. foliis ſublanceolatis tomentoſis ſeſſilibus, corymbis alternis conglobatis, floribus globoſis.

maritimum. 20. Gn. ramoſiſſimum, foliis lanceolatis ſeſſilibus acutiuſculis, calicis ſquamis intimis aureis. *Mant. p.* 283. *Burm. afr. t.* 77. *f.* 2.

ſerratum. 21. Gn. foliis lanceolatis ſerratis amplexicaulibus ſupra nudis. *Burm. afr. t.* 76. *f.* 3.

craſſifolium. 22. Gn. foliis lato-lanceolatis ſubpetiolatis coriaceis tomentoſis, corymbo compoſito, caule prolifero. *Mant. p.* 112.

dentatum. 23. Gn. foliis cuneiformibus dentatis ſeſſilibus, corymbo ſimplici. *Burm. afr. t.* 68. *f.* 3.

patulum. 24. Gn. foliis ſpatulatis amplexicaulibus, corymbis aggregatis, ramis patentibus.

petiolatum. 25. Gn. foliis ovatis integerrimis petiolatis, floribus confertis terminalibus. *Burm. afr. t.* 76. *f.* 1.

** *Herbacea.*

† *Chryſocoma.*

orientale. 26. Gn. ſubherbaceum, foliis lineari-lanceolatis ſeſſilibus, corymbo compoſito, pedunculis elongatis. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 55.

milleflorum. 27. Gn. floribus corymboſis faſtigiatis ruſeſcenti-albidis, calicibus ſubcylindricis. *Suppl. p.* 362.

cylindricum. 28. Gn. foliis feſſilibus oblongis tomentoſis, corymbis inæqualibus, calicibus glabris cylindricis feſſilibus. *Pluckn. phyt.* 298. *f.* 4.

arenarium. 29. Gn. foliis lanceolatis, inferioribus obtuſis, corymbo compoſito, caulibus ſimpliciſſimis. *Flor. dan. t.* 641.

rutilans. 30. Gn. foliis lanceolatis, corymbo decompoſito, caule inferne ramoſo. *Dill. h. Elth. t.* 107. *f.* 127.

imbricatum. 31. Gn. foliis lanceolatis tomentoſis, ſquamis calicis reflexis, caule ramoſo. *Burm. afr. t.* 80. *f.* 2.

cymoſum. 32. Gn. foliis lanceolatis trinerviis ſupra glabris, racemo terminali, caule inferne ramoſo. *Pluckn. alm. t.* 279. *f.* 1.

nudifolium. 33. Gn. foliis lanceolatis trinerviis nudis reticulato-venoſis. *Petiv. gaz. t.* 82. *f.* 1.

uniflorum. 34. Gn. foliis lanceolatis alternis lanatis, caulibus unifloris proſtratis lanatis. *Hablizl ap. S. G. Gmel. it.* 4. *p.* 176.

albeſcens. 35. Gn. niveo-tomentoſum, foliis lineari-lanceolatis, caule erecto inferne ſimplici, ramis terminalibus faſtigiatis, floribus confertis conicis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 112.

luteo-album. 36. Gn. foliis ſemiamplexicaulibus enſiformibus repandis obtuſis utrinque pubeſcentibus, floribus conglomeratis. *Pluckn. alm. t.* 31. *f.* 16.

pedunculare. 37. Gn. foliis ſpatulatis ſubamplexicaulibus ſubtus tomentoſis calicis ſquamis acutiſſimis. *Mant. p.* 284.

Vira vira. 38. Gn. foliis decurrentibus ſpatulatis utrinque tomentoſis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 125.

odoratiſſimum. 39. Gn. foliis decurrentibus mucronatis utrinque tomentoſis planis. *Mill. h. angl. t.* 131. *f.* 2.

⊢ ⊢ *Argyrocoma.*

ſanguineum. 40. Gn. foliis decurrentibus lanceolatis tomentoſis planis, apiculo nudo terminali. *Rauw. it. p.* 285. *ic.*

undulatum. 41. Gn. foliis decurrentibus lanceolatis undulatis acutis ſubtus tomentoſis, caule ramoſo. *Dill. h. Elth. t.* 108. *f.* 130.

fœtidum. 42. Gn. foliis amplexicaulibus integerrimis acutis ſubtus tomentoſis, caule ramoſo. *Volkam. norimb. p.* 194. *ic. Pappus ſimplex.*

criſpum. 43. Gn. foliis amplexicaulibus ſpatulatis tomentoſis, calicibus obtuſiſſimis plicato-undulatis baſi tomentoſis. *Pluck. alm. t.* 298. *f.* 3.

helianthemifolium. 44. Gn. foliis ſubamplexicaulibus lanceolatis, corymbis compoſitis, calicis ſquamis ſubplicatis. *Volkam. norimb.* p. 194. ic.

ſquarroſum. 45. Gn. foliis ſeſſilibus lingulatis tomentoſis, calicis ſquamis interioribus ſubulatis recurvatis. *Pluckn. alm.* t. 323. f. 1.

ſtellatum. 46. Gn. foliis ſeſſilibus lanceolatis villoſis, calicibus acutis extrinſecus incarnatis. *Burm. afr.* t. 80. f. 1.

obtuſifolium. 47. Gn. foliis lanceolatis, caule tomentoſo paniculato, floribus glomeratis conicis terminalibus. *Dill. h. Elth.* t. 108. f. 131.

arabicum. 48. Gn. foliis lanceolatis remotis petiolatis ſupra piloſis integris, corymbo terminali, caule ramoſo. *Forsk. flor. æg. arab.* p. 218.

indicum. 49. Gn. foliis lanceolatis, caule ramoſiſſimo diffuſo, corymbis inæqualibus, calicibus intus coloratis. *Pluck. alm.* t. 187. f. 5.

purpureum. 50. Gn. foliis lanceolatis nudis, caule erecto ſimpliciſſimo, floribus ſpicatis lateralibus ſeſſilibus. *Dill. h. Elth.* t. 109. f. 132.

margaritaceum. 51. Gn. foliis lineari-lanceolatis acuminatis alternis, caule ſuperne ramoſo, corymbis faſtigiatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 12. n. 50.

cinereum. 52. Gn. foliis linearibus integris, calicibus cinereis. *Forsk. flor. æg. arab.* p. 218.

cuneifolium. 53. Gn. foliis cuneatis obtuſis ſubſinuatis, calicibus einereis. *Forsk. flor. æg. arab.* p. 218.

denudatum. 54. Gn. foliis ſpatulatis ſubtus niveis tomentoſis, ſupra lævibus. *Suppl.* p. 364.

americanum. 55. Gn. foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſubtomentoſis, caule inferne ſimplici ſuperne corymboſo, floribus ovatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp.* p. 112.

plantagineum. 56. Gn. foliis radicalibus ovatis maximis, caule ſimpliciſſimo, ſarmentis procumbentibus. *Pluckn. alm.* t. 348. f. 9.

dioicum. 57. Gn. ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici, floribus dioicis. *Dod. pempt.* 68.

alpinum. 58. Gn. ſarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, capitulo aphyllo, floribus oblongis. *Flor. dan.* t. 332.

† † † *Filaginoidea.*

ſilvaticum. 59. Gn. caule ſimpliciſſimo erecto, floribus ſparſis. *Flor. dan.* *t.* 254. β) Gnaphalium germanicum. *Schrank. flor. bav.* 2. *p.* 368.

norwegicum. 60. Gn. caule herbaceo ſimpliciſſimo, foliis lanceolatis utrinque acutis trinerviis ſubtus lanuginoſis, ſpica florum terminali denſe folioſa. *Flor. dan. t.* 254.

verticillatum. 61. Gn. caule ſimpliciſſimo, floribus verticillatis, foliis linearibus. *Suppl. p.* 364.

ſpicatum. 73. Gn. caule ſimpliciſſimo herbaceo, floribus verticillatis, foliis faſciculatis linearibus revolutis. *Petiv. gazoph. t.* 8. *f.* 12.

ſupinum. 62. Gn. caule ſimplici procumbente, floribus ſparſis. *Bocc. muſ. t.* 85.

Oculus Cati. 63. Gn. caule proſtrato, foliis ovatis, floribus glomeratis terminalibus villoſiſſimis. *Suppl. p.* 364.

glomeratum. 64. Gn. caule diffuſo, calicibus ſquamis interioribus ſubulatis nudis, foliis ſubamplexicaulibus.

uliginoſum. 65. Gn. caule ramoſo diffuſo, floribus confertis terminalibus. *Flor. dan. t.* 859.

nudum. 74. Gn. caule ramoſo herbaceo diffuſo, floribus confertis terminalibus nudis. *Hoffm. bot. Taſchenb.* 1791. *p.* 292.

tomentoſum. 75. Gn. caule ramoſo herbaceo diffuſo, floribus confertis terminalibus tomentoſis. *Hoffm. bot. Taſchenb.* 1791. *p.* 292.

piloſellum. 66. Gn. foliis lanceolatis quinquenerviis ſubtus tomentoſis, caule nudo, floribus capitatis. *Suppl. p.* 364.

radiatum. 67. Gn. foliis lanceolatis, calicum radio multiplici ſubrotundo. *Suppl. p.* 365.

declinatum. 68. Gn. foliis lineari-lanceolatis, calicibus radio albo lanceolato. *Suppl. p.* 365.

† † † † *incertæ cohortis.*

lanatum. 69. Gn. lanatum, foliis lineari-oblongis apice calloſo-mucronatis, corymbo coarctato, caule ſimpliciſſimo. *Forſt. flor. auſt. p.* 55.

involucratum. 70. Gn. foliis linearibus elongatis mucronatis ſubtus tomentoſis, capitulo terminali folioſo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 55.

japonicum. 71. Gn. erectum, foliis lineari-enſiformibus ſubtus niveis, capitulis terminalibus. *Thunb. flor. jap. p.* 311.

hyemale. 72. Gn. ſarmentis procumbentibus, foliis radicalibus obtuſis tomentoſis, floribus glomeratis conicis rubris. *Walt. flor. carol. p.* 203.

947. XERANTHEMUM. *Recept.* paleaceum aut nudum. *Pappus* ſetaceus, plumoſus aut piloſus. *Cal.* imbricatus, radiatus, radio colorato.

* *receptaculo paleaceo, pappo quinqueſeto.*

annuum. 1. X. herbaceum, foliis lanceolatis patentibus. *Jacq. flor. auſt.* 4. *t.* 388. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 20.

** *receptaculo nudo.*

⊢ *pappo piloſo.*

bellidioides. 2. X. ramis uniflor s, foliis ovato-oblongis cuſpidatis amplexicaulibus, pedunculis tomentoſis ſubaphyllis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 55.

caneſcens. 3. X. fruticoſum, foliis imbricatis ovato-ſubulatis glabris. *Burm. afr. t.* 68. *f.* 1.

veſtitum. 4. X. fruticoſum erectum, foliis adnatis lanceolato-linearibus apice calloſo-mucronatis, ramis unifloris foiioſis. *Seb. muſ.* 2. *t.* 43. *f.* 5.

imbricatum. 5. X. caulibus fruticoſis erectum, foliis ovatis ſubtomentoſis, pedunculis ſquamoſis. *Petiv. gaz. t.* 5. *f.* 10.

proliferum. 6. X. caule fruticoſo prolifero, floribus ſeſſilibus, foliis granulato-ſubrotundis imbricatis obſoletis. *Mant. p.* 467. *Seb. muſ.* 2. *t.* 89. *f.* 8.

⊢ ⊢ *pappo plumoſo.*

ſpecioſiſſimum. 7. X. fruticoſum erectum, foliis amplexicaulibus lanceolatis trinerviis, floribus pedunculatis. *Seb. muſ.* 2. *t.* 43. *f.* 6.

retortum. 8. X. caulibus fruteſcentibus provolutis, foliis tomentoſis recurvatis. *Dill. h. Elth. t.* 322. *f.* 415.

9. X.

ſtolonife- rum. 9. X. procumbens repens ſericeum, foliis oblongis recurvato-patulis, ramulis unifloris. *Suppl. p.* 366.

virgatum. 10. X. ramis unifloris virgatis, foliis lanceolatis tomentoſis, pedunculis ſubnudis. *Mant. p.* 284. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 16. *f.* 3.

ſeſamoi- des 11. X. ramis unifloris imbricatis, foliis linearibus. *Burm. afr. t.* 67. *f.* 2. *β) Seb. muſ.* 2. *t.* 43. *f.* 5.

ſquamo- ſum. 12. X. ramis unifloris inferne imbricatim folioſis, ſuperne denſe ſquamoſis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 279. *t.* 20. *f.* 2.

panicula- tum. 13. X. floribus paniculatis, foliis lineari-lanceolatis. *Suppl. p.* 366. *Burm. afr. t.* 67. *f.* 1.

Stæheli- na. 14. X. pedunculis terminalibus exſertis nudis unifloris, foliis lanceolatis tomentoſis.

variega- tum. 15. X. floribus ſolitariis nutantibus, ſquamis calicis obtuſis maculatis.

ſpinoſum. 16. X. ſquamis calicis mucronato-ſpinoſis. *Burm. afr. t.* 67. *f.* 3.

* * * *incertæ tribus.*

fulgidum. 17. X. foliis lato-lanceolatis convoluto-incumbentibus, floribus ſubſeſſilis. *Suppl. p.* 365.

recurva- tum. 18. X. foliis recurvatis lanceolatis complicato-canaliculatis cuſpidatis ciliatis, ramulis unifloris. *Suppl. p.* 366.

948. CARPESIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus, ſquamis exterioribus reflexis.

cernuum. 1. C. floribus terminalibus. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 204.

abrota- noides. 2. C. floribus lateralibus. *Osb. it. t.* 10.

949. BACCHARIS. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus, cylindricus. *Floſculi* feminei hermaphroditis immiſti.

ivæfolia. 1. B. foliis lanceolatis longitudinaliter dentato-ſerratis. *Barth. act. Hafn.* 2. *t.* 57.

fœtida. 2. B. foliis lanceolatis ſerrato-dentatis, corymbis folioſis

neriifolia. 3. B. foliis lanceolatis ſuperne uno alterove denticulo ſerratis.

Dioſcoridis. 4. B. foliis lato-lanceolatis dentatis ſeſſilibus ſtipulatis. *Suppl. p.* 366. *Rauw. it. p.* 54. *ic.*

arborea. 5. B. foliis elliptico-lanceolatis integerrimis nudis petiolatis. *Mant. p.* 284.

halimifolia. 6. B. foliis obovatis ſuperne emarginato-crenatis. *du Hamel arbr.* 1. *t.* 35.

braſiliana. 7. B. foliis obovatis integris ſcabris ſeſſilibus ſubtus venoſis.

indica. 8. B. foliis obovatis denticulatis petiolatis. *Breyn. cent. t.* 70.

viſcoſa. 9. B. foliis ſubcuneiformibus ſemiamplexicaulibus dentatis obtuſis piloſo-viſcoſis alternis, floribus corymboſis. *Walt. flor. carol. p.* 202.

950. CONYZA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus, ſubrotundus. *Cor:* radii 3fidæ.

caneſcens. 1. C. foliis linearibus, panicula faſtigiata. *Suppl. p.* 397.

ſaxatilis. 2. C. foliis linearibus ſubdentatis, pedunculis longiſſimis unifloris, caule ſuffruticoſo. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 10. *f.* 16.

ſordida. 3. C. foliis linearibus integerrimis, pedunculis longis trifloris, caule ſuffruticoſo. *Mant. p.* 466. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 543. Gnaphalium ſordidum.

linifolia. 4. C. foliis lineari-lanceolatis integerrimis, corollis radiatis. *Pluckn. alm. t.* 79. *f.* 2.

ſquarroſa. 5. C. foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboſo, calicibus ſquarroſis. *Flor. dan. t.* 622.

virgata. 6. C. foliis lanceolatis ſerrulatis decurrentibus, caulibus virgatis, floribus ſpicatis ſparſis congeſtis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 152. *f.* 5.

decurrens. 7. C. foliis lanceolatis ſerrulatis decurrentibus, floribus axillaribus ſeſſilibus glomeratis.

balſamifera. 8. C. foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis, petiolis etiam dentatis. *Suppl. p.* 1208. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 24. *f.* 1.

aſteroides. 9. C. foliis lato-lanceolatis ſubſerratis, corollis radiatis, calicibus ſquarroſis.

criſpata. 10. C. foliis lanceolatis decurrentibus ſerrato dentatis nudis, pedunculis unifloris, caule fruticoſo. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 71.

purpuraſcens. 11. C. foliis ovato-lanceolatis ſerratis ſubtomentoſis, caule ſubherbaceo inferne ſimplici ſuperne corymboſo, floribus ovatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 258. *t.* 252. *f.* 1.

lobata. 12. C. foliis ſuperioribus ovato-lanceolatis obſolete ſerratis, inferioribus trifidis, floribus corymboſis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 152. *f.* 4. *an Calææ potius ſpecies ?*

anthelmintica. 13. C. foliis lanceolato-ovatis ſcabris, pedunculis unifloris, calicibus ſquarroſis. *Rheed. h. malab.* 2. *t.* 24.

ſinenſis. 14. C. foliis lanceolato-ovatis reflexo-ſerratis ſubtus tomentoſis, floribus terminalibus congeſtis. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 14. *f.* 2.

colorata. 15. C. foliis ovatis ſerratis ſubtomentoſis acutis, caule corymboſo, corollis ſubgloboſis. β) *Pluckn. alm. t.* 177. *f.* 2.

candida. 16. C. foliis ovatis tomentoſis, floribus confertis, pedunculis lateralibus terminalibuſque. *Buxb. cent.* 2. *t.* 17.

arboreſcens. 17. C. foliis lanceolatis integerrimis ſubtus tomentoſis, racemis erectis ſecundis, bracteis reflexis. *Plum. ſpec. t.* 130. *f.* 2.

fruticoſa. 18. C. foliis ovatis integerrimis obtuſis, floribus ſeſſilibus alternis, ramulis flexuoſis.

incifa. 30. C. foliis ovatis ſubcordatis piloſo-viſcidis dentatis baſi auriculatis, receptaculi diſco favoſo. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 184.

tortuoſa. 19. C. foliis ovato-oblongis integerrimis, caule tortuoſo fruticoſo, racemis reflexis.

bifrons. 20. C. foliis ovato-oblongis amplexicaulibus. *Pluckn. alm. t.* 87. *f.* 4.

ſcabra. 21. C. foliis oblongis ſubdentatis ſeſſilibus ſcabris, pedunculis unifloris elongatis. *Mant. p.* 113.

pubigera. 22. C. foliis oblongis ſubdentatis ſubpetiolatis, pedunculis lanatis ſubbifloris. *Mant. p.* 113. *Rumpf. amb.* 5. *t.* 103. *f.* 2.

cinerea. 23. C. foliis oblongis, floribus paniculatis, corollis cylindricis calice duplo longioribus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 17. *f.* 7.

caroliniensis. 24. C. foliis lanceolato-oblongis integerrimis, corymbis axillaribus, pedunculis multifloris. *Jacq. coll.* 2. *p.* 271.

rupeſtris. 25. C. foliis ſpatulatis ſubdentatis cauleque ſuffruticoſo tomentoſis, pedunculis elongatis unifloris. *Mant. p.* 113. *Shaw afr. t.* 176.

rugoſa. 33. C. foliis ellipticis decurrentibus crenatis ſubtus tomentoſis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 71.

bifoliata. 26. C. foliis ovalibus dentatis, pedunculis diphyllis, bracteis oppoſitis. *Pluckn. alm. t.* 177. *f.* 1.

hirſuta. 27. C. foliis ovalibus integerrimis ſcabris ſubtus hirſutis.

patula. 31. C. foliis ellipticis ſerratis ſubtus villoſis, calicibus ſubgloboſis, foliolis lanceolato-ſubulatis, ramis patulis. *Mill. h. angl. t.* 247.

rugoſa. 32. C. fruticoſa, foliis cuneiformibus ſerratis villoſis rugoſis reticulatis, pedunculis villoſis unifloris floribus radiatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 184.

rigida. 28. C. foliis petiolatis obovatis integris ſcabris ſubtus venoſis, ſpicis flexuoſis, floribus ſecundis geminatis. *Plum. ic.* 14. *f.* 1.

aurita. 29. C. foliis dentato-ſinuatis, auriculis ſubdecurrentibus. *Suppl. p.* 367.

951. ERIGERON. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cor.* radii lineares, anguſtiſſimæ.

carolinianum. 1. E. caule paniculato, floribus ſubſolitariis terminalibus, foliis linearibus integerrimis. *Dill. h. Elth. t.* 306. *f.* 393.

gramineum. 2. E. caule unifloro, foliis linearibus ciliatis ſcabris. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 76. *f.* 2.

decurrens. 34. E. foliis linearibus tomentoſis decurrentibus, floribus paniculatis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 72.

incanum. 35. E. foliis linearibus tomentoſis ſubdentatis, floribus corymboſis, caule fruticoſo. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 72.

tuberoſum. 3. E. foliis linearibus, ramis unifloris, caule ſuffruticoſo. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 19. *f.* 20. *β*) *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 20. *f.* 15. *γ*) *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 22. *f.* 7.

graveolens. 4. E. foliis ſublinearibus integerrimis, ramis lateralibus multifloris. *Mant. p.* 468. *Lob. ic.* 346.

fœtidum. 5. E. foliis lanceolato-linearibus retuſis, floribus corymboſis. *Mill. h. angl. t.* 223.

glutinoſum. 6. E. foliis lanceolato-linearibus piloſo-viſcidis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 112.

viſcoſum. 7. E. foliis lanceolatis denticulatis baſi reflexis, pedunculis unifloris lateralibus, calicibus ſquarroſis, corollis radiatis. *Mant. p.* 468. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 165.

canadenſe. 8. E. foliis lanceolatis ciliatis, caule floribuſque paniculatis hirtis. *Hoffmann bot. Taſchend.* 1791. *t.* 12.

philadelphicum. 9. E. foliis lanceolatis ſubſerratis, caulinis ſemiamplexicaulibus, floſculis radii capillaceis longitudine diſci.

bahamenſe. 10. E. fruticoſum, foliis lanceolatis petiolatis integris, floribus terminalibus corymboſis, floſculis radii trifidis. *Scop. del. inſ.* 3. *p.* 14. *t.* 7.

Gouani. 11. E. foliis lanceolatis ſubdentatis margine ſcabris, floribus congeſtis, calicibus ſcarioſis. *Mant. p.* 469. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 79.

ſumatrenſe. 12. E. tomentoſum, floribus racemoſo-paniculatis, foliis lanceolatis ſubſerratis. *Wennerberg ap. Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 28.

ſericeum. 13. E. floribus paniculatis, foliis ovato-lanceolatis tomentoſo ſericeis integris ſerratiſque baſi appendiculatis. *Wennerberg apud. Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 28.

glanduloſum. 29. E. foliis ovato-lanceolatis integris cauleque piloſis, pedunculis ternis, calicibus hemiſphæricis glanduloſo piloſis. *Walt flor. carol. p.* 205.

camphoratum. 14. E. foliis lanceolato-ovatis villoſis, ſerraturis apice cartilagineis.

purpureum. 33. E. foliis oblongis ſubdentatis amplexicaulibus, caule piloſo multifloro, radii corollis capillaribus diſco longioribus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 186.

ſcandens. 15. E. foliis ovatis ſerratis villoſis, floribus axillaribus, caule ſcandente. *Thunb. flor. jap. p.* 313.

obliquum. 16. E. ramoſiſſimum, foliis ovatis obliquis. *Mant. p.* 573.

japonicum. 17. E. foliis ſeſſilibus obovatis ſerratis villoſis, floribus paniculatis. *Thunb. flor. jap. p.* 312.

alpinum. 18. E. foliis obtuſis ſubtus villoſis, caule ſubbifloro, calice ſubhirſuto. *Flor. dan. t.* 292.

ægyptiacum. 19. E. foliis ſpatularis dentatis ſemiamplexicaulibus, floribus globoſis. *Mant. p.* 112. 517. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 19.

jamaicenſe. 20. E. foliis lanceolatis, ſerraturis utrinque duabus, caule pauciſloro albeſcente. *Swartz obſ. bot. p.* 306. *t.* 8. *f.* 2.

rivulare. 21. E. foliis cuneatis acutis hirtis, apice utrinque dentatis margine ciliatis, caulinis ſeſſilibus, caule ſimpliciuſculo erecto paucifloro. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 113.

tricuneatum. 22. E. fruticuloſum, foliis cuneatis trilobis. *Suppl. p.* 368.

pinnatum. 23. E. foliis pinnatiſidis dentatis. *Suppl. p.* 368.

bonarienſe. 24. E. foliis baſi revolutis. *Dill. h. Elth. t.* 257. *f.* 334.

ſiculum. 25. E. calicis ſquamis inferioribus laxis florem ſuperantibus, pedunculis folioſis. *Magn. h. monſp. p.* 76. *ic.*

acre. 26. E. pedunculis alternis unifloris. *Jungh. pl. off. ic. t.* 12.

uniflorum. 27. E. caule unifloro, calice piloſo. *Flor. lapp. t.* 9. *f.* 3.

Drœbachienſe. 28. E. caule floribuſque paniculatis, terminali majore. *Flor. dan. t.* 874.

piloſum. 30. E. calicibus piloſis, ſquamis laxis. *Walt. flor. carol. p.* 206.

ſquarroſum. 31. E. calicibus tomentoſis, ſquamis patentibus. *Walt. flor. carol. p.* 206.

cymoſum. 32. E. foliis dentato-laciniatis, calicibus lævibus. *Walt. flor. carol. p.* 206.

962. TUSSILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* ſquamæ æquales, diſcum æquantes, ſubmembranaceæ.

* *ſcapo unifloro.*

Anandria. 1. T. ſcapo ſquamoſo erecto, calice clauſo, foliis lyrato-ovatis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 68. *f.* 1.

nana. 2. T. ſcapo ſquamoſo erecto, calice ſubaperto. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 143. *t.* 67. *f.* 2.

ſibirica. 3. T. ſcapo imbricato, foliis ovato-oblongis ſinuato-dentatis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 141. *t.* 67. *f.* 1.

pumila. 4. T. ſcapo ebracteato erecto, foliis lyratis inciſis denticulatis tomentoſis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 113.

nutans. 5. T. ſcapo ebracteato, flore nutante, foliis lyratis obtuſis, *Plum. ic.* 41. *f.* 1.

dentata. 6. T. ſcapo ebracteato, foliis lanceolatis dentatis villoſis. *Plum. ic.* 40. *f.* 2.

alpina. 7. T. ſcapo ſubnudo, foliis cordato-orbiculatis crenatis utrinque virentibus. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 246.

diſcolor. 8. T. ſcapo ſubnudo, foliis cordato-orbiculatis crenatis ſupra lucidis, ſubtus tomentoſo-incanis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 247.

Farfara. 9. T. ſcapo imbricato, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. *Flor. dan. t.* 595. *ad polygamias neceſſarias potius ſpectat.*

* * *ſcapo paucifloro.*

ſilveſtris. 10. T. ſcapo ſubunifloro ſubnudo, foliis cordato-orbiculatis inciſo-lobatis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *app. t.* 12.

japonica. 11. T. floribus alternis radiatis. *Mant. p.* 113. *Banks ic. Kæmpf. t.* 27. 28.

* * * *floribus in thyrſum aggregatis*, Petaſites.

Petaſites. 12. T. thyrſo ovato, floſculis femineis nudis paucis. *Flor. dan. t.* 842.

paradoxa 13. T. thyrſo ſubovato, floſculis femineis nudis multis, hermaphroditis ternis, antheris liberis, foliis triangulari-cordatis denticulatis. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 24. *t.* 3.

hybrida. 14. T. thyrſo oblongo, floſculis femineis nudis plurimis. *Dill. h. Elth. t.* 230. *f.* 297. *an. diſtincta ſatis à Petaſite.*

ſpuria. 15. T. thyrſo faſtigiato, floſculis femineis ſubpetaloideis plurimis, foliis triangulari-cordatis denticulatis, lobis ſinuatis. *Retz. obſ. bot.* 1. *p.* 29. *t.* 2. *an diſtincta a paradoxa ?*

rubella. 16. T. thyrſo faſtigiato, floſculis petaloideis, femineis paucis, foliis ſubcordatis angulatis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 145. *t.* 68. *f.* 2.

lutea. 17. T. thyrſo faſtigiato, pedunculis multifloris, floſculis pauciſſimis hermaphroditis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 149. *t.* 69. *f.* D. F.

alba. 18. T. thyrſo faſtigiato, floribus femineis nudis paucis. *Flor. dan. t.* 524.

frigida. 19. T. thyrſo faſtigiato, floribus radiatis, foliis ſubtus incanis. *Flor. dan. t.* 61.

radiata. 20. T. thyrſo faſtigiato, floribus radiatis, foliis utrinque glaberrimis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 140. *t.* 69.

palmata. 21. T. thyrſo faſtigiato, foliis palmatis dentatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 188. *t.* 11.

953. SENECIO. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris longus. *Cal.* conicus, caliculatus, ſquamis apice ſphacelatis.

* *floribus floſculoſis.*

hieracifolius 1. S. foliis amplexicaulibus laceris, caule herbaceo erecto. *Mant. p.* 469. *Herm. par. Lugdb. p.* 226. *ic.*

cernuus. 2. S. foliis eroſis auriculatis, floribus nubilibus cernuis. *Suppl. p.* 370. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 98.

japonicus. 3. S. foliis inciſo-pinnatifidis dentatis glabris petiolatis. *Thunb. flor. jap. p.* 315.

vulgaris. 4. S. foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, floribus ſparſis. *Flor. dan. t.* 513.

arabicus. 5. S. foliis ſubbipinnatis petiolatis laevibus. *Mant. p.* 114.

peucedanifolius. 6. S. foliis pinnatis filiformibus. *Suppl. p.* 372.

virgatus. 7. S. foliis lyratis ſubtus tomentoſis, pedunculis unifloris, ſquamis ſubulatis.

purpureus. 8. S. foliis lyratis hirtis, ſuperioribus lanceolatis dentatis. *Breyn. cent. t.* 67.

erubeſcens. 64. S. foliis lyratis viſcoſis utrinque piloſis, ſuperioribus oblongo-lanceolatis, caulibus aſcendentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 190.

divaricatus. 9. S. foliis lanceolatis dentatis ſcabris, ramulis floriferis divaricatis.

perſicifolius. 10. S. foliis lanceolatis integerrimis baſi dentatis.

reclinatus. 11. S. foliis linearibus ſparſis ſcabris recurvis, caule fruteſcente. *Suppl. p.* 369. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 66. *Herit. ſtirp. nov.* 1. *t.* 5.

biflorus. 70. S. foliis linearibus planis ſubdentatis laevibus, pedunculis ſubbifloris, caule fruticoſo. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 72.

Pſeudo-China. 12. S. ſcapo ſubnudo longiſſimo. *Dill. h. Elth. t.* 258. *f.* 335.

tuſſilaginoides. 63. S. foliis crenatis, infimis cordatis petiolatis, ſuperioribus pinnatifidis lyratis. *Walt. flor. carol. p.* 208.

* *floribus radiatis.*

⊢ *radio revoluto.*

triflorus. 13. S. foliis ſeſſilibus ſinuatis, calicibus conicis, ſquamis minimis intactis. *Kniph. bot. orig. cent.* 1. *n.* 80. *β*) Senecio paucifoliis. *S. G. Gmel. it.* 3. *p.* 171. *t.* 38. *f.* 1.

laniger. 14. S. foliis ſeſſilibus dentatis oblongis. *S. G. Gmel. it.* 1. *p.* 155. *t.* 35. *f.* 1.

ægyptius. 15. S. foliis amplexicaulibus ſinuatis, ſquamis calicis brevioribus integris ſphacelatis. *Mant. p.* 517.

lividus. 16. S. foliis amplexicaulibus lanceolatis dentatis, ſquamis calicis breviſſimis intactis. *Kniph. bot. orig. cent.* 10. *n.* 79.

glaucus. 17. S. foliis amplexicaulibus lanceolatis obtuſis dentatis.

trilobus. 18. S. foliis amplexicaulibus, ſquamis calicis ſphacelatis laceris.

cineraſcens. 66. S. foliis pinnatifidis tomentoſis margine revolutis, panicula patula, calicis ſquamis exterioribus patulis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 191.

viſcoſus. 19. S. foliis pinnatifidis viſcidis, ſquamis calicis laxis longitudine perianthii. *Dill. h. Eth. t.* 258. *f.* 336.

ſilvaticus. 20. S. foliis pinnatifidis denticulatis, caule corymboſo erecto. *Flor. dan. t.* 869.

nebrodenſis. 21. S. foliis lyratis ſinuatis obtuſis petiolatis, caule hirto. *Barr. rar. pl. ic. t.* 401.

varicoſus. 22. S. foliis ovatis petiolatis dentatis punctulato-varicoſis. *Linn. fil. dec.* 9. *t.* 5.

hadienſis. 23. S. foliis ellipticis petiolatis integerrimis denticulatiſque, caule fruticoſo, floſculis radii quinis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 149. *ic. t.* 19.

leucanthemifolius. 62. S. foliis ſpatulatis inciſo-crenatis, corymbo paucifloro. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 238.

⊢ ⊢ *radio patente.*

† *foliis diviſis aut compoſitis.*

pubigerus. 24. S. petiolis radicalibus lanatis, foliis runcinatis, caulibus

ſimpliciſſimis, floribus lateralibus ſeſſilibus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 18. *f.* 32.

elegans. 25. S. foliis pinnatifidis æqualibus patentiſſimis, margine incraſſato recurvato. *Seb. muſ.* 1. *t.* 22. *f.* 1. *β*) *Volkam. norimb. p.* 225. *ic.*

ſqualidus. 26. S. foliis pinnatifidis, laciniis linearibus diſtantibus, corollis calice longioribus integris. *β*) Senecio alpeſtris. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 387.

erucifolius. 27. S. foliis pinnatifidis dentatis ſubhirtis, caule erecto. *Barr. pl. rar. ic. t.* 153.

venuſtus. 67. S. foliis pinnatifidis, laciniis linearibus acutis dentatis, caule calicibuſque glabris. *Ait. hort. kew.* 3. *p.* 192.

alpinus. 28. S. foliis cordatis lyratis groſſe ſerratis, petiolis auritis. *Suppl. p.* 371. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 557. Cineraria alpina.

auriculatus. 71. S. foliis lanceolatis lyrato-pinnatis dentatis nudis, petiolis auritis. *Vahl ſymb. bot.* 1. *p.* 72. *t.* 18.

Jacobæa. 29. S. foliis pinnato-lyratis, laciniis lacinulatis, caule erecto. *Knorr del. hort.* 1. *t.* I.

umbellatus. 30. S. foliis pinnato-denticulatis, laciniis diſtantibus. *Mant. p.* 470.

haſtatus. 31. S. foliis pinnato-ſinuatis petiolis amplexicaulibus, pedunculis folio triplo longioribus. *Dill. h. Elth. t.* 152. *f.* 184.

abrotanifolius. 32. S. foliis pinnato-multifidis linearibus nudis acutis, pedunculis ſubunifloris. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 79.

incanus. 33. S. foliis utrinque tomentoſis ſubpinnatis incanis, corymbo ſubrotundo. *Pluckn. phyt.* 39. *f.* 6.

tenuifolius. 34. S. foliis pinnatis, pinnis linearibus, pedunculis corymboſis caule erecto. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 278.

diffuſus. 35. S. foliis bipinnatis linearibus caulibus diffuſis. *Suppl. p.* 371.

canadenſis. 36. S. foliis bipinnatis linearibus, pedunculis corymboſis.

aureus. 37. S. foliis crenatis, infimis cordatis petiolatis, ſuperioribus pinnatifidis lyratis.

lyratus. 38. S. foliis infimis lyratis dentatis, ſupremis ſerratis amplexicaulibus, lobis margine muricatis. *Suppl. p.* 369.

† † *foliis indiviſis ſimplicibuſque.*

linifolius. 39. S. foliis linearibus integerrimis, corymbo ſubſquamato, caule herbaceo. *Barr. pl. rar. ic. t.* 802.

roſmarinifolius. 40. S. foliis linearibus margine revolutis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 369. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 20.

longifolius. 41. S. foliis linearibus ſparſis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 470. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 71.

cruciatus. 42. S. foliis linearibus ſubtus tomentoſis, inferioribus cruciatis, ſuperioribus integris. *Suppl. p.* 371.

aſper. 68. S. foliis lanceolato-linearibus dentatis rigidis, calicibus ſublanuginoſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 196.

juniperinus. 43. S. foliis ſubulatis, caule fruticoſo. *Suppl. p.* 371.

byzantinus. 44. S. foliis oblongis remote dentatis ſpinoſo-denticulatis ſupra nudis, caule herbaceo.

eroſus. 45. S. foliis radicalibus petiolatis oblongis ſinuatis ſerratis villoſis, caule unifloro ſubnudo. *Suppl. p.* 370.

ilicifolius. 46. S. foliis ſagittatis amplexicaulibus dentatis, caule herbaceo. *Seb. muſ.* 1. *t.* 22. *f.* 4.

paludoſus. 47. S. foliis enſiformibus acute ſerratis ſubtus ſubvilloſis, caule ſtricto. *Flor. dant. t.* 385.

nemorenſis. 48. S. foliis lanceolatis biſerratis ſubtus villoſis, caule ramoſo, corollis octonis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 184.

ſarracenicus. 49. S. foliis lanceolatis ſerratis glabriuſculis, floribus corymboſis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 186.

Doria. 50. S. foliis lanceolatis denticulatis nudis ſubdecurrentibus, ſuperioribus ſenſim minoribus, floribus corymboſis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 185.

marginatus. 51. S. foliis lanceolatis glabris ſubarticulatis marginatis amplexicaulibus, corymbo compoſito. *Suppl. p.* 370.

haſtifolius. 52. S. foliis lanceolatis ſubdentatis lævibus amplexicaulibus. *Suppl. p.* 372.

lanceus. 69. S. foliis lanceolatis baſi cordatis amplexicaulibus lævibus argute ſerratis, caule frutescente. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 194.

lanatus. 53. S. foliis ſeſſilibus utrinque lanatis dentatis, infimis ovatis, ſuperioribus lanceolatis. *Suppl. p.* 370.

maritimus. 54. S. foliis ovatis denticulatis carnoſis amplexicaulibus, caule herbaceo procumbente. *Suppl. p.* 369.

angulatus. 55. S. foliis ovatis dentato-angulatis glabris petiolatis. *Suppl. p.* 369.

Doronicum. 56. S. foliis indiviſis ſerratis, radicalibus ovatis ſubtus villoſis, caule indiviſo ſubunifloro. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *app. t.* 45.

populifolius. 57. S. foliis ovatis ſpatulatis integris obtuſis, adultioribus ſupra glabris, caule fruticoſo.

rigidus. 58. S. foliis ſpatulatis repandis eroſis ſcabris amplexicaulibus, caule fruticoſo. *Seb. muſ.* 1. *t.* 22. *f.* 5.

ſibiricus. 59. S. foliis ellipticis lævibus, floſculis radii quinis. *Suppl. p.* 370.

halimifolius. 60. S. foliis obovatis carnoſis dentatis, caule fruticoſo. *Dill. h. Elth. t.* 104. *f.* 124.

cordifolius. 61. S. foliis cordatis dentatis, calicibus ſimpliciſſimis. *Suppl. p.* 372.

incertæ tribus.

ciliatus. 65. S. floribus radiatis, caule piloſo, foliis lanceolato-linearibus ciliatis. *Walt. flor. carol. p.* 208.

954. ASTER. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Coroll.* radii plures quam 10. *Cal.* imbricati, ſquamæ inferiores patulæ.

* *Fruticoſi.*

reflexus. 1. A. foliis ovatis ſubimbricatis recurvatis ſerrato-ciliatis, floribus terminalibus. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 28.

Cymbalariæ. 46. A. foliis ovatis ſinuatis calicibuſque imbricatis hirtis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 197.

crinitus. 2. A. foliis ovato-oblongis acutis ſubtus tomentoſis, calicibus pilo terminatis.

fruticuloſus. 3. A. foliis linearibus punctatis, pedunculis unifloris nudis. *Commel. h. auſt.* 2. *t.* 27.

taxifolius. 4. A. ſuffruticoſus, foliis decurrentibus ſubulatis canaliculatis ciliatis, floribus terminalibus.

carolinianus. 43. A. caule ramoſiſſimo flexuoſo ſubſcandente, foliis integris lævibus lanceolatis ſeſſilibus, pedunculis folioſis unifloris. *Walt. flor. carol. p.* 208.

* * *Herbacei.*

⊢ *foliis ſubintegerrimis.*

† *pedunculis ſquamatis.*

hyſſopifolius. 5. A. foliis lineari-lanceolatis baſi attenuatis ſtriatis, ramulis corymboſis faſtigiatis. *Mant. p.* 114. 517.

dumoſus. 6. A. foliis linearibus glabris, ramulorum breviſſimis paniculatis, rames calicibus cylindricis. *Pluckn. alm. t.* 78. *f.* 6.

ericoides. 7. A. foliis linearibus glaberrimis, rameis ſubulatis, caulinis elongatis, calicibus ſubſquarroſis, caule glabro.

multiflorus. 52. A. foliis linearibus glabriuſculis, ramulis ſecundis, calicibus ſquarroſis, ſquamis acutis, caule pubeſcente. *Dill. hort. Elth.* 40. *t.* 36. *f.* 40.

folioloſus. 53. A. foliis lanceolato-linearibus glabris, ramulorum patentiſſimis, calicis ſquamis acutis, caule pubeſcente. *Dill. hort. Elth.* 39. *t.* 35. *f.* 39.

ſalicifolius. 54. A. foliis lineari-lanceolatis glabris, calicibus laxis, caule lævi. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 203.

linariifolius. 8. A. foliis linearibus mucronatis ſcabris ſtriatis, ſuperioribus laxis remotis, calicibus inermibus, ramis faſtigiatis. *Pluckn. alm. t.* 14. *f.* 7.

linifolius. 9. A. foliis linearibus ſcabriuſculis, ramis corymboſis faſtigiatis, radiis diſco ſubæqualibus.

rigidus. 10. A. foliis linearibus alternis, floribus terminalibus ſolitariis.

tenuifolius. 11. A. foliis ſublinearibus, pedunculis folioſis. *Pluckn. alm. t.* 78. *f.* 5.

nemoralis. 47. A. foliis lineari-lanceolatis baſi attenuatis ſcabriuſculis, ramis filiformibus unifloris, calicibus laxis imbricatis, foliolis acutis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 198.

acris. 12. A. foliis lanceolato-linearibus ſtriatis planis, floribus corymboſis faſtigiatis, pedunculis folioſis. *Lob. ic.* 349.

umbellatus. 48. A. foliis lanceolatis baſi attenuatis margine ſcabris, ramis corymboſis faſtigiatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 199.

novæangliæ. 13. A. foliis lanceolatis cordatis piloſis amplexicaulibus, calicibus laxis diſcum ſuperantibus, foliolis lineari-lanceolatis ſubæqualibus, caule hiſpido. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 2.

ciliatus. 44. A. foliis lanceolatis integris ciliatis, floribus ſubſolitariis. *Walt. flor. carol. p.* 209.

ſquarroſus. 45. A. foliis ſquarroſis triangularibus confertis ſcabris, floribus ſubpaniculatis. *Walt. flor. carol. p.* 209.

grandiflorus. 14. A. foliis linearibus ſubamplexicaulibus hiſpidis ciliatis, ramorum caliciſque reflexis. *Mill. h. angl. t.* 282.

paludoſus. 49. A. foliis linearibus amplexicaulibus erectis glaberrimis margine ſcabris, pedunculis ſubnudis, calicibus ſquarroſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 201.

patens. 50. A. foliis oblongis integris acutis cordatis ſubamplexicaulibus ſcabris, ramis patulis elongatis paucifloris, calicibus ſubſquarroſis, caule hirto. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 201.

æſtivus. 51. A. foliis lanceolatis ſubamplexicaulibus glabris margine ſcabris, calicibus laxis, foliolis æqualibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 203.

undulatus. 15. A. foliis ſerratis piloſis undulatis, inferioribus cordatis, petiolis alatis, caule hiſpido, ramulis virgatis. *Herm. par. Lugdb. p.* 96. *ic.*

coriaceus. 16. A. foliis ovatis ſuperne ſulcatis ſubtus lanatis, pedunculis unifloris lanatis. *Forſter flor. auſtr. p.* 56.

concolor. 17. A. foliis ovatis ſeſſilibus, caule ſimpliciſſimo, racemo terminali.

† † *pedunculis nudis.*

Tripolium. 18. A. foliis lineari-lanceolatis carnoſis glabris trinerviis, calicis ſquamis ſubmembranaceis obtuſis. *Flor. dan. t.* 615.

vernus. 19. A. foliis radicalibus lanceolatis obtuſis, caule ſubnudo filiformi ſubramoſo.

Amellus. 20. A. foliis oblongo-lanceolatis integris ſcabris, ramis nudiuſculis corymboſis, calicibus imbricatis ſubſquarroſis, ſquamis obtuſis interioribus membranaceis apice coloratis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 435.

ſibiricus. 21. A. foliis lanceolatis ſubamplexicaulibus piloſo ſcabris ſerratis, calicibus laxis hiſpidis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 80. *f.* 1.

alpinus. 22. A. foliis ſubſpatulatis hirtis, caule ſimplici unifloro. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 88.

tenellus. 23. A. foliis filiformibus aculeato-ciliatis, calicibus hemiſphæricis foliolis æqualibus. *Mant. p.* 471. *Curtis bot. magaz. t.* 33.

divarica-tus. 24. A. foliis ovatis ſerratis, floralibus integerrimis obtuſiuſculis amplexicaulibus, ramis divaricatis. *Pluckn. alm. t. 79. f. 1.*

⊢⊢ *foliis ſerratis.*
† *pedunculis nudis.*

cordifo-lius. 25. A. foliis cordatis petiolatis ſubtus piloſis, petiolis ſubſimplicibus, caule hirto, ramis paniculatis. *Moriſ. hiſt. pl. 3. t. 22. f. 34.*

corymbo-ſus. 59. A. foliis cordatis glabris acuminatis petiolatis, petiolis ſimplicibus, caule glabro, ramis faſtigiatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 207.*

panicula-tus. 60. A. foliis glabris acutis petiolatis, radicalibus cordatis, caulinis ovatis, ſummis lanceolatis integris, caule glabro paniculato, calicibus laxis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 207.*

puniceus. 26. A. foliis amplexicaulibus lanceolatis ſcabris, caule hiſpido, ramis paniculatis, calicibus laxis diſcum ſuperantibus. *Herm. par. Lugdb. p. 651. ic.*

annuus. 27. A. foliis piloſiuſculis, ſuperioribus lanceolatis, inferioribus ſubovatis crenatis, calicibus hemiſphæricis, ſquamis ſtrigoſis ſubæqualibus. *Flor. dan. t. 486.*

ſcaber. 28. A. foliis oblongis ſcabris, pedunculis paniculatis. *Thunb. flor. jap. p. 316.*

†† *pedunculis ſquamoſis.*

indicus. 29. A. foliis ovato-oblongis, floralibus ovali-lanceolatis, ramulis unifloris. *Pluckn. alm. t. 149. f. 4.*

miſus. 30. A. foliis ſeſſilibus lanceolatis ſubſerratis glabris, calicis ſquamis acutis, diſco radiis æquali, caule villoſiuſculo.

lævis. 31. A. foliis amplexicaulibus lucidis oblongis, radicalibus ſubſerratis, caule glabro, ramis ſimplicibus ſubunifloris.

novi Bel-gii. 32. A. foliis ſubamplexicaulibus lanceolatis glabris margine ſcabris, inferioribus ſerratis, caule glabro, ramis ſubdiviſis, calicibus laxis. *Herm. par. Lugdb. p. 67. ic.*

Tradeſ-canti. 33. A. foliis lanceolatis ſeſſilibus cauleque tereti glabris, ramis virgatis.

junceus. 55. A. foliis lanceolato-linearibus ſeſſilibus glabris, infimis ſubſerratis, ramulorum lanceolatis, caule glabriuſculoſo, ramis virgatis. *Ait. hort. Kew. 3. p. 204.*

pendulus. 56. A. foliis elliptico-lanceolatis glabris, ramulorum remotiuſculis, caule pubeſcente, ramis divaricatiſſimis pendulis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 204.

diffuſus. 57. A. foliis elliptico-lanceolatis glabris, caule pubeſcente, ramis patentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 205.

divergens. 58. A. foliis elliptico-lanceolatis glabris, caulinis lineari-lanceolatis, caule pubeſcente, ramis patentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 205.

tardiflorus. 34. A. foliis glabris lanceolatis baſi attenuatis ſeſſilibus, calicibus laxis glabris.

ſpectabilis. 61. A. foliis lanceolatis ſcabriuſculis, inferioribus ſerratis, ramis corymboſis, calicibus laxis ſquarroſis foliaceis, ſquamis ſubcuneiformibus. *Ait hort. Kew.* 3. *p.* 209.

Radula. 62. A. foliis lanceolatis acuminatis rugoſis ſcaberrimis, calicis ſquamis lanceolatis obtuſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 210.

holoſericeus. 35. A. foliis oblongo-lanceolatis ſubtus argenteo-ſericeis, pedunculis unifloris folioſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 56.

mutabilis. 36. A. foliis ſubamplexicaulibus lævibus lanceolatis, calicibus laxis, caule glabro, ramulis virgatis. *Pluckn. alm. t.* 326. *f.* 1.

tataricus. 37. A. foliis radicalibus lanceolato-ovatis ſcabris, caule paucifloro. *Suppl. p.* 373.

ſinenſis. 38. A. foliis ovato-oblongis integris ſinuatiſve ciliatis, calicibus ciliatis folioſis patentibus. *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 3. 4. 5.

macrophyllus. 39. A. foliis oblongis, caulinis cordatis petiolatis, ſummis ovatis ſeſſilibus. *Otterit. ſtirp. nov.* 2. *t.* 66.

criſpus. 40. A. foliis linearibus ſerrato-criſpis, caule tomentoſo, radio diſco breviore. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 150.

††† *pedunculis nullis.*

hiſpidus. 41. A. foliis infimis oblongis crenatis ſcabris, caulinis lanceolatis integris ciliatis, caule ſcabro, floribus ramos terminantibus. *Thunb. flor. jap. p.* 315. *Banks ic. Kæmpf. t.* 29.

* * * *incertæ tribus.*

ericæfolius. 42. A. calice cylindrico, ſquamis membranaceis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 150.

ſalicinus. 63. A. foliis lanceolatis ſerratis margine ſcabris, ramis ſublinearibus integerrimis, pedunculis alternis ſubnudis. *Scholl. flor. barb. t.* 1.

955. **SOLIDAGO.** *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cor.* radii circiter 5. *Cal.* ſquamæ imbricatæ, conniventes.

ſuaveolens. 1. S. foliis lineari-lanceolatis integerrimis acutis ſubquinquenerviis punctatis glabris tenerrime ciliatis, racemis paniculatis ſecundis, caule erecto pubeſcente. *Schœpf. it.* 1. *p.* 166. *Pluckn. alm. t.* 116. *f.* 6.

viminea. 24. S. caule erecto ſubpubeſcente, foliis lineari-lanceolatis membranaceis baſi attenuatis glabris margine ſcabris, infimis ſubſerratis, racemis erectis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 215.

dubia. 2. S. foliis lanceolatis ſeſſilibus nervoſis ſupra ſcabris rariter denticulatis. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 19. *t.* 10.

mexicana. 3. S. foliis lanceolatis ſubcarnoſis lævibus integerrimis, racemis paniculatis erectis, pedunculis ſquamoſis, caule obliquo glabro.

ſerotina. 4. S. racemis terminalibus folioſis ſecundis, foliis lanceolatis ſubſerratis deflexis. *Retz obſ. bot.* 2. *p.* 26. *an diſtincta ſatis ſpecies ?*

piloſa. 18. S. panicula terminali, caule piloſo, foliis ovatis integris ciliatis. *Walt. flor. carol. p.* 207.

ſempervirens. 5. S. foliis lineari-lanceolatis ſubcarnoſis lævibus integerrimis margine ſcabro, racemis paniculatis ſecundis, caule erecto glabro. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 5.

gigantea. 25. S. caule erecto glabro, foliis lanceolatis ſerratis glabris margine ſcabris, racemis paniculatis ſecundis, pedunculis hirtis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

arguta. 26. S. caule erecto glabro, foliis glabris argute inæqualiter ſerratis, caulinis ellipticis, radicalibus ovato-oblongis, racemis paniculatis ſecundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 213.

juncea. 27. S. caule erecto glabro, foliis lanceolatis glabris margine ſcabris, inferioribus ſerratis, racemis paniculatis ſecundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 213.

elliptica. 28. S. caule erecto glabro, foliis ellipticis lævibus ſerratis, racemis paniculatis ſecundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 214.

ſtricta. 29. S. caule erecto glabro, foliis caulinis lanceolatis glabris margine ſcabris integerrimis, radicalibus ſerratis, racemis paniculatis erectis, pedunculis glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 216.

lævigata. 30. S. caule erecto lævi, foliis carnoſis lanceolatis integerrimis lævibus, racemis paniculatis erectis, pedunculis ſquamoſis villoſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 215.

Sera. 31. S. caule erecto tereti lævi, foliis lineari-lanceolatis triplinerviis glabris margine aſperis ſerratis, racemis paniculatis ſecundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

exſia. 6. S. foliis lanceolatis ſerratis glabris, racemis erectis; caule recto lævi. *Dill. h. Elth. t.* 307. *f.* 395.

lateriflora. 7. S. racemis paniculatis ſecundis ſubrecurvis, foliis lanceolatis ſubtriplinerviis glabris margine ſcabris, caule erecto piloſiuſculo.

altiſſima. 8. S. caule erecto hirto, paniculis ſecundis, foliis enerviis ſerratis rugoſis ſcaberrimis lanceolatis. *Mart. cent. t.* 14.

canadenſis. 9. S. caule villoſo erecto, racemis paniculatis ſecundis recurvis, foliis lanceolatis triplinerviis ſerratis ſcabris. *Pluckn. alm. t.* 263. *f.* 1.

procera. 19. S. caule erecto villoſo, racemis ſpiciformibus erectis, innuptis nutantibus, foliis lanceolatis ſerratis triplinerviis ſcabris ſubtus villoſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

reflexa. 20. S. caule erecto villoſo, racemis paniculatis ſubſecundis, foliis lanceolatis ſubſerratis triplinerviis ſcabris reflexis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 211.

petiolaris. 21. S. caule erecto villoſo, racemis erectis, foliis ellipticis ſcabriuſculis petiolatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 215.

nemoralis. 22. S. caule erecto tomentoſo, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis integerrimis, radicalibus ſubcuneiformibus ſerratis, racemis paniculatis ſecundis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 213.

bicolor. 10. S. racemis erectis, caule foliiſque ellipticis piloſis, inferioribus ſerratis, calicis ſquamis obtuſis. *Mant. p.* 114. *Pluckn. alm. t.* 114. *f.* 8.

minuta. 11. S. caule ſimpliciſſimo piloſo, foliis lanceolatis acutis ſerratis glabris, racemo terminali ſimplici erecto. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 7. 8.

aſpera. 23. S. caule erecto tereti piloſo, racemis paniculatis ſecundis, foliis ovatis ſubellipticis ſcaberrimis rugoſis ſerratis enerviis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 212.

Virga-aurea. 12. S. caule erecto tereti pubeſcente ſuperne ramoſo, racemis erectis, foliis inferioribus ellipticis ſerratis. *Flor. dan. t.* 663.

cambrica. 33. S. caule ſimpliciſſimo pubeſcente, foliis cuneiformi-lanceolatis ſerratis ſubpiloſis, racemis erectis. *Dill. hort. Elth.* 413. *t.* 306. *f.* 393.

multiradiata. 34. S. caule ſubvilloſo, foliis ſeſſilibus lanceolatis glabris ciliatis, inferioribus apice ſerratis, racemo terminali erecto. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 218.

flexicaulis. 13. S. caule flexuoſo glabro angulato, foliis ovatis acuminatis ſerratis glabris, racemis erectis. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 3. *an eadem cum latifolia.*

ambigua. 32. S. caule ſubflexuoſo angulato glabro ramoſo, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis ſubtus ſubpiloſis, racemis erectis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 217.

latifolia. 14. S. caule erecto, foliis ovatis acuminatis ſerratis, racemis lateralibus ſimplicibus. *Pluckn. alm. t.* 235. *f.* 4.

rigida. 15. S. caule foliiſque ovato-oblongis piloſis ſcabris, caulinis integerrimis, infimis ſerratis floriferis paniculatis, racemis compactis erectis. *Herm. par Lugdb. p.* 243. *ic.*

noveboracenſis. 16. S. foliis radicalibus ovato-oblongis petiolatis, caule nudiuſculo ramoſo faſtigiato.

arboreſcens. 17. S. caule arboreo, paniculis corymboſis ſtrictis terminalibus, foliis ovato-ſubrotundis acutis repandis petiolatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 56.

951. CINERARIA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Cal.* ſimplex, polyphyllus, æqualis.

geifolia. 1. C. pedunculis ramoſis, foliis reniformibus ſuborbiculatis ſublobatis dentatis petiolatis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 22. *f.* 2.

humifuſa. 2. C. pedunculis unifloris, foliis reniformibus ſubangulatis, petiolis apice auriculatis nudiſve. *Herit. ſert. angl. p.* 25.

cymbalarifolia. 3. C. foliis lyratis, impari reniformi denticulato, caulinis ſummis amplexicaulibus lobatis integerrimis.

tuſſilaginis. 4. C. floribus laxe paniculatis, foliis reniformi-cordatis multangulis ſubtus tomentoſis, petiolis baſi auritis. *Herit. ſert. angl. p.* 26.

ſibirica. 5. C. racemo ſimplici, foliis cordatis obtuſis denticulatis lævibus, caule ſimpliciſſimo monophyllo. *Mant. p.* 472. *Amm. ruth. t.* 24.

cordifolia. 6. C. panicula pauciflora, foliis caulinis petiolatis cordatis acute ſerratis glabris, caule angulato. *Suppl. p.* 371. 375. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 176. β) *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 177.

aurita. 7. C. floribus corymboſis, foliis cordatis ſubangulatis ſubtus tomentoſis, petiolis baſi biauritis. *Herit. ſert. angl. p.* 26. *t.* 31.

malvæfolia. 8. C. floribus cymoſis, foliis cordatis angulatis ſubtus ſubtomentoſis, petiolis ſimplicibus. *Herit. ſert. angl. p.* 26. *t.* 32.

cruenta. 9. C. floribus cymoſis, foliis cordatis angulatis ſubtus purpuraſcentibus, petiolis baſi auritis. *Herit. ſert. angl. p.* 26. *t.* 33.

elongata. 10. C. foliis ſubcordatis eroſis, pedunculis longiſſimis ſubulato-ſquamoſis. *Suppl. p.* 374.

lanata. 11. C. pedunculis unifloris, foliis cordato-ſubrotundis ſeptangulis ſubtus lanuginoſis. *Herit. ſert. angl. p.* 25. *t.* 30. *Jacq. Collect.* 3. *p.* 177. *t.* 19. *f.* 1.

glauca. 12. C. racemo ſimplici, foliis ſpatulato-cordatis integerrimis, caule ſimpliciſſimo. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 74.

criſpa. 13. C. floribus paniculatis, foliis caulinis ſpatulato-oblongis ſerratis obtuſis amplexicaulibus baſi dilatato-dentatis. *Suppl. p.* 376. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 178.

longifolia. 14. C. foliis oblongis obſolete denticulatis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 181.

cacalioides. 15. C. foliis oblongis teretibus carnoſis, panicula terminali elongata pauciflora, pedunculis alternis. *Suppl. p.* 374.

glabra. 16. C. foliis oblongis acutis ſubdenticulatis enerviis utrinque glabris ſubcarnoſis, caule fruticoſo corymboſo, calicibus cylindricis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 113.

linifolia. 17. C. pedunculis unifloris, foliis ſparſis, caule fruticoſo.

japonica. 18. C. foliis enſiformibus dentatis tomentoſis, floribus terminalibus. *Thunb. flor. jap. p.* 317.

integrifolia. 19. C. floribus umbellatis, foliis denticulatis lanceolatis, radicalibus ſpatulatis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 179. γ) *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 180.

aurea. 20. C. floribus corymboſis, foliis lanceolatis ſerratis ſubtus tomentoſis.

denticulata. 21. C. foliis lanceolatis glabris denticulatis, floribus paniculatis. *Suppl. p.* 375.

lineata. 22. C. foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis apice ſerratis baſi dentatis. *Suppl. p.* 375.

diſcolor. 23. C. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſubdenticulatis glabris ſubtus niveo-tomentoſis, caule fruticoſo corymboſo. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 114.

americana. 24. C. fruticoſa, paniculis axillaribus, foliis alternis petiolatis lato-lanceolatis ſerratis ſupra glabris ſubtus incanis. *Suppl. p.* 375.

paluſtris. 25. C. floribus corymboſis, foliis lato-lanceolatis dentato-ſinuatis, caule villoſo. *Flor. dan. t.* 573.

haſtifolia 26. C. foliis haſtatis, laciniis lateralibus bifidis divaricatis. *Suppl. p.* 376.

ſonchifolia. 27. C. foliis amplexicaulibus ſinuatis difformibus. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 21. *f.* 1.

ſenecionis. 28. C. foliis ſinuato-pinnatifidis glabris, caulinis ſubſeſſilibus, floribus ſubcorymboſis. *Herit. ſert. angl. p.* 27.

viſcoſa. 29. C. pedunculis unifloris, foliis pinnatifido-lobatis acutis viſcidis ſubcarnoſis. *Herit. ſert. angl. p.* 25.

maritima. 30. C. floribus paniculatis, foliis pinnatifidis tomentoſis laciniis ſinuatis, caule fruteſcente. *Kniph. bot. orig. cent.* 6. *n.* 68.

canadenſis. 31. C. floribus paniculatis, foliis pinnatifidis ſubvilloſis, laciniis ſinuatis, caule herbaceo.

capillacea. 32. C. foliis pinnatis, pinnis capillaceis integris. *Suppl. p.* 375.

lobata. 33. C. floribus ſubcorymboſis, foliis ſubrotundis multilobatis glabris, petiolis baſi auritis, calicibus ſubcaliculatis. *Herit. ſert. angl. p.* 26. *t.* 34.

purpurata. 34. C. caule ſubbifloro, foliis obovatis ſubtomentoſis. *Mant. p.* 285.

alata. 35. C. caule herbaceo, foliis obovatis decurrentibus, floribus corymboſis. *Suppl. p.* 374.

Amelloides. 36. C. pedunculis unifloris, foliis oppoſitis ovatis nudis, caule ſuffruticoſo. *Mill. h. angl. t.* 76. *f.* 2.

repanda. 37. C. paniculis compoſitis racemoſis diffuſis, foliis petiolatis ovatis repando-ſinuatis ſubtus tomentoſis, caule arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 56. *Charact. gen. t.* 46.

ſcapiflora. 38. C. pedunculis longiſſimis unifloris, foliis ovatis glabris duplicato-dentatis. *Suppl. p.* 25.

multiflora. 39. C. floribus cymoſis, foliis cordato-ovatis ſubtus tomentoſis, petiolis dimidio auritis. *Herit. ſert. angl. p.* 26.

perfoliata. 40. C. foliis ovato-cordatis amplexicaulibus, pedunculis unifloris elongatis. *Suppl. p.* 375.

rotundifolia. 41. C. paniculis paucifloris, foliis petiolatis ovato-ſubrotundis integerrimis ſubtus tomentoſis, caule arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 56. *Charact. gen. t.* 46.

caroliniensis. 42. C. floribus paniculatis, foliis petiolatis oblongis denticulatis lævibus, caule herbaceo. *Walt. flor. carol. p.* 207.

956. INULA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Antheræ* baſi in ſetas 2 deſinentes.

ſquarroſa. 1. I. foliis ſeſſilibus ovalibus lævibus reticulato-venoſis ſubcrenatis, calice ſquarroſo. *Pluckn. alm. t.* 16. *f.* 1.

cærulea. 2. I. foliis decurrentibus obovatis ſubſerratis, caule ſuffruticoſo, floribus ſeſſilibus terminalibus. *Mant. p.* 471. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 553. Aſter polifolius.

provincialis. 3. I. foliis ſubſerratis ſubtus tomentoſis, radicalibus petiolatis ovatis, caule erecto unifloro.

odora. 4. I. foliis amplexicaulibus dentatis hirſutiſſimis, radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis, caule paucifloro. *Col. ecphr.* 1. *p.* 253. *ic.*

Helenium. 5. I. foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis ſubtus tomentoſis, calicum ſquamis ovatis. *Flor. dan. t.* 728.

ſpiræifolia. 6. I. foliis ſubſeſſilibus ovato-oblongis nudis reticulatis confertis ſerrulatis, floribus terminalibus ſubſeſſilibus.

Oculus Chriſti. 7. I. foliis amplexicaulibus oblongis integris hirſutis, caule piloſo corymboſo. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *p.* 223.

arabica. 8. I. foliis oblongis ſeſſilibus, pedunculis filiformibus, calicibus cylindricis. *Mant. p.* 115. *Pluckn. alm. t.* 149. *f.* 4.

dubia. 9. I. foliis ſeſſilibus oblongis ciliatis, caule unifloro. *Thunb. flor. jap. p.* 318.

bifrons. 10. I. foliis decurrentibus oblongis denticulatis, floribus congeſtis terminalibus ſubſeſſilibus. *Bocc. muſ.* 1. *t.* 121.

dyſenterica. 11. I. foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villoſo paniculato, calicis ſquamis ſetaceis. *Flor. dan. t.* 410.

indica. 12. I. foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis ſerratis, pedunculis unifloris filiformibus, floribus globoſis. *Burm. zeyl. t.* 55. *f.* 2.

undulata. 13. I. foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis undulatis. *Mant. p.* 115.

Pulicaria. 14. I. foliis amplexicaulibus undulatis, caule proſtrato, floribus ſubgloboſis, radio breviſſimo. *Flor. dan. t.* 613.

ſuaveolens. 15. I. foliis lanceolatis ſubſerratis, inferioribus petiolatis, ſuperioribus ſeſſilibus, caule multifloro ſubcorymboſo. *Jacq. h. Vind.* 3. *t.* 51.

britannica. 16. I. foliis amplexicaulibus lanceolatis ſerratis diſtinctis ſubtus villoſis, caule ramoſo erecto villoſo. *Flor. dan. t.* 413.

chryſocomoides. 17. I. foliis ſemiamplexicaulibus linearibus margine revolutis minutis, pedunculis unifloris. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 239.

germanica. 18. I. foliis ſeſſilibus lanceolatis recurvis ſcabris, floribus ſubfaſciculatis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 134.

ſalicina. 19. I. foliis lanceolatis recurvis ſerrato-ſcabris, ramis angulatis, floribus inferioribus altioribus. *Flor. dan. t.* 786.

hirta. 20. I. foliis ſeſſilibus lanceolatis recurvis ſubſerrato-ſcabris, caule teretiuſculo ſubpiloſo, floribus inferioribus altioribus. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 358.

mariana. 21. I. foliis ſeſſilibus lanceolatis ſubſerratis piloſis, pedunculis ſubunifloris ſubviſcoſis, foliolis linearibus. *Mill. dict. ic. t.* 56.

Buboniùm. 22. I. foliis lanceolatis rigidulis denticulatis ſubvilloſis ſeſſilibus, caule ramiſque ſubbifloris, calice ſquarroſo. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *app. t.* 19.

japonica. 23. I. foliis ſeſſilibus lanceolatis denticulatis, pedunculis virgatis unifloris. *Thunb. flor. jap. p.* 318. *Banks ic. Kæmpf. t.* 30.

montana. 24. I. foliis lanceolatis hirſutis integerrimis, caule unifloro, calice brevi imbricato. *Lob. ic.* 350.

fœtida. 25. I. foliis lanceolato-linearibus integerrimis, corymbis ramoſis, radiis florum breviſſimis. *Bocc. ſic. t.* 13.

aromatica. 26. I. foliis linearibus integerrimis tomentoſis ſparſis, caule fruticoſo. *Pluckn. alm. t.* 326. *f.* 2.

enſifolia. 27. I. foliis ſeſſilibus linearibus acuminatis nervoſis glabris ſparſis, caule ſubunifloro. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 162.

crithmifolia. 28. I. foliis linearibus carnoſis tricuſpidatis.

pinifolia. 29. I. foliis ſubulato-linearibus triquetris confertiſſimis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 472. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 18. *f.* 31.

æſtuans. 30. I. foliis ſpatulatis ſubtus tomentoſis. *Plum. ic.* 41. *f.* 2.

958. ARNICA. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Corollul.* radii filamentis 5 ſine antheris.

montana. 1. A. foliis ovatis integris, caulinis geminis oppoſitis. *Flor. dan. t.* 63.

ciliata. 2. A. foliis amplexicaulibus ovatis dentatis ciliatis glabris, caule ſimplici unifloro. *Thunb. flor. jap. p.* 318.

crocea. 3. A. foliis ovatis repando-denticulatis ſubtus tomentoſis. *Burm. afr. t.* 55. & *t.* 56. *f.* 2.

glacialis. 4. A. foliis alternis repando-ſubdentatis, radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis. *Wulfen ap. Jacq. Collect.* 1. *p.* 230. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 47.

ſcorpioides. 5. A. foliis alternis dentatis mollibus oblongo-ovatis. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 349.

Doronicum. 6. A. foliis alternis ſubſerratis oblongis aſperis, *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 92.

hirſuta. 7. A. foliis oblongis hirſutis ſubtus tomentoſis ſcapo nudo unifloro. *Forſk. flor. æg. arab. p.* 151.

piloſelloides. 8. A. foliis integerrimis ellipticis villoſis, ſcapo unifloro aphyllo lanato, calice radium æquante.

maritima. 9. A. foliis lanceolatis, inferioribus ſerratis, caule folioſo multifloro.

Oporina. 10. A. fruticoſa, foliis lanceolatis calloſo-crenatis ſubtus tomentoſis, pedunculis unifloris ſolitariis terminalibus ſquamatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 56.

japonica. 11. A. foliis inciſo-palmatis denticulatis, floribus terminalibus ſubbinis. *Thunb. flor. jap. p. p.* 319.

palmata. 12. A. foliis inciſo-palmatis dentatis, floribus paniculatis, *Thunb. flor. jap. p.* 319.

Gerbera. 13. A. foliis pinnatifidis, laciniis rotundatis. *Burm. afr. t.* 56. *f.* 1.

corono-pifolia 14. A. foliis pinnatis, pinnis linearibus.

959. DORONICUM. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris. *Calic.* ſquamæ 2plicis ordinis æquales, diſco longiores. *Sem.* radii nuda pappoque deſtituta.

Pardalianches. 1. D. foliis cordatis obtuſis denticulatis, radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 350. *β)* Doronicum auſtriacum. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 130.

altaicum. 2. D. foliis ovalibus decurrenti-amplexicaulibus alternis. *Pallas act. Petrop.* 1779. 2. *p.* 271. *t.* 16.

plantagineum. 3. D. foliis ovatis acutis ſubdentatis, ramis alternis.

Bellidiaſtrum. 4. D. caule nudo ſimpliciſſimo unifloro. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 400.

acaule. 5. D. ſcapis nudis ſimpliciſſimis multifloris tomentoſis. *Walt. flor. carol. p.* 205.

lævifolium. 6. D. caule ſubſimplici, foliis lævibus ſubdentatis. *Walt. flor. carol. p.* 205.

ramoſum. 7. D. caule ramoſo, foliis lanceolatis ſubhirſutis ſeſſilibus. *Walt. flor. carol. p.* 205.

960. PERDICIUM. *Recept.* nudum. *Pappus* capillaris ſeſſilis. *Corollul.* 2labiatæ.

ſemifloſculare. 1. P. ſcapo unifloro nudo, flore ſemifloſculoſo.

radiale. 2. P. floribus ſubradiatis, calice exteriore tetraphyllo, caule fruticoſo. *Brown. jam. t.* 33. *f.* 1.

braſilienſe. 3. P. floribus ſubradiatis, calicibus ſimplicibus, caule herbaceo. *Mant. p.* 115.

lævigatum. 4. P. floribus ſubradiatis, caule ſuffruticoſo, foliis lanceolatis acutis integerrimis. *Bergius act. Stockh.* 1772. *p.* 228. *t.* 7.

magellanicum. 5. P. foliis runcinatis, caule diphyllo ſimplici unifloro. *Suppl. p.* 376.

tomentoſum. 6. P. foliis lyratis ſubtus tomentoſis. *Thunb. flor. jap. p.* 319.

1421. MUTISIA. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus. *Cal.* cylindricus, imbricatus. *Corollul. radii* ovali-oblongæ : *diſci* trifidæ.

Clematis. 1. MUTISIA. *Suppl. p.* 373.

1161. HELENIUM. *Recept.* nudum : *radii* paleaceum. *Pappus* 5dentatus. *Cal.* ſimplex multipartitus. *Corollulæ* radii ſemitrifidæ.

autumnale. 1. H. foliis ſerratis decurrentibus glaberrimis. *Pluckn. amalth. t.* 372. *f.* 4.

æſtivale. 2. H. foliis integerrimis, corollulis radii quadrifidis. *Walt. flor. carol. p.* 210.

vernale. 3. H. foliis integerrimis, corollulis radii trifidis. *Walt. flor. carol. p.* 210.

ſerotinum 4. H. foliis ſerratis ſeſſilibus. *Walt. flor. carol. p.* 210.

pubeſcens. 5. H. foliis pubeſcentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 227.

BOLTONIA. *Cal.* imbricatus, ſquamis linearibus. *Pappus* obſolete dentatus, 2cornis. *Recept.* favoſum. *Germ.* compreſſa, verticalia.

glaſtifolia 1. B. foliis inferioribus ſerratis. *Herit. ſert. angl. p.* 27. *t.* 35.

aſteroides. 2. B. foliis integerrimis. *Herit. ſert. ang. p.* 27. *t.* 36. *Mant. p.* 116. Matricaria aſteroides.

962. BELLIS. *Recept.* nudum, conicum. *Pappus* o. *Cal.* hemiſphæricus: ſquamis æqualibus. *Sem.* obovata.

perennis. 1. B. ſcapo nudo. *Flor. dan. t.* 503.

annua. 2. B. caule ſubfoliofo ramoſo multifloro.

arabica. 3. B. foliis lanceolatis ciliatis, petiolo alato lineari. *Forsk: flor. æg. arab. p.* 151.

1322. BELLIUM. *Recept.* nudum. *Sem.* turbinata, corona paleacea 8phylla pappoque ariſtato. *Cal.* foliolis æqualibus.

bellidioides. 1. B. ſcapis nudis filiformibus. *Mant. p.* 285. *Triumf. obſ. t.* 82.

minutum. 2. B. caule folioſo. *Mant. p.* 286. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 561. Pectis minuta. *Schreb. n. act. Upſ.* 1. *t.* 5. *f.* 2.

964. TAGETES. *Recept.* nudum. *Pappus* paleis 5 erectis. *Cal.* 1phyllus, 5dentatus, tubuloſus. *Floſculi* radii 5 perſiſtentes.

patula. 1. T. caule ſubdiviſo patulo. *Knorr. del. hort.* 1. *t.* S. 7. 8.

erecta. 2. T. caule ſimplici erecto, pedunculis nudis unifloris. *Knor del. hort.* 1. *t.* S. 6. a. β) *Knorr del. hort.* 1. *t.* S. 6. γ) *Col. ecphr.* 2. *t.* 46. *f.* 1. δ) *Col. ecphr.* 2. *t.* 46.

minuta. 3. T. caule ſimplici recto, pedunculis ſquamoſis multifloris. *Dill. h. Elth. t.* 280. *f.* 362.

963. LEYSERA. *Recept.* ſubpaleaceum. *Pappus* paleaceus, diſci etiam plumoſus. *Cal.* ſcarioſus.

gnaphalodes. 1. L. foliis ſparſis, floribus pedunculatis. *Seb. muſ.* 2. *t.* 66. *f.* 6.

Callicornia. 2. L. foliis trifariis, floribus ſubſeſſilibus. *Mant. p.* 286. *Plukn. phyt.* 350. *f.* 4.

caroliniana. 3. L. foliis radicalibus rotundatis ſubſerratis hirſutis, caulinis oppoſitis. *Walt. flor. carol. p.* 211.

paleacea. 4. L. foliis triquetris apice calloſis recurvatis, *an potius Athanaſiæ ſpecies?*

974. ZINNIA. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* mucronibus 2 erectis. *Cal.* ovato-cylindricus, imbricatus. *Floſcul.* radii 5 perſiſtentes, integri.

pauciflora. 1. Z. floribus ſeſſilibus. *Mill. h. angl. t.* 64.

multiflora. 2. Z. floribus pedunculatis, foliis petiolatis. *Linn. dec.* 23. *t.* 12.

verticillata. 3. Z. foliis verticillatis integris.

Bidens. 4. Z. foliis pinnatifidis, caulinis ſeſſilibus, feminum ariſtis longis retro aculeatis. *Kœnig. apud Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 28.

965. PECTIS. *Recept.* nudum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* 5phyllus, cylindricus. *Floſculi* radii 5.

linifolia. 1. P. foliis linearibus integerrimis utrinque lævibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 149. *f.* 3.

punctata. 2. P. foliis linearibus ſeſſilibus ſubtus punctatis. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 196.

ciliaris. 3. P. foliis linearibus ſemiamplexicaulibus baſi ciliatis. *Plum. ic.* 51. *f.* 2.

humifuſa. 4. P. foliis ovatis ſubtus punctatis baſi utrinque ciliatis, caulibus procumbentibus. *Plunb. ic.* 84. *t.* 95. *f.* 2.

966. CHRYSANTHEMUM. *Recept.* nudum. *Pappus* marginatus. *Cal.* hemiſphæricus, imbricatus ſquamis marginalibus membranaceis.

* *Leucanthema.*

frutefcens. 1. Chr. fruticoſum, foliis carnoſis linearibus pinnatis dentatis apice trifidis. *Wal. hort. t.* 24.

corymboſum. 2. Chr. foliis pinnatis inciſo-ſerratis, caule multifloro. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 379.

inodorum. 3. Chr. foliis pinnatis multifidis, caule ramoſo diffuſo. *Flor. dant. t.* 896.

Achilleæ. 4. Chr. foliis bipinnatis, pinnis imbricatis, caule ſtricto multifloro. *Mich. nov. pl. gen. t.* 29.

monſpelienſe. 5. Chr. foliis imis palmatis, foliolis linearibus pinnatifidis. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 93.

alpinum. 6. Chr. foliis cuneiformibus pinnatifidis, laciniis integris, caulibus unifloris. *Barrel. pl. rar. ic.* 458. *f.* 3.

atratum. 7. Chr. foliis omnibus cuneiformibus oblongis inciſis carnoſis.

Leucanthemum. 8. Chr. foliis amplexicaulibus oblongis ſuperne ſerratis inferne dentatis. *Blackw. herb. t.* 42. *β*) *Barrel. pl. rar. ic. t.* 458. *f.* 2.

ſerotinum. 9. Chr. foliis lanceolatis ſuperne ſerratis utrinque acuminatis. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 90.

carolinianum. 26. Chr. foliis lanceolatis integris lævibus, caule ramoſiſſimo. *Walt. flor. carol. p.* 204.

montanum. 10. Chr. foliis imis ſpatulato-lanceolatis ſerratis, ſummis linearibus. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 91. *an mera* Chr. *leucanthemi varietas ?*

graminifolium. 11. Chr. foliis linearibus ſubintegerrimis. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 92.

Balſamita. 12. Chr. foliis ovatis oblongis ſerratis auriculatis. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 89.

paludoſum. 13. Chr. foliis omnibus ſpatulatis inciſo-ſerratis carnoſis, ramis unifloris. *Poir. voy. en Barb.* 2. *p.* 241.

** *Chryſanthema.*

indicum. 14. Chr. foliis ſimplicibus ovatis ſinuatis angulatis ſerratis acutis. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 44. *β) Pluckn. alm. t.* 160. *f.* 6.

Myconis. 15. Chr. foliis lingulatis obtuſis ſerratis, calicis ſquamis æqualibus. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 94.

floſculoſum. 16. Chr. floſculis omnibus uniformibus hermaphroditis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 9. *f.* 15. *β)* Cotula grandis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 564. *Jacq. obſ. bot.* 4. *t.* 81.

ſegetum. 17. Chr. foliis amplexicaulibus ſuperne laciniatis inferne dentato-ſerratis. *Bulliard herb. Franc. t.* 339.

arcticum. 18. Chr. foliis ſimplicibus cuneiformibus ſubpalmatis multifidis obtuſis. *Gmel. flor. ſibir.* 2. *t.* 84.

pinnatifidum. 19. Chr. fruticoſum, foliis ſimplicibus oblongis pinnatifidis, laciniis ſerratis. *Suppl. p.* 377.

coronarium. 20. Chr. foliis pinnatis inciſis extrorſum latioribus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 4. *f.* 2. 3.

pectinatum. 21. Chr. foliis pinnatis linearibus parallelis acutis integerrimis, pedunculis ſolitariis unifloris.

italicum. 22. Chr. foliis bipinnatis ſerratis, florum radiis longitudine diſci, caule procumbente. *Mant. p.* 116. *Mich. nov. pl. gen. t.* 29.

millefoliatum. 23. Chr. foliis bipinnatis dentatis, caule decumbente, corollæ radiis diſco brevioribus. *Sp. pl.* 1263. Anthemis millefolia. *Mill. dict. ic. t.* 9.

bipinnatum. 24. Chr. foliis bipinnatis ſerratis villoſis, radiis diſco brevioribus. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 85. *f.* 1.

*** *incertæ tribus.*

japanicum. 25. Chr. foliis petiolatis apice inciſis dentatis. *Suppl. p.* 321.

Digitized by Google

967. MATRICARIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* hemiſphæricus, imbricatus, ſquamis marginalibus ſolidis, acutiuſculis.

proſtrata. 1. M. foliis ſimplicibus ovatis dentatis, pedunculis lateralibus unifloris, ramis decumbentibus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 114.

Parthenium. 2. M. foliis compoſitis planis, foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. *Flor. dan. t.* 674.

argentea. 3. M. foliis bipinnatis, pedunculis ſolitariis.

maritima. 4. M. receptaculis hemiſphæricis, foliis bipinnatis ſubcarnoſis ſupra convexis ſubtus carinatis. *Raj. angl.* 3. *t.* 7. *f.* 1.

ſuaveolens. 5. M. receptaculis conicis, radiis deflexis, ſquamis calicis margine æqualibus, *an vere diſtincta a chamomilla?*

Chamomilla. 6. M. receptaculis conicis, radiis patentibus, ſquamis calicis margine æqualibus. *Zorn pl. off. ic. t.* 139.

1420. UNXIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* 5phyllus, foliolis ovatis. *Floſculi radii & diſci* 5.

camphorata. 1. UNXIA. *Suppl. p.* 368.

MADIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* 8phyllus. *Sem.* plano-convexa.

ſativa. 1. M. foliis lineari-lanceolatis petiolatis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 114.

melita. 2. M. foliis lanceolatis amplexicaulibus. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 114.

968. COTULA. *Recept.* ſubnudum. *Pappus* marginatus. *Corollul.* diſci 4fidæ, radii fere nullæ.

turbinata. 1. C. receptaculis ſubtus inflatis turbinatis, floribus radiatis. *Mant. p.* 473. *Breyn. cent. t.* 73.

Verbeſina. 2. C. foliis oppoſitis trinervis cordatis crenatis, floribus radiatis pedunculatis binis. *Mant. p.* 473. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 155. *f.* 2. *an forte cum Verbeſina Layenia proprium genus conſtituit?*

pyrethraria. 3. C. foliis oppoſitis ovatis crenatis petiolatis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 116.

coronopifolia. 4. C. foliis lanceolato-linearibus amplexicaulibus dentatis, floribus floſculoſis. *Flor. dan. t.* 341.

umbellata. 5. C. foliis lanceolatis hirſutis, floribus umbellatis, caule erecto. *Suppl. p.* 378.

minuta. 6. C. foliis alternis ſubamplexicaulibus oblongis dentatis, floribus ſolitariis ſeſſilibus folio oppoſitis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 57.

quinqueloba. 7. C. foliis quinquelobis ſubtomentoſis, caulibus erectis. *Suppl. p.* 377.

ſtricta. 8. C. foliis pinnatifidis planis nudis punctatis, caule erecto ſtricto, floribus radiatis. *Mant. p.* 287. *Berg. cap. t.* 5. *f.* 9.

aurea. 9. C. foliis pinnato-ſetaceis multifidis, floribus floſculoſis cernuis.

anthemoides. 10. C. foliis pinnato-multifidis dilatatis, floribus floſculoſis. *Dill. h. Elth. t.* 23. *f.* 25. *β)* Artemiſia niſotica. *Spp. pl. p.* 1189.

viſcoſa. 11. C. foliis lyrato-pinnatis, floribus radiatis.

capenſis. 12. C. foliis pinnatis ſubcarnoſis teretiuſculis, infimis ſubbipinnatis, floribus radiatis. *Mant. p.* 115. 287. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 563. Matricaria capenſis.

pilulifera. 13. C. foliis bipinnatis, capitulis globoſis, caule erecto. *Suppl.* 378.

tanacetifolia. 14. C. foliis tripinnatis, lacinulis acutis, caule erecto, floribus floſculoſis corymboſis. *Pluckn. mant. t.* 430. *f.* 7.

ſericea. 15. C. foliis ſupra decompoſitis tomentoſis linearibus. *Suppl. p.* 377.

969. ANACYCLUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Semina* lateralia membranacea, emarginata.

orientalis. 1. A. foliis compoſitis ſetaceis acutis rectis. *Boerh. ind. h. Lugdb.* 1. *p.* 110. *ic.*

2. A.

creticus. 2. A. foliis decompoſitis linearibus, foliolis diviſis planis.

valentinus. 3. A. foliis decompoſitis linearibus, foliolis diviſis teretiuſculis acutis, floribus floſculoſis.

aureus. 4. A. foliis bipinnatis teretiuſculis incanis excavato-punctatis. *Mant. p.* 287. *Lob. ic.* 771.

970. ANTHEMIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 0. *Cal.* hemiſphæricus, ſubæqualis. *Floſculi* radii plures, quam 5.

* *radio albo.*

Cota. 1. A. florum paleis rigidis pungentibus. *Mant. p.* 474. *Till. h. piſ. t.* 19.

arvenſis. 2. A. receptaculis conicis, paleis ſetaceis, ſeminibus coronato-marginatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 5.

Cotula. 3. A. receptaculis conicis, paleis ſetaceis, ſeminibus nudis. *Blackw. herb. t.* 67.

mixta. 4. A. foliis ſimplicibus dentato-laciniatis. *Plukn. alm. t.* 17. *f.* 4.

alpina. 5. A. foliis dentato-pinnatis integerrimis linearibus, caule villoſo unifloro, petalis ovatis, paleis ſphacelatis. *Jacq. flor. auſtr.* 5. *t.* 30.

nobilis. 6. A. foliis pinnato-compoſitis linearibus acutis ſubvilloſis. *Blackw. herb. t.* 526.

Pyrethrum. 7. A. foliis pinnato-multifidis, caulibus ſimplicibus unifloris decumbentibus. *Mill. h. angl. t.* 38.

chia. 8. A. foliis pinnatifidis laciniatis, pedunculis nudis ſubvilloſis.

tomentoſa. 9. A. foliis pinnatifidis obtuſis planis, pedunculis hirſutis folioſis, calicibus tomentoſis. *Flor. dan. t.* 685.

maritima. 10. A. foliis pinnatis denticulatis carnoſis nudis punctatis, caule proſtrato, calicibus ſubtomentoſis. *Till. h. piſ. t.* 19. *f.* 3.

altiſſima. 11. A. erecta, foliis pinnatis, pinnatum baſibus denticulo reflexo aſperis. *Mant. p.* 474. *Kniph. bot. orig. cent.* 11. *n.* 4.

corymboſa. 12. A. foliis ſubbipinnatis linearibus acutis, caule ſimplici erectiuſculo villoſo, corollulis radii obovatis obtuſiſſimis tridentatis. *Haënk. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 73.

auſtriaca. 13. A. receptaculis conicis, paleis oblongis mucronatis; feminibus nudis, foliis bipinnatis lanuginoſo-villoſis. *Jacq. flor. auſtr. 5. t. 444.*

** *radio flavo ſ. concolore.*

valentina. 14. A. caule ramoſo, foliis pubeſcentibus tripinnatis ſetaceis, calicibus villoſis pedunculatis. *Breyn. cent. t. 75.*

americana. 15. A. foliis triternatis, pedunculis terminalibus ramo longioribus, *an eadem cum verbeſina mutica?*

tinctoria. 16. A. foliis bipinnatis ſerratis ſubtus tomentoſis, caule corymboſo. *Flor. dan. t. 741.*

odorata. 17. A. foliis apice pinnatifidis, pedunculis elongatis, calicibus membranaceis, radio ſterili. *Ait. hort. Kew. 3. p. 238.*

trinervia. 18. A. foliis ovatis ſerratis trinerviis oppoſitis petiolatis, receptaculo conico. *Suppl. p. 378.*

repanda. 19. A. foliis ſimplicibus ovato-lanceolatis repando-crenatis.

repens. 20. A. foliis ſimplicibus ovato-lanceolatis obſolete ſerratis, caule repente. *Walt. flor. carol. p. 211.*

arabica. 21. A. caule decompoſito, calicibus ramiferis. *Shaw. afr. t. 36. f. 38.*

971. ACHILLEA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* ovatus, imbricatus. *Floſculi* radii 5-10.

* *foliis ſimplicibus.*

† *integris.*

Ageratum. 1. A. foliis oblongis obtuſis ſerratis faſciculatis. *Mill. k. angl. t. 10. Jungh. pl. offic. ic. t. 17.*

herbarota. 2. A. foliis cuneiformibus, apice dentatis. *Allion. flor. pedem. n. 656. ic.*

alpina. 3. A. foliis lanceolatis ſemiamplexicaulibus ſerratis, ſerraturis ſerrulatis.

Ptarmica. 4. A. foliis lineari-lanceolatis amplexicaulibus ſerrulatis. *Flor. dan. t. 643.*

† † *foliis diviſis.*

lobata. 5. A. foliis villoſis linearibus ſubdentatis apice lobatis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 218.*

Clavenæ.	6.	A. foliis obovatis laciniatis tomentoſis. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 76.
ſerrata.	7.	A. foliis pinnatifidis lineari-lanceolatis tomentoſis baſi laciniatis. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 25.
capitata.	8.	A. foliis profunde pinnatifidis tomentoſis, laciniis dentatis, floribus umbellato-capitatis. *Willden. de achill. n.* 7. *t.* 1.
criſtata.	9.	A. foliis pectinato-pinnatifidis argute ſerratis glabris. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 25.
coronopifolia.	10.	A. foliis pinnatifidis dentatis glabris. *Willden. de achill. n.* 9. *t.* 1.
liguſtica.	11.	A. foliis pinnatifidis glabris, inciſuris tri-vel multifidis. *Allion. flor. pedem.* 4. 660. *ic.*
macrophylla.	12.	A. foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis inciſo-ſerratis, infimis diſtinctis. *Pill. & Mitterpach. it. t.* 11.
magna.	13.	A. foliis pinnatifidis, laciniis inæqualiter dentatis. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 25.
ſquarroſa.	32.	A. foliis lanceolato-linearibus pinnatifidis, laciniis ovato-cuneiformibus inciſo-acuminatis verticalibus, caule ſubvilloſo. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 242.

** *foliis compoſitis.*

† *pinnatis.*

ægyptiaca.	14.	A. foliis tomentoſis, pinnis ſubrotundis dentatis. *Tournef. it.* 1. *t.* 87.
cretica.	15.	A. foliis tomentoſis, pinnis quadrifidis imbricatis.
nana.	16.	A. foliis villoſis, pinnis linearibus integerrimis, foliorum inferiorum dentatis. *Allion. pedem.* 3. *t.* 2. *f.* 3.
Halleri.	17.	A. foliis hirſutis, pinnis acute dentatis lateſcentibus. *Hal. hiſt. ſtirp. Helv.* 1. *p.* 47. *n.* 110.
micrantha.	18.	A. foliis pubeſcentibus, pinnis laciniatis, florum radio minimo. *Gmel. flor. ſib.* 2. *p.* 198. *n.* 164. *t.* 83. *f.* 2.
piloſa.	19.	A. foliis ſubtus piloſis, pinnis integris bifidiſque. *Willden. de achill. n.* 19.
falcata.	20.	A. foliis alternis, pinnis falcatis argute ſerratis.
impatiens.	21.	A. pinnis lanceolatis geminatis. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 83. *f.* 1.
Santolina.	22.	A. foliis faſciculatis glabris, pinnis obtuſis tridentatis,

moſcha- ta. 23. A. foliis glabris, pinnis lineari-lanceolatis integerrimis punctatis. *Haller. hiſt. ſtirp. Helv.* 1. *p.* 47. *n.* 112. *Scop. del. inſ.* 1. *t.* 3.

†† *foliis ſubbipinnatis.*

atrata. 24. A. foliis glabris pectinatis, caule piloſo. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 22.

tanace- tifolia. 25. A. foliis punctatis, pinnis pinnatifidis, laciniis integris inciſiſque. *Mill. h. angl. t.* 9. *Allion. pedem. n.* 666. *an diſtincta ſpecies ?*

pubeſ- cens. 26. A. foliis pubeſcentibus, pinnis pinnatifidis, laciniis inæqualibus.

nobilis. 27. A. foliis pubeſcentibus, pinnis oblongis pinnatifidis, inciſuris æqualibus.

tomen- toſa. 28. A. foliis tomentoſis, pinnulis denſe imbricatis integerrimis acutis. *S. G. Gmel. it.* 1. *t.* 25. *f.* 2.

††† *foliis bipinnatis.*

Millefo- lium. 29. A. foliis glabris, pinnarum laciniis linearibus dentatis. *Flor. dan. t.* 737.

abrota- nifolia. 30. A. foliis pubeſcentibus, pinnulis tenuiſſimis linearibus integerrimis.

odorata. 31. A. foliis piloſis, pinnulis lanceolatis integerrimis mucronatis. *Barr. pl. rar. ic. t.* 992. *β*) *Wulfen apud Jacq. Collect.* 1. *t.* 21. *an mera nobilis varietas ?*

972. **TRIDAX.** *Recept.* paleaceum. *Pappus* multiradiatus, ſimplex. *Cal.* imbricatus, cylindricus. *Corollulæ* radii 3partitæ.

procum- bens. 1. Tridax.

978. **AMELLUS.** *Recept.* paleaceum. *Pappus* capillaris. *Cal.* imbricatus. *Corollulæ* radii indiviſæ.

lychnitis. 1. A. foliis oppoſitis lanceolatis obtuſis tomentoſis, pedunculis unifloris. *Mant. p.* 476. *Breyn. prodr.* 3. *t.* 15. *f.* 2.

umbellatus. 2. A. foliis oppoſitis triplinerviis ſubtus tomentoſis, floribus umbellatis. *Brown. jam. t.* 33. *f.* 2.

carolinianus. 3. A. foliis oppoſitis ſublanceolatis ſubſerratis, pedunculis geminis unifloris axillaribus. *Walt. flor. carol. p.* 213.

1321. ECLIPTA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Corollulæ* diſci 4fidæ.

erecta. 1. E. caule erecto, foliis baſi deflexis, ſeſſilibus lanceolatis. *Mant. p.* 286. 475. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 564. Cotula alba. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 18. *f.* 1.

ſeſſilis. 2. E. caule erecto, foliis ſubamplexicaulibus ovatis dentatis, floribus axillaribus ſeſſilibus diſtoideis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 114.

latifolia. 3. E. caule erecto, foliis ovatis petiolatis. *Suppl. p.* 378.

punctata. 4. E. caule erecto punctato, foliis planis. *Mant. p.* 286. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 197.

proſtrata. 5. E. caule proſtrato, foliis ſubundulatis ſubpetiolatis. *Mant. p.* 128. 475. *Syſt. nat.* XII 3. *p.* 564. Cotula proſtrata. *Linn. comm. Goett.* 3. *t.* 11.

973. SIGESBECKIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* exterior, 5phyllus, proprius, patens. *Radius* dimidiatus.

orientalis. 1. S. petiolis ſeſſilibus, calicibus exterioribus majoribus patentibus. *Hort. Cliff. t.* 23.

occidentalis. 2. S. petiolis decurrentibus, calicibus nudis. *Mant. p.* 475. *an potius Verbeſina ?*

floſculoſa. 3. S. floſculis tridentatis, hermaphroditis triandris. *Herit. ſtirp. nov.* 2. *p.* 37. *t.* 19.

975. VERBESINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* ariſtatus. *Cal.* 2plici ordine. *Floſculi* radii circiter 5.

alata. 1. V. foliis alternis decurrentibus angulato-dentatis acuminatis. *Commel. h. amſt.* 1. *t.* 3.

ſinenſis. 2. V. foliis alternis petiolatis ovato-lanceolatis ferratis.

virginica. 3. V. foliis alternis petiolatis lanceolatis, floribus corymboſis.

mutica. 14. V. foliis alternis petiolatis, ſuperioribus tripartitis, inferioribus integris ovatis, pedunculis terminalibus unifloris. *Swarts obſerv. bot. p.* 314. *t.* 8. *f.* 1.

pinnatifida. 4. V. foliis alternis pinnatifidis, caule herbaceo. *Plum. ic.* 41. *t.* 51.

gigantea. 5. V. foliis alternis profunde pinnatifidis, caule fruticoſo. *Jacq. coll.* 1. *p.* 53. *pl. rar. ic. cent.* 1. *t.* 97.

Boſvallea. 6. V. foliis multifido-capillaribus, caulibus proſtratis, floſculis ſenis, femineo unico. *Suppl. p.* 379.

Lavenia. 7. V. foliis oppoſitis ovatis trinerviis glabris petiolatis, femineis tricornibus. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 63. *an cum Cotula Verbeſina in diſtinctum genus conjungenda? an eadem cum Adenoſtemate Forſteri prodr. flor. auſtr. p.* 58. *n.* 284.

dichotoma. 8. V. foliis oppoſitis ovatis tomentoſis petiolatis, caule ſupra dichotomo, extimo internodio compreſſo. *Murray comm. Goett.* 1779. *p.* 15. *t.* 4.

fruticoſa. 9. V. foliis oppoſitis ovatis ſerratis petiolatis, caule fruticoſo. *Plum. ic.* 52.

nodiflora. 10. V. foliis oppoſitis ovatis ſerratis, calicibus oblongis ſeſſilibus, caulinis lateralibus. *Dill. h. Elth. t.* 45. *f.* 53.

biflora. 11. V. foliis oppoſitis oblongo-ovatis triplinerviis acuminatis ſerratis, pedunculis geminis bifloris. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 79.

calendulacea. 12. V. foliis oppoſitis lanceolatis obtuſiuſculis, pedunculis longis unifloris, calicibus ſimplicibus. *Rheed. h. malab.* 10. *t.* 42.

laciniata. 13. V. foliis ſinuato-laciniatis. *Walt. flor. carol. p.* 213. *an hujus generis?*

977. BUPHTHALMUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* obſoletus. *Seminum* latera, præſertim radii, marginata. *Stigma* floſculorum hermaphroditicorum indiviſum.

* *Aſteriſci* T.

fruteſcens. 1. B. foliis oppoſitis lanceolatis, petiolis bidentatis, caule fruticoſo. *Catesb. Car.* 1. *t.* 93.

arboreſcens. 2. B. foliis oppoſitis lanceolatis utrinque tomentoſis edentulis integerrimis, caule fruticoſo. *Plum. ic.* 106. *f.* 2.

ſericeum. 3. B. foliis oppoſitis approximatiſſimis ſpatulo-oblongis ſericeis, ſquamis calicis ſetaceis hirſutis, caule arboreo. *Suppl. p.* 379. *Herit. ſert. angl. t.* 37.

ſpinoſum. 4. B. calicibus acute folioſis, foliis alternis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis. *Blackw. herb. t.* 272. *Mill. h. angl. t.* 249. *f.* 1.

melitenſe. 5. B. calicibus acute folioſis pedunculatis, foliis lanceolatis baſi attenuato-petiolatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 218.

pratenſe. 15. B. calicibus acute folioſis, foliis alternis cuneiformibus inciſis hirtis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 153. Ceruana pratenſis.

graveolens. 6. B. calicibus acute folioſis, foliis alternis pinnatifidis. *Vahl ſymbol. botan.* 1. *p.* 74. *t.* 19.

ramoſum. 7. B. calicibus obtuſe folioſis terminalibus ſolitariis, foliis oppoſitis ſeſſilibus lanceolatis remotis, caule hiſpido ramoſo. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 151.

aquaticum. 8. B. calicibus obtuſe folioſis ſeſſilibus axillaribus, foliis alternis oblongis obtuſis, caule herbaceo. *Mill. h. angl. t.* 249. *f.* 2.

maritimum. 9. B. calicibus obtuſe folioſis pedunculatis, foliis alternis ſpatulatis, caule herbaceo. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 129.

durum. 10. B. foliis alternis lanceolatis integerrimis, caule ſuffruticoſo. *Pluckn. alm. t.* 21. *f.* 3.

** *Aſteroidea* T.

ſalicifolium. 11. B. foliis alternis lanceolatis ſubſerratis villoſis, calicibus nudis, caule herbaceo. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 370.

grandiflorum. 12. B. foliis alternis lanceolatis ſubdenticulatis glabris, calicibus nudis, caule herbaceo. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 7. *f.* 52.

ſpecioſiſſimum. 13. B. foliis alternis amplexicaulibus ovatis nudis ſerratis ſubciliatis, caule unifloro. *Mant. p.* 177. 517. *Arduin. ſpec.* 1. *t.* 12. *an ad ſilphium potius ſpectat?*

helianthoides. 14. B. foliis oppoſitis ovatis ſerratis triplinerviis, calicibus folioſis, caule herbaceo. *Herit. ſtirp. nov.* 4 *t.* 45. *an diſtinctum ſatis ab helianthо lævi & ſilphio ſolidaginoide, & Rudbeckia oppoſitifolia?*

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

979. HELIANTHUS. *Recept.* paleaceum, planum, *Pappus* radii o, diſci 2paleis conſtans. *Cal.* imbricatus, ſubſquarroſus.

annuus. 1. H. foliis omnibus cordatis trinerviis, pedunculis incraſſatis, floribus cernuis. *Mill. illuſtr. ic. Knorr del. hort.* 1. *t. S.* 1.

indicus. 2. H. foliis omnibus cordatis trinerviis, pedunculis æqualibus, calicibus folioſis. *Mant. p.* 117.

multiflorus. 3. H. foliis inferioribus cordatis trinerviis, ſuperioribus ovatis. *Pluckn. phyt.* 159. *f.* 2.

tuberoſus. 4. H. foliis ovato-cordatis triplinerviis. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 161.

frondoſus. 5. H. calicibus ſquarroſis undulatis frondoſis, radiis octopetalis, foliis ovatis, caule inferne ſcabro.

divaricatus. 6. H. foliis oppoſitis ſeſſilibus ovato-oblongis trinerviis, panicula dichotoma.

atro-rubens. 7. H. foliis oppoſitis ſpatulatis crenatis triplinerviis ſcabris, ſquamis calicis erectis longitudine diſci. *Dill. h. Elth. t.* 94. *f.* 110.

decapetalus. 8. H. caule inferne lævi, foliis lanceolato-cordatis triplinerviis, radiis decapetalis, pedunculis ſcabris.

altiſſimus. 9. H. foliis alternis latiuſcule lanceolatis ſcabris, petiolis ciliatis, caule ſtricto glabro. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 160.

gigan- 10. H. foliis alternis lanceolatis ſcabris baſi ciliatis, caule
teus. ſtricto ſabro. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 7. *f.* 66.

lævis. 11. H. foliis oppoſitis trinerviis lanceolatis ſerratis lævibus, caule pedunculiſque glabris.

thurifer. 12. H. caule fruticoſo, foliis lineari-lanceolatis. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 135.

anguſti- 13. H. foliis alternis linearibus.
folius.

ſtrumo- 14. H. radice fuſiformi. *Bocc. ſic. t.* 27. *f.* 4. *an mera*
ſus. *gigantei varietas?*

GALARDIA. *Recept.* paleaceum, convexum. *Sem.* angulata, apice cornu 5phylla. *Cal.* duplici ſquamarum ordine ſubæqualis.

alternifo- 1. GALARDIA. *Fougeroux act. Pariſ. ad ann.* 1786. *p.* 1.
lia. *ſeq. t.* 1. 2.

TITHONIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* apice 5paleacea. *Cal.* duplici ſquamarum ordine connivens, cylindricus, ſubæqualis.

uniflora. 1. TITHONIA. *Des Fontaines act. Pariſ. extram. vol* 12.

980. RUDBECKIA. *Recept.* paleaceum, conicum. *Pappus* margine 4dentato. *Cal.* 2plici ſquamarum ordine.

laciniata. 1. R. foliis compoſitis laciniatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 6. *f.* 53. 54.

digitata. 2. R. foliis inferioribus compoſitis, caulinis quinatis ternatiſque, ſummis ſimplicibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 251.

triloba. 3. R. foliis ſpatulatis, inferioribus trilobis, ſuperioribus indiviſis. *Plukn. alm. t.* 22. *f.* 2.

hirta. 4. R. foliis indiviſis ſpatulato-ovatis triplinerviis ſerratis hirtis, receptaculo conico, paleis lanceolatis. *Knorr del. hort.* 1. *t. F.* 1. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 29.

fulgida. 5. R. foliis oblongo-lanceolatis denticulatis hiſpidis baſi anguſtatis ſubcordatis, receptaculo hemiſphærico, paleis lanceolatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 251.

purpurea. 6. R. foliis lanceolato-ovatis alternis indiviſis, radii petalis bifidis. *Catesb. Car.* 2. *t.* 59.

oppoſitifolia. 7. R. foliis lanceolato-ovatis oppoſitis ſerratis, radii petalis bifidis.

anguſtifolia. 8. R. foliis oppoſitis linearibus integerrimis. *Mill. h. angl. t.* 224. *f.* 2.

981. COREOPSIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 2-4cornis. *Cal.* erectus, polyphyllus, baſi radiis coloratis patentibus cinctus.

verticillata. 1. C. folis decompoſito-linearibus. *Ehret. pict. t.* 9. *f.* 1.

coronata. 2. C. foliis pinnatis ſerratis lineatis glabris. *Plum. ic.* 53. *f.* 2.

leucantha. 3. C. foliis pinnatis ſerratis, radio florum diverſicolore.

chryſantha. 4. C. foliis ternatis ovato-oblongis ſerratis, radio florum concolore. *Plum. ic.* 53. *f.* 1.

alba. 5. C. foliis ſubternatis cuneatis ſerratis. *Pluckn. alm. t.* 160. *f.* 3.

tripteris. 6. C. foliis ſubternatis integerrimis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 44.

aurea. 7. C. foliis ſerratis, radicalibus tripartitis, caulinis trifidis integriſve lanceolato-linearibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 252.

procera. 8. C. foliis ellipticis acuminatis ſerratis petiolatis venoſis decurrentibus, inferioribus verticillatis, ſuperioribus alternis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 253.

reptans. 9. C. foliis ſerratis ovatis, ſummis ternatis, caule repente. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 154. *f.* 2. 3.

baccata. 10. C. foliis ſerratis ovatis, ſeminibus bacciformibus. *Suppl. p.* 380.

Bidens. 11. C. foliis lanceolatis ſerratis oppoſitis amplexicaulibus, pappo bicorni. *Moriſ. hiſt.* 3. *t.* 5. *f.* 25. *an mera bidentis cernuæ varietas?*

quadricornis. 12. C. foliis lanceolatis ſerratis oppoſitis amplexicaulibus, pappo quadricorni. *Krock. flor. ſileſ.* 2. 2. *p.* 481.

alterni-folia. 13. C. foliis lanceolatis ſerratis alternis petiolatis decurrentibus. *Jacq. h. Vind.* 2. *t.* 110.

lanceolata. 14. C. foliis lanceolatis integerrimis ciliatis. *Dill. h. Elth. t.* 48. *f.* 56.

linenſis. 15. C. foliis ſubintegerrimis caule ovatis tomentoſis. *Jacq. col.*, 2. *p.* 299. *pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 49.

auricu-lata. 16. C. foliis integerrimis ovatis, inferioribus ternatis. *Pluckn. alm. t.* 83. *f.* 5. & *t.* 242. *f.* 4.

craſſifo-lia. 17. C. foliis obovato-oblongis obtuſis integerrimis pubeſcentibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 253.

anguſti-folia. 18. C. foliis alternis lineari-lanceolatis integerrimis lævibus, radii petalis oblongis trifidis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 253.

major. 19. C. foliis verticillatis lato-lanceolatis baſi pubeſcentibus. *Walt. flor. carol. p.* 214.

perfolia-ta. 20. C. foliis caulinis oblongis enſiformibus oppoſitis perfoliatis, caule ramoſo. *Walt. flor. carol. p.* 215.

gladiata. 21. C. foliis radicalibus linearibus lævibus integris, caulinis alternis, pedunculis terminalibus. *Walt. flor. carol. p.* 215.

983. OSMITES. *Recept.* paleaceum. *Pappus* obſoletus. *Cor.* radii ligulatæ. *Cal.* imbricatus, gibbus.

Bellidiaſ-trum. 1. O. foliis linearibus carnoſis, calicibus ſcarioſis.

campho-rata. 2. O. foliis lanceolatis ſubſerratis baſi dentatis. *Mant. p.* 477. *Seb. muſ.* 1. *t.* 90. *f.* 2. *β) Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 565. Anthemis leucantha.

Aſteriſ-coides. 3. O. foliis lanceolatis punctatis, caulibus folioſis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 16. *f.* 4.

calicina. 4. O. foliis lanceolatis nudis, calicibus ſcarioſis. *Suppl. p.* 380.

ENCELIA. *Recept.* paleaceum. *Sem.* paleæ membranaceæ conduplicatæ, incluſa. *Cal.* polyphyllus, ſimplex, æqualis.

alternifo-lia. 1. ENCELIA. *Juſſieu gen. plant. p.* 180.

SCLEROCARPUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* foliol. inter. canaliculatis.

africanus. 1. SCLEROCARPUS. *Jacq. fil. act. Helv.* 9. *f.* 1.

981. GORTERIA. *Recept.* nudum. *Pappus* ſimplex. *Cor.* radii ligulatæ. *Cal.* imbricatus, ſquamis ſpinoſis.

uniflora. 1. G. foliis lanceolatis indiviſis ſubtus tomentoſis, caulibus unifloris depreſſis. *Suppl. p.* 382.

perſonata. 2. G. foliis lanceolatis integris ſinuatiſque, caule erecto, floribus pedunculatis. *Plukn. phyt.* 273. *f.* 6.

rigens. 3. G. foliis lanceolatis pinnatifidis, caule depreſſo, ſcapis unifloris. *Mill. h. angl. t.* 49.

ſetoſa. 4. G. foliis lanceolatis decurrentibus adnatis ciliato-ſpinoſis, floribus terminalibus pedunculatis. *Mant. p.* 287.

ſquarroſa. 5. G. foliis lanceolatis decurrentibus adnatis ciliato-ſpinuloſis, floribus ſeſſilibus. *Mant. p.* 470. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 28.

echinata. 6. G. foliis oblongis ſinuato-inciſis ſpinuloſis, caulibus aſcendentibus, receptaculis paleaceis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 254. *an hujus generis?*

barbata. 7. G. foliis elliptico-lanceolatis dentato-ariſtatis, calicibus pedunculatis ciliato-ſetaceis. *Suppl. p.* 382.

Aſteroides. 8. G. foliis ellipticis, ſerraturis ſetaceis. *Suppl. p.* 381. *Jacq. pl. rar. ic. cent.* 2. *t.* 48.

hiſpida. 9. G. foliis oblongis ciliato-ſpinoſis erectis glabris, calicibus integris ſpina terminatis. *Suppl. p.* 382.

ſpinoſa. 10. G. foliis oblongis ſeſſilibus dentato-ſpinoſis patentibus glabris, calicibus ciliato-ſpinoſis, erectis. *Suppl. p.* 381.

cernua. 11. G. foliis oblongis amplexicaulibus dentato-ſpinoſis patentibus glabris, calicibus ciliato-ſerratis cernuis. *Suppl. p.* 382.

herbacea. 12. G. foliis caulinis amplexicaulibus ciliatis, radicalibus inermibus ſubtus villoſis. *Suppl. p.* 381.

ciliaris. 13. G. foliis imbricatis bifariam ciliatis, ciliis exterioribus ſpinaque terminali reflexis. *Seb. muſ.* 1. *t.* 23. *f.* 1.

DIDELTA. *Recept.* 4partitum, medium 3angulare nudum, lateralia fungoſa, ſetoſa, ſegmentis indureſcentibus in pericarpium. *Pappus* ſimplex. *Cal.* 2plex. *Floſculi* diſci medii ſteriles, laterales perfecti, radii ligulati, neutri. *Germina* immerſa.

tetragoniæfolia. 1. DIDELTA. *Herit. ſtirp. nov.* 3. *p.* 55. *t.* 28. *an ſegregatio potius accenſenda?*

2271. ZŒGEA. *Recept.* ſetoſum. *Pappus* ſetaceus. *Cor.* radii ligulatæ. *Cal.* imbricatus.

Leptaurea. 1. Z. foliis oblongis, calice hirto campanulato. *Mant. p.* 117. *Suppl. p.* 383. *Herit. ſtirp. nov.* 3. *p.* 57. *t.* 29.

capenſis. 2. Z. foliis linearibus, calice glabro baſi gibbo. *Suppl. p.* 382.

aleppica. 3. Z. foliis pinnatis, pinnis lineari-lanceolatis integerrimis, calicis ſquamis exterioribus ciliatis apice ſcarioſis. *Jacq. coll.* 1. *p.* 89.

984. CENTAUREA. *Recept.* ſetoſum. *Pappus* plumoſus vel capillaris. *Cor.* radii infundibuliformes, longiores, irregulares.

* *calicibus lævibus inermibus*, Jaceæ.

Centaureum. 1. C. calicis ſquamis ovatis, foliis pinnatis, pinnis ſerratis decurrentibus. *Reg. bot. t.* 354.

alpina. 2. C. calicis ſquamis ovatis obtuſis, foliis pinnatis glabris integerrimis, impari ſerrato. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 25. *f.* 5.

moſchata. 3. C. calicibus ſubrotundis glabris, ſquamis ovatis, foliis lyrato-dentatis. *Knorr del hort.* 2. *t.* C. 4. *f.* 1. 2.

Moſchus. 4. C. calicis ſquamis ovato-lanceolatis, foliis pinnatis lineari-oblongis integerrimis. *Hublizl apud S. G. Gmelin it.* 4. *p.* 176.

Crupina. 5. C. calicis ſquamis lanceolatis, foliis pinnatis ſerratis ſubciliatis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 34.

erucifolia. 6. C. calicis ſquamis lanceolatis, foliis lanceolatis ſubdentatis. *Pluckn. phyt.* 39. *f.* 3. *mala.*

Lippii. 7. C. calicis ſquamis mucronatis, foliis decurrentibus lyrato-dentatis. *Iſnard act. Pariſ.* 1719. *t.* 10.

maxima. 8. C. caule fruticoſo, foliis ellipticis tomentoſis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 152.

mucronata. 9. C. calicis ſquamis ovatis mucronatis, foliis lanceolatis ſeſſilibus mucronatis ſerratis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 151.

** *ſquamis calicis ſerrato-ciliatis*, Cyani.

bracteata. 10. C. calicibus ſubciliatis baſi folioſis, foliis margine ſcabris, radicalibus oblongis ſubintegerrimis, caulinis lanceolatis ſeſſilibus integerrimis. *Scop. del. inſ.* 2. *p.* 17. *t.* 9.

ſpinoſa. 11. C. calicibus ſubciliatis, ramis ſpinoſis. *Alp. exot. p.* 162. *ic.*

montana. 12. C. calicibus ſerratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule ſimpliciſſimo. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 371.

Cyanus. 13. C. calicibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis, infimis dentatis. *Knorr del. hort.* 1. *t.* K. 4. 5.

argentea. 14. C. calicibus ſerratis, foliis tomentoſis, radicalibus pinnatifidis, laciniis inauritis. *Barr. pl. rar. ic.* 218.

nigra. 15. C. calicis ſquamulis ovatis, ciliis capillaribus erectis, foliis lyrato-angulatis, floribus floſculoſis. *Reich. flor. francoſ. n.* 625. *ic.*

paniculata. 16. C. calicis ſquamis planis ciliatis, foliis bipinnatis, rameis pinnatifidis linearibus, caule paniculato. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 320.

pullata. 17. C. calicibus ciliatis verticillato-folioſis, foliis lyratis dentatis obtuſis. *Mill. h. angl. ic. t.* 152. *f.* 2.

cineraria. 18. C. calicibus ciliatis terminali-ſeſſilibus, foliis tomentoſis bipinnatifidis, laciniis acutis. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 92. β) Centaurea. *Krock. flor. ſib.* 2. 2. *p.* 489. *n.* 1462.

Stœbe. 19. C. calicibus ciliatis oblongis, foliis pinnatifidis linearibus integerrimis.

ſempervirens. 20. C. calicibus ciliatis, foliis lanceolatis ſerratis infimo dente ſubſtipulatis, inferioribus haſtatis. *Bocc. ſic.* *t.* 39. *f.* 3.

acaulis. 21. C. calicibus ciliatis, foliis lyratis, caule ſubnullo. *Shaw ſpec. p.* 342. *ic.*

ſibirica. 22. C. calicibus ciliatis, foliis tomentoſis indiviſis pinnatifidiſque integerrimis, caule declinato. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 42. *f.* 2.

raguſina. 23. C. calicibus ciliatis, foliis tomentoſis pinnatifidis, laciniis obtuſis ovatis integerrimis, exterioribus majoribus. *Mill. h. angl. t.* 152. *f.* 1.

caroliniana. 76. C. foliis ſeſſilibus baſi ſerrato-ſetaceis. *Walt. flor. carol. p.* 214.

Scabioſa. 24. C. calicibus ciliatis, foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis.

tatarica. 25. C. calicibus ciliatis, foliis pinnatis, pinnis lanceolatis indiviſis. *Suppl. p.* 383.

capillata. 26. C. calicibus recurvato-plumoſis, foliis imis pinnatis dentatis, ſummis lanceolatis. *Haller act. Goet.* 1. *t.* 6.

pectinata. 27. C. calicibus recurvato-plumoſis, foliis lyratis denticulatis, rameis lanceolatis integerrimis.

uniflora. 28. C. calice recurvato-plumoſo, foliis lanceolatis ſubdentatis tomentoſis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 2.

phrygia. 29. C. calicibus recurvato-plumoſis, foliis indiviſis oblongis ſcabris. *Flor. dan. t.* 520. β) Centaurea ſerratuloides? *Krocke flor. ſileſ.* 2. 2. *p.* 484.

hyſſopifolia. 30. C. calicibus recurvato-plumoſis, foliis lineari-lanceolatis apice patulis ſuffruticoſis. *Barrel pl. rar. ic.* 306.

linifolia. 31. C. calicibus recurvato-plumoſis, foliis linearibus ſparſis cauleque hirtis. *Mant. p.* 117. *Barr. pl. rar. ic.* 139. 162.

diluta. 79. C. calicibus ciliatis, ſquamis acuminatis ſubſpinoſis, foliis oblongis pinnatifidiſque, radii floſculis diſco longioribus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 261.

*** *ſquamis calicis aridis ſcarioſis*, Rhapontica.

orientalis. 32. C. calicibus ſcarioſis ciliatis, foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis. *Kniph. bot. orig. cent.* 4. *n.* 16.

ſtrobilacea. 33. C. calicibus ſcarioſis ſerrato-ciliatis ſpinoſis, foliis ſubtus punctatis pinnatis, pinnis lanceolatis falcatis erectis. *Scop. del. inſ.* 1. *t.* 17.

Jacea. 34. C. calicibus laceris, foliis lanceolatis, radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis. *Flor. dan. t.* 519.

radiata. 47. C. calicibus ſubinermibus ſubariſtatis radiatis, foliis pinnatifidis. *Sp. pl.* 1201. Xeranthemum erucæfolium. *Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 47. *f.* 1.

ſalmantica. 48. C. calicibus ſetula ſubſpinoſa exſtante glabris, foliis lyratoruncinatis ſerratis. *Mant. p.* 478. *Jacq. h. Vind.* 1. *t.* 64.

tingitana. 49. C. calicibus margine ſpinoſis, foliis lanceolatis indiviſis ſerrato-ſubſpinoſis. *Herm. par. Lugdb. p.* 163. *ic.*

cichoracea. 50. C. calicum ſpinis ſetaceis, foliis decurrentibus indiviſis ſerrato-ſpinoſis. *Till. h. piſ. t.* 27.

galactites. 51. C. calicum ſpinis ſetaceis, foliis decurrentibus ſinuatis ſpinoſis ſubtus tomentoſis.

peregrina. 52. C. calicum ſpinis ſetaceis, foliis lanceolatis petiolatis inferne dentatis.

pumila. 53. C. calicum ſpinis ſimpliciſſimis, foliis dentato-pinnatis villoſis, caule nullo.

muricata. 54. C. calicum ſpinis ſimpliciſſimis, foliis inferioribus pinnatifidis, ſuperioribus lanceolatis, pedunculis longiſſimis.

Venetum. 55. C. calicum ſpinis ſimpliciſſimis, dentibus duobus oppoſitis, foliis lanceolatis integris decurrentibus. *Mant. p.* 478.

Crocodilium. 56. C. calicibus ſcarioſis ſimpliciſſime ſpinoſis, foliis pinnatifidis integerrimis, lacinia extima majore dentata. *Barr. pl. rar. ic. t.* 503.

† † *calicis ſpinis palmatis*, Stoebæ.

ſeſſilis. 57. C. calicibus oblongis radicalibus glomerato - ſeſſilibus, foliis pinnatis inciſis. *Forsk flor. æg. arab. p.* 152.

ſonchifolia. 58. C. foliis ſubdecurrentibus ſpinuloſis repando - dentatis. *Mant. p.* 478. *Pluckn. phyt.* 39. *f.* 1.

ſeridis. 59. C. foliis decurrentibus tomentoſis oblongis, infimis ſinuato-dentatis. *Pluckn. phyt.* 38. *f.* 1.

romana. 60. C. foliis decurrentibus inermibus, radicalibus pinnatifidis, impari maximo. *Zanon. hiſt. t.* 42.

napifolia. 61. C. foliis decurrentibus ſinuatis ſpinuloſis, radicalibus lyratis. *Herm. par. Lugdb. p.* 189. *ic.*

Isnardi. 62. C. foliis lyrato-dentatis hiſpidis ſubamplexicaulibus, floribus ſeſſilibus terminalibus. *Isnard act. Pariſ.* 1719. *t.* 9.

ſphærocephala. 63. C. foliis ovato-lanceolatis petiolatis dentatis. *Herm. par. Lugdb. p.* 333. *ic.*

aſpera. 64. C. calicum ſquamis palmato-triſpinoſis, foliis lanceolatis dentatis. *Bocc. muſ.* 2. *t.* 26.

cæſpitoſa. 81. C. foliis ſinuato-dentatis, inferioribus petiolatis, ſuperioribus ſemiamplexicaulibus. *Cyrill. pl. rar. Nat. f.* 1. *t.* 8.

† † † *calicis ſpinis compoſitis*, Calcitrapæ.

collina. 65. C. calicibus ciliatis inermibus ſpinoſis, foliis radicalibus bipinnatifidis, caule acutangulo.

rupeſtris. 66. C. calicibus ciliatis ſpinoſis, foliis bipinnatis linearibus. *Col. ecphr.* 1. *t.* 35. *f.* 2.

Centau-roides. 67. C. calicibus ciliatis ſpinoſis, foliis lyrato-pinnatis integerrimis, lacinia impari majore. *Col. ecphr.* 1. *t.* 35. *f.* 1.

ſicula. 68. C. calicibus ciliato-ſpinoſis terminalibus, foliis decurrentibus lyratis inermibus incanis *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 28. *f.* 26.

aurea. 80. C. calicibus ſimpliciſſime ſpinoſis, ſpinis patulis, floſculis æqualibus, foliis hirtis, inferioribus pinnatifidis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 265.

Calcitra-poides. 69. C. calicibus ſubduplicato-ſpinoſis, foliis amplexicaulibus lanceolatis indiviſis ſerratis.

Calcitra-pa. 70. C. calicibus ſubduplicato-ſpinoſis ſeſſilibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloſo. *Regn. bot. t.* 329.

ægyptia-ca. 71. C. calicibus duplicato-ſpinoſis ſublanatis, foliis ſeſſilibus lanceolatis integris dentatiſque, caule prolifero. *Mant. p.* 118.

eriopho-ra. 72. C. calicibus duplicato-ſpinoſis lanatis, foliis ſemidecurrentibus integris ſinuatiſque, caule prolifero. *Mant. p.* 478. *Kniph. bot. orig. cent.* 7. *n.* 10.

Benedic-ta. 73. C. calicibus duplicato-ſpinoſis lanatis involucratis, foliis ſemidecurrentibus denticulato-ſpinoſis. *Blackw. herb. t.* 476.

ſolſtitia-lis. 74. C. calicibus duplicato-ſpinoſis ſolitariis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis, radicalibus lyrato-pinnatifidis. *Col. ecphr.* 1. *t.* 31.

meliten-ſis. 75. C. calicibus duplicato-ſpinoſis confertis terminalibus, foliis decurrentibus lanceolatis ſinuoſis inermibus. *Bocc. ſic. t.* 35.

POLYGAMIA NECESSARIA.

985. MILLERIA. *Recept.* minimum. *Pappus* o. *Cal.* 3partitus. *Radius* corollæ dimidiatus.

quinqueflora. 1. M. foliis cordatis pedunculis dichotomis. *Mant. p.* 478. *Mart. cent. t.* 41. β) *Mart. cent. t.* 47. *f.* 2.

biflora. 2. M. foliis ovatis, pedunculis ſimpliciſſimis. *Mart. cent. t.* 47. *f.* 1.

FLAVERIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* connivens, æqualis, 3-4phyllus.

chilenſis. 1. Fl. glomerulis terminalibus capitatis. *Juſſieu gen. plant. p.* 186. 187.

peruviana. 2. Fl. glomerulis terminalibus ſpiratis. *Juſſieu gen. plant. p.* 187.

1323. BALTIMORA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* cylindricus, polyphyllus. *Radius* corollæ 5florus.

recta. 1. BALTIMORA. *Mant. p.* 288. *Pluckn. mant. t.* 342. *f.* 3.

986. SILPHIUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* marginato-2cornis. *Cal.* ſquamoſus.

laciniatum. 1 S. foliis alternis pinnato-ſinuatis. *Linn. fil. faſc.* 1. *t.* 1.

terebinthinaceum. 2. S. foliis alternis ovatis ſerratis ſcabris, radicalibus cordatis. *Suppl. p.* 383. *Jacq. h. Vind.* 1. 43.

ſcabrum. 9. S. foliis alternis lato-lanceolatis ſerratis ſcabris ciliatis ſubſeſſilibus. *Walt. flor. carol. p.* 216.

ſolidaginoides. 3. S. foliis oppoſitis petiolatis lanceolatis acute ſerratis.

perfoliatum. 4. S. foliis oppoſitis petiolatis deltoidibus perfoliatis, caule tetragono lævi. *Jungh. fl. ic. cent.* 1. *n.* 33.

connatum. 5. S. foliis oppoſitis ſeſſilibus perfoliatis, caule tereti ſcabro. *Mant. p.* 574. *Jungh. pl. ic. cent.* 1. *n.* 26.

Aſteriſcus. 6. S. foliis oppoſitis ſeſſilibus indiviſis, inferioribus alternis. *Dill. h. Elth. t.* 37. *f.* 42.

trilobatum. 7. S. foliis oppoſitis ſeſſilibus cuneiformibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 155. *f.* 1.

trifoliatum. 8. S. foliis ternis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 68.

987. POLYMNIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 0. *Cal.* exterior 4-5phyllus. interior 10phyllus, foliolis cymbiformibus.

carnoſa. 1. P. foliis alternis oblongis, calicibus ſerratis, caule fruteſcente decumbente. *Suppl. p.* 384.

canadenſis. 2. P. foliis alternis haſtato-ſinuatis. *Amœn. acad.* 3. *t.* 1. *f.* 5.

Uvedelia. 3. P. foliis oppoſitis haſtato-ſinuatis. *Pluckn. alm. t.* 83. *f.* 3.

Tetragonotheca. 4. P. foliis oppoſitis ſpatulatis ſubdentatis. *Sp. pl. p.* 1273. Tetragonotheca helianthoides.

ſpinoſa. 5. P. foliis oppoſitis ovato-cordatis ſeſſilibus, aculeis ſupra axillaribus, calicibus integris, caule fruticoſo erecto. *Suppl. p.* 384.

abyſſinica. 6. P. foliis oppoſitis lanceolatis ſeſſilibus. *Suppl. p.* 383.

Wedelia. 7. P. foliis lanceolatis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 118. *Jacq. ſtirp. amer. pict. t.* 198. *Pappus* 10*dentatus; an ergo hujus generis?*

988. CHRYSOGONUM. *Recept.* paleaceum. *Pappus* 1phyllus, 3dentatus. *Cal.* 5phyllus. *Sem.* caliculo 4phyllo involuta.

virginianum. 1. CHRYSOGONUM. *Pluckn. alm. t.* 83. *f.* 4. & *t.* 242. *f.* 3. *Petioli folio longiores.*

BASTERA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* imbricatus.

Houttuy-ni. 1. BASTERA. *Houttuyn. Linn. Syſt.* 4. *p.* 437.

989. MELAMPODIUM. *Recept.* paleaceum, conicum. *Pappus* 1phyllus, vulviformis. *Cal.* 5phyllus.

humile. 1. M. caule erecto, foliis lyrato-dentatis ſeſſilibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 114.

americanum. 2. M. caule erecto, foliis ſublinearibus utrinque unidentatis.

auſtrale. 3. M. caule decumbente, foliis ovatis ſerratis.

TRIXIS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice hirſuto. *Corollul.* radii 3fidæ.

terebinthinacea. 1. Tr. foliis ovatis ſerrulatis hiſpidis ſubtus hirſutis, floribus corymboſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 115.

aſpera. 2. Tr. foliis ovatis baſi & apice attenuatis dentato-ſerratis aſperis, floribus paniculatis. *Aubl. pl. guj. p.* 804. *t.* 317.

eroſa. 3. Tr. foliis lato-ovatis inciſo-ſerratis rugoſis ſcabris petiolo longioribus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 115.

BAILLIERIA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* apice 2cornia. *Cal.* ovatus, 4-5phyllus. *Corollul.* rad. 7.

aſpera. 1. BAILLIERIA. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 804. *t.* 317. β) Bailliera ſilveſtris *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 807.

990. CALENDULA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Cal.* polyphyllus, ſubæqualis. *Sem.* diſci ut plurimum membranacea.

ſancta. 1. C. feminibus urceolatis obovatis lævibus, calicibus ſubmuricatis.

arvenſis. 2. C. ſeminibus cymbiformibus muricatis incurvatis, intimis conglobatis; extimis erectis caudatis. *Bulliard herb. Franc. t.* 239.

officinalis. 3. C. ſeminibus cymbiformibus muricatis incurvatis omnibus. *Mill. ill. ic. Knorr. del. hort.* 1. *t.* R. 21.

pumila. 4. C. ſeminibus oblongis incurvatis, foliis orbiculatis crenatoſerratis, ſerraturis mucronatis, ſcapo nudo unifloro. *Forſt. flor. auſtr. p.* 57.

tomentoſa. 5. C. foliis obovatis integris tomentoſis, ſcapo nudo unifloro. *Suppl. p.* 284.

fruticoſa. 6. C. foliis obovatis ſubdentatis, caule fruticoſo decumbente. *Mill. h. angl. t.* 283.

rigida. 7. C. foliis ellipticis dentatis ſcabriuſculis, ſeminum alis ſemiorbicularis *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 271.

hybrida. 8. C. foliis lanceolatis dentatis, caule folioſo, pedunculis ſuperne incraſſatis. *Mill. h. angl. t.* 75. *f.* 1.

pluvialis. 9. C. foliis lanceolatis ſinuato-denticulatis, caule folioſo, pedunculis filiformibus. *Mill. h. angl. t.* 75. *f.* 2.

nudicaulis. 10. C. foliis lanceolatis ſinuato-dentatis, caule ſubnudo. *Mant. p.* 479. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 33.

arboreſceus. 11. C. foliis cuneiformi-lanceolatis ſerrato-dentatis, caule ramoſo, pedunculis unifloris teretibus. *Jacq. Collect.* 3. *p.* 167.

graminifolia. 12. C. foliis linearibus ſubintegerrimis, caule ſubnudo unifloro, ſeminibus obcordato orbiculatis lævibus. *Mill. h. angl. t.* 76. *f.* 1.

Tragus. 13. C. cauleſcens, foliis alternis linearibus ſubintegerrimis ſubpiloſis, ſeminibus ſuborbiculatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 271.

oppoſitifolia. 14. C. foliis oppoſitis linearibus integerrimis ſubcarnoſis glabris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 272.

991. ARCTOTIS. *Recept.* villoſum vel paleaceum. *Pappus* corona ſubcentophylla. *Cal.* imbricatus: ſquamis intimis apice ſcarioſis.

* *receptaculo villoſo.*

† *floſculis radiantibus ſterilibus.*

calendulacea. 1. A. foliis runcinatis ſubtomentoſis.

Calendula. α A. floſculis radiantibus duodenis ſubintegris. *Herm. par. bat. p.* 42. *ic.*

hypochondriaca. β. A. floſculis radiantibus trifidis, media inflexa. *Breyn ic. t.* 15.

triſtis. γ. A. floſculis radiantibus quadripartitis. *Mant. p.* 479. *Commel rar. t.* 36.

coruſcans. δ. A. floſculis radiantibus tripartitis, exteriori trifida.

ſuperba. ε. A. floſculis radiantibus quinquepartitis.

ſerrata. 2. A. foliis lanceolatis indiviſis dentato-ſerratis. *Suppl. p.* 385.

microphylla. 3. A. foliis linearibus indiviſis nudis. *Suppl. p.* 385.

†† *floſculis radiantibus fertilibus.*

argentea. 4. A. foliis lanceolato-linearibus integerrimis tomentoſis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 273.

plantaginea. 5. A. foliis lanceolato-ovatis nervoſis denticulatis amplexicaulibus.

anguſtifolia. 6. A. caulibus repentibus arachnoideis, foliis lyratis utrinque bidentatis. β) *Mant. p.* 479.

aſpera. 7. A. foliis pinnato-ſinuatis villoſis, laciniis oblongis dentatis. *Mant. p.* 480. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 22.

grandiflora. 8. A. foliis pinnatifidis denticulatis arachnoideis trinerviis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 272.

** *receptaculo paleaceo.*

tenuifolia. 9. A. foliis linearibus indiviſis glabris. *Mant. p.* 288. *an vere diſtincta ab anguſtifolia?*

ſcarioſa. 10. A. foliis decompoſitis, floſculis radiantibus ſterilibus, paleis floſculos diſci æquantibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 274.

acaulis. 11. A. pedunculis radicalibus, foliis lyratis. *Commel. rar. t.* 35.

dentata. 12. A. floſculis radiantibus ſterilibus, foliis pinnatis, pinnis pinnatifido-dentatis. *Burm. afr. t.* 64.

paleacea. 13. A. floſculis radiantibus ſterilibus, paleis floſculos diſci æquantibus, foliis pinnatis linearibus. *Burm. afr. t.* 65. *f.* 1.

paradoxa. 14. A. floſculis radiantibus ſterilibus, paleis coloratis diſco longioribus, foliis bipinnatis linearibus. *Pluckn. phyt.* 312. *f.* 5.

anthemoides. 15. A. paleis floſculo brevioribus, foliis ſupradecompoſitis linearibus. *Burm. afr. t.* 63. *f.* 2.

caroliniana. 16. A. foliis radicalibus ovatis dentatis hirſutis, pedunculis radicatis piloſis unifloris. *Walt. flor. Carol. p.* 216.

992. OSTEOSPERMUM. *Recept.* nudum. *Pappus* 0. *Cal.* polyphyllus. *Drupæ* ſubgloboſæ, coloratæ, tandem oſſeæ, congregatæ, 1loculares.

junceum. 1. O. foliis linearibus acutis carinatis diſtantibus, panicula terminali. *Mant. p.* 290.

triquetrum. 2. O. foliis linearibus triquetris. *Suppl. p.* 385.

ilicifolium 3. O. foliis oblongis dentato-angulatis ſcabris ſemiamplexicaulibus, ramis ſulcatis. *Burm. zey. t.* 62.

ſpinoſum. 4. O. ſpinis ramoſis. *Mant. p.* 480. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 43. *Piſifero proximum.*

piſiferum. 5. O. foliis lanceolatis mucronatis ſubpetiolatis glabris ſerratis, ramis denticulato-angulatis. *Mill. h. angl. t.* 194. *f.* 1.

calendulaceum. 6. O. foliis lanceolatis ſeſſilibus dentatis ſcabris, caule carnoſo laxo. *Suppl. p.* 386.

polygaloides. 7. O. foliis lanceolatis ſparſis decurrentibus glabris integerrimis, axillis lanatis. *Mant. p.* 480. *Pluckn. mant. t.* 382.

corymboſum. 8. O. foliis lanceolatis glabris, floribus paniculatis. *Mant. p.* 290.

ciliatum. 9. O. foliis elliptico-lanceolatis crenatis ciliatis. *Burm. afr. t.* 61. *f.* 2.

imbricatum. 10. O. foliis ovatis obtuſis imbricatis. *Mant. p.* 290.

herbaceum. 11. O. foliis ovatis ſubſeſſilibus ſpatulatis ſerratis, caule herbaceo. *Suppl. p.* 385.

niveum. 12. O. foliis ovatis petiolatis dentatis lanatis. *Suppl. p.* 386.

perfoliatum. 13. O. foliis ovatis petiolatis angulato-dentatis ſubtus tomentoſis, petiolis perfoliato-amplexicaulibus. *Suppl. p.* 386.

moniliferum. 14. O. foliis obovatis ſerratis petiolatis ſubdecurrentibus. *Dill. h. Elth. t.* 78. *f.* 79.

Arctotoides. 15. O. foliis lyratis petiolatis, petiolis baſi auriculatis ſemiamplexicaulibus tomentoſis. *Suppl. p.* 385.

rigidum. 16. O. foliis dentato-pinnatifidis piloſis, ramis inermibus. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 275.

pinnatifidum. 17. O. foliis pinnatifidis. *Herit. ſtirp. nov.* 1. *p.* 11. *t.* 6.

cæruleum. 18. O. erectum viſcoſum, foliis pinnatis, pinnis oblongis inæqualiter ſerratis utrinque decreſcentibus. *Jacq. Coll.* 1. *p.* 78. *an idem cum pinnatiſido ?*

993. OTHONNA. *Recept.* nudum. *Pappus* ſubnullus. *Cal.* 1phyllus, multifidus, ſubcylindricus.

* *foliis ſimplicibus indiviſiſque.*

ericoides. 1. O. caule dichotomo imbricato, foliis aceroſis, pedunculo longiſſimo, ex divaricaturis ſolitario. *Suppl p.* 388.

tenuiſſima. 2. O. foliis filiformibus carnoſis, caule fruticoſo. *Mant. p.* 118. *Pluckn. phyt.* 319. *f.* 5.

linifolia. 3. O. herbacea, foliis linearibus marginatis gramineis. *Suppl. p.* 388.

craſſifolia. 4. O. foliis lanceolatis integerrimis ſubcarnoſis, caule erecto. *Mill. h. angl. t.* 245. *f.* 2.

cheirifolia. 5. O. foliis lanceolatis trinerviis integerrimis, caule ſuffruticoſo repente. *Mill. h. angl. t.* 245. *f.* 1.

Digitized by Google

coronopifolia. 6. O. foliis lanceolatis, infimis integerrimis, ſuperioribus ſinuato-dentatis. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 70.

parviflora. 7. O. foliis lanceolatis glabris amplexicaulibus, floribus paniculatis. *Mant. p.* 289. *Syſt. nat.* XII, 3. *p.* 553. Senecio rigens. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 72.

lateriflora. 8. O. foliis lanceolatis, floribus lateralibus, pedunculis longitudine foliorum. *Suppl. p.* 387.

Lingua. 9. O. foliis ovato-lanceolatis ſemiamplexicaulibus. *Suppl. p.* 387.

heterophylla. 10. O. foliis radicalibus ovatis angulato-dentatis, caulinis lanceolatis integriuſculis. *Suppl. p.* 387.

Cacalioides. 11. O. ramoſa nuda lævis, foliis faſciculatis obovatis ſeſſilibus pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 388.

fruteſcens. 12. O. foliis ovalibus ſubdentatis, caule fruteſcente. *Mant. p.* 288. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 557. Cineraria othonnites. *Commel. h. amſt.* 20. *t.* 76.

virginea. 13. O. foliis cuneatis inciſis. *Suppl. p.* 389.

arboreſcens. 14. O. foliis oblongis integerrimis, caule arboreſcente carnoſo, cicatricibus lanatis. *Dill. h. Elth. t.* 103. *f.* 123.

bulboſa. 15. O. foliis oblongis nudis petiolatis, caule herbaceo, pedunculis unifloris longiſſimis. *Breyn cent.* 1. *t.* 66.

denticulata. 16. O. foliis oblongis denticulatis glabris baſi attenuatis amplexicaulibus, floribus paniculatis. *Ait. hort. Kew.* 2. *p.* 276.

digitata. 17. O. foliis oblongis indiviſis, vel digitato-dentatis, pedunculis unifloris. *Suppl. p.* 386.

** *foliis diviſis compoſitiſve.*

capillaris. 18. O. foliis lyratis ramis capillaribus. *Suppl. p.* 388.

trifida. 19. O. foliis trifidis linearibus, floribus lateralibus pedunculatis. *Suppl. p.* 387.

trifurcata. 20. O. foliis trifido-pinnatifidis, laciniis linearibus, pedunculis lateralibus faſtigiatis. *Suppl. p.* 387.

pectinata. 21. O. foliis pinnatifidis, laciniis linearibus parallelis. *Mill. h. angl. t.* 194. *f.* 2.

ciliata. 22. O. foliis pinnatifidis ſeſſilibus, laciniis ovatis ciliatis, pedunculis terminalibus elongatis unifloris. *Suppl. p.* 386.

pinnata. 23. O. foliis pinatifidis, laciniis lanceolatis integerrimis decurrentibus. *Suppl. p.* 387. *Burm. afr. t.* 59.

munita. 24. O. foliis pinnatifidis imbricatis incurvis, laciniis triquetris ſubulatis, caule dichotomo, pedunculis ex divaricaturis. *Suppl. p.* 388.

abrotani-folia. 25. O. foliis multifido-pinnatis linearibus, caulium geniculis villoſis. *Seb. muſ.* 2. *t.* 23. *f.* 6.

Tagetes. 26. O. foliis linearibus pinnatis ſubdentatis. *Murray comm. goett.* 1780. *p.* 17. *t.* 5.

Athanaſiæ. 27. O. foliis pinnatis filiformibus, calice hemiſphærico duodecimdentato. *Suppl. p.* 386.

1324. HIPPIA. *Recept.* nudum. *Pappus* o. *Semina* marginibus latiſſimis. *Cal.* hemiſphæricus, ſubimbricatus. *Corollul.* radii 10, obſoletæ, ſubtrifidæ.

integrifolia. 1. H. hiſpida erecta, foliis obovatis ſerratis quinquenerviis, racemis terminalibus. *Suppl. p.* 389.

minuta. 2. H. herbacea repens glabra, foliis pinnatis, pedunculis axillaribus unifloris. *Suppl. p.* 389.

fruteſcens. 3. H. fruticoſa villoſa, foliis pinnatifidis, floribus corymboſis. *Mant. p.* 291. *Suppl. p.* 390. *Sp. pl. p.* 1183. Tanacetum fruteſcens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 579. Eriocephalus pectinifolius. *Commel. h. amſt.* 2. *t.* 101.

994. ERIOCEPHALUS. *Recept.* ſubvilloſum. *Pappus* o. *Cal.* 10phyllus, æqualis. *Radii* floſculi 5.

africanus. 1. E. foliis integris diviſiſque, floribus corymboſis. *Dill. h. Elt. t.* 110. *f.* 134.

racemoſus. 2. E. foliis linearibus indiviſis, floribus racemoſis.

995. FILAGO. *Recept.* nudum. *Pappus* o. vel brevis ſimplex. *Cal.* imbricatus. *Floſculi feminei*, partim apetali inter ſquamas calicis locati.

acaulis. 1. F. floribus acaulibus ſeſſilibus, foliis floralibus majoribus. *Barr. pl. rar. ic.* 127.

arvenſis. 2. F. caule paniculato, floribus conicis lateralibus.

germanica. 3. F. panicula dichotoma, floribus rotundatis axillaribus hirſutis, foliis acutis.

pyramidata. 4. F. caule dichotomo, floribus pyramidatis pentagonis axillaribus, floſculis femineis ſerratis.

gallica. 5. F. caule dichotomo erecto, floribus ſubulatis axillaribus, foliis filiformibus. *Pluckn. alm. t.* 298. *f.* 2.

montana. 6. F. caule ſubdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribuſque. *Lob. ic.* 481.

Leontopodium. 7. F. caule ſimpliciſſimo, capitulo terminali bracteis hirſutiſſimis radiato. *Mant. p.* 481. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 86.

996. MICROPUS. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Cal.* caliculatus. *Rad.* corollæ o. *Floſculi feminei* ſquamis calicis involuti.

ſupinus. 1. M. caule procumbente, foliis geminis. *Pluckn. alm. t.* 187. *f.* 6.

erectus. 2. M. caule erecto, calicibus edentulis, foliis ſolitariis. *Loeſl. hiſp. t.* 1. *f.* 3.

POLYGAMIA SEGREGATA.

997. ELEPHANTOPUS. *Caliculus* 4florus. *Corollulæ* ligulatæ, hermaphroditæ. *Recept.* nudum. *Pappus* ſetaceus vel ariſtatus.

ſcaber. 1. E. foliis oblongis ſcabris. *Dill. h. Elth. t.* 106. *f.* 126.

tomentoſus. 2. E. foliis ovatis tomentoſis.

ſpicatus. 3. E. foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus. *Sloan. jam.* 1. *p.* 256. *t.* 150. *f.* 3. 4.

anguſtifolius. 4. E. foliis caulinis lineari-lanceolatis integris villoſis. *Sloan. jam.* 1. *p.* 256. *t.* 148. *f.* 4.

1325. ŒDERA. *Calic.* multiflori. *Corollulæ* tubuloſæ, hermaphroditæ, una alterave feminea ligulata. *Recept.* palaceum. *Pappus* paleis pluribus.

prolifera. 1. Œ. foliis lanceolatis oppoſitis ciliatis utrinque glabris. *Mant. p.* 291. *Supp. p.* 391. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 569. Buphthalmum capenſe.

aliena. 2. Œ. foliis linearibus ſubtus tomentoſis. *Suppl. p.* 390.

998. SPHÆRANTHUS. *Calic.* multiflori. *Coroll.* tubuloſæ hermaphroditæ & obſoletæ feminæ. *Recept.* ſquamoſum. *Pappus* o.

indicus. 1. Sph. foliis decurrentibus lanceolatis ſerratis, pedunculis criſpatis. *Rheed. i. malab.* 10. *t.* 43.

africanus. 2. Sph. foliis decurrentibus ovatis ſerratis, pedunculis teretibus. *Mant. p.* 119. *Burm. ind. t.* 60. *f.* 2.

ſinenſis. 3. Sph. foliis ſeſſilibus pinnatifidis. *Mant. p.* 119.

999. ECHINOPS. *Calic.* 1florus. *Coroll.* tubuloſæ, hermaphroditæ. *Recept.* ſetoſum. *Pappus* obſoletus.

ſphærocephalus. 1. E. capitulis globoſis, foliis ſinuatis aſperis ſubtus tomentoſis. *Mill. illuſtr. ic.*

ſpinoſus. 2. E. capitulis inſperſis ſpinis longis. *Mant. p.* 119.

Ritero. 3. E. capitulo globoſo, foliis pinnatifidis ſupra glabris. *Mill. h. angl. t.* 130. *β) Gmel. flor. ſib.* 2. *t.* 46.

ſtrigoſus. 4. E. capitulis faſciculatis, calicibus lateralibus ſterilibus, foliis ſupra ſtrigoſis. *Herm. par. Lugdb. p.* 224. *ic.*

TETRANTHUS. *Calix* 4florus. *Calic.* 1phyllus. *Sem.* coronata. *Coroll.* tubuloſæ, hermaphroditæ.

littoralis. 1. TETRANTHUS. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 116.

ROLANDRA. *Flores* faſciculati in capitulum ſquamis interjectis. *Cal.* partial. 2-valvis, 1florus. *Coroll.* hermaphroditæ. *Pappus.* o.

argentea. 1. ROLANDRA. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 116. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 7. *Echinops fruticoſus.*

1000. **GUNDELIA.** *Calic.* fere o. *Corollul.* 5. tubuloſæ, maſculæ & hermaphroditæ. *Recept.* paleaceum. *Pappus* o. *Sem.* margine obſoleto.

Tournefortii. 1. GUNDELIA. *Mill. h. angl. t.* 287.

1422. **JUNGIA.** *Cal. communis* 3florus. *Recept.* paleaceum. *Floſculi* tubuloſi, 2labiati, labio exteriori ligulato, interiori 2partito.

ferruginea. 1. JUNGIA. *Suppl. p.* 3901.

CRASPEDIA. *Cal.* communis imbricatus. *Calic.* o. *Floſculi* hermaphroditi, tubuloſi, faſciculis aliquot depreſſis. *Recept.* paleaceum. *Pappus* plumoſus.

uniflora. 1. CRASPEDIA. *Forſt. flor. auſtr. p.* 58.

NASSAUVIA. *Cal. comm.* 4-5florus. *Recept.* nudum. *Floſcul.* ſubbilabiati, hinc 3dentati, inde 2fidi.

magellanica. 1. NASSAUVIA. *Juſſieu gen. plant. p.* 175.

1001. **STŒBE.** *Calic.* 1florus *Coroll.* tubuloſæ, hermaphroditæ. *Recept.* nudum. *Pappus* plumoſus.

æthiopica. 1. St. foliis recurvato-uncinatis nudis. *Mant. p.* 481.

ericoides. 2. St. foliis recurvatis incanis, corollis biſloris diſſormibus. *Mant. p.* 574. *Breyn. cent. t.* 9.

diſticha. 3. foliis recurvis faſciculatis, ſpicis bifariis. *Suppl. p.* 391.

proſtrata. 4. St. foliis reſupinatis hinc tomentoſis, caulibus proſtratis *Mant. p.* 291.

gnaphaloides. 5. St. foliis imbricatis appreſſis filiformibus. *Mant. p.* 119. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 582. Seriphium corymbiferum. *Spec. pl. p.* 1192. Gnaphalium niveum. *Burm. afr. t.* 77. *f.* 1.

gomphrenoides. 6. St. foliis imbricatis appreſſis lanceolatis, capitulo terminali ſeſſili. *Suppl. p.* 391.

ſcabra. 7. St. foliis tortis appreſſis linearibus exterius tuberculato-ſcabris intus tomentoſis, floribus racemoſis. *Suppl. p.* 391.

Rhinocerotis. 8. St. foliis triquetris appreſſis, ramulis tomentoſis cernuis, racemis proliferis. *Suppl. p.* 391.

reflexa. 9. St. procumbens, foliis linearibus, ſpicis ovatis, ramis aſcendentibus. *Suppl. p.* 391.

CLAS.

CLASSIS XIX.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

		* *fructificationibus ſpicatis.*
1169.	EQUISETUM.	*Spica* ſparſa, *Fructificationes* peltatæ, baſi valvatæ.
1170.	ONOCLEA.	*Spica* 2ſticha, *Fructificationes* 5valves.
1171.	OPHIOGLOSSUM.	*Spica* articulata, *Fructificationes* circumſciſſæ.
1172.	OSMUNDA.	*Spica* racemoſa, *Fructificationes* 2valves.
	MARATTA.	*Capſulæ* multiloculares, loculis ſuperne dehiſcentibus.
1185.	LYCOPODIUM.	*Capſulæ* dehiſcentes 2valves.
		** *fructificationibus frondoſis, in pagina inferiori.*
1173.	ACROSTICUM.	*Fructificationes* ſubtus totam frondem tegentes.
1179.	POLYPODIUM.	*Fructificationes* in acervulos ſubrotundos ſubfronde diſtributæ.
	DICKSONIA.	*Fructificationes* ſubrotundæ, margini averſo ſubjectæ.
1176.	HEMIONITIS.	*Fructificationes* lineas decuſſantes ſub fronde efficientes.
1178.	ASPLENIUM.	*Fructificationes* lineas ſubparallelas ſub fronde efficientes.
1175.	BLECHNUM.	*Fructificationes* lineas utrinque coſtis adjaceates efficientes.
1177.	LONCHITIS.	*Fructificationes* lineas ad ſinus marginis efficientes.
1174.	PTERIS.	*Fructificationes* ſubtus in linea marginali frondis.
	DAREA.	*Fructificationes* lineas breves ſolitarias ex unico frondis latere ſubtus exſertas efficientes.
1180.	ADIANTUM.	*Fructificationes* maculas apicem margine reflexo obtectas efficientes.
1181.	TRICHOMANES.	*Fructificationes* ſolitariæ margini ipſi infertæ.
	CÆNOPTERIS.	*Fructific.* puncto marginali ſolitario, rima concava ſcobe parva capitulata farta.

*** *fructificationibus lateralibus.*

1182. MARSILEA.	*Fructus* 4capſularis.
1183. PILULARIA.	*Fructus* 4locularis.
1184. ISOETES.	*Fructus* 2locularis.

MUSCI.

* *frondoſi.*

1186. PORELLA.	*Capſ.* multilocularis, poris pertuſa, ſine operculo & calyptra.
1187. SPHAGNUM.	*Flos maſculus* clavatus, antheris planis. *Capſ.* operculatæ ſine calyptra, ore lævi, in eadem planta.
1191. SPLACHNUM.	*Gemma* orbicularis, terminalis. *Capſ.* in alia planta cum calyptra & apophyſi maxima, periſtomate octodentato.
1192. POLYTRICHUM.	*Gemma* orbicularis, terminalis. *Capſula* in alia planta calyptra munita, periſtomatis dentibus 32.
1193. MNIUM.	*Gemma* orbicularis, rarius capitata. *Capſ.* utplurimum in alia planta, calyptra munitæ, periſtomatis dentibus 16, rarius 4.
1189. PHASCUM.	*Capſula* calyptra munita cum rudimento operculi perſiſtente.
1194. BRYUM.	*Gemmæ* ſæpe axillares, nunc in alia nunc in eadem planta cum capſulis calyptra munitis, pedunculo terminali ex tuberculo exeunti inſidentibus.
1195. HYPNUM.	*Gemmæ* in alia utplurimum planta. *Capſulæ* pedunculo laterali ex perichætio prodeunti inſidentes, periſtomatis dentibus ſedecim.
1190. FONTINALIS.	*Gemma* in eadem planta cum *capſula* ſeſſili perichætio imbricato obvoluta & calyptra munita.
1188. BUXBAUMIA.	*Gemma* orbicularis. *Capſ.* pedunculata, periſtomate externo 16dentato, interno membranaceo plicato.

** *hepatici.*

1198. MARCHANTIA.	*Capſula* peltata, pedunculata, inferne ſeminifera.

1196. JUNGERMANNIA. *Capſula* pedunculata, nuda, 4valvis.
1197. TARGIONIA. *Cal.* 2valvis, includens capſulam campanulatam.

ALGÆ.

* *terreſtres.*

1201. ANTHOCEROS. *Capſ.* ſubulata, 2valvis, valvis ſeminiferis.
1199. BLASIA. *Theca* cylindrica e fundo gemmas globuloſas excludens.
1200. RICCIA. *Fructificationes* granuloſæ frondi innatæ.
1202. LICHEN. *Propagines* & *gemmæ* receptaculis elevatis lævibus nitidis cruſtæ vel frondis innidulantes.
1208. BYSSUS. *Fibræ* ſimplices uniformes lanuginoſæ.

** *aquaticæ.*

1206. ULVA. *Gemmæ* vel *Gangyli* rotund. in membrana diaphana.
1205. FUCUS. *Gangyli* cuſpomorphi vel *ſemina* graniformia ſub punctis perforatis latentia.
1207. CONFERVA. *Fibræ* ſimplices, aut ramoſæ gemmas globuloſas protrudentes.

* *Spongia? Corallina?*

FUNGI.

1209. AGARICUS. *Fungus* ſubtus lamelloſus.
MERULIUS. *Fungus* ſubtus venoſus.
1210. BOLETUS. *Fungus* ſubtus poroſus.
THÆLÆPHORA. *Fungus* ſubtus papilloſus.
1211. HYDNUM. *Fungus* ſubtus echinatus.
1212. PHALLUS. *Fungus* ſubtus lævis, ſupra celluloſus.
1214. HELVELLA. *Fungus* turbinatus, plicatus, rugoſus.
ATRACTOBOLUS. *Fungus* ejaculatorius ſeſſilis cupularis operculatus, veſicula gemmifera fuſiformi ejicienda.
TYMPANIS. *Fungus* cyathiformis, cupula ſuperne volvata, gemmis ſevis confectis in pulverem fatiſcentibus.
MYROTHECIUM. *Fungus* cyathiformis, cupula ſuperne volvam, gemmis lento viſcidis.

SETARIA. *Fungus* hypocrateriformis ſtipitatus, pilei ſuperficie ſuperiori punctata umbilicata, margine primum ævoluto, gemmis ſimilaribus, ſtipite brevi ſetaceo.

CYATHUS. *Fungus* campanulatus, capſulas lentiformes intus gerens.

PORONIA. *Fungus* patelliformis, in ſuperficie externa gemmas ejaculans.

1215. PEZIZA. *Fungus* ſæpe concavus, ſine capſulis aut gemmis oculo nudo viſibilibus.

PATERA. *Fungus* carnoſus, ſeſſilis, planiuſculus, ſuperne glaber.

1216. CLAVARIA. *Fungus* glaber clavatus aut ramoſus.

ACROSPERMUM. *Fungus* ſimpliciſſimus ſub erectus, in apice convexo extrinſecus gemmas portans.

PUCCINIA. *Fungus* cylindricus, gemmis caudatis farctus.

STEMONITIS. *Fungus* corticatus, tomento pollinifero elaſtice proſiliente impletus.

1213. CLATHRUS. *Fungus* cancellatus.

1217. LYCOPERDON. *Fungus* gemmas Filo inſtructas continens.

TUBER. *Fungus* ſucco pulpoſo repletus.

CARPOBOLUS. *Fungus* capſulam globoſam ejaculans, ſeſſilis, vertice radiatim dehiſcente.

SPERMODERMIA. *Fungus* globoſus ſeſſilis ſimpliciſſimus ſpongioſus, corticis vicem ſupplente polline conferto.

VERMICULARIA. *Capſula* globoſa ſeſſilis, corporibus vermiformibus liberis repleta.

PYRENIUM. *Fungus* globoſus ſeſſilis integerrimus, germina nuda conglobata nuclei inſtar includens.

MEDUSULA. *Fungus* globoſus ſtipitatus confertus ſolidus, gemmis externis fuſiformibus flexilibus colliqueſcentibus.

CHORDOSTYLUM. *Fungus* tenuiſſimus ſtipitatus, capitulo globoſo ſubdeciduo intus gemmas gerente, ſtipite longiſſimo ſubramoſo.

SPHÆRIA. *Fungus* gemmis ecaudatis farctus, per poros in ſuperficie ſparſos emittens.

THELEOBOLUS. *Fungus* ejaculatorius ſeſſilis, ſubſtantia & placenta gemmifera ſolidis gelatinoſis dejiciendis.

1204. TREMELLA. *Fungus* gelatinoſus, gemmis latitantibus.

MESENTERICA. *Fungus* expanſus gelatinoſus venoſus, in margine gemmas ferens.

TUBERCULARIA. *Fungus* gelatinoſus ſtipitatus, pileatus ſtipite craſſiſſimo farcto ; pileo tuberculato-papilloſo ſtipiti arcte appreſſo in ſuperficie ſuperiori gemmas portante.

STILBUM. *Fungus* gelatinoſus aggregatus ſtipitatus, capitulo diaphano nitente ſolido perſiſtente, extrinſecus gemmas portante.

ASCOPHORA. *Fungus* erectus ſtipitatus, capitulo globoſo-oblongo inflato opaco elaſtico, extrinſecus gemmas ferente ſtipite ſetaceo.

SCLEROTIUM. *Fungus* ſimpliciſſimus globoſo-oblongus, ſubſtantia tenaci duriuſcula centro demum ſubhiante, cortice inſeparabili ſuperne nunquam dehiſcente.

HYSTERIUM. *Fungus* labiato-globoſus ſeſſilis, capſula in labiis dehiſcente, ſubſtantia prominente exterius gemmas portante.

XYLOSTROMA *Fungus* expanſus coriaceus deformis interpolatus lævis æqualis, gemmis globuloſis minutiſſimis intus fibrillis fungi infixis.

HYDROGERA. *Fungus* ſtipitatus ſtipite capillari ſuperne ventricoſo hydrophoro, placenta gemmifera dejicienda pileum conſtituente.

MUCILAGO. *Fungus* celluloſus aut filamentoſus aquoſus, ſine granulis & capitulis.

EMBOLUS. *Fungus* celluloſus pulverulentus, ſine cortice.

HELOTIUM. *Fungus* fugaciſſimus perpendicularis, ſtipite capillari, pileo minuto convexo inferne nudas gemmas portante.

1218. MUCOR. *Fungus* mollis in pulverem capitulo incluſum dehiſcens.

MONILIA. *Granula* minuta ſubſtantiæ filamentoſæ affixa.

RETICULARIA. *Fungus* gemmina pulverulenta reticulo implicata gerens.

FULIGO. *Fungus* mollis, butyraceus, in atrum pulverem dilabens.

FILICES.

1169. EQUISETUM. *Clava* ovato-oblonga, multivalvis, Fructificationes peltatæ intus dehiſcentes.

ſilvaticum. 1. E. frondibus compoſitis, ſpica terminali flaccida. *Weinm. phytanth. t.* 479. *f. f.*

arvenſe. 2. E. ſcapo fructificante nudo, fronde ſterili verticillato-ramoſo decumbente. *Curt. flor. Lond. t.* 285.

paluſtre. 3. E. caule angulato, frondibus ſimplicibus. *Weinm. phytanth. t.* 479. *f.* d. e. *β*) *Raj. angl.* 3. *t.* 5. *f.* 3.

fluviatile. 4. E. caule ſtriato, frondibus ſubſimplicibus. *Blackw. herb. t.* 217. *f.* 2.

limoſum. 5. E. caule ſubnudo lævi. *Raj. angl.* 3. *t.* 5. *f.* 2. *an mera fluviatilis varietas ?*

hiemale. 6. E. caule nudo ſcabro baſi ſubramoſo. *Regn. bot. t.* 401.

pratenſe. 7. E. caule ſubæquali ramoſo ſulcato ſcaberrimo, ramis patentiſſimis ſterilibus, dentibus vaginarum ſubulatis ſcarioſis. *Ehrhart Hannöv. Mag.* 1784. 9.

giganteum. 8. E. caule ſtriato arboreſcente, frondibus ſimplicibus ſtrictis ſpiciferis. *Plum. ic.* 125. *f.* 2.

1185. LYCOPODIUM. *Capſulæ?* reniformes, 2-valves, elaſticæ, polyſpermæ.

nudum. 1. L. foliis ſubnullis, ſpicis dichotomis, floribus diſtantibus. *Mant. p.* 506. *Dill. muſc. t.* 64. *f.* 4.

ſelaginoides. 2. L. foliis ſparſis ciliatis lanceolatis, ſpicis ſolitariis terminalibus folioſis. *Flor. dan. t.* 70.

taxifolium. 3. L. foliis ſparſis lanceolato-linearibus patulis, caule erecto dichotomo, capſulis ſparſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 138.

alopecuroides. 4. L. foliis ſparſis ciliatis linearibus, ſpicis terminalibus folioſis. *Dill. muſc. t.* 62. *f.* 8.

ſquarroſum. 5. L. foliis ſparſis linearibus glabris, ſpicis terminalibus folioſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 86.

dichotomum. 6. L. foliis ſparſis lineari-acuminatis patulis, caule declinato aſſurgente dichotomo, ramis patulis, capſulis ſparſis. *Jacq. h. Vind.* 3. *p.* 26. *t.* 45.

clavatum. 7. L. foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. *Flor. dan. t.* 126.

rupeſtre. 8. L. foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis terminalibus tetragonis. *Dill. muſc. t.* 63. *f.* 11.

inundatum. 9. L. foliis ſparſis integerrimis, ſpicis terminalibus folioſis. *Flor. dan. t.* 336.

cernuum. 10. L. foliis ſparſis curvatis, caule ramoſiſſimo, ſpicis nutantibus. *Dill. muſc. t.* 63. *f.* 10.

obſcurum. 11. L. foliis ſparſis decurrentibus, farmentis repentibus, ſurculis erectis dichotomis. *Dill. muſc. t.* 67.

Bryopteris. 12. L. foliis ſparſis imbricatis, ramulis convolutis. *Dill. muſc. t.* 66. *f.* 11.

annotinum. 13. L. foliis ſparſis quinquefariis ſubſerratis, ſurculis annotino-articulatis, ſpicis terminalibus glabris erectis. *Flor. dan. t.* 127.

Selago. 14. L. foliis ſparſis octofariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, capſulis ſparſis. *Flor. dan. t.* 104.

linifolium. 15. L. foliis alternis remotis lanceolatis, capſulis axillaribus. *Dill. muſc. t.* 57. *f.* 5.

gnidioides. 16. L. foliis ternis imbricatis lanceolatis obtuſis glaberrimis caule dichotomo, ramis elongatis, capſulis axillaribus *Suppl. p.* 448.

ſerratum. 17. L. foliis quaternis lanceolatis ſerratis, capſulis ſeſſilibus axillaribus. *Thunb. flor. jap. p.* 341.

Phlegmaria. 18. L. foliis verticillato-quaternis, ſpicis terminalibus dichotomis. *Dill. muſc. t.* 61. *f.* 5.

rigidum. 19. L. foliis ſubverticillatis undique reflexis, inferioribus ſquarroſis rigidis, caule dichotomo faſtigiato, capſulis ſparſis. *Dill. muſc. p.* 4410. *t.* 57. *f.* 4.

ſcarioſum. 20. L. foliis bifariis imbricatis erectis ovatis glabris, ſpicis terminalibus ſquamoſis, ſquamis ſcarioſis reflexis. *Forſt. fl. auſtr. p.* 87.

complanatum. 21. L. foliis bifariis conn[illegible], ſuperficialibus ſolitariis, ſpicis geminis pedunculatis. *Flor. dan. t.* 78.

ſtoloniferum. 22. L. foliis bifariis patentibus, ſuperficialibus oblongis acutis diſtichis, ſurculis tetragonis repentibus longiſſimis inferne ſubnudis ſtoloniferis, ſpicis terminalibus ſeſſilibus. *Plum. fil. t.* 43.

plumoſum. 23. L. foliis bifariis patentibus, ſuperficialibus ſemiovatis ciliatis, ſurculis erectiuſculis, ſpicis terminalibus tetragonis ſeſſilibus. *Dill. muſc. t.* 66. *f.* 10.

ornithopodioides. 24. L. foliis bifariis patentibus, ſupeficialibus diſtichis, ſurculis repentibus, ſpicis ſeſſilibus. *Dill. muſc. t.* 62. *f.* 1. B.

carolinianum. 25. L. foliis bifariis patulis, ſuperficialibus ſolitariis, ſcapis longiſſimis monoſtachis. *Dill. muſc. t.* 66. *f.* 6.

helveticum. 26. L. foliis bifariis patulis ſuperficialibus diſtichis, ſpicis geminis pedunculatis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 196.

flabellatum. 27. L. foliis bifariis, ſuperficialibus diſtichis, caule erecto tereti. *Dill. muſc. t.* 65. *f.* 5.

canaliculatum. 28. L. foliis bifariis, ſuperficialibus diſtichis, caule erecto canaliculato. *Dill. muſc. t.* 65. *f.* 6.

ciliare. 29. L. foliis bifariis, ſuperficialibus diſtichis, caule ramoſo, ſpicis terminalibus ſolitariis folioſis compreſſis unilateralibus. *Kœnig ap. Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 32.

circinale. 30. L. foliis bifariis, ſuperficialibus geminis, ramis convolutis. *Suppl. p.* 448. *Dill. muſc. t.* 66. *f.* 11.

denticulatum. 31. L. foliis bifariis, ſuperficialibus imbricatis, ſurculis repentibus, capſulis ſparſis. *Dill. muſc. t.* 66. *f.* 1. A. *an varietas helvetici?*

apus. 32. L. foliis bifariis, alternis minoribus, caule repente, ſpicis ſeſſilibus. *Dill. muſc. t.* 64. *f.* 3.

myrtifolium. 33. L. foliis quadrifariis lineari-oblongis, ſpicis terminalibus filiformibus folioſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 87.

verticillatum. 34. L. foliis quadrifariis approximatis aceroſis, ramis dichotomis, capſulis axillaribus verticillatis. *Suppl. p.* 448.

ſanguinolentum. 35. L. foliis quadrifariis imbricatis, caulibus repentibus dichotomis, ſpicis ſeſſilibus tetragonis. *Amœn. acad.* 3. *f.* 26.

alpinum. 36. L. foliis quadrifariam imbricatis acutis caulibus erectis bifidis, ſpicis ſeſſilibus teretibus. *Flor. dan. t.* 79.

japonicum. 37. L. foliis ſexfariis integris, caule radicante. *Thunb. flor. jap. p.* 341.

radicans. 38. L. foliis quadrifariis, binis patulis, binis imbricatis, ſpica filiformi bifurca, caule ramisque repentibus dichotomis compreſſis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 493. *Dill. muſc. t.* 65. *f.* 2. A.

1170. ONOCLEA. *Spica* 2ſticha, fructificationibus 3-5valvibus.

ſenſibilis. 1. O. frondibus pinnatis apice ſubracemoſis. *Mant. p.* 504. *Pluckn. man. t.* 404. *f.* 2.

polypodioides. 2. O. frondibus bipinnatis, fructificationibus trivalvibus. *Mant. p.* 306.

1171. OPHIOGLOSSUM. *Spica* 2ſticha, articulata, articulis, tranſverſim dehiſcentibus, ſubgloboſis.

vulgatum. 1. O. fronde ovata, ſcapo unifolio. *Flor. dan. t.* 147.

nudicaule. 2. O. frondibus ovatis, ſcapo aphyllo. *Suppl. p.* 443.

luſitanicum. 3. O. fronde lanceolata. *Barr. pl. rar. ic. t.* 252. *f.* 2.

reticulatum. 4. O. fronde cordata. *Plum. fil. t.* 164.

crotalophoroides. 10. O. fronde ſubcordata ſcapo breviori. *Walt. flor. carol. p.* 256.

pendulum. 5. O. frondibus linearibus longiſſimis indiviſis. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 37. *f.* 3.

palmatum. 6. O. fronde palmata baſi ſpicifera. *Plum. fil. t.* 163.

flexuoſum. 7. O. ſcapo flexuoſo tereti, frondibus oppoſitis petiolatis palmatis, laciniis lanceolatis integerrimis glabris. *Suppl. p.* 443. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 33.

ſcanens. 8. O. caule flexuoſo tereti, frondibus conjugatis pinnatis, pinnis utrinque ſpiniferis. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 33.

japonicum. 9. O. caule flexuoſo angulato, frondibus ſupradecompoſitis, foliolis alternis laciſis. *Thunb. flor. jap. p.* 328.

1172. **OSMUNDA.** *Spica* ramoſa, Fructificationibus ſubgloboſis, ſeſſilibus transverſe dehiſcentibus.

* *fructificationibus in ſcapis diſtinctis.*

† *cauli ad baſin frondis inſidentibus.*

zeylanica. 1. O. ſcapo ſolitario, frondibus verticillatis lanceolatis indiviſis. *Rumpf. amb. 6. t. 68. f. 3.*

Lunaria. 2. O. ſcapo ſolitario, racemo laterali, fronde pinnata, ſolitario. *Flor. dan. t. 18.*

virginica. 3. O. ſcapo ſolitario, fronde ſupradecompoſita. *Plum fil. t. 159.*

ternata. 4. O. ſcapo ſolitario, fronde tripartita ſupra decompoſita. *Thunb. flor. jap. p. 329. t. 32.*

phyllitidis. 5. O. ſcapis geminis, fronde pinnata, caule lævi. *Plum. fil. t. 156.*

hirta. 6. O. ſcapis geminis, fronde pinnata, caule hirto. *Plum. fil. t. 157.*

hirſuta. 7. O. ſcapis geminis, fronde bipinnata hirſuta. *Plum. fil. t. 162.*

adiantifolia. 8. O. ſcapis geminis, frondibus ſupradecompoſitis. *Plum. fil. t. 158.*

†† *ſcapis nudis radicalibus.*

bipinnata. 9. O. fronde pinnata, pinnis pinnatifidis. *Plum. fil. t. 155.*

cervina. 10. O. fronde pinnata, pinnis integerrimis. *Plum. fil. t. 154.*

verticillata. 11. O. racemis verticillatis, fronde ſupradecompoſita. *Plum. fil. t. 160.*

filiculifolia. 12. O. ſcapo paniculato, fronde ſupradecompoſita. *Plum. fil. t. 161.*

bifurcata. 27. O. fronde pinnata, pinnis bifidis dichotomis ſimplicibuſque. *Jacq. coll. 3. p. 282. t. 20. f. 4.*

matricariæ. 28. O. fronde pinnata, pinnis ovatis crenatis. *Schranck. flor. bav. 2. p. 419.*

trifida. 29. O. fronde ternata. *Jacq. coll. 3. p. 281. t. 20. f. 3.*

** *fructificationibus frondi inſidentibus.*

† *omni.*

regalis. 13. O. fronde bipinnata, racemo terminali ſupradecompoſito. *Flor. dan. t. 217.*

Clayto-niana. 14. O. frondibus pinnatis, pinnis pinnatifidis apice coarctato fructificantibus.

⊢ ⊢ *fructificationibus in frondibus distinctis.*

Spicanthus. 15. O. frondibus ſterilibus pinnatifidis, fructificantibus pinnatis anguſtioribus, laciniis integerrimis. *Flor. dan. t.* 99. *an acroſtichi potius ſpecies?*

capenſis. 17. O. frondibus pinnatis, pinnis cordato-lanceolatis crenulatis. *Mant. p.* 306.

cinnamomea. 17. O. fronde pinnata, pinnis pinnatifidis, ſcapis hirſutis, racemis oppoſitis compoſitis.

caroliniana. 26. O. fronde pinnata, pinnis inferioribus undulato-dentatis lanceolatis diſtinctis, ſuperioribus confluentibus. *Walt. flor. carol. p.* 287.

Struthiopteris. 18. O. frondibus ſterilibus binnatifidis, ſcapo fructificante pinnato diſticho.

japonica. 19. O. fronde bipinnata, pinnulis cordato-lanceolatis ſerratis. *Thunb. flor. jap. p.* 330.

Lancea. 20. O. fronde bipinnata, pinnulis lanceolatis ſerratis. *Thunb. flor. jap. p.* 330.

criſpa. 21. O. frondibus ſupradecompoſitis, foliolis alternis ſubrotundis inciſis. *Mant. p.* 505. *Flor. dan. t.* 496.

*** *tribus incertæ.*

ramoſa. 22. O. racemis lateralibus, frondibus bipinnatis, pinnulis inciſis. *Roth flor. germ.* 1. *p.* 444.

ſcandens. 23. O. caule ſcandente, frondibus pinnatis oppoſitis. *Rheed. h. mal.* 12. *p.* 67. *t.* 34.

diſcolor. 24. O. frondibus pinnatis, pinnis oblongis acutiuſculis integris ſeſſilibus alternis approximatis. *Forſt. fl. auſtr. p.* 78.

procera. 25. O. frondibus pinnatis, pinnis remotis ovato-oblongis acuminatis ſerratis ſeſſilibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 78.

MARATTIA. *Capſ.* multiloculares, loculis ſuperne longitudinaliter dehiſcentibus.

alata. 1. M. rhachibus ſquamoſis, partialibus alatis, foliolis acuto ſerratis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 128. *Smith. plant. ic. ined.* 2. *t.* 46.

lævis. 2. M. rhachibus lævibus, partialibus alatis, foliolis apice obtuſe ferratis, ſummis confluentibus. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 47.

fraxinea. 3. M. rhachibus lævibus ſimplicibus, foliolis lanceolatis ferratis omnibus diſtinctis. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 48.

1173. ACROSTICHUM. *Fructificationes* diſcum totum frondis inferius tegentes.

* *fronde ſimplici.*

† *indiviſa.*

ſerrulatum. 1. A. frondibus linearibus dentatis apice fructificantibus, ſurculo breviſſimo radicante. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 128.

graminoides. 2. A. frondibus nudis linearibus apice ſubdichotomis fructificantibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 128.

longifolium. 3. A. frondibus lineari-lanceolatis acutis integerrimis, ſterilibus erectis, fertilibus ſpiraliter revolutis. *Plum. fil. t.* 118. *t.* 135.

heterophyllum. 4. A. frondibus integerrimis glabris petiolatis, ſterilibus ſubrotundis, fertilibus linearibus. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 29.

petiolatum. 5. A. frondibus glabris petiolatis, ſterilibus lineari-lanceolatis, fertilibus linearibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 128.

muſcoſum. 6. A. frondibus petiolatis ſquamoſis, ſterilibus ovato-lanceolatis obtuſis, fertilibus lineari-lanceolatis. *Plum. fil. t.* 139.

lanceolatum. 7. A. frondibus lineari-lanceolatis acutis, ſurculo ſcandente. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 33.

ſimplex. 8. frondibus glabris petiolatis, ſterilibus lanceolatis acuminatis, fertilibus lineari-lanceolatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 128.

ſpicatum. 9. A. fronde petiolata lanceolata utrinque attenuata integerrima, ſpica terminali lineari. *Suppl. p.* 444. *Smith plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 49.

villoſum. 10. A. frondibus lato-lanceolatis ſubcrenulatis utrinque villoſis. *Plum. fil. t.* 127. *f.* D.

latifolium. 11. A. frondibus lato-lanceolatis glaberrimis marginatis, fructificantibus ovato-lanceolatis, ſurculo repente. *Plum. fil. t.* 135.

citrifolium. 12. A. frondibus lanceolato-ovatis integerrimis, furculo ſcandente. *Plum. fil. t.* 116.

crinitum. 13. A. frondibus ovatis obtuſis hirſutis ſupra crinitis. *Pet. fil. t.* 13. *f.* 14.

Lingua. 14. A. frondibus oblongis obtuſis petiolatis, furculo repente. *Thunb. flor. jap. p.* 330. *t.* 33.

punctatum. 15. A. frondibus cordato-lingulatis acuminatis integerrimis ſupra punctatis.

haſtatum. 16. A. fronde haſtata. *Thunb. flor. jap. p.* 331. *t.* 34.

⊢ ⊢ *fronde diviſa.*

ſeptentrionale. 17. frondibus nudis linearibus laciniatis. *Flor. dan. t.* 60.

auſtrale. 18. A. ſtipitibus nudis glaberrimis apice dichotomo-ramoſis ſubſexradiatis ſubulatis lateriſloris. *Suppl. p.* 444. *Vahl. ſymb. bot.* 1. *t.* 25.

pectinatum. 19. A. nudum ſimpliciſſimum, ſpica lanata ſecunda aſcendente compreſſa. *Pluckn. alm. t.* 95. *f.* 4.

dichotomum. 20. A. nudum dichotomum, ſpicis ſecundis aſcendentibus reflexis compreſſis. *Pet. gaz. t.* 70. *f.* 12.

digitatum. 21. A. ſtipitibus nudis triquetris, fronde digitata lineari integerrimis æquali. *Amoen. acad.* 1. *p.* 269. *f.* 1.

ferrugineum. 22. A. frondibus pinnatifidis, laciniis linearibus acutis patentibus integerrimis connatis, ſtipite lævi. *Pluckn. phyt.* 89. *f.* 9.

polypodioides. 23. A. frondibus pinnatifidis, laciniis linearibus obtuſis integerrimis patentibus connatis, ſtipite ſquamoſo. *Pluckn. alm. t.* 289. *f.* 1. *nonne potius polypodii ſpecies?*

* * *fronde compoſita.*

⊢ *pinnata.*

platyneuron. 24. A. pinnis alternis ovatis crenatis ſeſſilibus ſurſum arcuatis. *Pluckn. alm. t.* 289. *f.* 2.

punctuatum. 25. A. pinnis alternis lanceolatis integerrimis ſupra punctatis glabris, infimis auriculatis, ſummis decurrentibus. *Suppl. p.* 444.

aureum. 26. A. pinnis alternis linguiformibus integerrimis glabris. *Pluckn. fil. t.* 104.

areolatum. 27. A. pinnis alternis linearibus apice ſerratis.

rufum. 28. A pinnis oblongo-ovatis integerrimis pubeſcentibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 45. *f.* 1.

ſorbifolium. 29. A. pinnis oblongo-ovatis integris ſerratis acutis, ſtipitibus ſquamoſis. *Pet. fil. t.* 9. *f.* 8.

marginatum. 30. A. pinnis oblongis integerrimis undulatis acuminatis, ſtipite nudo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 40. *vix propria ſpecies, certe hujus generis.*

ſanctum. 31. A. frondibus lanceolatis, pinnis lineari-lanceolatis inciſo-ſerratis, ſerraturis infimis majoribus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 49. *f.* 2. *an polypodium ?*

trifoliatum. 32. A. pinnis ternatis lanceolatis. *Plum. fil. t.* 144.

†† *fronde ſubbipinnata.*

ſiliquoſum. 33. A. pinnis alternis ſurſum pinnulatis linearibus, inferioribus bipartitis. *Amoen. acad.* 1. *p.* 270. *f.* 3.

thalictroides. 34. A. pinnis alternis utrinque pinnatifidis, ſterilibus latioribus. *Flor. zeyl. p.* 377. *f.* 4. *an idem cum ſiliquoſo ?*

ſulphureum. 35. A. pinnis alternis ovatis pinnatifidis, laciniis retuſis ſerratis. *Plum. fil. t.* 44.

Marantæ. 36. A. pinnis oppoſito-coadunatis ſubtus hirſutiſſimis baſi ſubdentatis. *Pluckn. alm. t.* 281. *f.* 4.

ilvenſe. 37. A. pinnis oppoſito-coadunatis obtuſis ſubtus hirſutis baſi integerrimis. *Flor. dan. t.* 391.

ebeneum. 38. A. pinnis ſeſſilibus oblongis ſinuatis, ſummis breviſſimis integerrimis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 53. *f.* 1. *an ſola ætate minore ab calomelam. diſtinctum ?*

furcatum. 39. A. dichotomum, pinnis pinnatis, pinnulis parallelis lanceolatis approximatis integerrimis. *Plum. fil. t.* 28. *polypodii potius ſpecies.*

††† *fronde bipinnata.*

cruciatum. 40. A. pinnis oppoſitis lanceolatis, infimis cruciatim appendiculatis. *Plum. fil. t.* 38.

barbatum. 41. A. pinnis oppoſitis, pinnulis lanceolatis obtuſis ſerratis ſeſſilibus alternis. *Pluckn. alm. t.* 181. *f.* 5.

filare. 42. A. pinnis alternis remotis, pinnulis erectis confluentibus linearibus apice filari dentatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 184.

calomelas. 43. A. pinnis alternis lanceolatis acuminatis pinnatifidis. *Plum. fil. t.* 40.

velleum. 44. A. pinnis ovatis cordatis latere inciſis ſubtus hirſutiſſimis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 457.

⊢⊢⊢⊢ *fronde ſupradecompoſita.*

aculeatum. 45. A filiolis bifidis, ſtipitibus aculeatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 61. *an potius Trichomanes ?*

1174. PTERIS. *Fructificationes* in lineam digeſtæ ſubtus cingentem frondis marginem.

* *frondibus ſimpliciſſimis.*

piloſelloides. 1. Pt. frondibus ſterilibus obovatis, fertilibus lanceolatis longioribus, ſurculis repentibus. *Banks ic. Kæmpf. t.* 31.

lanceolata. 2. Pt. frondibus lanceolatis ſubangulatis glabris, apice fructificante. *Plum. fil. t.* 132.

anguſtifolia. 3. Pt. frondibus lanceolato-linearibus integris erectis margine toto fructificantibus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 129.

lineata. 4. P. frondibus linearibus integerrimis longitudinaliter fructificantibus. *Plum. fil. t.* 143.

tricuſpidata. 5. Pt. frondibus linearibus apice trifidis. *Plum. fil. t.* 140.

furcata. 6. Pt. frondibus dichotomis ſubtus hiſpidis, apice fructificantibus. *Plum. fil. t.* 141.

** *frondibus compoſitis.*

⊢ *quaternata.*

quadrifoliata. 7. Pt. fronde ſubrotunda integerrima, ſurculis repentibus! *Pluckn. phyt.* 401. *f.* 5. *Linn. mant. p.* 202. Marſilea minuta.

⊢⊢ *frondibus pinnatis.*

grandifolia. 8. Pt. pinnis oppoſitis ovato-linearibus acuminatis integerrimis. *Plum. fil. t.* 106.

cretica. 9. Pt. pinnis oppoſitis lanceolatis ſerrulatis baſi anguſtatis, infimis ſubtripartitis. *Mant. p.* 130. *Tournef. inſt.* 1. *herb. t.* 321.

rotundifolia. 10. Pt. frondibus hiſpidis, pinnis ſubeppoſitis ſubrotundis obſolete crenatis. *flor. Forſt. auſtr. p.* 79.

lunulata. 11. Pt. pinnis alternis petiolatis lunulatis ſtriatis. *Retz. obſ. bot.* 2. *p.* 28. *t.* 4.

trichomanoides. 12. Pt. pinnis ſubovatis obtuſis repandis ſubtus hirſutis. *Plum. fil. t.* 75.

ſubciliata. 13. Pt. pinnis lanceolatis-ſerrulato-ciliatis, baſi ſupra latioribus. *Forsk flor. æg. arab. p.* 185.

nervoſa. 14. Pt. pinnis lanceolatis parallelo-nervoſis integris, infimis binatis. *Thunb. flor. jap. p.* 332.

ſtipularis. 15. Pt. pinnis linearibus ſeſſilibus, ſtipulis lanceolatis. *Plum. fil. t.* 70.

vittata. 16. Pt. pinnis linearibus rectis baſi rotundatis. *Osb. it. t.* 4.

longifolia. 17. Pt. pinnis linearibus repandis baſi cordatis. *Plum. fil. t.* 69.

††† *frondibus ſemibipinnatis.*

ſerrulata. 18. Pt. frondibus linearibus ſerrulatis. *Suppl. p.* 445. *Burm. zeyl. t.* 37. *f.* ext.

†††† *frondibus ſubbipinnatis.*

argula. 19. Pt. pinnis lanceolatis ſerratis, foliolis infimis bis bipartitis. *Pluckn. almag. p.* 153. *t.* 290. *f.* 2.

pedata. 20. Pt. frondibus quinquangulis trifoliatis, foliolis pinnatifidis, lateralibus bipartitis. *Plum. fil. t.* 152. β) *Pallas Comm. petrop.* 12. *t.* 12.

ſinuata. 21. Pt. frondibus bipinnatifidis, laciniis ſinubuſque rotundatis. *Thunb. flor. jap. p.* 332.

humilis. 22. Pt. pinnis oblongis inciſis ſubpinnatis, extimis obſolete crenatis confluentibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 79.

comans. 23. Pt. pinnis pinnatifidis, laciniis elongatis lanceolatis apice attenuatis ſerratis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 79.

arborea. 24. Pt. pinnis pinnatifidis, caudice arboreo aculeato.

biaurita. 25. Pt. pinnis pinnatifidis, infima bipartita. *Plum. fil. t.* 15.

denticulata. 26. Pt. pinnis inferioribus ſemipinnatis lanceolatis ſterilibus denticulato-ciliatis, fertilibus integerrimis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 29.

27. Pt.

ſemipin- 27. Pt. pinnis lateralibus loboque infimo ſemipinnatifidis.
nata. *Osb. it. t. 3. f. 1.*

mutilata. 28. Pt. pinnis pinnatis, infimis ſemipinnatifidis, terminalibus baſeoſque longiſſimis. *Plum. fil. t. 51.*

atro- 29. Pt. pinnis lanceolatis, infimis ſubpinnatis, terminalibus
purpurea. longioribus.

viridis. 30. Pt. pinnis ſuperioribus lanceolatis ſeſſilibus, inferioribus pinnatifidis pinnatiſque petiolatis. *Forsk. flor. æg. ar. p. 186.*

dentata. 31. Pt. pinnis ſeſſilibus remotis decurſive pinnatis, pinnulis oppoſitis linearibus crenato-dentatis. *Forsk. flor. æg. ar. p. 186.*

farinoſa. 32. Pt. pinnis ſeſſilibus oppoſitis, ſupremis concatenatis, inferioribus remotis, pinnulis connatis ſubtus farinoſo-tomentoſis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 187.*

† † † † † *frondibus quadripinnatis.*

quadri- 33. Pt. pinnulis baſi liberis, infimis bipinnatis. *Forsk. flor.*
pinnata. *æg. arab. p. 186.*

† † † † † † *frondibus ſupradecompoſitis.*

aculeata. 34. Pt. pinnis bipinnatifidis, laciniis lato-lanceolatis, caudice arboreo aculeato. *Plum. fil. t. 5.*

regularis. 35. Pt. pinnis ſeſſilibus, pinnulis connatis patentibus lineari-lanceolatis integris, infimis pinnatis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 186.*

decurſi- 36. Pt. pinnulis erecto-recurvis decurrentibus, infimis
va. decurſive pinnatis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 186.*

ſerrata. 37. Pt. pinnulis concatenatis lanceolatis ſerrulatis, infimis ſejunctis pinnatis. *Forsk. flor. æg. arab. p. 187.*

aquilina. 38. Pt. pinnis pinnatis, pinnulis lanceolatis, infimis pinnatifidis, ſuperioribus minoribus. *Blackw. herb. t. 325.*

caudata. 39. Pt. pinnis linearibus, infimis baſi pinnato-dentatis terminalibus longioribus. *Plum. fil. t. 29. β) Jacq. coll. 2. p. 273. pl. rar. ic. cent. 2. faſc. 1. t. 25.*

eſculen- 40. Pt. frondibus ſulcatis, foliolis pinnatis, pinnis linearibus
ta. decurrentibus, ſummis brevioribus. *Forſt. flor. auſt. p. 79.*

hetero- 41. Pt. pinnis ovato-oblongis ſerratis obtuſis, frondibus
phylla. fertilibus integerrimis. *Sloan. jam. 1. t. 53. f. 2.*

1175. BLECHNUM. *Fructificationes* in lineis 2 coſtæ frondis approximatis parallelis.

occidentale. 1. Bl. frondibus pinnatis, pinnis lanceolaris oppoſitis baſi emarginatis. *Pet. fil. t. 3. f. 9.*

auſtrale. 2. Bl. frondibus pinnatis, pinnis ſubſeſſilibus cordato-lanceolatis integerrimis, infimis oppoſitis. *Mant. p. 130.*

orientale. 3. Bl. frondibus pinnatis, pinnis linearibus alternis.

virginicum. 4. Bl. frondibus pinnatis, pinnis multifidis. *Mant. p. 307.*

japonicum. 5. Bl. fronde bipinnatifida, lacinulis ovatis obtuſis ferratis. *Suppl. p. 445. Thunb. flor. jap. p. 333. t. 35.*

radicans. 6. Bl. frondibus bipinnatis, pinnatis lanceolatis crenulatis lineolis fructificantibus interruptis. *Mant. p. 307. Pluckn. alm. t. 179. f. 2.* β) Blechnum caroliniauum. *Walt. flor. carol. p. 257.*

1176. HEMIONITIS. *Fructificationes* in lineis ramoſis vel decuſſatis.

lineata. 1. H. frondibus lanceolato-linearibus, fructificationibus ſubparallelis longitudinalibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p. 129.*

reticulata. 2. H. frondibus lanceolato-falcatis integerrimis, venis reticulatis. *Forſt. flor. auſtr. p. 79.*

lanceolata. 3. H. frondibus lanceolatis integerrimis. *Plum. fil. 127. f. 6.*

paraſitica. 4. H. frondibus ovatis acuminatis, furculis paleaceis repentibus.

palmata. 5. H. frondibus palmatis hirſutis. *Plum. fil. t. 151.*

japonica. 6. H. frondibus bipinnatis, pinnulis lanceolatis integris. *Thunb. flor. jap. p. 333.*

1177. LONCHITIS. *Fructificationes* in lineolis ſub frondis ſinubus.

hirſuta. 1. L. frondibus pinnatifidis obtuſis integerrimis, ſurculis ramoſis hirſutis. *Plum. fil. t. 20.*

pedata. 2. L. frondibus pedatis, foliolis pinnatifidis ſerrulatis. *Brown. jam. t. 1. f. 1. 2.*

repens. 3. L. frondibus pinnatis, pinnis alternis ſinuatis, ſurculis ramoſis aculeatis. *Plum. fil. t.* 12.

aurita. 4. L. frondibus pinnatis, pinnis infimis bipartitis, ſurculis indiviſis aculeatis. *Plum. fil. t.* 17.

bipinnata. 5. L. fronde bipinnata, pinnis alternis, pinnulis linearibus confluentibus interioribus emarginatis. *Forsk. flor. æg. ar. p.* 184.

tenuifolia. 6. L. arboreſcens, frondibus ſupradecompoſitis, foliolis pinnatis, pinnis lineari-oblongis ſerratis, infimis pinnatifidis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

1178. ASPLENIUM. *Fructificationes* in lineas rectas ſubparallelas in pagina inferiori frondis congeſtæ.

* *fronde ſimplici.*

† *indiviſa.*

rhizophyllum. 1. A. frondibus cordato-enſiformibus, apice filiformi radicante. *Pluckn. alm. t.* 105. *f.* 3.

Scolopendrium. 2. A. frondibus cordato-lingulatis integerrimis, ſtipitibus hirſutis. *Jungh. pl. off. ic. cent.* 1. *t.* 5.

anguſtifolium. 3. A. frondibus lineari-lanceolatis acutiuſculis integerrimis. *Jacq. Collect.* 1. *p.* 121.

Nidus. 4. A. frondibus lanceolatis integerrimis glabris. *Breyn. cent. t.* 99.

ſerratum. 5. A. frondibus lanceolatis ſerratis ſubſeſſilibus. *Plum. fil. t.* 124.

proliferum. 6. A. frondibus lato-lanceolatis ſubſeſſilibus, primoribus obovatis apice radicantibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 71. *t.* 26. *f.* 1.

plantagineum. 7. A. frondibus ovato-lanceolatis ſubcrenatis, ſtipite tetragono.

lanceum. 8. A. fronde elliptico-glabra, ſtipite tereti ſquamoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 333.

† † *fronde diviſa.*

Hemionitis. 9. A. frondibus cordato-haſtatis quinquelobis integerrimis, ſtipitibus lævibus.

Ceterach. 10. A. frondibus pinnatifidis, laciniis alternis confluentibus obtuſis. *Blackw. herb. t.* 216.

Ooo o 2

præmorſum. 11. A. frondibus tripinnatifidis, laciniis ſubcuneiformibus, lacinulis apice eroſo dentatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 130.

*** fronde compoſita.*

† ternata.

pumilum. 12. A. foliolis tripartito-inciſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 129.

†† fronde pinnata.

obtuſifolium. 13. A. frondibus ſubpinnatis, pinnis obtuſis ſinuatis decurrentibus alternis. *Pet. fil. t.* 2. *f.* 4.

bifolium. 14. A. pinnis lanceolatis ſubſinuatis connatis. *Plum. fil. t.* 133.

nodoſum. 15. A. pinnis lanceolatis integerrimis oppoſitis. *Plum. fil. t.* 108.

grandifolium. 16. A. pinnis lanceolatis ſubſerratis alternis baſi ſuperne rectangulis inferne rotundatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 130.

diſſectum. 17. A. pinnis lanceolatis inciſo-ſerratis apice caudatis. *Plum. fil.* 46.

ebeneum. 50. A. pinnis lanceolatis ſubfalcatis ſerratis baſi auriculatis, ſtipite læviſſimo ſimplici. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 462.

falcifolium. 18. A. pinnis falcato-lanceolatis crenatis baſi ſurſum angulatis. *Plum. fil. t.* 60.

cultrifolium. 19. A. pinnis falcato-lanceolatis inciſo-ſerratis baſi deorſum angulatis. *Plum. fil. t.* 59.

marginatum. 20. A. pinnis cordato-lanceolatis oppoſitis ſubmarginatis integerrimis. *Pet. fil. t.* 12. *f.* 2.

dentatum. 21. A. pinnis cuneiformibus obtuſis crenato-emarginatis. *Plum. fil. t.* 101.

alternifolium. 22. A. pinnis cuneiformibus alternis ſuperne inciſis. *Wulfen apud Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 51. *t.* 5. *f.* 2. *an diſtinctum a germanico ?*

monanthemum. 23. A. pinnis trapeziis obtuſis ſuperne crenatis, linea fructificationis unica. *Mant. p.* 130.

viride. 24. A. frondibus lanceolatis, pinnis trapezoideis crenatis. *Hudſon flor. angl.* 453. *Boldon filic. Brit.* 1. *p.* 24. *t.* 14.

polyodon. 25. A. pinnis trapezoidibus acuminatis acutis duplicato-ſerratis. *Forſt. flor. auſt. p.* 80.

eroſum. 26. A. pinnis trapezio-oblongis ſtriatis eroſis baſi erectis. *Sloan. jam.* 1. *t.* 33. *f.* 2.

dimidiatum. 27. A. pinnis trapezio-oblongis acuminatis furſum angulatis deorſum integris planis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 129.

tenerum. 28. A. pinnis rhombeo-oblongis obtuſis inciſo-ſerratis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

obtuſatum. 29. A. pinnis oblongis obtuſis ſerratis oppoſitis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

obliquum. 30. A. pinnis oblongis oppoſitis acuminatis ſerratis, margine exteriore breviore, ſtipite ſquamuloſo. *Forſt. fl. auſtr. p.* 80.

lanceolatum. 31. A. frondibus lanceolatis, pinnis oblongis acutis inciſis alternis. *Forsk. flor. ӕg. arab. p.* 185.

ſquamoſum. 32. A. pinnis acuminatis inciſis, ſtipite ſquamoſo. *Pet. fil. t.* 5. *f.* 2.

lucidum. 33. A. pinnis oblongo-ovatis acuminatis ſerratis oppoſitis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

rhizophorum. 34. A. frondibus apice radicantibus, pinnis ovatis repando-ſubauritis, minimis remotis integerrimis. *Pluckn. alm. t.* 253. *f.* 4.

marinum. 35. A. pinnis obovatis ſerratis ſuperne gibbis obtuſis baſi cuneatis. *Bolton fil. Brit.* 1. *t.* 15.

pygmeum. 36. A. pinnis ſubrotundis quinis ternisve. *Vix diſtincta ſpecies.*

trichomanoides. 37. A. pinnis ſubrotundis crenatis. *Flor. dan. t.* 119.

anthriſcifolium. 38. A. pinnis obtuſe lobato-ſerratis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 103. *t.* 2. *f.* 3. 4.

ſorbifolium. 39. A. pinnis longe lanceolatis acuminatis crenatis. *Jacq. coll.* 2. *p.* 106. *t.* 3. *f.* 2.

✝✝✝ *fronde ſubbipinnata.*

japonicum. 40. A. pinnis acutis inciſo-pinnatifidis ſerrulatis ſtipite ſquamoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 334.

ſtriatum. 41. A. pinnis pinnatifidis obtuſis crenatis, terminali acuminata. *Pet. fil. t.* 3. *f.* 3. 4.

flaccidum. 42. A. pinnis alternis remotis pinnatifidis, laciniis linearibus ſtriatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

caudatum. 43. A. pinnis pinnatifidis linearibus apice ſetaceis, laciniis obtuſis apice inciſo-ſerratis, ſtipite hirto. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

bulbiferum. 44. A. pinnis pinnatifidis decurrentibus oblongis obtuſis, fructificationibus proliferis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 80.

germanicum. 45. A. pinnis imis trifoliatis, ſuperioribus ſimplicibus dentatis. *Hall. hiſt. ſtirp. helv.* 3. *p.* 8. *Breyn. cent. p.* 189. *f.* 97.

Trichomanes ramoſum. 46. A. pinnis pinnatis, inferioribus minoribus, pinnulis obovatis crenatis.

fragrans. 47. A. pinnis pinnatis alternis, pinnulis lanceolatis latiuſculis apice ſerratis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 130.

leptophyllum. 51. A. frondibus bipinnatis tripinnatifidiſque, pinnis remotis, lobis cuneiformibus inciſis, fructificationibus ſolitariis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 694. *n.* 53. Polypodium leptophyllum. *Magnol. hort. monſp. t.* 5.

⊢ ⊢ ⊢ ⊢ *frondibus alternatim decompoſitis.*

Ruta muraria. 48. A. foliolis cuneiformibus crenulatis. *Flor. dan. t.* 190.

⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ *fronde ſubtripinnata.*

Adiantum nigrum. 49. A pinnis alternis, pinnulis lanceolatis inciſo-ſerratis. *Flor. dan. t.* 250.

cicutarium. 50. A. fronde glaberrima, pinnulis ſuperioribus pinnatifidis, laciniis lanceolatis integris. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 92. *t.* 52. *f.* 3.

1179. POLYPODIUM. *Fructificationes* per inferiorem frondis partem in globulos diſpoſitæ.

* *fronde ſimplici.*

⊢ *indiviſa.*

minimum. 1. P. ſcandens, foliis ſubrotundis craſſis acutis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 74. *t.* 28. *f.* 3.

rigidum. 2. P. frondibus integerrimis glabris acutis. *Plum. fil. t.* 135.

gramineum. 3. P. frondibus acuminatis integerrimis glabris, fructificationibus ſolitariis, ſurculo nudo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 130.

lanceolatum. 4. P. frondibus lanceolatis integerrimis glabris, fructificationibus ſolitariis, ſurculis nudis. *Pet. fil. t.* 6. *f.* 2.

lycopodioides. 5. P. frondibus lanceolatis integerrimis glabris, fructificationibus ſolitariis, ſurculo ſquamoſo repente. *Plum. fil. t.* 119.

comoſum. 6. P. frondibus lanceolatis glabris integerrimis apice multifidis, fructificationibus ſparſis. *Plum. fil. t.* 131.

craſſifolium. 7. P. frondibus lanceolatis glabris integerrimis, fructificationibus ſerialibus. *Pet. fil.* 1. *t.* 8.

phyllitidis 8. P. frondibus lanceolatis glabris integerrimis, fructificationibus ſparſis. *Pet. pter. t. 6. f.* 10.

repens. 9. P. frondibus lanceolatis acuminatis glabris, fructificationibus ſparſis, ſurculo repente. *Plum. fil. t.* 134.

trifurcatum. 10. P. frondibus lanceolatis glabris repando-ſinuatis apice trilobis. *Plum. fil. t.* 138.

plantagineum. 11. P. frondibus lanceolato-oblongis glabris integerrimis, fructificationibus ſerialibus. *Jacq. coll.* 2. *p.* 104. *t.* 3. *f.* 1.

heterophyllum. 12. P. frondibus crenatis glabris, ſterilibus ſubrotundis ſeſſilibus, fertilibus lanceolatis, fructificationibus ſolitariis. *Plum. fil. t.* 120.

piloſelloides. 13. P. frondibus integerrimis hirtis, ſterilibus ovatis, fertilibus lanceolatis, fructificationibus ſolitariis. *Plum. fil. t.* 118.

lineare. 14. P. frondibus lineari-lanceolatis glabris, fructificationibus ſolitariis. *Thunb. flor. jap. p.* 335.

anguſtifolium. 15. P. frondibus lineari-lanceolatis longiſſimis acuminatis rigidis, margine convexo, fructificationibus ſparſis, ſurculo repente. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 130.

ſerpens. 16. P. frondibus lanceolato-linearibus ſubundulatis glabris, fructificationibus ſolitariis, ſurculo hirſuto radicante. *Plum. fil. t.* 124.

marginellum. 17. P. frondibus cuneiformi-linearibus obtuſis marginatis glabris, fructificationibus ſolitariis confertis, ſurculo breviſſimo nudo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 130.

acroſtichoides. 18. P. frondibus linearibus glabris, fructificationibus confertis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 81.

ſtoloniferum. 19. P. frondibus linearibus obtuſis pubeſcentibus, fructificationibus ſerialibus, ſtolonibus repentibus. *Forſt. flor. auſt. p.* 81.

ſurinamenſe. 143. P. fronde lineari remote ſerrulata glabra, fructificationibus ſolitariis. *Jacq. collect.* 3. *p.* 285. *t.* 21. *f.* 4.

† † *fronde diviſa.*

† *lobata.*

Pica. 20. P. fronde cordata triloba, lobis lanceolatis ſubulatis baſi auriculatis, intermedio elongato. *Suppl. p.* 446.

phymatodus. 21. P. frondibus trifidis quinquelobiſve lanceolatis ſupra fructificationes verucoſis. *Mant. p.* 306. *Burm. zeyl t.* 86.

haſtatum. 22. P. fronde trifido-haſtata. *Thunb. flor. jap. p.* 335.

† † *frondibus pinnatifidis, laciniis ſæpe coadunatis.*

ſcandens. 23. P. frondibus lævibus, laciniis linearibus obtuſis undulatis diſtantibus, ſtolonibus radicantibus ſcandentibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 81.

puſtulatum. 24. P. frondibus lævibus, laciniis oblongis integris acuminatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 81.

aureum. 25. P. frondibus lævibus, laciniis oblongis diſtantibus infimis patulis, terminali maxima, fructificationibus ſerialibus. *Plum. fil. t.* 76.

ellipticum. 26. P. frondibus lævibus, laciniis ellipticis integris, ſurculo repente. *Thunb. flor. jap. p.* 335.

loriceum. 27. P. frondibus lævibus, laciniis lanceolatis diſtantibus horizontalibus repandis. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 10. 12.

alatum. 28. P. frondibus lævibus, laciniis oblongis diſtantibus dentatis. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 13.

ſquamatum. 29. P. frondibus ſcabris, laciniis lanceolatis diſtantibus horizontalibus integerrimis. *Plum. fil. t.* 79.

aſplenifolium. 30. P. frondibus piloſis, laciniis ſemiovatis acutis. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 16. *β*) *Plum. fil. t.* 88.

trichomanoides. 31. P. frondibus ſubpiloſis, laciniis ſemiovatis obtuſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 131.

ſuſpenſum. 32. P. frondibus glabris, laciniis ſemiovatis acutis. *Plum. fil. t.* 87.

criſpatum. 33. P. frondibus glabris, laciniis ſemiorbiculatis crenatis. *Pet. fil. t.* 13. *f.* 12.

myoſuroides. 34. P. frondibus glabris, laciniis in apice lanceolatis coadunatis, fructificationibus inferioribus remotis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 131.

pendulum. 35. P. frondibus ſubſeſſilibus glabris pendulis, laciniis oblongis obtuſiuſculis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 131.

incifum. 36. P. frondibus lanceolatis, laciniis rotundatis, infimis minoribus coadunatis. *Plum. fil. t.* 91.

ſcolopendroides. 37. P. frondibus lanceolatis, laciniis obtuſiuſculis, infimis remotis. *Pet. fil.* 2. *t.* 1.

pectinatum. 38. P. frondibus lanceolatis, laciniis approximatis enſiformibus parallelis acutis horizontalibus, radice nuda. *Pet. fil. t.* 7. *f.* 14.

taxifolium. 39. P. laciniis approximatis enſiformibus parallelis acutis aſcendentibus, radice hirta. *Plum. fil. t.* 89.

ſtruthionis. 40. P. laciniis approximatis enſiformibus repandis horizontalibus. *Plum. fil. t.* 82.

Otiter. 41. P. laciniis lanceolatis obtuſis alternis diſtantibus. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 16.

virginianum. 42. P. laciniis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice lævi. *Plum. fil. t.* 77.

vulgare. 43. P. laciniis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata. *Zorn. pl. off. ic.* 1. *t.* 46.

quercifolium. 44. P. frondibus ſterilibus ſeſſilibus brevioribus obtuſis ſinuatis, fertilibus alterno-pinnatis lanceolatis. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 11.

††† *frondibus bipinnatifidis.*

cambricum. 45. P. laciniis lanceolatis lacero-pinnatifidis ſerratis. *Pluckn. alm. t.* 30. *f.* 1.

obliteratum. 46. P. lacinulis alternis lato-lanceolatis attenuatis crenatis, crenis apice & baſi utrinque obliteratis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 132.

Serra. 47. P. laciniis linearibus longiſſimis attenuatis ſerratis, ſerraturis ſemiovatis acutis ſtriatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 132.

tetragonum. 48. P. laciniis lanceolatis acuminatis oppoſitis diſtantibus horizontalibus, lacinulis ovatis obtuſiuſculis, ſtipite tetragono. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 132.

deltoideum. 49. P. laciniis inferioribus abbreviatis integris oblongis deltoideis reflexis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 133.

inviſum. 50. P. fronde glabra, laciniis lineari-lanceolatis acuminatis longiſſimis, lacinulis ovato-falcatis acutis integris, infimis æqualibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 90. *t.* 51.

patens. 51. P. fronde ſubtus villoſiuſcula, laciniis lineari-lanceolatis elongatis, lacinulis oblongis acutis integris, infimis longioribus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 91. *t.* 52. *f.* 1.

†††† *fronde tripinnatifida.*

hirtum. 52. P. fronde inferne tripinnatifida, ſuperne bipinnatifida & tandem pinnatifida, laciniis ovatis obtuſis ſubintegris, ſtipite ramiſque hirtis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 133.

punctatum. 53. P. lacinulis lanceolatis obtuſis pinnatifidis, ſtipite villoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 337.

coriaceum. 54. P. fronde coriacea inferne tripinnatifida, ſuperne bipinnata, pinnis pinnuliſque acuminatis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 133.

††††† *fronde quadripinnatifida.*

diſſectum. 55. P. fronde glabriuſcula, lacinulis ovatis obtuſis inciſo-ſerratis, fructificationibus in ſinu ſolitariis, ramis ramuliſque pubeſcentibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 96. *t.* 37. *f.* 1. 2.

æmulum. 149. P. fronde glabra, pinnis oblongo-linearibus inciſis, pinnulis apice denticulatis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 466.

†††††† *fronde quinquepinnatifida.*

effuſum. 56. P. fronde ſubglabra membranacea, lacinulis acutis argute ſerratis, rachi ramuliſque marginatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 57. *f.* 3.

** *fronde compoſita.*

† *ternata.*

trifoliatum. 57. P. frondibus ſinuato-lobatis, foliolo intermedio majore. *Plum. fil. t.* 148.

cicutarium. 58. P. foliolis bipinnatis baſi laciniatis obtuſe inciſo-ſerratis acuminatis, infimis gibboſioribus.

triphyllum. 144. P. frondibus pinnatis, pinnis tribus alternis linearibus. *Jacq. coll.* 3. *p.* 284. *t.* 22. *f.* 1.

†† *frondibus pinnatis.*

dentatum. 59. P. fronde dentata ſuperne pinnatifida, pinnis crenatis, infimis deflexis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 185.

fontanum. 60. P. frondibus lanceolatis, pinnis ſubrotundis argute inciſis, ſtipite lævi. *Bolton fil. Brit.* 1. *t.* 21.

Lonchitis. 61. P. pinnis lunulatis ciliato-ſerratis declinatis, ſtipitibus ſtrigoſis. *Flor. dan. t.* 497.

rhizophyllum. 62. P. frondibus decumbentibus apice caudatis, fertilibus radicantibus, pinnis ovato-deltoideis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 132.

reptans. 63. P. frondibus repentibus apice radicantibus, pinnis ſubcordatis ovatis obtuſis crenatis baſi ſubauriculatis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 30. *f.* 1.

cordifolium. 64. P. pinnis cordatis obtuſis integerrimis repandis. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 11.

falcatum. 65. P. pinnis cordatis falcatis acuminatis integris, fructificationibus approximatis ſparſis. *Suppl. p.* 446. *Thunb. flor. jap. p.* 336. *t.* 35.

echinatum. 66. P. pinnis falcato-lanceolatis ſubſerratis ſurſum auritis baſi & anterius ſpinoſis, ſtipite ſquamoſo. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 82. *t.* 36. *f.* 4. 5.

auriculatum. 67. P. pinnis falcato-lanceolatis ſerratis baſi truncatis ſurſum auritis. *Burm. zeyl. t.* 44. *f.* 2.

crenatum. 68. P. pinnis oblongo-lanceolatis crenatis glabris, fructificationibus biſeriatis. *Plum. fil. t.* 3.

ſimile. 69. P. pinnis lanceolatis integerrimis diſtantibus, ſupremis minoribus, punctis ſerialibus. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 32.

diſſimile. 70. P. pinnis lanceolatis ſubpubeſcentibus confluentibus, inferioribus diſtinctis, punctis ſparſis. *Pluckn. almag. t.* 288. *f.* 1.

ſemicordatum. 71. P. pinnis lanceolatis parallelis glaberrimis baſi oblique cordatis, lobo inferiore gibboſiore, fructificationibus quadri-ſeriatis. *Plum. fil. t.* 113.

ſagittatum. 72. P. pinnis lanceolatis obtuſis integris baſi utrinque denticulo acutis, inferioribus mutilatis triangularibus minutis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 132.

triangulare. 73. P. pinnis triangularibus dentatis. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 10.

exaltatum. 74. P. pinnis enſiformibus integris, baſi inferiore introrſum, ſuperiore ſurſum gibbis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 31.

unitum. 75. P. pinnis enſiformibus ſerratis, ſerraturis ſemiovatis ovato-nervoſis. *Burm. zeyl. t.* 44. *f.* 1.

marginale. 76. P. pinnis ſuperioribus coalitis, inferioribus enſiformibus ſurſum auriculatis inciſis ſtipite villoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 337.

eveſtum. 77. P. pinnis oppoſitis oblongis apice lineari acuminatis ſerratis, fructificationum ſerie ſubmarginali continua. *Forſt. flor. auſtr. p.* 81.

hirſutulum. 78. P. pinnis oblongis obtuſe ſerratis baſi ſurſum auriculatis, ſtipite villoſo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 81.

reticulatum. 79. P. pinnis oblongis integerrimis, anaſtomoſibus rectangulis, punctis rectangulis approximatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 81. *Plum. fil. t.* 92.

tenellum. 80. P. pinnis alternis remotis linearibus acuminatis undulatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 81.

molliſſimum. 147. P. pinnis pinnatifidis linearibus acuminatis utrinque villoſis. *Jacq. collect.* 3. *p.* 188.

gujanenſe. 81. P. pinnis latis crenatis ſuboppoſitis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 86. *t.* 43. *f.* 1. 2.

adiantoides. 82. P. pinnis auriculatis. *Plum. fil. f.* 7. *an diſtincta ſpecies ?*

ſerratum. 83. P. pinnis alternis ſerratis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 78. *t.* 33. *f.* 1.

Hippocrepis. 145. P. pinnis oblongis acuminatis obtuſe inciſis ſupra piloſis ſubtus glabris. *Jacq. coll.* 3. *p.* 186.

fraxinifolium. 146. P. pinnis lanceolatis acuminatis undulatis tranſverſim lineatis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 187.

⊢ ⊢ ⊢ *frondibus ſubbipinnatis.*

Phegopteris. 84. P. pinnis oppoſitis, ſuperioribus pinnula trapezoide conjunctis infimo pari deflexo, pinnulis obtuſis glomerulis capſularum dimidiam marginis partem occupantibus. *Bolton fil. Brit.* 1. *t.* 20.

montanum. 85. P. pinnis alternis, pinnulis integerrimis lanceolatis obtuſiuſculis, glomerulis marginalibus. *Wilden. prodr. flor. berol. n.* 883.

retroflexum. 86. P. pinnis infimis reflexis, pinnulis laceris. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 9.

fragrans. 87. P. frondibus lanceolatis, pinnis confertis, laciniis obtuſis ſerratis, ſtipite paleaceo.

paraſiticum. 88. P. frondibus lanceolatis, pinnis ad medium pinnatifidis, laciniis rotundatis integerrimis ſtriatis. *Rheed. h. malab.* 12. *t.* 17.

molle. 89. P. pinnulis lanceolatis obtuſiuſculis apice crenulatis. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 70.

Callip-teris. 90. P. pinnis ovato-oblongis profunde pinnatifidis, laciniis ovatis duplicato-ſerratis, ſerraturis mucronulatis. *Ehrh. Hannöv. Mag.* 1784. 9. *an vere diſtinctum a criſtato?*

criſta-tum. 91. P. pinnulis oblongis obtuſis ſerratis, ſerraturis ciliatis, glomerulis capſularum duplici ſerie diſpoſitis. *Ad Afzelius n. act. Stockh.* 1787. *t.* 9. *f.* 1. 2. *Bolton fil. Brid.* 1. *t.* 23.

Thelyp-teris. 92. P. pinnis pinnatifidis integerrimis ſubtus undique glomerulis capſularum tectis. *Mant. p.* 505. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 687. Acroſtichum Thelypteris. *Flor. dan. t.* 760.

nympha-le. 93. P. frondibus pubeſcentibus, pinnis linearibus acuminatiſſimis ſerratis baſi pinnatifidis, laciniis oblongis obtuſis vix antrorſum falcatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 81.

lacinia-tum. 94. P. pinnis pinnatifidis, laciniis oblongis obtuſe ſerratis, inferioribus longioribus vix coalitis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 81.

exoſum. 95. P. frondibus glabris, pinnis linearibus acuminatiſſimis ſerrato-pinnatis, pinnulis lanceolatis falcato-acutis baſi connatis. *Forſt. flor. auſt. p.* 81.

pennige-rum. 96. P. frondibus glabris, pinnis linearibus acuminatiſſimis ſubpinnatis, pinnulis ovato-oblongis obtuſis connatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 82.

veſtitum. 97. P. pinnis rhombeo-ovatis acutis inciſo-ſerratis, infimis lobatis ſubpinnatis, ſtipite ſquamis ſcarioſis veſtito. *Forſt. flor. auſtr. p.* 82.

ſetoſum. 98. P. pinnis ſubpinnatis, pinnulis linearibus inciſo ſerratis, ſerraturis ſetaceis, ſtipite villoſo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 82.

adianti-forme. 99. P. pinnis ovatis profunde inciſis, laciniis ovatis obtuſis crenato-ſerratis, infimis diſcretis, ſtipite ſquamuloſo aſpero. *Forſt. flor. auſtr. p.* 82.

latifo-lium. 100. P. pinnis ovatis acuminatis pinnatifidis lobatiſque, lobis repandis crenatis, ſtipite glaberrimo nitido. *Forſt. flor. auſtr. p.* 83.

varium. 101. P. frondibus lateralibus bipinnatis, pinna infima pinnatifida.

††††*frondibus bipinnatis.*

ariſta-tum. 102. P. pinnis inferioribus pinnatis, pinnulis rhombeo-oblongis inciſis, laciniis mucronato-ſerratis, ſtipite villoſiuſculo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 82.

fragile. 103. P. pinnis remotis, pinnulis ſubrotundis inciſis. *Flor. dan. t.* 401.

villoſum. 104. P. frondibus hirſutis, pinnulis obtuſis oblongis, terminalibus acuminatis. *Plum. fil. t.* 27.

decuſſatum. 105. P. pinnulis obtuſis horizontalibus integerrimis, terminalibus lanceolatis. *Pet. fil. t.* 2. *f.* 5. 6.

Filix mas. 106. P. pinnulis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo. *Blackw. herb. t.* 323.

Filix femina. 107. P. pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. *Blackw. herb. t.* 325.

Barometis. 108. P. pinnulis lanceolatis pinnatifidis ſerratis, radicibus lanatis.

rhæticum. 109. P. pinnis pinnuliſque lanceolatis remotis, ſerraturis acuminatis.

ſetigerum. 100. P. pinnulis lanceolatis inciſis integris, ſtipite ſetoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 337.

orientale. 111. P. pinnulis lanceolatis connexis integris patentibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 185.

pubeſcens. 112. P. frondibus piloſis, pinnulis lanceolato-ovatis ſubinciſis acutis, extimis confluentibus.

muricatum. 113. P. pinnulis ovatis denticulato-ſpinoſis. *Pet. fil. t.* 1. *f.* 6.

ſetiferum. 114. P. pinnulis reniformibus, dentibus ſetiferis, ſtipite lanato. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 185.

nudum. 115. P. pinnulis rhombeis inciſo-crenatis, ſtipite ſcabro nudo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 82.

aculeatum. 116. P. pinnulis lunulatis ciliato-dentatis, ſtipite ſtrigoſo. *Mill. illuſtr. ic. Bolton. fil. Brit.* 1. *t.* 26.

noveboracenſe. 117. P. pinnulis oblongis integerrimis parallelis, ſtipite lævi.

bulbiferum. 118. P. pinnis remotis, pinnulis oblongis obtuſis ſerratis ſubtus bulbiferis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 3. *f.* 10.

medullæ. 119. P. pinnis acuminatiſſimis, pinnulis oblongis ſubfalcatis acutis crenatis, ſtipite aſpero, caudice arboreo hiſpido. *Forſt. flor. auſtr. p.* 82.

extenſum. 120. P. pinnis acuminatis apice ſerratis, pinnulis oblongis ſerratis, ſtipite punctis aſpero, caudice arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 83.

arboreum. 121. P. frondibus ſerratis, caudice arboreo inermi. *Plum. fil. t.* 1.

ſpinoſum. 122. P. frondibus ſerratis, caudice arboreo aculeato. *Plum. fil. t.* 3. *nonne potius pteridis ſpecies?*

dealbatum. 123. P. pinnis acuminatis ſubtus albis, pinnulis oblongis ſubfalcatis ſerratis, ſtipite aſpero, caudice arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 83.

lacerum. 124. P. pinnulis ſeſſilibus, extimis confluentibus falcatis ſerratis, ſtipite ſquamoſo. *Thunb. flor. jap. p.* 337.

lunulatum. 125. P. pinnis apice ſerratis ſetaceis, pinnulis lineari-oblongis falcatis apice ſerrulatis, ſtipite aſpero. *Forſt. flor. auſtr. p.* 83.

elongatum. 150. P. pinnis glabris obtuſis argute ſeratis, ſuperioribus ovatis, mediis oblongis, inferioribus lanceolatis pinnatiſidis acutiuſculis. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 465.

affine. 126. P. pinnis acuminatis, pinnulis lineari-oblongis crenatis, ſtipite glabro. *Forſt. flor. auſtr. p.* 83.

dichotomum. 127. P. frondibus dichotomis, pinnulis linearibus integris parallelis. *Thunb. flor. jap. p.* 338. *t.* 37.

glaucum. 128. P. fronde bipartita ſubtus glauca, pinnulis inciſis integris. *Thunb. flor. jap. p.* 338.

regium. 129. P. pinnis ſuboppoſitis, pinnulis alternis laciniatis. *Vaill. flor. pariſ. t.* 9. *f.* 1.

marginatum. 130. P. pinnulis baſi ſinuato-repandis, fructificationibus marginalibus.

†††††*fronde ſupradecompoſita.*

ſpeluncæ. 131. P. frondibus piloſis, foliolis lanceolatis pinnatis pinnis oppoſitis pinnatiſidis. *Pluckn. alm. t.* 244. *f.* 2.

crenulatum. 132. P. foliolis alternis bipinnatis, pinnulis pinnatiſidis crenatis ciliatis. *Forsk flor. æg. arab. p.* 185.

Dryopteris. 133. P. foliolis ternis bipinnatis. *Flor. dan. t.* 759.

capenſe. 134. P. foliolis bipinnatis, pinnulis baſi unifloris. *Suppl. p.* 445.

pyramidale. 135. P. pinnulis terminalibus lanceolatis longiſſimis ſerratis, ſtipite inferne aculeato. *Pet. fil. t.* 4. *f.* 2.

alpinum. 136. P. frondibus alterne tripinnatis, pinnulis oblongis vage inciſis, laciniis obtuſis ſubbifidis. *Wulf. uſſ. Jacq. coll.* 2. *p.* 171. *Seg. pl. ver. ſuppl. t.* 1. *f.* 3.

multifidum. 148. P. fronde tripinnata glabra triangulari, pinnulis oblongis pinnatifide inciſis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 187.

axillare. 151. P. fronde tripinnata glabra, pinnis oblongis apice ſerratis adnatis paucifloris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 466.

umbroſum. 152. P. fronde tripinnata glabra, pinnis lanceolato-linearibus ſerratis adnatis multifloris. *Ait. hort. Kew.* 3. *p.* 466.

horridum. 137. P. pinnulis ſemiſagittatis baſi connexis apice ſerratis, caudice aculeato. *Pet. fil. t.* 5. *f.* 1.

aſperum. 138. P. pinnulis obtuſis apice ſerratis, terminalibus acuminatis, caudice arboreo aculeato. *Pet. fil. t.* 4. *f.* 7.

montium. 139. P. fronde triangulari, pinnulis pinnatifidis, ſegmentis ultimis oblongis obtuſis bifidis trifidiſque. *Pluckn. alm. t.* 89. *f.* 4.

┼┼┼┼┼┼ *frondibus quadripinnatis.*

denticulatum. 140. P. fronde glabra inferne quadripinnata ſuperne tripinnata, pinnulis cuneato-ovatis inciſis denticulatis, fructificationibus ſolitariis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 134.

quadripinatum. 141. P. pinnulis lanceolatis pinnatifidis, laciniis ovatis acutis ſubtus glaucis, ramis ramuliſque aſperis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 134.

armatum. 142. P. pinnulis lanceolatis crenulatis ſupra glabris ſubtus hirſutis, fructificationibus confertis, ramis ramuliſque aſperis, caudice arboreo aculeato. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 134.

DICKSONIA. *Fructificationes* ſubrotundæ, margine averſo frondis ſubjectæ.

arboreſcens. 1. D. frondibus ſupradecompoſitis villoſis, foliolis ſubintegris. *Herit. ſert. angl. p.* 31. *t.* 43.

Culcita. 2. D. frondibus ſupradecompoſitis glabris, foliolis ſerratis. *Herit. ſert. angl. p.* 31. *an eadem cum Polypodio Barometis?*

1180. ADIANTUM. *Fructificationes* in maculis ovalibus terminalibus ſub replicato frondis margine.

* *fronde ſimplici.*

reniforme. 1. A. frondibus reniformibus ſtipitatis multifloris. *Pluckn. alm. t.* 287. *f.* 5.

2. A.

ſagittatum. 2. A. frondibus ſagittatis ſtipitatis. *Aubl. pl. jug. 2. p. 964. t. 366.*

philippenſe. 3. A. frondibus reniformibus alternis petiolatis lobatis multifloris. *Pet. gaz. t. 4. f. 4.*

repens. 4. A. frondibus trapeziformibus cordatis pinnatifidis, laciniis lanceolatis apice ſerratis floriferis, infimis inciſis. *Suppl. p. 446.*

decurrens. 5. A. fronde bipinnatifida. *Jacq. coll. 2. p. 103. t. 2. f. 1. 2.*

** *fronde compoſita.*

trilobum. 6. A. pinnis tripartitis obtuſis inciſis multifloris. *Pet. fil. t. 11. f. 9.*

radiatum. 7. A. fronde digitata, foliolis pinnatis pinnis unifloris. *Plum. fil. t. 100.*

pedatum. 8. A. frondibus pedatis, foliolis pinnatis, pinnis anterius gibbis inciſis fructificantibus. *Pluckn. alm. t. 124. f. 2.*

fuſcum. 9. A. frondibus pedatis, foliolis pinnatis, pinnis rhombeo-rotundatis ſubquadrifloris. *Retz. obſ. bot. 2. p. 28. t. 5.*

caudatum. 10. A. frondibus pinnatis falcatis apice caudatis. *Mant. p. 308. Burm. zeyl. t. 5. f. 1.*

ſerrulatum. 11. A. frondibus bipinnatis, pinnulis deltoideo-oblongis ſerratis, fructificationibus ſolitariis ſuperioribus. *Pluckn. phyt. t. 253. f. 1.*

haſtatum. 12. A. frondibus pinnatis, pinnis haſtato-trilobis rectis. *Suppl. p. 447.*

Lancea. 13. A. frondibus pinnatis, pinnis oppoſitis oblongis, terminalibus triangulari-haſtatis. *Seb. muſ. 2. t. 64. f. 7. 8.*

macrophyllum. 14. A. frondibus pinnatis, pinnis oppoſitis rhomboideis acutis, ima majora, infima ſubhaſtata reflexa, fructificationibus anterius & inferius reflexis. *Brown. jam. p. 87. t. 38. f. 1.*

deltoideum. 15. A. frondibus pinnatis, pinnis alternis deltoideis obtuſis, ſumma triangulari, fructificationibus ſuperne & anterius continuatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p. 134.*

pumilum. 16. A. fronde pinnata, pinnis alternis ſubrotundis ſerrulatis, ſumma majuſcula trapezoide, fructificationibus interruptis, ſtipite capillari. *Pluckn. alm. t. 251. f. 4.*

cuneatum. 17. A. frondibus pinnatis, pinnis oppoſitis ſubpinnatis, pinnulis cuneiformibus retuſis alternis. *Forſt. flor. auſtr. p. 84.*

Ppp p

*** *fronde decompoſita.*

denticula-tum. 18. A. foliolis alternis trapezoideis acuminatis crenatis, ſterilis denticulatis, fructificationibus ſuperioribus interruptis. *Pet. fil. t.* 52.

flabellula-tum. 19. A. foliolis alternis rhombeis rotundatis multifloris, ſtipitibus ſupra pubeſcentibus. *Pluckn. alm. t.* 4. *f.* 3.

trifolia-tum. 20. A. foliolis alternis ternatis linearibus unifloris. *Pet. fil. t.* 11. *f.* 4.

Capillus Veneris. 21. A. foliolis alternis, ſecundariis cuneiformibus lobatis pedicellatis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 7.

chuſanum. 22. A. foliolis alternis pinnatifidis, laciniis inæqualibus.

trunca-tum. 23. A. foliolis pinnatis, pinnis alternis cuneatis ſubfalcatis truncatis integerrimis. *Burm. ind. t.* 66. *f.* 4.

gujanen-ſe. 24. A. fronde bipinnata, pinnis oppoſitis, pinnulis reniformibus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 963. *t.* 365.

criſtatum. 25. A. frondibus bipinnatis, pinnis infimis bipartitis, pinnulis lunatis ſuperne multifloris.

furcatum. 26. A. fronde bipinnata, pinnulis ſæpius bipartitis linearibus, pinea fructificationis unica. *Suppl. p.* 447. *Pluckn. mant. t.* 350. *f.* 4.

ſtrictum. 27. A. fronde bipinnata, pinnis tetragonis faſtigiatis erectis, pinnulis alternis lunatis integris, fructificationibus ſuperius continuatis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 135. *Plum. fil. t.* 97.

ſerratum. 28. A. fronde bipinnata, pinnulis deltoideo-oblongis ſerratis, fructificationibus ſolitariis ſuperioribus. *Pluck. alm. t.* 253. *f.* 1.

villoſum. 29. A. frondibus bipinnatis, pinnulis rhombeis anterius exteriuſque fructificantibus, ſtipite villoſo. *Mant. p.* 505. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *t.* 55. *f.* 1.

pulveru-lentum. 30. A. frondibus bipinnatis, pinnullis ovalibus anterius truncatis unifloris, ſtipite hirto. *Plum. fil. t.* 55.

caffrorum. 31. A. frondibus bipinnatis, pinnulis ovatis inciſo-denticulatis ſubtus paleaceis. *Suppl. p.* 447. *Mant. p.* 307. Polypodium caffrorum.

fragrans. 32. A. frondibus bipinnatis, pinnulis ovatis ſublobatis obtuſis ſubtus nudis. *Suppl. p.* 447. *Mant. p.* 307. Polypodium fragrans.

ſtriatum. 33. A frondibus bipinnatis, pinnulis rigidis falcato-ovatis ſtriatis, fructificationibus ſuperne interruptis, ſtipite tereti aſpero. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 135.

microphyllum. 34. A. fronde bipinnata, pinnulis alternis oblongis obtuſis curvatis inferius pinnatifidis. *Sloan. hiſt. jam.* 1. *p.* 98. *t.* 13. *f.* 2.

borbonicum. 43. A. fronde bipinnata glabra, pinnulis oblongis, infima ſuperne bipartita, reliquis integerrimis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 286. *t.* 21. *f.* 1.

tenellum. 44. A. frondibus bipinnatis, pinnulis lobatis, lobis oblongis. *Jacq. coll.* 3. *p.* 287. *t.* 21. *f.* 3.

**** *fronde ſupradecompoſita.*

fragile. 35. A. fronde ſupradecompoſita ſuperne bipinnata, pinnulis obovatis cuneatis integris, fructificationibus interruptis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 135.

tenerum. 36. A. foliolis ſecundariis alternis rhombeo-cuneiformibus obtuſis inciſis, fructificationibus interruptis. *Pluckn. phyt. t.* 254. *f.* 1.

clavatum. 37. A. foliolis alternis, ſecundariis cuneiformibus integerrimis, alternis unifloris. *Plum. fil. t.* 101. *f.* B.

trapeziforme. 38. A. foliolis alternis, ſecundariis rhombeis inciſis utrinque fructificantibus.

aculeatum. 39. A. foliolis ſecundariis palmatis multifloris, ſtipite aculeato. *Plum. fil. t.* 94.

hexagonum. 40. A. foliolis ſecundariis ſexangularibus emarginatis integerrimis utrinque unifloris. *Pet. fil. t.* 10. *f.* 2. *anne idem cum pteride heterophylla ?*

pteroides. 41. A. foliolis ſecundariis ovatis integris crenulatis, ſtipite lævi. *Mant. p.* 130.

æthiopicum. 42. A. foliolis ſecundariis rotundatis integris crenulatis, petiolatis capillaribus. *Pluckn. alm. t.* 253. *f.* 2.

1181. TRICHOMANES. *Fructificationes* ſolitariæ, turbinatæ, ſtilo ſetaceo terminatæ, margini frondis ipſi inſertæ.

* *fronde ſimplici.*

r *indiviſa.*

reniforme. 1. Tr. frondibus reniformibus ſtipitatis multifloris, capſulis exſertis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

puſillum. 2. Tr. frondibus linearibus inciſis, ſurculo repente. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

membranaceum. 3. Tr. frondibus oblongis laceris. *Pet. fil. t.* 13. *f.* 5.

r r *frondibus pinnatifidis.*

reptans. 4. Tr. frondibus cuneato-ovatis inciſo-pinnatifidis, ſurculo repente. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

criſpum. 5. Tr. frondibus lanceolatis, laciniis parallelis ſubſerratis. *Plum. fil. t.* 86.

polypodioides. 6. Tr. frondibus lanceolatis repandis, fructificationibus ſolitariis terminalibus.

aſperioides. 7. Tr. frondibus pendulis lanceolatis glaberrimis, laciniis bilobis, lobis obtuſis fructificationibus bivalvibus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

humile. 8. Tr. frondibus dichotomis, laciniis alternis decurrentibus linearibus obtuſis integris, fructificationibus turbinato-infundibuliformibus ſtilis ſetaceis exſertis, ſtipite vix ullo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

r r r *frondibus bipinnatifidis.*

ſericeum. 9. Tr. frondibus pendulis lanceolatis tomentoſis, laciniis alternis, laciniulis linearibus obtuſis integris, inferioribus bifidis, fructificationibus terminalibus hirſutis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

ciliatum. 10. Tr. frondibus erectis deltoidibus, laciniis ovatis, lacinulis linearibus obtuſis ciliatis, fructificationibus terminalibus bivalvibus hirtis, ſtipite marginato. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

lucens. 11. Tr. frondibus pendulis lanceolatis hirſutis lucidis, laciniis parallelis, lacinulis ſubrotundis ſubſerrulatis, ſtipite hirſutiſſimo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

fucoides. 12. Tr. frondibus ovatis glabris, laciniis ovatis, lacinulis bipartitis, ſegmentis ſerratis obtuſis, fructificationibus bivalvibus ſupra baſin pinnarum inſertis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

rrrr frondibus tripinnatifidis.

undulatum. 13. Tr. frondibus tripinnatifidis bipinnatiſve pendulis lanceolatis, laciniis lacinuliſque alternis decurrentibus, ſecundariis linearibus retuſis crenulatis undulatis, fructificationibus terminalibus bivalvibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 137.

rrrrr frondibus quadripinnatifidis.

rigidum. 14. Tr. frondibus erectis deltoideis, laciniis patentibus, lacinuliis lanceolatis, ſecundariis linearibus apice inciſis, ſcyphis fructificantibus pedicellatis axillaribus. *Swarts nov. pl gen. & ſp. p.* 137.

polyanthon. 15. Tr. frondibus deltoideis erectis, laciniis lacinuliſque decurrentibus, ſecundariis linearibus obtuſis, fructificationibus bivalvibus numeroſis, ſtipite marginato. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 137.

clavatum. 16. Tr. frondibus oblongo-lanceolatis laxis, laciniis lacinuliſve decurrentibus, ſecundariis linearibus emarginatis; fructificationibus terminalibus bivalvibus ſubrotundis, ſtipite teretiuſculo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 137.

*** fronde compoſita.*

r pinnata.

contiguum. 17. Tr. pinnis linearibus alternis approximatis integris, fructificantibus apice inciſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

adiantoides. 18. Tr. pinnis enſiformibus acuminatis inciſo-ſerratis, ſerraturis bifidis. *Burm. zeyl. t.* 43.

tunbrigense. 19. Tr. pinnis oblongis dichotomis decurrentibus dentatis. *Bolton fil. brit. t.* 31.

rr frondibus ſubbipinnatis.

dilatatum. 20. Tr. pinnis alternis decurrentibus dichotomis cuneiformibus inciſis, fructificationibus bivalvibus orbicularibus inflatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

bivalve. 21. Tr. pinnis alternis decurrentibus dichotomis, laciniis linearibus ſerratis, fructificationibus ſubrotundis bivalvibns. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

pyxidiſe- 22. Tr. pinnis alternis confertis lobatis linearibus. *Bolton fil.*
rum. *brit. t.* 30.

hirſutum. 23. Tr. pinnis alternis pinnatifidis piloſis. *Pet. fil. t.* 15. *f.* 5.

ſanguino- 24. Tr. pinnis alternis pinnatifidis, laciniis dichotomis linea-
lentum. ri-obtuſis integris decurrentibus, fructificationibus ovato-ſubrotundis dehiſcentibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 84.

crinitum. 25. Tr. frondibus piloſis, pinnis ovatis pinnatifidis, laciniis bifidis, lacinulis obtuſis, ſtipite erecto hirto. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 136.

lineare. 26. Tr. frondibus pendulis lanceolatis glabris, pinnis remotis, pinnulis linearibus bipartitis, fructificationibus terminalibus bivalvibus, ſtipite capillari. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 137.

ſquarro- 27. Tr. pinnis oblongis acuminatis ſubpinnatis ſerratis, ſerra-
ſum. turis mucronatis, fructificationibus ſinuum globoſis dehiſcentibus ſubbivalvibus, ſtipite hiſpido barbato, caudice arboreo. *Forſt. flor. auſtr. p.* 86.

††† *frondibus bipinnatis.*

ſtrigo- 28. Tr. pinnulis rhombeis piloſis ſerratis, fructificationibus
ſum. ſolitariis infra ſerraturas. *Thunb. flor. jap. p.* 339.

epiphyl- 29. Tr. pinnis acuminatis, pinnulis linearibus inciſo-ſerratis,
lum. fructificationibus in pagina ſuperiore infra apicem ſerraturarum ſquamaceis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

cuneifor- 30. Tr. pinnis dichotomis pinnulisque alternis, his cuneifor-
me. mibus inciſis, fructificationibus truncato-laceris. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

gibbero- 31. Tr. pinnulis oblongis pinnatifido-inciſis, laciniis linea-
ſum. ribus integris margine interiori infra apicem fructificantibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

demiſ- 32. Tr. pinnis alternis ſtrictis, pinnulis pinnatifido-dicho-
ſum. tomis, laciniis linearibus obtuſis integris, fructificantibus globoſis terminalibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

tamariſci- 42. Tr. pinnulis pinnatifide lobatis, coſta piloſa. *Jacq. coll.*
forme. 3. *p.* 285. *t.* 21. *f.* 3.

ſſſſ frondibus decompoſitis.

multifidum. 33. Tr. foliolis alternis pinnatis, pinnis dichotomis linearibus decurrentibus argute ſerratis, fructificationibus ovato-ſubrotundis dehiſcentibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

elatum. 34. Tr. foliolis pinnatis, pinnis oblongis ſtrictis pinnatifido-inciſis, laciniis oblongis apice ſerratis, fructificationibus terminalibus ovatis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

flaccidum. 35. Tr. foliolis rhombeis ſubpinnatis, pinnis cuneiformibus apice inciſis margine interiore infra apicem fructificantibus. *Forſt. flor. auſtr. p.* 85.

ſolidum. 36. Tr. foliolis acuminatis, ſecundariis ovato-oblongis inciſis crenatis, fructificationibus filiformibus tubuloſis. *Forſt. flor. auſtr. p.* 86.

ſſſſſ fronde ſupradecompoſita.

ſinenſe. 37. Tr. foliis pinniſque alternis lanceolatis, pinnis laciniis cuneiformibus. *Osb. it. t.* 6.

ſcandens. 38. Tr. foliolis pinniſque alternis, his oblongis ſerratis. *Plum. fil. t.* 93.

capillaceum. 39. Tr. pinnis filiformibus linearibus unifloris. *Plum. fil. t.* 99.

japonicum. 40. Tr. pinnulis inciſo-trifidis acutis. *Thunb. flor. jap. p.* 340.

canarienſe. 41. Tr. frondibus tripartitis, foliolis pinniſque alternis, his pinnatifidis. *Pluckn. alm. t.* 291. *f.* 2. *β)* Polypodium luſitanicum. *Sp. pl.* 2. *p.* 1556. *Magn. h. monſp. p.* 79. *ic.*

CÆNOPTERIS. *Fructificationes* in lineolis ſubmarginalibus lateralibus membrana exterius dehiſcente tectis.

rutæfolia. 1. C. frondibus pinnatifidis, laciniis linearibus planis obtuſis. *Berg. act. Petrop. pr.* 1782. 2. *p.* 249. *t.* 7. *f.* 2.

furcata. 2. C. fronde bipinnata, pinnulis imis furcatis, rhachi compreſſa marginata. *Berg. act. Petrop. pr.* 1782. 2. *p.* 248. *t.* 7. *f.* 1.

rhizophylla. 3. C. fronde bipinnata apice radicante, pinnulis obovatis ſubfalcatis petiolatis, primordialibus lobatis. *Smith. plant. ic. ined. faſc.* 2. *t.* 80.

viviparа. 4. C. frondibus ſubtripinnatis, laciniis ſubulatis erectis. *Berg. act. Petrop. l. nr. 1782. 2. p. 250. t. 7. f. 3. Suppl. p.* 444. Acroſtichum viviparum.

1182. MARSILEA. *Cal.* communis ovalis coriaceus multilocularis. *Cor.* o. *Filam.* o. *Anther.* plures. *Piſt.* plura. *Stil.* o.

patens. 1. M. foliis oppoſitis ſimplicibus. *Mant. p.* 506. *act. palat.* 3. *phyſ. t.* 21.

quadrifolia. 2. M. foliis quaternis integerrimis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 4. *f.* 5.

1183. PILULARIA. *Cal.* communis villoſus, 4fariam dehiſcens, globoſa, 4locularis. *Anth.* plures ſeſſiles. *Piſt.* plura. *Stil.* o.

globulifera. 1. Pilularia. *Flor. dan. t.* 223.

1184. ISOETES. *Flores maſculi: Anthera* intra baſin frondis ſeſſilis. *Fructificatio feminea: Capſula* 2locularis extra baſin frondis.

lacuſtris. 1. I. foliis ſubulatis ſemiteretibus recurvis. *Suppl. p.* 448. *Flor. dan. t.* 191. *an vere diſtincta ſui generis planta perfecta?*

coromandeliana. 2. I. foliis filiformibus erectis glabris. *Suppl. p.* 447.

MUSCI.

1186. PORELLA. *Anthera* oblonga, dehiſcens poris plurimis lateralibus, non operculata. *Calyptra* o.

pinnata. 1. Porella. *Dill. muſc. t.* 68. *f.* 4.

1187. SPHAGNUM. *Flos maſculus* clavatus, antheris planis. *Capſ.* in eadem planta operculatæ, ſeſſiles, ſine calyptra integra, ore lævi.

paluſtre. 1. Sph. ramis deflexis. *Flor. dan. t.* 474. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 1. *f.* 1. 2. *t.* 3. *f.* 9. & 4. *f.* 14. & 9. *f.* 53. 54. β) *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 3. *f.* 13-15.

alpinum. 2. Sph. ſubramoſum erectum. *Dill. muſc. t.* 32. *f.* 3. *an bryi potius ſpecies?*

1189. PHASCUM. *Capſula* ovata, calyptra munita, cum rudimento operculi perſiſtente.

pedunculatum. 1. Ph. acaule, capſula pedunculata. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* II.

cernuum. 2. Ph. acaule, foliis floralibus erectis, pedunculo curvato. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 31. *t.* 11. *Schreb. de phaſco. p.* 8. *t.* 1. *f.* 6. 7.

ſerratum. 3. Ph. acaule, foliis ovato-lanceolatis ſerratis planis erectis. *Schreb. de phaſco. p.* 8. *t.* 2.

muticum. 4. Ph. acaule, foliis ovatis muticis concavis conniventibus. *Schreb. de phaſco. p.* 8. *t.* 1. *f.* 11. 12.

cuſpidatum. 5. Ph. cauleſcens, foliis ovatis cuſpidatis patulis, ſummis erectis conniventibus. *Flor. dan. t.* 249. *f.* 3. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 699. Phaſcum acaulon.

ſubulatum. 6. Ph. cauleſcens, foliis lanceolato-linearibus patulis. *Flor. dan. t.* 249. *f.* 1. *Hedw. crypt.* 4. *t.* 35.

piliferum. 7. Ph. cauleſcens, foliis oblongis apice piliferis. *Schreb. phaſco. t.* 1. *f.* 8-10.

criſpum. 8. Ph. cauleſcens, foliis minutis laxis capſulam cingentibus ſubulatis concavis, apice cuſpidato undulatis. *Hedw. cryptog.* 1. *p.* 25. *t.* 9.

patens. 9. Ph. cauleſcens, foliis lanceolatis dentatis patulis, capſulæ apice diaphano. *Hedw. cryptog.* 1. *p.* 28. *t.* 10.

nitidum. 10. Ph. cauleſcens humile, foliis ſubulato-carinatis ſubfaſciatis, capſulis pedunculatis ſuberoſis. *Hedw. cryptog.* 4. *p.* 91. *t.* 34.

caulescens. 11. Ph. cauleſcens erectum, foliis lanceolatis alternis. *Dill. muſc. t.* 85. *f.* 15.

repens. 12. Ph. cauleſcens repens, capſulis lateralibus ſeſſilibus. *Dill. muſc. t.* 85. *f.* 16.

alterniſolium. 13. Ph. caulibus capſuliferis nanis, ſterilibus altioribus erectis, foliis alternis ſubulatis. *Dickſ. crypt. brit. faſc.* 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 2.

1190. FONTINALIS. *Gemma* in eadem planta cum *capſula* ſubſeſſili, perichætio imbricato obvoluta & calyptra munita.

minor. 1. F. foliis ovatis concavis trifariis acutis paſſim geminis, capſulis terminalibus. *Dill. muſc. t.* 33. *f.* 2.

antipyretica. 2. F. foliis complicato-carinatis trifariis acutis, capſulis lateralibus. *Dill. muſc. t.* 33. *f.* 1. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 5. *f.* 27. & 2. *t.* 1. *f.* 5. *t.* 4. *f.* 14. 15. & *t.* 9. *f.* 53-55.

criſpa. 3. F. ſurculis ramoſis pennatis, foliis duplicato-bifariis rotundatis patentibus imbricatis undulatis, capſulis lateralibus poſterioribus. *Dill. muſc. t.* 32. *f.* 7. 8.

diſticha. 4. F. ſurculis ſimplicibus, foliis bifariis patentibus retuſis imbricatis planis, capſulis lateralibus poſterioribus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 138.

ſquamoſa. 5. F. foliis imbricatis ſubulato-lanceolatis, capſulis lateralibus. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 32. *t.* 12.

albicans. 6. F. foliis imbricatis ovato-lanceolatis pilo terminatis, capſulis lateralibus. *Dill. muſc. t.* 32. *f.* 5.

capillacea. 7. F. foliis ſecundis lineari-ſetaceis, perichætialibus longiſſimis convolutis ſubulatis. *Dill. muſc. p.* 260. *t.* 33. *f.* 5.

alpina. 8. F. foliis ſubſecundis ellipticis obtuſiuſculis, perichætialibus lanceolatis acutis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 2. *p.* 2. *t.* 4. *f.* 1.

1188. BUXBAUMIA. *Gemma* orbicularis, *Capſula* pedunculata, periſtomate externo 16dentato, interno membranaceo plicato.

aphylla. 1. B. aphylla, pedunculo elongato. *Flor. dan. t.* 44. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 3. *f.* 10. & *t.* 9. *f.* 51.

folioſa. 2. B. acaulis, capſula ſubſeſſili foliis cincta. *Linn. fil. de muſc. p.* 33. *t.* 1. *f.* 4. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2 *t.* 9. *f.* 52.

1191. SPLACHNUM. *Gemma* orbicularis, terminalis. *Capſula* in alia planta cylindrica cum calyptra & apophyſi maxima, periſtomate octodentato.

luteum. 1. Spl. umbraculo orbiculari plano. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 17.

ampullaceum. 2. Spl. umbraculo ampullaceo obconico. *Flor. dan. t.* 822. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 7. *f.* 33. 34. & *crypt.* II. 2. *t.* 14.

vaſculoſum. 3. Spl. umbraculo ampullaceo ſubgloboſo. *Flor. dan. t.* 192. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 15.

rubrum. 4. Spl. umbraculo orbiculari hemiſphærico. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 18.

ſphæricum. 5. Spl. receptaculo globoſo. *Linn. fil. muſc. t.* 1. *f.* 1. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 16.

anguſtatum. 6. Spl. cauleſcens, foliis piliferis, pedunculo breviſſimo. *Linn. fil. muſc. p.* 33. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 12.

urceolatum. 7. Spl. trunco erecto bifloro, foliis cochleariformibus imbricatis apiculatis, apophyſi tumidiuſcula obconica. *Hedw. crypt.* II. 2. *t.* 13.

Breweri. 8. Spl. foliis lanceolatis integerrimis. *Hedw. crypt.* 114. *p.* 120. *t.* 38.

longifetum. 9. Spl. foliis ovatis cuſpidatis, umbraculo ſubgloboſo. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 441.

tenue. 10. Spl. cauleſcens, foliis ovato-oblongis acutis, receptaculo obconico attenuato. *Dickſ. crypt. Brit. f.* 2. *p.* 2. *t.* 4. *f.* 2.

ovatum. 11. Spl. acaule, foliis lanceolato-ovatis acutis, receptaculo obovato. *Dill. muſc. p.* 344. *t.* 44. *f.* 4.

1192. POLYTRICHUM. *Gemma* orbicularis, terminalis, *Capſula* in alia planta calyptra munita, periſtomatis externis dentibus 32.

* *capſula apophyſi munita.*

commune. 1. P. ſurculo ſimplici prolifero, foliis lineari-lanceolatis ſerrulatis, capſulis oblongis tetraëdris, calyptris villoſis. *Blackw. herb. t.* 375. *Hedw. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 9. *f.* 62. 64. & 2. *t.* 7. *f.* 37.

magellanicum. 2. P. ſurculo ſimplici prolifero, foliis ſubulatis canaliculatis cartilagineo-ſerratis, capſulis oblongis tetraëdris, calyptris villoſis. *Suppl. p.* 449.

juniperinum. 3. P. ſurculo ſimplici prolifero, foliis lineari-lanceolatis, integerrimis mucronatis, capſulis oblongis tetraëdris, calyptris villoſis. *Flor. dan. t.* 295.

piliferum. 4. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis integerrimis; apice piliferis, capſulis oblongis tetraëdris; calyptris villoſis. *Dill. muſc. t.* 54. *f.* 3.

pulverulentum. 5. P. ſurculo ſubſimplici folioſo, foliis lanceolatis acuminatis horizontalibus roridis. *Reynar act. Lauſann.* II. 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 2.

ſerratum. 13. P. ſurculo ſimplici, capſulis tetraëdris, foliis lanceolato-linearibus ſerratis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 446.

** *capſula ſine apophyſi.*

nanum. 6. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis apice ſubſerratis, capſulis ſubrotundis, calyptris villoſis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium polytrichoïdes. *Hedw. crypt.* 2. *t.* 37. *t.* 13.

aloïdes. 7. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis apice ſerrulatis, capſulis cylindricis, calyptris villoſis. *Hedw. cryptog.* 2. *p.* 40. *t.* 14.

undulatum. 8. P. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis ſerratis undulatis, capſulis cylindricis, operculi acumine longe producto, calyptris dimidiatis glabris. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 701.

Bryum undulatum. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 46. *t.* 16. β) *Hedw. crypt.* 2. *t.* 17.

hercynicum. 9. P. ſurculo ſubſimplici, foliis lanceolatis carnoſis, capſulis erectis urceolatis calyptris interrupte villoſis. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 43. *t.* 15.

alpinum. 10. P. ſurculo ramoſiſſimo, foliis lanceolatis denticulatis, pedunculis terminalibus, capſulis ovatis. *Flor. dan. t.* 296.

urnigerum. 11. P. ſurculo ramoſiſſimo, foliis lanceolatis dentato-ſerratis, pedunculis axillaribus, capſulis cylindricis. *Dill. muſc. t.* 55. *f.* 5.

convolutum. 12. P. caule folioſo, foliis involutis ſubulatis glabris, pedunculo filiformi brevi, calyptra villoſa. *Suppl. p.* 449. *Linn. fil. muſc. t.* 1. *f.* 3.

1193. MNIUM. *Gemma* orbicularis rarius capitata, *Capſulæ* utplurimum in alia planta calyptra munitæ, periſtomatis dentibus 16 rarius 4.

* *gemmis capſuliſque in eadem planta.*

⁊ *periſtomate interno ciliis 16 membranaceis planis,* Funaria ſ. Koelreutera.

hygrometricum. 1. Mn. ſurculo ſubſimplici, foliis oblongis acuminatis, capſulis ovatis nutantibus, operculis planis. *Flor. dan. t.* 648. *f.* 2. *Hedw. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 5. *f.* 21-26. & 2. *t.* 3. *f.* 11. *t.* 5. *f.* 25. 26 *t.* 6. *f.* 27. *t.* 10. *f.* 58-61.

⁊⁊ *periſtomate interno obſolete ſulcato laciniato:* Timmia.

megapolitanum. 2. Mn. erectum, foliis lineari-lanceolatis ſerratis patulis, capſula cernua, operculo convexo medioque depreſſo. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 83. *t.* 31.

** *gemmis capſuliſque in diverſa planta.*

⁊ *illis capitatis, harum periſtomate ſimplici.*

† *periſtomatis dentibus.* 4. Tetraphis, ſive Georgia

pellucidum. 3. Mn. ſurculo ſimplici, foliis ovatis, capſulis cylindricis. *Flor. dan. t.* 300. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 7. *f.* 32.

Digitized by Google

†† *periſtomatis dentibus* 16. Dicranum.

purpure- um. 4. Mn. ſurculo ramoſo, foliis oblongis acutis carinatis; capſulis ſubcylindricis, ſetis axillaribus. *Dill. muſc. t.* 49. *f.* 51. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 4. *f.* 17.

ſtrictum. 5. Mn. ſurculo cauleſcente, foliis capillaceis, pedunculis elongatis terminalibus, capſulis obliquis. *Swartz nov. gen. pl. & ſp. p.* 139. *an hujus cohortis ?*

latifolium. 6. Mn. erectum, foliis oblongo-dilatatis concavis pilo brevi terminatis, capſula cylindrica recta. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 89. *t.* 33.

ſcoparium. 7. Mn. ſurculo ramoſo, foliis lineari-lanceolatis recurvis ſecundis, capſulis erectis oblongo-cylindricis, operculis conicis acuminatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 701. Bryum ſcoparium. *Curt. flor. Lond. t.* 38. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 41. 42.

hetero- mallum. 8. Mn. ſurculo ſubſimplici, foliis ſetaceis recurvis, capſulis ovatis, operculis acuminatis recurvis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum heteromallum. *Hedw. cryp.* 3. *p.* 72. *t.* 26. *& fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 9. *f.* 55. 61.

tortile. 33. Mn. ſurculo ſubdiviſo, foliis ſubulato-carinatis reflexis heteromallis ſiccitate tortilibus, thecis oblongis, operculo roſtrato. *Schrader.*

glaucum. 9. Mn. ſurculo ramoſo, foliis ovatis acutis imbricatis, capſulis oblongis, operculis acuminatis recurvis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 701. Bryum glaucum. *Dill. muſc. t.* 46. *f.* 20.

pellu- cens. 10. Mn. ſurculo hirſuto, foliis recurvis acutis, capſulis erectiuſculis. *Dill. muſc. t.* 46. *f.* 23. 24. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 701. Bryum pellucidum.

acicula- re. 11. Mn. foliis erectis ſubſecundis, capſulis erectis, operculo aciformi. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum aciculare. *Dill. muſc. t.* 46. *f.* 25.

ſimplex. 12. Mn. ſurculo ſimpliciſſimo, medio pedunculifero, foliis ſubulatis, capſula nutante oblonga. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum ſimplex. *Dill. muſc. t.* 50. *f.* 9. *Hedw. crypt.* II. 4. *p.* 108. *t.* 34.

puſillum. 34. Mn. foliis capillaribus rigidulis erectis, ſummis æqualibus. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 96. *t.* 29. *f.* B.

ſpuricum. 35. Mn. ſurculo erecto, foliis nitidis cuſpidatis concavis, ſummis confertis patulis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 96. *t.* 30.

†† *gemmis orbicularibus, periſtomate duplici.*

† *interno reticulato*, Mæſia.

triquetrum. 13. Mn. ſurculo ramoſo, foliis lanceolatis acutis carinatis patulis, capſulis obliquis oblongo-cylindricis, operculis conicis. *Hedw. crypt.* 3. *t.* 21. 22.

uliginoſum. 14. Mn. ſurculo ſubſimplici, foliis oblongo-lanceolatis obtuſis, capſulis obliquis pyriformibus, operculis conicis umbilicatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum trichodes. *Hedw. crypt.* 1. *t.* 1. 2. & *fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *f.* 16. 20. 2. *t.* 6. *f.* 28. & *t.* 9. *f.* 56. 57.

†† *periſtomate interno e membrana ciliis difformibus.*

tomentoſum. 15. Mn. ſurculo dichotomo erecto tomentoſo, foliis ſubulatis, capſulis ſphæricis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 139.

ſphærocarpon. 16. Mn. ſurculis erectis tomentoſis filiformibus, ramis ſimplicibus faſciculatisque terminalibus, foliis capillaribus, capſulis ſphæricis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 139.

ramoſum. 17. Mn. ſurculo ramoſo erecto, pedunculis axillaribus. *Dill. muſc. t.* 31. *f.* 4. *an cum* 2 *præcedentibus hujus cohortis?*

fontanum. 18. Mn. ſurculo ſubramoſo erecto, foliis lanceolatis apice ſetaceis incurvis, capſulis ſubrotundis obliquis, operculo conico umbilicato obtuſo. *Flor. dan. t.* 299.

marchicum. 19. Mn. ſurculo ramoſo erecto, foliis ovatis acuminatis, capſulis ſubrotundis obliquis, operculis mucrone craſſo adunco. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 474. *Hedw. crypt.* II. 4. *t.* 39.

paluſtre. 20. Mn. ſurculo ramoſo dichotomo, foliis ſubulatis acutis carinatis, capſulis oblongis, operculis conicis. *Dill. muſc. t.* 31. *f.* 3.

annotinum. 21. Mn. foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis ſubradicalibus, capſulis nutantibus. *Dill. muſc. t.* 50. *f.* 68.

hornum. 22. Mn. capſulis pendulis, pedunculo curvato, ſurculo ſimplici, foliis margine ſcabris. *Curt. flor. Lond. t.* 48. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 1. *f.* 2. 3. 10. & 12. *t.* 1. *f.* 4. & *t.* 4. *f.* 22. 23.

capillare. 23. Mn. capſulis pendulis, foliis ovatis ſetiferis carinatis, pedunculis longiſſimis. *Dill. muſc. t.* 50. *f.* 67.

crudum. 24. Mn. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis acutis, capſulis nutantibus ovatis, operculis conicis, calyptris recurvatis. *Hedw. crypt.* 4. *t.* 37.

Digitized by Google

puncta-tum. 25. Mn. capſulis cernuis, pedunculis aggregatis, foliis obovatis integerrimis obtuſis punctatis. *Dill. muſc. t.* 53. *f.* 81. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 10. *f.* 66-69.

cuſpida-tum. 26. Mn. capſulis nutantibus, pedunculis aggregatis foliis ovatis acutis ſerratis. *Dill. muſc. t.* 53 *f.* 79.

ſerra-tum. 27. Mn. ſurculo ſimplici, foliis ovatis acuminatis, ſummis anguſtioribus ſerratis, thecis ovatis nutantibus, operculi roſtello recurvo. *Schrader.*

roſtra-tum. 28. Mn. ſurculo ſimplici, foliis ovatò-ligulatis ſubſerratis, thecis ovatis nutantibus, operculi roſtello recurvo. *An ſatis diſtinctum a ſerrato! Schrader.*

prolife-rum. 29. Mn. capſulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis roſaceo congeſtis lanceolatis acutis. *Dill. muſc. t.* 52. *f.* 77.

undula-tum. 30. Mn. capſulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis ſerrulatis. *Dill. muſc. t.* 52. *f.* 76.

nutans. 31. Mn. ſurculo ſubramoſo, foliis ovatis acutis, capſulis pyriformibus nutantibus. *Dill. muſc. t.* 51. *f.* 74.

cæſpiti-tium. 32. Mn. capſulis pendulis, foliis lanceolatis, acuminato-ſetaceis pedunculis longiſſimis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 702. Bryum cæſpiticium. *Curt. flor. Lond. t.* 166. a. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 3. *f.* 12. & *t.* 10. *f.* 67.

1194. BRYUM. *Gemmæ* ſæpe axillares, nunc in alia, nunc in eadem planta cum *capſulis* calyptra munitis, pedunculo terminali ex tuberculo exeunti inſidentibus.

* *gemmis conſpicuis nullis*, Webera.

pomifor-me. 1. Br. ſurculo ramoſo, foliis lineari-lanceolatis ſeta terminatis imbricato-patulis, capſulis ſphæricis, operculo plano. *Dill. muſc. t.* 44. *f.* 1.

mnioides. 2. Br. ſurculo ſubſimplici, foliis linearibus, capſulis pyriformibus nutantibus, operculis conicis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium pyriforme. *Hedw. cryptog.* 1. *t.* 3. & *fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 3. *f.* 12.

3. Br.

nutans. 3. Br. ſurculo ſimplici, foliis ovato-lanceolatis conniventibus, capſulis cylindricis, operculis conicis mucronatis. *Hedw. crypt.* 1. *p.* 9. *t.* 4.

rubrum. 56. Br. capſula oblonga nutante; foliis ſubulatis, caule ſimpliciſſimo medio pedunculifero. *Mant. p.* 309. *an huc ſpectat?*

* * *gemmis inſtructa.*

⁊ *gemmis capſulas includentibus*, Swarzia.

capillaceum. 61. Br. foliis diſtichis baſi ſemivaginantibus, capſulis erectis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 88. *t.* 26.

inclinatum. 62. Br. foliis baſi ſemivaginantibus ſubſetaceis, capſulis inclinatis, periſtomatis dentibus perforatis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 90. *t.* 27.

trifarium. 63. Br. foliis trifariis, ſuperioribus lanceolatis, inferioribus ſubulatis, capſulis ovatis erectis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 92. *t.* 28.

⁊⁊ *in eadem planta cum capſulis.*

† *periſtomate nudo*, Hedwigia.

ciliatum. 4. Br. capſulis ſeſſilibus terminalibus; calyptra minima. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 107. *t.* 40.

aquaticum. 95. Br. capſulis oblongis, trunco tenui declinato, apice foliiſque linearibus acuminatis reclinatis. *Hedw. crypt.* III. 2. *p.* 29. *t.* 11. *Jacq. flor. auſtr. t.* 290.

†† *periſtomate octodentato.*

Octoblepharis. 4. Br. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 15. *t.* 6.

††† *periſtomate* 16*dentato*:

⊥ *ſimplici.*

L *gemmis axillaribus*: Leerſia.

pulvinatum. 5. Br. ſurculo ramoſo; foliis oblongis piliferis, capſulis ſubrotundis nutantibus, calyptris minutis. *Dill. muſc. t.* 50. *f.* 65. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 10. *f.* 65.

cirrhatum. 6. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolatis acutis, capſulis oblongis, operculo acuminato, calyptris dimidiatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 700. Mnium cinctum. *Flor. dan. t.* 538. *f.* 4. *nonne potius ad dicrana Hedwigii ablegandum?*

exſtinctorium. 7. Br. ſurculo ſimplici, foliis lanceolatis, capſulis cylindricis, calyptris campanulatis margine integris capſulas ſuperantibus. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 49. *t.* 18. *fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 4. *f.* 19. & 24. a.

cuſpidatum. 68. Br. ſurculo ſimplici, foliis lanceolato-linearibus acuminatis, capſulis ovatis, operculis conico-roſtratis ſubincurvis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 442.

ciliare. 8. Br. ſurculo ſubramoſo, calyptra ampla conica ciliata. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 53. *t.* 19.

†† *gemmis ſparſis*: Trichoſtomum.

hypnoides. 9. Br. ſurculo ramoſo decumbente, foliis oblongis apice piliferis, capſulis oblongis, calyptris integris. *Flor. dan. t.* 476. *Hedw. frond. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 43. 44.

microcarpon. 10. Br. ſurculo ramoſo, foliis patulis, ſetis terminalibus, capſulis ſubrotundis. *Dill. muſc. t.* 46. *f.* 29.

indicum. 11. Br. ſurculo ramoſo erecto, foliis lanceolatis convolutis, ſetis ſuperne incraſſatis axillaribus, capſulis oblongis, operculis roſtratis. *Willdenav bot. Mag.* 4. *p.* 7. *t.* 1. *f.* 1.

faſciculare. 89. Br. ſurculo procumbente, ramis confertis brevibus, foliis lanceolatis margine revoluto-patulis, capſulis ovato-oblongis. *Schrader.*

ericoides. 88. Br. ſurculo erecto, ramis confertis brevibus, follis lanceolato-acuminatis, apice diaphanis recurvis, capſulis ovatis. *Schrader.*

anguſtatum. 87. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolato-ſubulatis ſiccitate tortilibus, capſulis oblongis. *Schrader.*

lanceolatum. 58. Br. ſurculo ſubſimplici erecto, foliis lanceolatis mucronatis, capſulis ovatis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 81. *t.* 23.

pallidum. 12. Br. ſurculo ſimplici breviſſimo, foliis capillaceis ſubulatis vaginantibus, capſulis cylindricis, operculis conicis, calyptris dimidiatis. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 75. *t.* 27.

baſiflorum. 69. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolatis erectis, capſularum pedunculis ex baſi ramorum bracteatis, operculo conico ſubobliquo. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 448.

tortum. 70. Br. capſula ſubcylindrica flexuoſa, periſtomatis dentibus articulatis, operculo conico, pedunculis intortis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 449. *an diſtincta ſpecies?*

Digitized by Google

repens. 71. Br. capſula recta, ſeneſcente incurva, ſurculo repente, ramis filiformibus erectis, foliis enervibus lanceolatis patulis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 450.

fontino-lioides. 96. Br. trunco longo ramoſo, foliis lanceolatis patulis, capſulis lateralibus. *Hedw. crypt.* III. 2. *p.* 36. *t.* 14.

puſillum. 13. Br. ſurculo ſimplici breviſſimo, foliis ſubulatis vaginantibus, capſulis oblongis, operculis conicis, calyptris dimidiatis. *Hedw. crypt.* 3 *p.* 78. *t.* 28.

ſecundum. 60. Br. foliis lanceolatis dentato-cuſpidatis, capſulis oblongis erectis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 86. *t.* 25.

†† *periſtomate præter dentes ciliis ſpiraliter convolutis munito:* Tortula.

murale. 14. Br. ſurculo breviſſimo ſubdiviſo, foliis ovatis acutis apice piliferis, capſulis oblongis, operculis conicis acutis. *Dill. muſc. t.* 45. *f.* 14.

tortuoſum. 90. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolato-linearibus ſerratis undulatis ſiccitate criſpis, capſulis cylindricis, operculo roſtrato. *Dill. muſc. t.* 48. *f.* 40.

agrarium. 15. Br. acaule, capſulis cylindricis erectiuſculis ſubulatis, foliis lanceolatis acutis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 139. *an hujus cohortis?*

acuminatum. 16. Br. capſulis cylindricis erectis ſubulatis, ſurculis cauleſcentibus ceſpitoſis, foliis linearibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 139. *an hujus cohortis?*

ſubulatum. 17. Br. ſurculo breviſſimo ſimplici, foliis ovatis obtuſiuſculis, capſulis cylindricis, operculo conico acuto. *Curt. flor. Lond. t.* 214. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 38-40.

†††† *periſtomate dentibus* 32.

Didymodon. 17*. Br.
Hedw. crypt. 3. *p.* 8.

††† *gemmis in alia, capſulis in alia planta.*

† *periſtomate nudo:* Gymnoſtomum.

pyriforme. 18. Br. foliis explanatis oblongis acutis, capſulis pyriformibus. *Flor. dan. t.* 537. *f.* 1. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 1. *f.* 2. 3. *t.* 2. *f.* 6. *α. β. t.* 4. *f.* 18. & *f.* 24. b. & *t.* 6 *f.* 31.

Heimii. 19. Br. trunco erecto foliiſque ſpatulato-acuminatis ad apicem denticulatis, capſulis oblongis erectis. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 80. *t.* 30.

ovatum. 20. Br. foliis ovatis concavis piliferis, capſulis ovatis. *Hedw. crypt.* 1. *p.* 16. *t.* 6.

obtuſum. 74. Br. foliis lanceolato-ovatis acuminatis, capſulis erectis obovatis truncatis, operculo convexo. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 5. *t.* 4. *f.* 7.

truncatulum. 21. Br. foliis explanatis mucronatis, capſulis truncatis. *Hedw. crypt.* 1. *p.* 13. *t.* 5.

pennatum. 22. Br. ſurculo ſimplici erecto pinnatifido apice fructifero, pinnis diſtichis lanceolatis integerrimis. *Hedw. crypt.* 3. *p.* 81. *t.* 29.

curviroſtrum. 59. Br. ſurculo pallido debili recto, foliis linearibus reflexis. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 84. *t.* 24.

ſtelligerum. 73. Br. capſulis erectis ſemigloboſis nudis, foliis linearibus ſtellato-verticillatis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 2. *p.* 3. *t.* 4. *f.* 4.

++ *periſtomate 16dentato.*

⊥ *ſimplici.*

L *gemmis ſparſis:* Grimmia.

apocarpum. 23. Br. capſulis ſeſſilibus terminalibus, calyptra minima. *Hedw. crypt.* I. 4. *p.* 104. *t.* 39.

ſeſſile. 24. Br. capſulis ſeſſilibus, foliis rectis carinatis. *Dill. muſc. t.* 55. *f.* 10.

ſilvaticum. 25. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolatis, capſulis oblongis pedunculatis axillaribus terminalibuſque, operculo mucrone obtuſo, calyptris villoſis. *Flor. dan. t.* 648. *f.* 1.

ſetaceum. 26. Br. foliis ſetaceis, capſulis pyriformibus, pedunculis recurvatis. *Hedw. crypt.* 4. *p.* 102. *t.* 38.

LL *gemmis terminalibus capitatis.* Weiſſia.

viridulum. 27. Br. capſulis ovatis erectis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato-patulis. *Curt. flor. Lond. t.* 132. a.

Dickſoni. 28. Br. foliis lineari-lanceolatis, capſulis oblongis, operculo acuminato, calyptra dimidiata. *Dickſon crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 5.

recurviroſtrum. 29. Br. foliis lanceolatis imbricato-patulis, capſula gracili, operculi roſtello recurvo. *Hedw. crypt.* 1. *p.* 19. *t.* 7.

unilaterale. 30. Br. trunco erecto, foliis baſi latioribus, cuſpide ſubulata rigida unilaterali, capſularum operculo conico annulato. *Hedw. crypt.* I. *p.* 22. *t.* 8.

minutum. 31. Br. ſurculo ſimplici nano capſulaque ovata erectis, foliis capillaribus. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 94. *t.* 29. *f.* A.

⊥⊥ *periſtomate duplici.*

L *interno ſimili.* Orthothrichum.

criſpum. 32. Br. foliis imbricatis cuſpidatis ſiccitate criſpis, capſulis ovatis. *Hedw. crypt.* II. 4. *p.* 111. *t.* 35.

ſtriatum. 33. Br. ſurculo ramoſo, foliis lanceolatis acutis, capſulis oblongis ſeſſilibus axillaribus terminalibuſque, operculo acuminato, calyptris piloſis. *Dill. muſc. t.* 55. *f.* 8. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond* I. *t.* 8. & 2 *t.* 2. *f.* 7. 8. & *t.* 7. *f.* 36. *crypt.* II. 4. *t.* 36.

tectorum. 34. Br. capſulis ſubſeſſilibus, caliptris villoſis conicis, ſetis breviſſimis axillaribns. *Dill. muſc. t.* 55. *f.* 9. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 7. *f.* 35. *crypt.* II. 4. *t.* 37.

diaphanum. 93. Br. foliis lanceolato-acuminatis apice diaphanis, capſula oblonga ſtriata, periſtomii dentibus internis capillaceis. *Schrader.*

affine. 94. Br. foliis lanceolatis margine revoluto-patulis, capſula oblonga ſtriata, periſtomatis dentibus ciis internis capillaceis. *Schrader.*

L L *interno membrana 16dentata.* Pohlia.

elongatum. 35. Br. trunco erecto, foliis lineari-lanceolatis, capſularum baſi elongata. *Hedw. crypt.* I. 4. *p.* 96. *t.* 36.

L L L *interno membrana plicata canaliculata.* Bartramia.

Bartramia. 67. Br. foliis apice ſubulatis, capſulis ovatis lateralibus. *Hedw. crypt.* II. 4. *p.* 126. *t.* 40.

L L L L *interno ciliato.*

⊤ *ciliis ſpiraliter convolutis.* Barbula.

rurale. 36. Br. ſurculo ramoſo, foliis reflexis obovatis obtuſis apice piliferis, capſulis cylindricis, operculis conicis acutis. *Dill. muſc. t.* 45. *f.* 12. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* I. *t.* 6. *f.* 28. 32.

calcarium. 72. Br. acaulon, capſulis erectis obconicis dentatis, foliis erectis teretibus obtuſiuſculis. *Dickſ. crypr. Bryt.* 2. *p.* 3. *t.* 4. *f.* 3.

paludoſum. 52. Br. acaulum, foliis ſetaceis, capſulis obtuſiſſimis patulis. *Dill. muſc. t.* 49. *f.* 53.

verticillatum. 53. Br. capſulis erectis, pedunculis arefactione confertis, foliis piliferis, ſurculis faſtigiatis. *Dill. muſc. t.* 47. *f.* 35.

Celſii. 54. Br. capſulis erectiuſculis, pedunculis longiſſimis, foliis ſetaceis, ſurculis acaulibus. *Dill. muſc. t.* 49. *f.* 54.

ſquarroſum. 55. Br. capſulis obliquis, foliis quinquefariis imbricatis recurvis, caule ferrugineo-tomentoſo. *Buxb. cent.* 4. *t.* 65. *f.* 1.

argenteum. 56. Br. capſulis pendulis, ſurculis cylindricis imbricatis laevibus. *Flor. dan. t.* 880. *f.* 2. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond. t.* 6. *f.* 29.

ventricoſum. 57. Br. capſulis pendulis ventricoſis oblongis, foliis trifariis patulis ſubulato-lanceolatis carinatis, ſurculis ramoſis. *Dill. muſc. t.* 51. *f.* 72.

carneum. 64. Br. capſulis pendulis ſubgloboſis, foliis acutis alternis. *Hedw. crypt.* 2. *p.* 56. *t.* 20.

alpinum. 65. Br. capſula pendula oblonga, foliis ovatis acuminatis carinatis, ſurculis ramoſis, axillis peduncuIiferis. *Dill. muſc. t.* 50. *f.* 64.

dendroides. 66. Br. capſulis nutantibus, ſurculo erecto, ramis verticillatis terminalibus, ramulis alternis, foliis ferratis. *Linn. fil. muſc. p.* 34. *t.* 1. *f.* 2.

*** *dubiae tribus.*

† *periſtomate dentato.*

reticulatum. 75. Br. capſulis erectis pyriformibus, foliis ovatis ferratis reticulatis. *Dickſ. crypr. Brit.* 2. *p.* 4. *t.* 4. *f.* 6.

ſplachnoides. 76. Br. capſulis erectis obovatis, apophyſi ſubrotunda, foliis lineari-ſetaceis. *Flor. dan. t.* 538. *f.* 2.

bipartitum. 77. Br. capſulis erectis ſubobliquis, ſurculis bifidis, foliis lanceolatis acutis carinatis imbricato-patulis. *Dill. muſc. p.* 385. *t.* 49. *f.* 50.

Zierii. 78. Br. capſulis pendulis clavatis elongatis ſurculis teretibus, foliis radicalibus patentibus longioribus. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 8. *t.* 4. *f.* 10.

cubitale. 79. Br. capſulis pendulis clavatis oblongis, ſurculis ſetiſque inflexis, foliis ſagittatis acutis marginatis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 9. *t.* 5. *f.* 2.

†† *periſtomate ciliato.*

marginatum. 80. Br. capſulis nutantibus, operculo roſtrato, foliis ovato-lanceolatis acutis denticulatis marginatis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 9. *t.* 5. *f.* 1.

dealbatum. 81. Br. capſulis erectis ſubrotundis ſubincurvis dentato-ciliatis, foliis lanceolatis acutis patentibus. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 8. *t.* 5. *f.* 3.

brevifolium. 82. Br. capſulis erectis oblongis attenuatis obſolete ciliatis, foliis confertis linearibus carinatis. *Dill. muſc. p.* 377. *t.* 47. *f.* 39.

flaveſcens. 83. Br. capſulis erectis cylindricis, ſurculis ſubſimplicibus, foliis lanceolato-linearibus carinatis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 4. *t.* 4. *f.* 5.

ericetorum. 84. Br. capſulis erectis ovato-oblongis annulatis, foliis lineari-lanceolatis exſiccatione contortis. *Dill. muſc. p.* 354. *t.* 45. *f.* 13.

patens. 85. Br. capſulis erectis ſubpyriformibus, ſetis breviſſimis, ſurculis erectiuſculis, ramis patentibus ſubfaſtigiatis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 6. *t.* 4. *f.* 8.

††† *periſtomate annulato.*

tetragonum. 86. Br. capſulis erectiuſculis ſubgloboſis, ſurculis tetragonis, junioribus ſcandenti-flexuoſis, foliis adpreſſis ſubulatis, *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 8. *t.* 4. *f.* 9.

1195. HYPNUM. *Gemmæ* in alia utplurimum planta. *Capſulæ* pedunculo laterali ex perichætio prodeunti inſidentes, periſtomate exteriori 16dentato.

* *gemmis capſuliſque in eadem planta, periſtomate ſimplici.* Fiſſidens.

† *fronde pinnata.*

pinniforme. 1. H. fronde ſimpliciſſima, pinnis patentibus ſubulatis, pedunculis radicalibus. *Dill. muſc. t.* 43. *f.* 68. *Swartz obſ. bot. t.* 11. *f.* 2. *an hujus tribus?*

taxifolium. 2. H. fronde ſimplici baſi ſetifera, pinnis oblongis acutis, capſulis oblongis, operculo acuminato. *Flor. dan. t.* 473. *f.* 2.

denticulatum. 3. H. fronde ſubſimplici baſi ſetifera, pinnis cuneiformibus acutis conjugatis, capſulis cylindricis, operculo obtuſo. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 5.

bryoides. 4. H. fronde ſimplici apice ſetifera, pinnis oblongis acutis, capſulis oblongis, operculis acutis. *Flor. dan. t.* 473. *f.* 1.

ſemicompletum. 14. H. trunco filiformi ramoſo, foliis alternis, inferioribus bracteolatis, ſuperioribus lanceolatis ſemivaginantibus pinnatis, capſulis ſubſeſſilibus minimis. *Hedw. crypt.* III, 2. *p.* 34. *t.* 13.

acacioides. 5. H. fronde ramoſa apice pedunculifera. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 4. *an hujus tribus?*

adiantoides. 6. H. fronde ſubramoſa medio ſetifera, pinnis oblongis acutis, capſulis ſubcylindricis, operculis acumine brevi. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 3.

ornithopodioides. 6. H. fronde ramoſa, pinnis patentiſſimis ovatis carinatis mucronatis. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 9.

palmatum. 8. H. fronde ſimpliciſſima ſubpalmata apice pedunculifera, pinnis diſtantibus patentibus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

polypodioides. 9. H. fronde ſimpliciſſima lanceolata erecta apicem verſus pedunculifera, pinnis obtuſis, pedunculis capſuliſque incurvis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

aſplenioides. 10. H. fronde ſubramoſa erecta lineari apice pedunculifera, capſulis incurvis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 140. *Dickſ. crypt. Br.* 2. *t.* 5. *f.* 5. *an cum* 3. *praecedentibus hujus tribus?*

†† *furculis confertis.*

ſciuroides. 11. H. furculo ſubramoſo, foliis imbricatis ovato lanceolatis apice piliferis, capſulis oblongis, operculo conico. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 54. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 45. 46.

polycarpon. 90. H. foliis linearibus ſiccitate criſpis, capſulis ad apicem confertis. *Hedw. cryptog.* II. 4. *p.* 99. *t.* 31.

ſtrumoſum. 91. H. foliis lineari-lanceolatis, capſulis incurvis baſi ad latus intumeſcentibus. *Hedw. cryptog.* II. 4. *p.* 102. *t.* 32.

criſpa- tum. 92. H. erectum, foliis ſubdiſtichis baſi ſemivaginantibus apice capillaribus, capſulis ovatis rectis. *Hedw. cryptog.* II. 4. *p.* 105. *t.* 133.

** *gemmis in alia, capſulis in alia planta*, periſtomatis interni.

ɼ ciliis apice liberis: Neckera.

criſpum. 12. H. ſurculis ramoſis erectiuſculis, foliis diſtichis oblongis obtuſis rugoſis, capſulis oblongis, operculo roſtrato, roſtro reflexo. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 12. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 8. *f.* 47. 48.

viticulo- ſum. 13. H. ſurculis ramoſis decumbentibus, foliis oblongis acutis patulis, capſulis oblongis, operculis conicis. *Dill. muſc. t.* 39. *f.* 43. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 3. *f.* 11. & 2. *t.* 8. *f.* 49. 50.

dendroi- des. 15. H. ſurculo erecto inferne nudo ſuperne faſciculato ramoſo folioſo, foliis lineari lanceolatis imbricatis, capſulis ſubcylindricis erectis, operculi roſtello incurvo. *Flor. dan. t.* 823. *f.* 2.

curtipen- dulum. 16. H. ſurculis erectis ramoſis teretibus folioſis, foliis oblongo-ovatis acutis imbricatis, capſulis nutantibus ovatis, operculis acuminatis. *Dill. muſc. t.* 43. *f.* 69.

ſericeum. 17. H. ſurculo ramoſo repente, foliis oblongis ſeta terminatis ante imbricatis, capſulis erectis cylindricis, operculis acuminatis recurvis. *Curt. flor. Londin. t.* 126.

aduncum. 18. H. ſurculo ramoſo erecto, foliis lineari-lanceolatis falcatis carinatis apice ſetaceis fecundis, capſulis obliquis oblongis, operculis conicis oblongis. *Dill. muſc. t.* 37. *f.* 26.

hetero- mallum. 107. H. trunco inferius ramoſo ſuperius florido, capſulis heteromallis, foliis ovato-acuminatis concavis. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 38. *t.* 15.

filifor- me. 108. H. trunco ſubramoſo filiformi pendulo, foliis ovatis acutis concavis patulis, capſulis baſi annulato-pilifera breviſſime pedunculatis. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 41. *t.* 16.

filicoi- des. 109. H. trunco erecto bifariam ramoſo, ramis approximatis, foliis ovato-acutis concavis, capſulis axillaribus, operculo rugulofo. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 45. *t.* 18.

penna- tum. 110. H. trunco tenui decumbente ramoſo, ramis ſubramoſis, foliis lanceolatis confertis bifariam divergentibus, capſula perichætio immerſe ovata. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 47. *t.* 19.

jamai-cenſe. 111. H. trunco debili ſubramoſo, ramulis patulis bifariis capſuligeris, foliis oblongo-ovatis, vaſorum faſciculo profunde ſulcato. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 43. *t.* 17.

pumilum. 112. H. trunco ramuloſo, foliis lanceolatis reſime acuminatis alternatim confertis bifariam divergentibus, capſula ovata pedunculoque exſertis. *Hedw. cryptog.* III. 2. *p.* 49. *t.* 20.

albicans. 19. H. ſurculo ramoſo aſcendente, foliis oblongo-lanceolatis apice ſetaceis capſulis oblongis obliquis, operculis conicis obtuſis. *Dill. muſc. t.* 42. *f.* 63.

†† *periſtomatis interni ciliis uniformibus baſi membranacea connexis :* Leskea.

trichomanoides. 20. H. ſurculo ramoſo, foliis diſtichis oblongis ſublunatis obtuſis, capſulis ſubcylindricis, operculi roſtello reflexo. *Willdenow prodr. flor. berol. n.* 941.

filifolium. 21. H. ſurculis ramoſis, ramis breviſſimis, foliis ſubulatis acutis, capſulis oblongis, operculis conicis obtuſis. *Dill. muſc. t.* 42. *f.* 62.

flagellare. 93. H. ſurculis repentibus, ramis erectis ſubſimplicibus, foliis lanceolatis acuminatis apice reflexis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 462.

paluſtre. 22. H. ſurculis repentibus vagis ramoſis, foliis ovatis acutis fecundis, capſulis cylindricis, operculis obtuſis. *Dill. muſc. t.* 37. *f.* 27.

myoſuroides. 23. H. frondibus reptantibus ramoſiſſimis, ramis teretibus, foliis ovato-lanceolatis erecte imbricatis pilo terminatis, capſulis cylindricis. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 51.

attenuatum. 24. H. ſurculis ramoſiſſimis, ramis incurvatis apice gracileſcentibus, foliis fecundis ovatis carinatis obtuſis, capſulis erectis cuſpidatis. *Schreb. ſpic. flor. Lipſ. p.* 100. *Hedw. cryptog.* 2. *p.* 34. *t.* 12.

complanatum. 25. H. frondibus complanatis ramoſiſſimis, foliis diſtichis imbricatis ovato-obtuſis complicatis, capſulis ovatis, operculo conico. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 7. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 10. *f.* 62. 64.

ſerpens. 26. H. ſurculis repentibus filiformibus, foliis ſetaceis, capſulis cylindricis inflexis, operculo conico. *Dill. muſc. t.* 42. *f.* 64. A.

ſetaceum. 27. H. ſurculis repentibus, ramis tenuiſſimis filiformibus, foliis ſetaceis, capſulis erectis, operculis acuminatis. *Schrader.*

luteſcens. 28. H. ſurculis procumbentibus, foliis ovato-lanceolatis ſubulatis ſtriatis, capſulis obliquis. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 98.

††† *periſtomatis interni ciliis e membrana difformibus.*

† *frondibus pinnatis.*

Dickſoni. 29. H. fronde ramoſa, pinnis imbricatis acutis diſtichis compreſſis undulatis, perichætio pedunculum æquante. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 8.

ſilvaticum. 30. H. fronde ramoſa decumbente medio pedunculifera, pinnis acutis. *Dill. muſc. t.* 34. *f.* 6.

†† *ſurculis vagis.*

lucens. 31. H. ſurculis ramoſis, frondibus ſubpinnatis, pinnis punctatis. *Dill. muſc. t.* 34.

undulatum. 32. H. ſurculis ramoſis, frondibus ſubpinnatis, foliis undulatis complicatis. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 11.

ſtramineum. 33. H. ſurculis ſubramoſis erectis filiformibus, foliis ovato-lanceolatis enervibus imbricatis. *Dickſ. cryptog. Brit. faſc.* 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 9.

fulgens. 34. H. ſurculis longiſſimis pendulis, frondibus compreſſis, foliolis diſtichis complicato-carinatis nitidis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

diaphanum. 35. H. ſurculis erectis ſubdiviſis, foliis bifariis ovatis acuminatis pellucidis planis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

rugoſum. 36. H. ſurculis erectiuſculis, foliis ſecundis recurvatis baſi rugoſis. *Mant. p.* 131. *Dill. muſc. t.* 37. *f.* 24.

fluitans. 37. H. ſurculis ramoſis, foliis ovatis acutis patulis, capſulis oblongis obliquis, operculis conicis. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 957.

ruſcifolium. 38. H. ſurculis ramoſis, foliis imbricatis lato-lanceolatis, capſulis ſubrotundis, operculo roſtrato. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 466.

triquetrum. 39. H. ramis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis. *Dill. muſc. t.* 38. *f.* 28. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 1. *t.* 7.

ſtriatum. 40. H. ramis recurvis, foliis ovatis lineatis acutis undique patentibus, operculis mucronatis. *Schreb. ſpicil. flor. lipſ. p.* 91. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 1. *f.* 1.

piliferum. 41. H. ramis rectis, foliis ovatis concavis obtuſis apice piliferis, operculis cuſpidatis. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 91.

intricatum. 42. H. ſurculis repentibus, ramis brevibus, foliis laxis lanceolatis acuminatis, capſulis obliquis cernuis, mucrone obliquo. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 99. *Vaill. flor. pariſ. t.* 28. *f.* 2.

albens. 43. H. ſurculis repentibus ramoſis compreſſis, foliis bifariis ovatis acutis pallidis, capſulis ſubnudantibus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

††† *ſurculis pinnatis.*

filicinum. 44. *a.* H. ſurculo ſimpliciter pinnato, foliis oblongis acuminatis reflexis ſecundis, capſulis ſubcylindricis, operculis convexis. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 19.

glabellum. 44. H. ſurculis erectiuſculis ramoſis divaricatis, foliis bifariis imbricatis oblongis obtuſis planis ſubdenticulatis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

proliferum. 45. H. ſurculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. *Curt. flor. Lond. t.* 9.

delicatulum. 46. H. ſurculis ſubproliferis plano-pinnatis cuſpidatis, pedunculis aggregatis. *Dill. muſc. t.* 83. *f.* 6.

parietinum. 47. H. ſurculis plano-pinnatis continuatis, pedunculis aggregatis. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 14. *Hedw. fund. hiſt. muſc. frond.* 2. *t.* 4. *f.* 4.

prælongum. 48. H. ſurculis ſubpinnatis decumbentibus, ramulis remotis, foliis ovatis, capſulis cernuis. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 15.

Criſta caſtrenſis. 49. H. ramulis approximatis, apicibus recurvis. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 20.

abietinum. 50. H. ſurculis teretiuſculis remotis inæqualibus. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 17.

plumoſum. 51. H. ſurculis repentibus, ramis confertis, foliis imbricatis ſubulatis, capſulis erectis. *Dill. muſc. t.* 35. *f.* 16.

†††† *ſurculorum foliis reflexis.*

cupreſſiforme. 52. H. ſurculis ſubpinnatis, foliis ſecundis recurvis apice ſubulatis. *Dill. muſc. t.* 37. *f.* 23.

compreſſum. 53. H. ſurculis compreſſis pinnato-ramoſis, foliis falcatis acuminatis recurvis, capſulis ovatis, operculo brevi conico. *Dill. muſc. t.* 36. *f.* 22.

Schreberi. 54. H. ſurculis pinnato-ramoſis apice ſubulatis, foliis oblongis acutis laxe imbricatis, capſulis oblongis, operculis conicis. *Willden. prodr. flor. Berol. n.* 955.

ſcorpioides. 55. H. ramis vagis procumbentibus recurvis, foliis ſecundis acuminatis. *Dill. muſc. t.* 37. *f.* 25.

patulum. 56. H. ſurculis filiformibus repentibus, ramulis vagis breviſſimis, foliis lanceolatis reflexo-patulis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

ſquarroſum. 57. H. ſurculis ramoſis, foliis lanceolatis acutis, capſulis oblongis, operculis acutis. *Flor. dan. t.* 535. *f.* 2.

loreum. 58. H. ſurculis reptantibus, ramis vagis erectis, foliis ſecundis ſubreflexis, capſulis ſubrotundis. *Dill. muſc. t.* 39. *f.* 40.

reptans. 59. H. ſurculis reptantibus, ramis vagis faſciculatiſque radicantibus filiformibus, foliis capillaribus patulis capſulis nutantibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

††††† *ſurculis faſciculatis.*

faſciculatum. 60. H. ſurculo erecto, ramis terminalibus confertis ſubdiviſis, ramulis compreſſis, foliis oblongis decuſſatis ſparſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 140.

tamariſci. 61. H. ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſubdiviſis, foliis bifariis ſubtus medio auriculatis, foliolis ſubrotundis acutis carinatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 141.

alopecurum. 62. H. ſurculo erecto, ramis faſciculatis terminalibus ſubdiviſis, capſulis ſubnutantibus. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 49. *an cum 2 præcedentibus hujus tribus?*

†††††† *ſurculis teretiuſculis.*

flexile. 63. H. ſurculis repentibus penduliſque longiſſimis flexuoſis, ramulis vagis abbreviatis teretibus recurvis, foliis confertis ovatis patulis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 141.

nigreſcens. 64. H. ſurculis filiformibus pendulis, ramis brevibus teretibus ſparſis, foliis æqualibus ſubulatis patulis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 141.

denſum. 65. H. ſurculis erectis teretibus, ramis vagis ſimpliciuſculis, foliis approximatis lanceolatis acutis carinatis patulis. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 141.

compoſi- 66. H. ſurculis ramiſque pinnato-ſparſis, ramulis confertis,
tum. pedunculis breviſſimis, capſulis erectis, calyptris piloſis.
Swarts nov. pl. gen. & ſp. p. 141.

purum. 67. H. ſurculis pinnato ſparſis ſubulatis, foliis ovatis obtuſis
ſubulatis. *Curt. flor. Lond. t.* 207.

Illece- 68. H. ſurculis ramiſque vagis teretibus erectiuſculis obtuſis.
brum. *Flor. dan. t.* 706. *f.* 1.

polytri- 69. H. ſurculis teretibus erectis ſimplicibus, foliis patulis,
choides. pedunculis brevibus, capſula erecta, calyptra piloſa.
Swarts nov. pl. gen. & ſp. p. 141.

riparium. 70. H. ſurculis teretibus ramoſis, foliis acutis patulis diſtantibus. *Flor. dan. t.* 649. *f.* 1.

cuſpida- 71. H. ſurculis pinnato-ramoſis apice longe cuſpidatis, foliis
tum. oblongo-acuminatis, capſulis cylindricis, operculis
conicis. *Dill. muſc. t.* 39. *f.* 34.

††††††† *ſurculis confertis.*

capillare. 72. H. ſurculis repentibus filiformibus ramoſis, ramis confertis capillaribus, foliis appreſſis ſubulatis, capſulis ovatis erectis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 141.

tomento- 73. H. ſurculis repentibus tomentoſis, ramis vagis confertis
ſum. erectiuſculis, foliis acutis patentibus diſtantibus, capſulis
cylindricis nutantibus, operculis incurvis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 141.

depreſ- 74. H. ſurculis repentibus ramoſis, ramulis depreſſis, foliis
ſum. lineari-lanceolatis patulis, ſiccis criſpis, capſulis nutantibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

tricho- 75. H. ſurculo repente, ramis diſtantibus erectis, foliis capil-
phyllum. laribus patentibus, capſulis erectis. *Sloan. hiſt. jam.* 1.
t. 25. *f.* 1.

veluti- 76. H. ſurculo repente, ramis confertis erectis, foliis ſubu-
num. latis, capſulis ſubnutantibus. *Flor. dan. t.* 475.

micro- 77. H. ſurculis repentibus ramoſis, ramulis filiformibus tere-
phyllum. tibus erectis, foliis incumbentibus ſubulatis, capſulis
obliquis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

ceſpito- 78. H. ſurculis ſimplicibus erectiuſculis tereti-compreſſis,
ſum. foliis ovato-lanceolatis, pedunculis ſurculo brevioribus,
capſulis erectis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

pungens. 79. H. ſurculis teretibus ramoſis apice attenuatis acutis ; foliis lanceolatis ſubulatis patulis rigidiuſculis, pedunculis capillaribus brevibus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

congeſtum. 80. H. ſurculis ramoſis declinatis, ramis erectiuſculis apice inflexis, foliis ſecundis ſubcapillaribus, pedunculis brevibus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

tetragonum. 81. H. ſurculis repentibus, ramis vagis erectiuſculis tetragonis foliis quadrifariam imbricatis concavis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

torquatum. 82. H. ſurculis repentibus, ramis erectis teretibus, foliis ſiccitate ſpiralibus appreſſis, calyptra coriacea, baſi quinquepartita. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

cirrhoſum. 83. H. ſurculis repentibus, ramis ſubdiviſis, foliis ſiccitate revolutis, capſulis globoſis, capſulis baſi multipartitis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

gracile. 84. H. ſurculis repentibus, ramis faſciculatis teretibus erectiuſculis, capſulis erectis ovatis. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 55.

myoſuron. 85. H. ſurculis ramoſiſſimis ſubulatis incurvatis utrinque attenuatis teretibus. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 50.

clavellatum. 86. H. repens, ramis rectis confertiſſimis, capſulis incurvis, operculis reflexis. *Pollich flor. palat. n.* 1055. *ic.*

julaceum. 87. H. ramis erectis teretibus imbricatis obtuſis, perichætiis longitudine fere pedunculorum. *Dill. muſc. t.* 41. *f.* 56.

Halleri. 88. H. ramulis approximatis brevibus, foliis planis recurvatis. *Hall. hiſt. ſtirp. helv. n.* 1734.

nitens. 89. H. ramis breviſſimis, foliis lanceolatis ſubulatis nitentibus. *Dill. muſc. t.* 39. *f.* 37.

*** *incertæ tribus.*

rotundifolium. 94. H. ſurculis repentibus ramoſis, foliis ovalibus patentibus diſtichis, capſulis ovatis dentato-ciliatis cernuis. *Scop. fl. carn.* 2. *p.* 339. *n.* 1333. *t.* 62.

atrovirens. 95. H. ſurculis repentibus ramoſis filiformibus, foliis ovato-lanceolatis laxis, capſulis obovatis ciliatis cernuis. *Dill. muſc. p.* 332. *t.* 43. *f.* 68.

flagellatum. 96. H. ſurculis proſtratis inferne elongatis tenuiſſimis nudis ſuperne ramoſis curvatis ſtellulatis, foliis reflexis, capſulis ciliatis ſubcylindricis. *Dill. muſc. p.* 306. *t.* 39. *f.* 42.

97. H.

medium. 97. H. ſurculis repentibus ramoſis, foliis lato-lanceolatis acutis imbricato-patulis, capſulis erectis cylindricis ciliatis. *Dill. muſc. p.* 331. *t.* 42. *f.* 65.

prolixum. 98. H. ſurculis ramoſis elongatis inferne ſubnudis, capſulis ovatis ciliatis, ſetis aſcendentibus abbreviatis. *Dill. muſc. p.* 238. *t.* 38. *f.* 32. & *t.* 85. *f.* 20.

pulchellum. 99. H. ſurculis confertis erectis, ramis ſubfaſciculatis linearibus, ſetis elongatis, capſulis erectis ſubobliquis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 13. *t.* 5. *f.* 6.

filamentoſum. 100. H. ſurculis confertis filiformibus ramoſis, capſulis ovatis ciliatis, perichætio bulbiformi. *Dill. muſc. p.* 282. *t.* 36. *f.* 18.

molle. 101. H. ſurculis pendulis filiformibus ramoſiſſimis, foliis imbricatis ovatis acutis, capſulis cernuis ſubrotundis. *Dickſ. crypt. Br.* 2. *p.* 11. *t.* 5. *f.* 8.

Smithii. 102. H. ſurculis pinnatis undique ramoſis, foliis ſuborbicularibus ſubconcavis, capſulis ovato-cylindricis, calyptra ſurſum piloſa. *Dickſ. crypt. Br.* 2. *p.* 10. *t.* 5. *f.* 4. *coll. of. driad. pl. n.* 19.

cylindricum. 103. H. ſurculis repentibus, ramis capſuliſque cylindricis, foliis erecte imbricatis ovatis acutis. *Dill. muſc. p.* 322. *t.* 41. *f.* 57.

chryſocomum. 104. H. ſurculis erectis ramoſis, foliis oblongo-lanceolatis acutis multinerviis ſubreflexo patulis. *Dill. muſc. p.* 302. *t.* 39. *f.* 36.

Ratabulum. 105. H. ramis vagis erectiuſculis, foliis ovatis acutis mucronatis patulis, operculis conicis. *Flor. dan. t.* 824. *f.* 2.

1196. JUNGERMANNIA. *Scyphuli* veſiculiferi, *ſquamulæ* gemmiferæ laterales aut *capitula* pulverulenta. *Capſula* pedunculata, nuda, 4valvis, ſeminibus ſubrotundis.

* *cauleſcentes.*

† *frondibus compoſitis.*

† *pinnatis.*

aſplenioides. 1. J. pinnis ovatis ſubciliatis. *Dill. muſc. t.* 69. *f.* 5. 6.

adiantoides. 2. J. frondibus erectis ſubdiviſis, pinnis ovatis obliquis ciliatis, capſulis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 142.

criſtata. 3. J. ſurculis repentibus, frondibus ramoſis erectis, pinnis lanceolatis acuti patentibus incumbentibus margine ſuperiori ferratis ſubtus lobatis conniventibus criſtatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 143.

proſtrata. 4. J. frondibus filiformibus reptantibus proſtratis ſimpliciuſculis, pinnis alternis ovatis integris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 143.

ſphagni. 5. J. frondibus reptantibus latere capſuliferis, pinnis ſubrotundis integerrimis imbricatis ſecundis. *Dickſon. cript. Brit. faſc.* 1. *t.* 6. *t.* 1. *f.* 10.

angulosa. 6. J. pinnis latiuſculis truncatis obtuſe tridentatis medio pedunculiferis, capſula campanulata. *Dill. muſc. t.* 71. *f.* 22. C. D.

javanica. 7. J. ſurculis ramoſiſſimis, pinnis ovatis imbricatis convexis. *Linn. fil. muſc. p.* 35. *f.* 2. *t.* 1.

viticuloſa. 8. J. pinnis planis nudis linearibus. *Dill. muſc. t.* 69. *f.* 7.

polyanthos. 9. J. pinnis integerrimis imbricatis convexis. *Dill. muſc. t.* 70. *f.* 9.

ſcalaris. 10. J. pinnis integerrimis ovatis diſtichis, extremo caule ſetifero. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 701. Mnium Trichomanis. *Dill. muſc. t.* 31. *f.* 5.

lanceolata. 11. J. frondibus lanceolatis apice pedunculiferis, pinnis integerrimis. *Dill. muſc. t.* 70. *f.* 10.

perfoliata. 12. J. frondibus confertis erectis indiviſis, pinnis perfoliatis incumbentibus ſecundis ovatis integris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 143.

bidentata. 13. J. ſurculis procumbentibus ramoſis apice pedunculiferis, pinnis ovatis bicuſpidatis, ſtipulis lanceolatis quadridentatis. *Dill. muſc.* 15. *t.* 70. *f.* 11. *β*) Jungermannia bidentata. *Weiſs cryptog.* 116. *Dill. muſc. t.* 70. *f.* 12.

bicornis. 14. J. pinnis alternis bicuſpidatis, cuſpidibus polliniferis. *Flor. dan. t.* 888.

globulifera. 15. J. pinnis emarginato-bidentatis, dentibus apice globuliferis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 481.

emarginata. 16. J. ſurculis ſimplicibus erectis, pinnis ſubrotundis obtuſe emarginatis integerrimis patentibus exſtipulatis. *Ehrh Hannöv. Mag.* 1784. *n.* 9.

ſetiformis. 17. J. ſurculis ſimplicibus teretibus filiformibus erectis, pinnis quadripartitis, laciniis lato ſubulatis canaliculatis æqualibus, ſtipulis nullis. *Ehrh. Hannöv. Magaz.* 1784. *n.* 9.

bicuſpidata. 18. J. frondibus medio pedunculiferis, pinnis diſtichis inciſo-bifidis. *Dill. muſc. t.* 70. *f.* 13.

ſphærocephala. 19. J. frondibus apice globuliferis, pinnis diſtichis inciſo-bidentatis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 701. Mnium fiſſum. *Dill. muſc. t.* 31. *f.* 6.

connata. 20. J. frondibus vagis, pinnis oppoſitis incumbentibus apice retuſis ſubemarginatis poſterius connatis bidentatis, capſulis terminalibus, perichætiis denticulatis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 143.

quadridentata. 21. J. frondibus proſtratis vage ramoſis apice floriferis, pinnis quadratis ſubquadridentatis. *Wulf. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 154.

quinquedentata. 22. J. frondidus ramoſis apice pedunculiferis, pinnis quinque dentatis. *Dill. muſc. t.* 71. *f.* 23.

tenera. 23. J. frondibus congeſtis repentibus, pinnis alternis diſtantibus ſubrotundis integris, auriculis ſubtus medio minutiſſimis bifidis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 143.

aquatica. 74. J. frondibus teretibus, foliis ſiccis ſubtus excavatis. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 496. *Dill. muſc. t.* 69. *f.* 8.

minuta. 75. J. frondibus erectis ramoſis, pinnis ſubtus auriculatis, foliis ſubrotundis. *Dill. muſc. p.* 481. *t.* 69. *f.* 2.

ventricoſa. 76. J. frondibus medio floriferis, vagina ſphæroidea, foliis bifidis. *Dill. muſc. p.* 489. *t.* 70. *f.* 14.

ſpinuloſa. 77. J. frondibus erectis ramoſis, foliis obovatis dentato-ſpinoſis. *Dill. muſc. p.* 489. *t.* 70. *f.* 15.

pauciflora. 78. J. ſurculis repentibus ramoſiſſimis filiformibus medio floriferis, foliis incurvatis bipartitis, vaginis conicis remotis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 15. *t.* 5. *f.* 9.

macrorhiza. 79. J. ſurculis erectis ramoſis apice floriferis, foliolis alternis retuſis patulis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 16. *t.* 5. *f.* 10.

†† *frondibus ſubbipinnatis.*

pallens. 24. J. frondibus erectis ramoſis, pinnis pinnatis incumbentibus ſubrotundis integris baſi ſemicordatis, perichætiis monophyllis retuſis infundibuliformibus. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 143.

ſimplex. 25. J. ſurculis filiformibus repentibus, frondibus erectis ſimplicibus, pinnis pinnatis ovatis diſtantibus ſerrato-ciliatis, capſulis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 143.

undulata. 26. J. frondibus ſupra bipinnatis apice pedunculiferis, pinnulis ſubrotundis integerrimis undulatis. *Vaill. flor. pariſ. t.* 19. *f.* 6.

nemoroſa. 27. J. frondibus ſupra bipinnatis apice pedunculiferis, pinnulis ciliatis. *Dill. muſc. t.* 71. *f.* 18.

reſupinata. 28. J. frondibus ſupra bipinnatis apice pedunculferis, pinnulis crenulatis imbricatis rotundis. *Dill. muſc. t.* 71. *f.* 19.

ſerrulata. 29. J. ſurculis confertis erectis ſimpliciuſculis obtuſis ſupra bipinnatis, pinnulis ovatis concavis bifidis ſerratis, capſulis terminalibus, perichætio ſubulato. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 143.

juniperina. 30. J. frondibus erectis ſimpliciuſculis rigidis ſupra bipinnatis apice pedunculiferis, pinnulis lanceolato-falcatis bifidis ſecundis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

albicans. 31. J. frondibus ſupra bipinnatis apice pedunculiferis, pinnulis linearibus recurvis. *Dill. muſc. t.* 71. *f.* 20.

capillaris. 32. J. ſurculis repentibus ramoſis capillaribus ſupra bipinnatis, pinnulis ſubimbricatis, omnibus tripartitis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

cupreſſina. 33. J. frondibus procumbentibus confertis pennatis ſupra bipinnatis, pinnulis imbricatis convexis quadrifidis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

trilobata. 34. J. frondibus ſubtus bipinnatis, pinnulis quadratis obſolete trilobis. *Dill. muſc. t.* 71. *f.* 22. 23.

reptans. 35. J. ſurculis decompoſitis medio pedunculiferis, foliis quadratis anterius inciſis, ſtipulis quadrifidis. *Dill. muſc. t.* 71. *f.* 24.

multiflora. 36. J. fronde repente ramoſa, foliolis alternis geminis ſetaceis æqualibus. *Mant. p.* 310. *Pollich. flor. palat. n.* 1063. *ic.*

cochleariformis. 37. J. frondibus ſubteretibus erectiuſculis, foliolis concavis rotundatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 701. Muſcum Jungermania. *Dill. muſc. t.* 69. *f.* 1.

barbata. 38. J. ſurculis elongatis medio pedunculiferis, foliis anterius crenatis, cauliculo ſubtus villoſo. *Schreb. ſpic. flor. Lipſ. p.* 107.

† † *frondibus imbricatis.*

compla-nata. 39. J. furculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis æqualibus. *Curt. flor. Lond. t.* 271.

tranſver-ſalis. 40. J. frondibus tranſverſalibus repentibus duplicato imbricatis, foliis ſubrotundis integris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

flava. 41. J. frondibus repentibus ramoſis duplicato-imbricatis, foliis ſubrotundis, inferioribus minutis bifidis, perichætio monophyllo retuſo. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

diuffuſa. 42. J. furculis ramoſiſſimis, frondibus dichotomis erectis duplicato-imbricatis, foliis ovatis convexis, inferioribus ſubrotundis denticulatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

ſtolonife-ra. 43. J. ſtolonibus reptantibus filiformibus, frondibus erectis confertis ſubdiviſis duplicato-imbricatis, foliis lanceolatis tridentatis ſecundis, inferioribus minimis ſubrotundis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

brachiata. 44. J. frondibus erectis dichotomis duplicato-imbricatis, foliis ovatis planis, inferioribus ſubrotundis convexis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

dilatata. 45. J. ſurculis repentibus foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis apice latioribus. *Dill. muſc. t.* 72. *f.* 27.

tamaris-cifolia. 46. J. ſurculis decompoſitis apice pedunculiferis, foliis ſubrotundis ſubtus auriculatis, ſtipulis ovatis emarginatis. *Dill. muſc. t.* 72. *f.* 31.

atrata. 47. J. ſurculis ramoſiſſimis pendulis capillaribus duplicato-imbricatis, foliis ovatis retuſis, inferioribus minutis cordatis bifidis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

filifor-mis. 48. J. frondibus erectis filiformibus ſimpliciuſculis duplicato-imbricatis, foliis ſubrotundis integris, inferioribus minutis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 144.

platy-phylla. 49. J. ſurculis procumbentibus ſubtus imbricatis, foliis cordatis acutis. *Dill. muſc. t.* 72. *f.* 32. 33.

filicina. 50. J. ſurculis erectis ramoſis pennatis pinnatis linearibus duplicato-imbricatis, pinnis ovatis acutis ſerrulatis, inferioribus ſubemarginatis dentatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

ciliaris. 51. J. ſurculis repentibus ſupra tomentoſis, foliis integris tomentoſiſſimis. *Vaillant. flor. Pariſ. t.* 26. *f.* 11.

vaginata. 52. J. ſurculis repentibus, foliis alternis cuneiformibus retuſis complicatis amplexicaulibus. *Linn. fil. muſc. p.* 35. *t.* 1. *f.* 5.

tomentoſa. 53. J. ſurculis erectis confertis pennatis duplicato-imbricatis, pinnis laciniatis tomentoſis ciliatis, capſulis terminalibus ſolitariis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

varia. 54. J. ſurculis erectiuſculis bifariam imbricatis, foliis bipartitis. *Dill. muſc. t.* 73. *f.* 36.

pulcherrima. 55. J. ſurculis repentibus, foliis duplicato-imbricatis inferne auriculatis ciliatis. *Linn. fil. muſc. p.* 35. *Dill. muſc. t.* 69. *f.* 3. *an. diſtincta ſatis a varia?*

bifaria. 56. J. ſurculis erectis ſimpliciuſculis confertis bifariam imbricatis, foliis ſubſecundis ovatis acutis denticulatis, capſulis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

pygmaea. 57. J. ſurculis ſubramoſis repentibus apice florigeris, foliis orbiculato-concavis ſubimbricatis alterne pinnatis. *Wulf. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 152.

puſilla. 58. J. ſurculis breviſſimis apice floriferis, foliis imbricatis anterius crenatis, cauliculo ſubtus villoſo. *Dill. muſc. t.* 74. *f.* 46.

julacea. 59. J. ſurculis teretibus erectis, foliis undique imbricatis bidentatis, capitulis pedunculatis. *Dill. muſc. t.* 73. *f.* 38.

rupeſtris. 60. J. ſurculis teretibus, foliis ſubulatis ſecundis. *Dill. muſc. t.* 73. *f.* 40.

trichophylla. 61. J. ſurculis teretibus, foliis capillaceis aequalibus. *Dill. muſc. t.* 73. *f.* 37. *an diſtincta ſatis a multiflora & ſertularioide?*

alpina. 62. J. ſurculis teretibus, foliis ovatis patentibus, calicibus imbricatis. *Dill. muſc. t.* 73. *f.* 39.

ſertularioides. 63. J. ſurculis repentibus, ramulis undique floriferis, foliis capillaceis aequalibus articulatis. *Suppl. p.* 449. *Linn. fil. muſc. p.* 35. *t.* 1. *f.* 6.

curvifolia. 80. J. ſurculis repentibus ramoſis teretibus, foliis ſubrotundis acuminatis bifidis, apicibus incurvatis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 15. *t.* 5. *f.* 7.

cinerea. 81. J. ſurculis repentibus ſupra bipinnatis medio floriferis, vagina cylindrica, foliis rotundatis. *Dill. muſc. p.* 498. *t.* 72. *f.* 28.

** *acaules.*

epiphylla 64. J. folio fundi innato. *Flor. dan. t.* 359.

ſinuata. 65. J. fronde plana integra pinnatifidaque ſinuata, laciniis coadunatis obtuſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

pinguis. 66. J. fronde oblonga ſinuata pingui. *Dill. muſc. t.* 74. *f.* 42.

fucoidea. 67. J. fronde erecta ſupra decompoſita, foliis foliolisque oppoſitis, his linearibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

multifida. 68. J. fronde bipinnatifida. *Dill. muſc. t.* 74. *f.* 43.

macro-rhiza. 82. J. fronde bipinnatifida plana ſinuata patula, apicibus inaequaliter bilobis. *Dill. muſc. p.* 511. *t.* 74. *f.* 44.

bipinnata. 69. J. fronde procumbente ramoſa bipinnata, pinnis pinnuliſque linearibus acutis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

furcata. 70. J. fronde lineari ramoſa, extremitatibus furcatis obtuſiuſculis. *Dill. muſc. t.* 74. *f.* 45.

dichotoma. 71. J. fronde lineari dichotoma eretiuſcula. *Swarts nov gen. & ſp. p.* 145.

linearis. 72. J. fronde reptante lineari dichotoma divaricata. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

polyphylla. 73. J. frondibus congeſtis ſubrepentibus laciniatis palmatiſque capſulis radicalibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

1197. TARGIONIA. *Cal.* 2valvis compreſſus, fovens in fundo *capſulam* ſubgloboſam polyſpermam.

hypophylla. 1. T. calicibus dehiſcentibus, fructificationibus ſolitariis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 9.

ſphaerocarpos. 2. T. calicibus apice perforatis, fructificationibus aggregatis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 17.

1198. MARCHANTIA. *Capſula* ſeſſilis, campanulata. *Gemma* peltata, pedunculata.

polymorpha. 1. M. furculis obtuſe lobatis, capſulis ſternatim decemfidis. *Schmidel ic. plant. & anal: part. t.* 9.

umbellata. 2. M. capſulis multilobis, pedunculo tetraëdro. *Dill. muſc. t.* 76. *f.* 6. C. D. & *t.* 77. *f.* 7. D.

triloba. 3. M. capſulis hemiſphæricis trilobis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 502.

hirſuta. 4. M. capſulis hemiſphæricis octofidis hirſutis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 145.

hemiſphærica. 5. M. ſurculis crenatis, capſulis hemiſphæricis quinquefidis. *Flor. dan. t.* 762.

chenopoda. 6. M. capſula dimidiata palmata quadrifida. *Dill. muſc. t.* 77. *f.* 8.

quadrata. 7. M. ſurculis dichotomis, capſula tetragona quadrifida ſubtus quadriloculari. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 487.

cruciata. 8. M. capſula quadripartita, laciniis tubuloſis. *Dill. muſc. t.* 75. *f.* 5.

conica. 9. M. ſurculis dichotomis ſinnatis, capſula conica ſubtus ſubquinqueloculari. *Flor. dan. t.* 274.

triloculariſ. 10. M. ſurculis dichotomis undulatis, capſula hemiſphærica integerrima ſubtus triloculari. *Roth. flor germ.* 1. *p.* 487.

tenella. 11. M. capſula hemiſphærica apiculata, margine lamellis radiato. *Dill. muſc. t.* 75. *f.* 4.

androgyna. 12. M. ſurculis dichotomis linearibus, capſulis hemiſphæricis integris. *Dill. muſc. t.* 75. *f.* 3.

A L G Æ.

1199. BLASIA. *Flos maſculus* ſeſſilis, ſubgloboſus, frondi immerſus.
Flos femineus Piſt. 1. *Capſ.* ovata, 1locularis, tubo coronata, per quem ſemina prorumpunt.

puſilla. 1. Blasia. *Flor. dan. t.* 45.

1200. RICCIA. *Capſulæ* ſeſſiles, globoſæ, 1loculares, frondi ad apicem innatæ, ſemina 20-30 alba vel fuſca hemiſphærica continentes.

cryſtallina. 1. R. frondibus ſuperficie papilloſis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 12.

natans. 2. R. frondibus obcordatis ciliatis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 18.

minima. 3. R. frondibus glabris bipartitis acutis. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 11.

glauca. 4. R. frondibus glabris canaliculatis bilobis obtuſis. *Flor. dan. t.* 898. *f.* 1. *β*) Riccia ciliata.

reticulata. 5. R. fronde difformi laciniata glabra reticulata. *Dill. muſc. t.* 79. *f.* 21.

fluitans. 6. R. frondibus dichotomis lineari-filiformibus. *Dill. muſc. t.* 74. *f.* 47.

fruticuloſa. 7. R. frondibus compreſſis ramoſis, ramis erectis furcatis ſubulatis. *Flor. dan. t.* 898. *f.* 3.

ſinuata. 8. R. frondibus ramoſis, laciniis ſinuatis apice dilatatis crenatis. *Dill. muſc. t.* 19. *f.* 29.

arachnoides. 9. R. frondibus capillaceis implexis. *Flor. dan. t.* 898. *f.* 2.

pyramidata. 10. R. frondibus indiviſis oblongis apice inferne triangulariter incraſſatis, capſulis pyramidatis. *Willden. bot. Magaz.* 4. *p.* 9. *Dill. muſc. t.* 78. *f.* 16.

1201. ANTHOCEROS. *Scyphuli* ſeſſiles, cylindrici integras gemmas granuloſas exhibentes. *Capſ.* ſubulata, ſubbivalvis, ſeminibus diſſepimento adhærentibus.

lævis. 1. A. fronde plana crenata. *Dill. muſc. t.* 68. *f.* 2.

criſpus. 2. A. fronde ſinuato-laciniata undulata margine criſpa non punctata. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 146. *an diſtincta ſpecies.*

punctatus. 3. A. fronde criſpa ſinuato-laciniata punctata. *Flor. dan. t.* 396.

multifidus. 4. A. frondibus bipinnatifidis linearibus. *Dill. muſc. t.* 88. *f.* 4.

1202. LICHEN. *Gemmæ* vel pulverem ſubtiliſſimum inorganicum referentes, vel receptaculis elevatis nitidis farinæ cruſtæ frondisve immixtis contentæ.

* *pulverulenti.*

antiquitatis. 1. L. ater. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus antiquitatis. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 18.

cinereus. 2. L. cinereus, rupes operiens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus ſaxatilis. *an mera prioris varietas ?*

Jolithus. 3. L. ſanguineus ſaxis innaſcens, violas olens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus Jolithus. *Flor. dan. t.* 899. *f.* 1.

flavus. 4. L. flavus, lignis adnaſcens. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus candelaris. *Flor. dan. t.* 840. *f.* 2.

arcumatus. 5. L. croceus. *Schreb. ſpic. flor. Lipſ. p.* 139.

incanus. 6. L. albus, globulis rotundatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus incana. *Dill. muſc.* 3. *t.* 1. *f.* 3.

botryoides. 7. L. viridis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus botryoides. *Flor. dan. t.* 840. *f.* 3.

rubens. 8. L. ruber. *Hoffmann lichen. p.* 4. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 5. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 550. *n.* 1578 *?*

roſeus. 9. L. conglomeratus roſeus. *Schreb. ſpicil. flor. Lipſ. p.* 140. *an lichen.*

odoratus. 10. L. fugax odoratus miniatus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 491. *an mera rubentis varietas ?*

putredinis. 11. L. tenuiſſimus purpureus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 491. *an mera rubentis varietas ?*

luteſcens. 12. L. verrucoſus ſulphureus. *Hoffm. lichen. p.* 3. *n.* 3.

variegatus. 13. L. cruſta rubro alboque colore varia. *Hagen. lichen. p.* 41. *n.* 8. *t.* 1. *f.* 1.

villoſus. 345. L. ater villoſus. *Haller: hiſt. ſtirp. Helv. n.* 1082.

albus. 14. L. pulverulento-cruſtaceus albiſſimus. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 721. Byſſus lactea. *Flor. dan. t.* 840. *f.* 4.

gramineus. 15. L. pulverulento-cruſtaceus elegantiſſime viridis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 491.

ferrugineus. 16. L. pulverulento-cruſtaceus minoſus cinereus. *Hoffm. lichen. p.* 9. *n.* 12. *t.* 2. *f.* 3. *an turberculoſi varietas?*

tuberculoſus. 17. L. pulverulento-cruſtaceus verrucoſus ſubcinereus. *Hoffm. lichen. p.* 9. *n.* 11. *t.* 2. *f.* 1.

farinoſus. 18. L. cruſta pulverulenta candida. *Hoffm. lichen. p.* 8. *n.* 10. *t.* 1. *f.* 1.

** *leproſi.*

γ *tuberculati*, Verrucariæ.

ſcriptus. 19. L. albicans, lineolis atris planis diviſis ſimplicibusque. *Hoffm. lichen. t.* 11. *f.* 2. a. b. c. d. *β)* Lichen hebraicus. *Hoffm. lichen. p.* 13. *t.* 3. *f.* 2. e. *γ)* Lichen pulivaris. *Hoffm. lichen. p.* 14. *t.* 3. *f.* 2. f.

geographicus. 20. L. flaveſcens lineolis ramoſis punctiſque nigris mappam referens. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 5.

rugoſus. 21. L. albicans, lineolis ſimplicibus punctiſque nigris confertis. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 2.

atrovirens. 22. L. viridis, margine tuberculiſque atris. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 14. *f.* 2.

paraſiticus. 23. L. farinoſus albicans, tuberculis ſtipitatis congeſtis nigris. *Hoffm. lichen. p.* 39. *n.* 48. *t.* 8. *f.* 5.

fuſcus. 24. L. viridis, tuberculis ſtipitatis congeſtis fuſcis. *Hoffm. lichen. p.* 39. *n.* 47. *t.* 8. *f.* 4.

byſſoides. 25. L. farinoſus, peltis ſtipitatis ſubgloboſis. *Mant. p.* 133. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 5. *an mera fungiformis varietas?*

fungiformis. 26. L. glauco-vireſcens, tuberculis planis ſtipitatis fuſcis.) *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 196. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 4.

fungoides. 27. L. candidus, tuberculis ſtipitatis capitatis difformibus ſubcarneis ſtipite longioribus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 146.

oculatus. L. fungoſo-papilloſus albus, tuberculis ſeſſilibus ſtipitatiſve nigris. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 17. *t.* 6. *f.* 3.

rufus. 28. L. fuſcus, tuberculis ſtipitatis planis ſubfuciis. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 4.

ericetorum. 29. L. albidus tuberculis ſtipitatis convexis carneis. *Hoffm. lichen. t.* 8 *f.* 3.

capitatus. 30. L. luteo-vireſcens, tuberculis ſtipitatis ſphæricis concoloribus. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 726. Mucor furfuraceus.

albo-cæ-31. L. albus, tuberculis cæruleſcentibus annullo atro circum-
ruleſcens. ſcriptis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 184. *t.* 15. *f.* 1.

ſabuleto-32. L. vireſcens, tuberculis ſubſtipitatis planiuſculis atris. *Schreb.*
rum. *ſpic. flor. Lipſ. p.* 134. *Wulf. ap. Jacq. collect.* 3. *t.* 2. *f.* 1.

Icmado-33. L. cinereus, tuberculis ſeſſilibus planis carneis. *Flor. dan.*
phila. *t.* 472. *f.* 4.

candidus. 34. L. candidiſſimus margine ſublobatus, tuberculis ſeſſilibus glauco-cæruleſcentibus. *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 193. *Hoffm. lichen. t.* 4. *f.* 6.

elvoloi-35. L. glauco-vireſcens, tuberculis ſeſſilibus planis ætate un-
des. dulatis. *Weber ſpicil. flor. gœtt. p.* 186.

viridatus. 36. L. cruſtaceus verniciformis, tuberculis ſeſſilibus planis. *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 187.

querneus. 37. L. fuſco-flaveſcens, tuberculis ſubimmerſis atris. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 3.

hemi-38. L. luteſcens, tuberculis immerſis atris politis. *Hagen. li-*
ſphæricus. *chen. p.* 48. *n.* 15.

coccine-39. L. farinaceus viridi-ſulphureus, tuberculis immerſis ru-
us. berrimis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 8. *t.* 2. *f.* 1.

lacteus. 41. L. albus, tuberculis concoloribus hemiſphæricis. *Mant. p.* 132. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 4. a. b.

rupicola. 42. L. albidus, tuberculis pallidis albo-marginatis. *Mant. p.* 132. *Hoffm. lichen. t.* 6. *f.* 3.

pertuſus. 43. L. verrucis ſubteſſellatis lævigatis pertuſis poro uno alterove cylindrico. *Mant. p.* 131. *Flor. dan. t.* 766. *Hoffm. lichen. p.* 16. 17. *t.* 3. *f.* 3. *β*) *Hoffm. lichen. t.* 3. *f.* 4. *γ*) *Hagen lichen. t.* 1. *f.* 3. *δ*) *Schrank fl. bav.* 2. *p.* 510. *n.* 1489.

puncti-336. L. cinereus, tuberculis punctiformibus nigris pertuſis im-
formis. merſis tandem prominulis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 573.

muſco-44. L. farinoſus incanus, tuberculis atris. *Rethan flor. cant.*
rum. *p.* 424. *ic.*

petræus. 45. L. farinaceus viridi-cineraſcens, tuberculis inæqualibus convexis atris. *Wulfen. berl. Naturforſch. Schr.* 8. *p.* 89. *nonne idem cum l. ſabuletorum ?*

caneſ-46. L. icanus, tuberculis nigris confertis. *Dill. muſc. t.* 18.
cens. *f.* 17. A.

cæruleo- 47. L. cæruleſcens tuberculis nigricantibus. *Lightf. flor. ſcot.*
nigricans. 805. *Dill. muſc. t.* 81. *f.* 2.

eſculen- 48. L. albus, tuberculis rugoſis griſeis. *Pall. it.* 3. *p.* 760.
tus. *t.* 1. *f.* 4.

granifor- 49. L. cruſta albeſcente granulata, tuberculis atris. *Hagen.*
mis. *lichen. p.* 47. *t.* 1. *f.* 2.

concentri- L. albus, tuberculis planis atris ſpiræ in modum congeſtis.
cus. *Linck. Ann. Naturgeſch.* 1. *p.* 36.

conflu- 50. L. ſubcinereus, tuberculis maximis aterrimis ætate con-
ens. fluentibus. *Weber ſpicil. flor. gœtt. p.* 180. *t.* 2.

lutereus. 50*. L. cinereus, tuberculis ſparſis luteſcentibus. *Arboreus. Schrader.*

ſphæroi- 51. L. cinereo-vireſcens, tuberculis globoſis incarnatis.
des. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 2.

flavo- 51*. L. cruſtaceus flavus, tuberculis carnoſis irregularibus
fuſcus. pallide fuſcis. *Ad. arenarium. Schrader.*

ſanguina- 52. L. cinereo-vireſcens, tuberculis atris. *Mant. p.* 507.
rius. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 5. *f.* 3. b. β) *Hoffm. lichen.*
t. 5. *f.* 4. γ) *Hoffm. lichen. t.* 5. *f.* 5.

colliculo- 53. L. cinereo-vireſcens, tuberculis albis. *Hoffm. lichen.*
ſus. *p.* 17. *n.* 19. *t.* 2. *f.* 2. *nonne potius ſphæria ?*

viridulus. 54. L. tuberculis hemiſphæricis viridibus. *Hoffm. lichen.*
p. 18. *n.* 20. *t.* 2. *f.* 6.

ſulphu- 55. L. rimoſus gibboſiuſculus ſulphureus, tuberculis nigris
reus. irregularibus minutis. *Hoffm. lichen. p.* 32. *n.* 40. *t.* 4.
f. 1. *pl. lichen.* 2. *t.* 11. *f.* 3.

fuſco-ater. 56. L. fuſcus, tuberculis atris. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 14.
f. 3. 4. & 3. *t.* 6. *f.* 2. bb.

vernalis. 57. L. albidus, tuberculis ſubrotundis ferrugineis. *Hoffm.*
lichen. t. 5. *f.* 1.

vernici- 58. L. cruſta verniciformi glauco-vireſcente linea duplici
formis. griſea circumſcripta, tuberculis planis albidis. *Roth.*
flor. germ. 1. *p.* 494.

calcarius. 59. L. candidus, tuberculis atris. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 8.

albo-ater. 60. L. albus, tuberculis nigricantibus. *Hoffm. lichen. p.* 30. *n.* 35.

cineraſ- 61. L. tuberculis nigris albo-marginatis. *Mant. p.* 132.
cens. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 14. *f.* 5. 6.

Digitized by Google

atro-albus. 62. L. niger, tuberculis albis ſubmarginatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 14. *f.* 1.

niger. 63. L. ater, tuberculis ſubrotundis concoloribus. *Suppl. p.* 449. *Hoffm. lichen. t.* 3. *f.* 6. β) Lichen terminalis. *Flor. dan. t.* 879. *f.* 1.

Oederi. 64. L. rimoſus ruber, tuberculis nigris congeſtis innatis. *Flor. dan. t.* 470. *f.* 1.

ventoſus. 65. L. flavus, tuberculis rubris. *Flor. dan. t.* 471. *f.* 1. *an cruenti varietas ?*

fagineus. 66. L. albus, tuberculis albis farinaceis. *Hoffm. lichen. t.* 2. *f.* 4. β) *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 11. C. γ) *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 11. A. B. δ) *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 11. D.

beatulinus. 67. L. albus, tuberculo centrali concolore. *Hudſ. flor. angl. ed.* 2. *p.* 525.

ferruginoſus. 68. L. albicans, tuberculis rufis. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 4. & *t.* 55. *f.* 8.

roſaceus. 69. L. tuberculis niveis nigro-punctatis. *Flor. dan. t.* 825. *f.* 1.

cinereo-fuſcus. 70. L. tenuis cinereus, tuberculis fuſcis planis ætate convexis. *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 188.

flavo-vireſcens. 71. L. cruſtaceus tener adhærens albo-ſubvireſcens, tuberculis lentiformibus triſtie luteolis. *Wulfen berl. Naturf. Schr.* 8. *p.* 122. *ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 13. *f.* 46.

flavo-rubeſcens. 72. L. vireſcens, tuberculis flavo-rubeſcentibus. *Hudſ. flor. angl. p.* 443. *n.* 11.

petroſus. 73. L. cruſta ſubnulla, tuberculis duris convexis. *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 190.

circumſcriptus. 74. L. cruſtaceus canus, margine ſerpentino atro, tuberulis diſci lentiformibus concoloribus. *Wulfen. berl. Naturf. Schr.* 8. *p.* 123.

ochrochlorus. 316. L. albicans, tuberculis lævibus ſubgloboſis olivaceo-flavis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 101. *t.* 2. *f.* 1.

rutilus. 317. L. nigricans, tuberculis globoſis ſaturate aurantiis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 101. *t.* 6. *f.* 2. *litt.* c.

calvus. L. albidus nigro-peruloſus, tuberculis pulvinatis ſparſis glabris nitidis obſcure fulvis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 18. *t.* 6. *f.* 4.

r r *ſcutellato-tuberculati.*

carpineus. 75. L. albidus, tuberculis ſeſſilibus confertis, junioribus ſcutelliformibus marginatis, ætate convexis cinerascentibus.

lentiger. 76. L. albus margine ſubfoliaceus, tuberculis confertis ſeſſilibus, junioribus ſcutelliformibus albo-marginatis, ætate convexis flaveſcentibus. *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 192. *Hoffm. lichen.* 2. *t.* 9. *f.* 4.

angulo-ſus. 77. L. ſc. albidus, ſcutellis confertis albidis in tubercula demum abeuntibus. *Schreb. ſpic. flor. Lipſ. n.* 1137.

viridiater. 78. L. pallide e flavo vireſcens, tuberculis atris tandem ſubſcutellatis. *Wulff. apud Jacq. coll.* 2. *p.* 186.

candelarius. 79. L. cruſtaceus luteus, junior pulverulentus ſcutellatus, ætate ſubfoliaceus tuberculoſus. *Hoffm lichen.* 2. *t.* 9 *f.* 3.
β) Lichen flaveſcens. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 18. A. C.

elegans. L. imbricatus margine foliaceus, foliis appreſſis explicatis aurantiis, tuberculis concoloribus. *Linck Ann. Naturg.* 1. *p.* 37.

Linckii. L. pulverulentus flavus, ſcutellis immerſis aurantiis. *Linck Ann. Naturg.* 1. *p.* 37.

gelidus. 80. L. albicans, peltis tuberculoſis rugoſis teſtaceis. *Mant. p.* 133. *Flor. dan. t.* 170. *f.* 2.

carbonarius. 80*. L. farinoſus ater, tuberculis ſcutellisque concoloribus. *Wulfen. Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 93. & *ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 6. *f.* 2. l. bb.

vitellinus. 80**. L. vitellinus, patellis concoloribus. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *p.* 5. *t.* 26. *f.* 1. & *t.* 27. *f.* 2.

virideſcens. 80***. L. viridis, tuberculis confertis rugoſis fuſconigreſcentibus. *Ad arenarium. Schrader.*

androgynus. 81. L. cruſtaceus albicans, tuberculis pulverulentis ſcutellisque pallidis, margine albo crenulato-pulverulento. *Hoffm. lichen. p.* 56. *n.* 70. *t.* 7. *f.* 3.

ocellatus. 82. L. cruſtaceus ramoſus cinereo-fuſceſcens, ſcutellis tuberculisque nigris, margine cinereo integro. *Wulfen Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 96.

griſeus. 84. L. ater tenuiſſimus, tuberculis griſeis. *Willden. bottan. Mag.* 4. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 4.

Hæmatomma. 85. L. tartareus albidus, verrucis marginatis truncatis ſanguineis. *Hoffm. pl. lichen.* 2. *p.* 53. *t.* 11. *f.* 1.

roſatus. 318. L. pallide roſeus cruſtaceo-glebofus late effuſus. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 100. *t.* 1. *f.* 1.

albo-incarnatus. 319. L. tener glebuloſus albus, tuberculis lentiformibus incarnatis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 106. *t.* 2. *f.* 3.

elveliformis. 320. L. glebulis concavo-pelviformibus ſupra rubens, ſubtus & margine albus, tuberculis ſubmarginalibus globoſis atris. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 108. *t.* 3. *f.* 3.

ſanguineo-ater. 321. L. albido-vireſcens, tuberculis hemiſphærico-convexis immarginatis ſaturate ſanguineis ex rubro tandem atris. *Wulff. ap. Jacq. collect.* 3. *p.* 117.

r r r *ſcutellati*, Scutellariæ.

pannoſus. 86. L. cruſtaceus ſubtus nigro-tomentoſus ſuperne ſublobatus obſolete multifidus, ſcutellis convexis rufis. *Swartz. nov. pl. gen. & ſp. p.* 146.

goſſypinus. 87. L. cruſtaceus capillaceus mollis tomentoſus candidus, ſcutellis nigris margine albidis. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 146.

ſcrupoſus. 88. L. cruſtaceus cinereus granoſus, ſcutellis immerſis atris, margine crenulato. *Schreb. ſpicil. flor. Lipſ. p.* 133. *Hoffm. pl. lichen.* 2. *p.* 54. *t.* 11. *f.* 2. β) *Scop. flor. carn. ed.* 2. *n.* 1375.

clauſus. 89. L. cruſtaceus albicans, ſcutellis immerſis concavis clauſis. *Hoffm. lichen. p.* 48. *n.* 62.

fulvus. 90. L. ſc. luteo-viridis, ſcutellis fulvis. *Schreb. ſpic. fil. Lipſ. n.* 1139.

badius. 92. L. cruſtaceus fuſcus, ſcutellis planis badiis. *Swartz nov. act. upſ.* 4.

excavatus. 94. L. cruſtaceus obſcure viridis, ſcutellis immerſis excavatis. *Hoffm. lichen. p.* 47. *n.* 61. *t.* 7. *f.* 4. *nonne ſphæriæ ſpecies?*

æruginoſus. 95. L. cruſtaceus æruginoſus, ſcutellis cernuis. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 275.

flaveolus. 96. L. albido-vireſcens, ſcutellis rubris planiuſculis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 13. *f.* 4. a? β) *Hoffm. lichen. t.* 6. *f.* 6.

tartareus. 97. L. cruſtaceus ex albido vireſcens, ſcutellis flaveſcentibus, margine albo. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 12. 13.

98. L.

luteus. 98. L. cinereo-vireſcens, ſcutellis luteis margine concoloribus. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 6.

cruentus. 99. L. cruſtaceus rimoſus viridi-flaveſcens, ſcutellis rubrofuſcis ſubmarginatis. *Weber ſpicil. flor. goett. p.* 148. *t.* 1. *an diſtinctus a ventoſo?*

rimoſus. 100. L. albicans, cruſta rimoſa, inſulis ſubrotundo-angulofis, ſcutellis glaucis margine albis. *Flor. dan. t.* 468. *f.* 3.

flaveſcens. 101. L. cruſtaceus verrucoſus flaveſcens, ſcutellis rubris, margine albo. *Wulfen apud. Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 79. *t.* 9. *f.* 1. *β)* Lichen flavo rubeſcens. *Hudſ. flor. angl.* 528. *an idem cum ventoſo?*

gibboſus. L. cruſtaceus verrucoſus fuſcus, ſcutellis ſubimmerſis atris cruſta marginatis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 20. *t.* 6. *f.* 5.

Dickſoni. L. ferrugineo-ochraceus, ſcutellis elevatis atro-cæruleſcentibus obtuſe marginatis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 19. *t.* 6. *f.* 6.

fuſco-luteus. L. cruſtaceus granoſo glebaceus albidus, ſcutellis planis ſordide luteis obſolete marginatis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 18. *t.* 6. *f.* 2.

pallidus. 102. L. cruſtaceus ſubvilloſus albicans, ſcutellis elevatis planis ſcabris brunneis, margine albo undulato. *Hoffm. lichen. p.* 50. *n.* 66. *t.* 5. *f.* 2. *an varietas ſubfuſci?*

ſubfuſcus. 103. L. cruſtaceus albicans, ſcutellis ſubfuſcis, margine cinereo ſubcrenato. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1005.

ſalicinis. 103*. L. flavus, ſcutellis convexiuſculis aurantiis margine pallidioribus. *Arboreus. Schrader.*

ater. 104. L. cruſtaceus albicans rugoſus, ſcutellis atris, margine albo ſubcrenato. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 710. Lichen ſubfuſcus. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 16.

palleſcens. 105. L. cruſtaceus albicans verrucoſus, ſcutellis pallidis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 5.

cupularis. 106. L. cruſtaceus albo-vireſcens nigro-punctatus rimoſus, ſcutellis hemiſphæricis dilutiſſime lateritiis, margine convexo exalbido. *Hedw. cryp.* II. 2. *t.* 20. B.

marmoreus. 107. L. ſubcinereus, ſcutellis ſubconcavis intus cerneis exterius & margine ſubhirſutis albis. *Hoffm. lichen. t.* 6. *f.* 4.

rufeſcens. 108. L. cruſtaceus lividus, ſcutellis minutis rufis. *Flor. dan. t.* 825. *f.* 2.

cæruleſcens. 109. L. albido-cæruleſcens, ſcutellis copioſiſſimis concoloribus. *Hagen lichen. p.* 50. *n.* 26. *t.* 1. *f.* 5.

canus. 110. L. cruſtaceus expanſus glauco-candicans, ſcutellis nigerrimis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 5.

aurantiacus. 111. L. albido-cinereus, ſcutellis aurantiacis. *Willden prodr. flor. berol. n.* 1004.

Parellus. 112. L. cruſtaceus albus, peltis concavis concoloribus obtuſis tumentibus. *Hoffm. lichen. p.* 55. *t.* 6. *f.* 2. *pl. lichen.* 2. *t.* 12. *f.* 5.

byſſinus. 113. L. pulverulentus nigricans, ſcutellis planis minutiſſimis flavis albo-marginatis. *Hoffm. lichen. p.* 46. *n.* 59. *t.* 4. *f.* 7.

corallinus. 114. L. ramoſus teres faſciculatus faſtigiatus confertiſſimus albus, ſcutellis terminalibus minutiſſimis concoloribus. *Mant. p.* 131. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 13. *f.* 2.

pezizoides. 115. L. cruſta fugaci-glauca, ſcutellis luteo-fuſcis confertis ſerratis. *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 200. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *t.* 2. *f.* 4.

urceolaris. 337. L. cinereus aut viridis, ſcutellis pallidis hemiſphæricis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 514. *n.* 1501.

upſalienſis. 116. L. cruſtaceus, foliolis ſubulatis ſtriatis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *t.* 2. *f.* 7.

cinereo-fuſcus. 117. L. cruſtaceus cinereus, patellis complanatis rufeſcentibus tenuiſſime marginatis. *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 244. *Hoffm. pl. lichen. t.* 12. *f.* 1.

fulgens. 118. L. cruſtaceus flavicans ſublobatus, verrucis carneis. *Swartz nov. act. Upſ.* 4.

albeſcens. 119. L. cruſtaceus cinereus, ſcutellis planis albis farinaceis. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 11. *an mera faginei varietas?*

verrucoſus. 120. L. cruſtaceus cinereus, ſcutellis vireſcentibus. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 9.

melanoſtictos. 121. L. cruſtaceus albicans, ſcutellis rugoſis nigris. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 15.

flavicans. 122. L. cruſtaceus luteo-vireſcens, ſcutellis flavis. *Dill. muſc. t.* 18. *f.* 18.

ſubimbricatus. 123. L. cruſtaceus cinereus ſubimbricatus, ſcutellis atris confertis margine albo. *Relh. flor. cantabr. p.* 427. *ic.*

minutiſſimus. 124. L. flaveſcens, ſcutellis fuſcis vix prominentibus, margine albo craſſiori. *Hagen lichen. p.* 61. *n.* 29. *t.* 1. *f.* 7.

marmoratus. 125. L. pallide roſeus, ambitu riviſque ſerpentinis, ſcutellis pulverulentis atro-ſanguineis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 178. *t.* B. *f.* 1.

*** *Imbricati.*

† *cruſtacei*, Pſoræ.

muralis. 126. L. flavo-vireſcens, ſcutellis concoloribus demum luteſcentibus, margine pallido. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 130. *Hoffm. lichen.* 2. *t.* 9. *f.* 1. β) Lichen murorum. *Hoffm. lichen.* 2. *p.* 64. *n.* 80. *t.* 9. *f.* 2.

granoſus. 127. L. foliolis oblongis lobatis inciſis cinereis lævibus, ſcutellis nigris, margine crenulato. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 130.

radioſus. 128. L. foliolis obſolete lobatis radiantibus cinereis, ſcutellis minimis fuſcis. *Hoffm. lichen. p.* 62. *n.* 78. *t.* 4. *f.* 5.

cæſius. 129. L. albido-cinereus, ſcutellis concoloribus tuberculis pulverulentis cæſiis. *Hoffm. plant. lichen. faſc.* 2. *p.* 37. *t.* 8. *f.* 1.

cinnabarinus. 130. L. foliolis minutiſſimis linearibus miniatis, ſcutellis concoloribus. *Hoffm. lichen. p.* 62. *n.* 79.

luridus. 131. L. foliolis craſſis minutis luridis ſinuatis ſubtus albidis, ſcutellis nigris. *Swartz nov. act. upſ.* 4. *Dill. muſc. t.* 30. *f.* 134.

melanoleucos. 132. L. depreſſus, fronde glabra obtuſe lobata albida inferne atra. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 9. *t.* 1. *f.* 2.

candidus. 132*. L. Pſ. albicans ſublobatus, tuberculis glaucis cæruleſcentibus. *Web. ſpic. flor. gœtt. n.* 279.

orbicularis. 133. L. Pſ. foliolis margine verrucoſis pulverulentis, ſcutellis fuſco-nigricantibus. *Hoffm. lichen.* 2. *p.* 63. *n.* 85. *t.* 9. *f.* 1.

obſcurus. 134. L. foliolis linearibus multifidis ſubfuſcis, ſcutellis fuſcoatris. *Hudſ. flor. angl. ed.* 2. *p.* 533.

craſſus. 135. L. foliolis rotundatis crenatis vireſcentibus, ſcutellis planis fulvis. *Hudſ. flor. angl. ed.* 2. *p.* 530. *Hoffm. lich.* 3. *t.* 19. *f.* 1.

Acetabulum. 136. foliolis obtuſis lævibus, ſcutellis margine duplicato ſerratis. *Hoffm. lich.* 3. *p.* 92. *n.* 102. *t.* 18. *f.* 2.

tiliaceus. 137. L. rotunde lobatus pulverulentus albido-glaucus. *Hoffm. lich.* 3. *p.* 96. *n.* 104. *t.* 16. *f.* 2.

verruca-138. L. ſcrobiculatus, foliis ſubrotundis ſinuatis, ſcutellis ruſis.
rius. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 1. *f.* 1.

rr foliacei, Pulmonariæ.

carnoſus. L. foliolis confertiſſimis erectiuſculis rotundatis laceris, margine farinaceo, ſcutellis craſſis elevatis planis ruſis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 21. *t.* 6. *f.* 7.

ſquama- L. foliolis minutis craſſiuſculis rotundatis ſinuato-angula-
tus. tis glauco-viridibus, ſcutellis convexo-planis ſcabris nigris obſolete marginatis. *Dill. muſc. p.* 228. *t.* 30. *f.* 135.

centrifu-139. L. foliolis obſolete multifidis lævibus albidis centrifugis,
gus. ſcutellis ruſo-fuſcis. *Hoffm. lich.* 2. *t.* 10. *f.* 3.

ſaxicola. 140. L. foliolis multifidis adpreſſis albo-viridantibus centrifugis, ſcutellis parvis flavicanti-fuſceſcentibus in centro congeſtis, margine albido crenulato. *Polich. flor. palat. n.* 1098. *an idem eum murali?*

leuco- L. foliolis minutiſſimis crenato-multifidis glauco-fuſcis,
phæus. apicibus incraſſatis obtuſiſſimis albo-farinaceis, ſcutellis planis nigris albido-marginatis. *Flor. dan. t.* 955. *f.* 2.

rigidus. 141. L. foliolis teretibus compreſſis ramoſo-multifidis atris centrifugis, ſcutellis ſeſſilibus concavis concoloribus. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 87. *t.* 9. *f.* 6. & *coll.* 2. *t.* 13. *f.* 5.

pictus. 142. L. foliolis multifidis ſinuatis adnatis centrifugis albidis, ſcutellis atris albo-marginatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 146.

ſpecioſus. 325. L. centrifugus ſupra exalbido virore per exſiccationem lacteo-cæruleſcens, foliolis lineari-frondoſis, frondibus pinnatifido-lobatis ciliatis, ſcutellis fuſco-ruſis, margine incano-vireſcente integro crenulatove. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 119. *t.* 7.

querci- 326. L. centrifugus dilute glauceſcens frondoſo-lobatus,
folius. frondibus ſinuato-pinnatifidis, laciniis rotundatis ſinuatis, ſcutellis obſcure rubris albo-marginatis. *Wulff. ap. Jacq. Coll.* 3. *p.* 127. *t.* 9. *f.* 2.

patellatus 227. L. ſaturate viridis depreſſus plicato-lobatus, lobis ſinuato-undatis, ſcutellis ſubcutaneis ſubſeſſilibus ſubcrenulatis concoloribus, exterius tuberculis albis farinaceo-leproſis inæqualibus. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 125. *t.* 9. *f.* 1.

laciniatus. 338. L. foliolis multilobis, lineis elevatis reticulatis farinoſis, ſubtus niger hiſpidus. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 520. *Dill. muſc. t.* 20. *f.* 42. 43.

omphalodes. 143. L. foliolis multifidis glabris obtuſis incanis, punctis vagis eminentibus. β) *Hoffm. lich.* 2. *t.* 12. *f.* 2. b. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 15. *f.* 2. a. b.

lanuginoſus. 144. L. foliolis planis multifidis margine pulverulentis ſubtus lanuginoſis. *Hoffm. lichen. p.* 82. *n.* 97. *t.* 10. *f.* 4.

ciliatus. 145. L. foliolis linearibus multifidis obſcure viridibus, ſcutellis pullis ciliatis. *Hoffm. lichen. p.* 60. *n.* 86. *t.* 14. *f.* 1.

diffuſus. 146. L. foliolis anguſtiſſimis multifidis in centro pulverulentis, ſcutellis ſubfuſcis. *Hoffm. lichen. t.* 70. *n.* 87.

fahlunenſis. 147. L. foliolis linearibus dichotomis planiuſculis acutis nigris, ſcutellis atris. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 10. *f.* 2.

ſtellaris. 148. L. foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis, ſcutellis pullis. *Hoffm. lich.* 2. *t.* 13. *f.* 1. 2.

ſtellariformis. 149. L. foliolis oblongis planis laciniatis, ſcutellis fuſcis. *Hoffm. lichen. p.* 73. *n.* 89. *an diſtinctus ſatis a ſtellari ?*

pullus. 151. L. foliolis lobatis olivaceis, ſcutellis integerrimis. *Schreb. ſpicil. flor. lipſ. p.* 131. *Hoffm. lich.* 3. *t.* 13. *f.* 4. B. *an varietas ſequentis ?*

olivaceus. 152. L. foliolis lobatis nitidis olivaceis, ſcutellis crenatis. β) *Hoffm. lich.* 3. *t.* 13. *f.* 5.

pulchellus. 153. L. canus foliolis ſubpinnato-lobatis centrifugis ciliatis, ſcutellis cinereis albo-marginatis. *Wulf. ap. Jacq. collect.* 2. *p.* 199. *t.* 16. *f.* 2.

pulverulentus. 154. L. foliolis lobatis crenatis obtuſis viridibus polline conſperſis, ſcutellis nigris margine crenatis. *Schreb. ſpicil. flor. lipſ. p.* 128. *Hoffm. pl. lichen.* 2. *p.* 39. *t.* 8. *f.* 2. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *t.* 15. *f.* 2. a. b.

quercinus. 155. L. frondibus obtuſe lobatis glaucis glabris, ſcutellis badiis margine crenatis. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1018.

ſtygius. 156. L. foliolis palmatis recurvis atris. *Hoffm. lich.* 2. *t.* 14. *f.* 2. *plant. lichen.* II. 1. *p.* 3. *t.* 25. *f.* 2.

ſaxatilis. 157. L. foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis badiis. *Hoffm. lich.* 3. *t.* 15. *f.* 1. β) *Hoffm. lich.* 3. *t.* 16. *f.* 1.

Cocoës. 158. L. foliolis ſinuatis candidis adnatis, ſcutellis ſparſis atris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 146.

pariẽti- nus. 159. L. foliolis criſpis fulvis, peltis concoloribus. *Hoffm. lich.* 3. *t.* 18. *f.* 1.

anguſta- tus. 160. L. foliolis linearibus diffuſis crenatis, punctis eminentibus nigris. *Hoffm. lichen. p.* 77. *n.* 94. *t.* 11. *f.* 1.

luteolus. 161. L. viridi-cineraſcens centrifugus, tuberculis lentiformibus aggregatis pallide luteolis. *Wulfen Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 86.

phyſodes. 162. L. foliolis anguſtis apice inflatis, ſcutellis pedicellatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 8.

ſquamo- ſus. 163. L. ſcutellis margine criſpis fuſcis. *Hoffm. lichen. p.* 100. *n.* 107.

atratus. 314. L. ſcutellis atratis concoloribus. *Hedwig cryptogam.* II. 3. *t.* 21. *f.* A.

cerinus. 315. L. cruſtaceus abidus, ſcutellis concoloribus medio cerinis. *Hedw. crypt.* II. 3. *t.* 25. *f.* B.

laqueatus. 322. L. ſupra viridis ſubtus & margine albus, ſcutellis flavis albo-marginatis in hemiſphærica demum tubercula abeuntibus. *Wulf. ap. Jacq. Collect.* 3. *p.* 109. *t.* 5. *f.* 2.

albofla- veſcens. 323. L. albus nodulofo vetrncoſus, ſcutellis aurantiis, magine tumidiuſculo albo. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 111. *t.* 5. *f.* 1.

fuſco-ru- bens. 324. L. tenaciſſimus ex fuſco rubens, ſcutellis rubellis, margine tumido concolore introrſum crenato. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 112. *t.* 2. *f.* 2.

tenax. 165. L. plumbeus ſinuato-lobatus, ſcutellis ſparſis excavatis aureis. *Swarts nov. act. Upſ.* 4.

**** *Gelatinoſi.*

criſpus. 166. L. foliolis imbricatis lobatis truncatis crenatis atro-viridibus, ſcutellis crenulatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 10. *f.* 1.

jacobææ- folius. 339. L. ex atro vireſcens, foliolis multipartitis criſpis, ſcutellis ex atro ſanguineis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 530. *Dill. muſc. t.* 19. *f.* 50.

criſtatus. 167. L. foliolis imbricatis dentato-ciliatis, ſcutellis rubris. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 12. *f.* 1.

pulcher. 168. L. imbricatus viridis exaſperatus undique concolor, ſcutellis ruſeſcentibus, margine crenulato. *Leers flor. herb. ed.* 2. *p.* 259. *Dill. muſc. t.* 19. *f.* 22.

herba- ceus. 169. L. lobatus, folius imbricatis obtuſe crenatis glabris, ſcutellis fulvis. *Hoffm. pl. lich.* 2. *p.* 51. *t.* 10. *f.* 2.

granu- 170. L. imbricatus, foliolis ſubrotundis crenatis ſcabriuſculis latus. atro-viridibus, ſcutellis fulvis, diſco depreſſo. *Suppl. p.* 450. *Dill. muſc. t.* 19. *f.* 24. *Wulf. ap. Jacq. Col. lect.* 3. *t.* 10. *f.* 2.

Tremel-171. L. atro-viridis, foliorum ſegmentis capillaceis ſcutello la. exiguis puniceis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 714. Tremella lichenoides. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 11. *f.* 1.

nigreſ- 169*. L. foliaceus ſubrotundus lobatus rugoſus atro-virens, cens ſcutellis confertis rugoſis. *Suppl. p.* 451. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 10. *f.* 3.

faſcicu-172. L. foliaceus erectus, ſcutellis terminalibus, junioribus laris. concavis vireſcentibus ætate turbinatis refuſcentibus. *Mant. p.* 133. *Flor. dan. t.* 462. *f.* 2.

rupeſtris.174. L. foliaceus lobatus, lobis obtuſis, ſcutellis ſparſis minutis concoloribus. *Linn. fil. de muſc. p.* 37. *Dill. muſc. t.* 19. *f.* 22.

opuntioi-328. L. proſtratus ramoſiſſimus, ramis diffuſis ſubarticulatis des. ſubreniformi-lobatis granulis, globoſis undique obtuſis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 133. *Dill. muſc. t.* 19. *f.* 29.

fugax. 329. L. ſuborbiculatus undoſo-plicatus ſublobatus hyalino-nigricans. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 141. *t.* 12. *f.* 2.

coriifor-330. L. atro-ſubvireſcens repens ſinuato-lobatus, lobis ſube-mis. rectis repando-criſpis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 142.

***** *Foliacei laecinioſi.*

chryſoph-175. L. ſubimbricatus linearis lacerus ciliatus, peltis elevatis thalmus. radiatis fulvis. *Mant. p.* 311. *β*) *Jacq. Collect.* 1. *t.* 4. *f.* 3. a. b. *Nonne potius fruticuloſis accenſendus.*

Burgaſ-176. L. criſpus, peltis elevatis exterius muricato-criſpis, fun-ſii. do depreſſo plano. *Suppl. p.* 450. *Lightf. fl. ſcot. t.* 26.

ciliaris. 178. L. erectiuſculus, laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis. *Flor. dan. t.* 711.

tenellus.179. L. albus tener, laciniis erectiuſculis obtuſis ciliatis ætate tubuloſis apertis, ſcutellis nigris ſeſſilibus. *Dill. muſc. t.* 20. *f.* 46.

islandi- 180. L. aſcendens, marginibus elevatis ciliatis, peltis termina-cus. libus. *Flor. dan. t.* 155. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 2. *t.* 9. *f.* 1.

citrinus. 181. L. lobatus ſupra citrinus ſubtus albus, ſcutellis concoloribus inæqualiter marginatis, diſco rufo. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 60. *t.* 20. C.

Endocar-181*. L. trunco plano minuto rotundato-angulato craſſiuſculo pon. obſcuro-viridi nigro-punctato ſupra albido, peltis immerſis. *Hedw. cryp.* II. 2. *t.* 20. A.

nivalis, 182. L. aſcendens criſpus glaber lacunoſus, margine elevato. *Flor. dan. t.* 227.

pulmo- 183. L. repens ſupra reticulato-lacunoſus ſubtus fuſco-tomen- narius. toſus, peltis marginalibus. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 1. *f.* 2. β) Lichen viviparus. *Roth. bot. Mag.* 4. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 3.

plum- 184. L. repens obtuſe lobatus ſupra lacunoſus vireſcenti- beus. plumbeus globulis farinoſis ſcutellisque croceis albo-marginatis ſparſis ſubtus tomentoſus ferrugineus. *Roth. bot. Mag.* 4. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 2. *an idem cum verrucario ?*

ſepin- 185. L. aſcendens ſubcrenulatus glaber ſuperne caſtaneus, ſcu- cola. tellis concoloribus ſubterminalibus. *Ehrh. hann. Mag.* 1783. *p.* 207. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 1-10.

furfura-185*. L. decumbens furfuraceus, laciniis acutis ſubtus lacu- ceus. noſis atris. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 2. *p.* 45. *t.* 9. *f.* 2.

ampul- 186. L. planiuſculus lobatus crenulatus, peltis globoſis infla- laceus. tis. *Jacq. Collect.* 1. *t.* 4. *f.* 3. c.

leucome-187. L. linearis ramoſus nigro-ſubciliatus, peltis ſubpedun- las. culatis radiatis. *Swarts obſ. bot. t.* 11. *f.* 3.

farina- 188. L. erectus compreſſus ramoſus, verrucis marginalibus ceus. farinoſis. *Dill. muſc. t.* 23. *f.* 63.

linearis. 189. L. erectus dichotomus, ramis linearibus divaricatis altero latere canaliculatis, peltis minutis marginalibus. *Linn. fil. muſc. p.* 36.

Filix, 190. L. fronde ſtipitata bifida laciniata lobata, lobis obtuſis crenatis, ſcutellis ſparſis planiuſculis. *Linn. fil. muſc. p.* 36. *t.* 2. *f.* 2.

calicaris. 191. L. erectus linearis ramoſus lacunoſus convexus mucronatus. *Dill. muſc. t.* 23. *f.* 62. A. B. C.

tincto- 192. L. erectus, laciniis anguſtis compreſſis anaſtomoſanti- rius, bus, extremitatibus liberis furcatis. *Weber ſpic. flor. gœtt.* 241.

fraxi- 193. L. erectus oblongus lanceolatus ſublaciniatus lacunoſus neus, glaber, ſcutellis ſubpedunculatis. *Dill. muſc. t.* 22. *f.* 59.

fucifor- 194. L. rectiuſculus lævis ſubtomentoſus ramoſus, laciniis mis, lanceolatis. *Mant. p.* 507. *Dill. muſc. t.* 22. *f.* 61.

fucoides. L. ramoſiſſimus poroſus albido-canefcens, ramis faſciculatis teretibus, ramulis abbreviatis faſtigiatis ſubulatis obtuſiuſculis, tuberculis lateralibus planiuſculis farinaceis. *Dill. muſc. p.* 167. *t.* 22. *f.* 60.

ſaturninus. L. rotunde lobatus ſupra nigricans ſubtus villoſus cinereus, ſcutellis rufis marginatis. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 21. *t.* 6. *f.* 8.

membranaceus. L. depreſſus plicato-rugoſus farinaceus albido-ſubſulphureus, ſcutellis ſubconcavis concoloribus. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 21. *t.* 6. *f.* 1.

prunaſtri. 195. L. erectiuſculus lacunoſus ſubtus tomentoſus albus. *Dill. muſc. t.* 22. *f.* 54. 55.

fallax. 196. L. tenuis ſuperne glaucus inferne candidus nigro-maculatus, ſcutellis terminalibus. *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 244.

juniperinus. 197. L. criſpus fulvus, peltis fuſcis. *Hoffm. lich. fuſc.* 2. *p.* 35. *t.* 7. *f.* 2.

caperatus. 198. L. pallide viridis rugoſus margine undulatus.

crocatus. 199. L. lacunoſus luteo-rufeſcens flavo-granulatus, laciniis ſinuatis rotundis, ſcutellis ſubconcavis fuſco-atris a fronde marginatis. *Dill. muſc. t.* 48. *f.* 12.

glaucus. 200. L. depreſſus lobatus glaber, margine criſpo farinaceo. *Flor. dan.* t. 598.

japonicus. 201. L. depreſſus inciſo-lobatus farinaceus criſpus ſubtus villoſus. *Thunb. flor. jap. p.* 344.

tremelloides. 202. L. plumbeus rugoſo-criſpus glaber, peltis ſparſis rubris. *Suppl. p.* 450.

ornatus. 203. L. erectiuſculus pellucidus criſpus, ſcutellis marginalibus plano-depreſſis rubris margine criſpis. *Suppl. p.* 450.

tenuiſſimus. 204. L. fuſco-vireſcens, foliis digitato-multifidis, ſcutellis ſubimmerſis fuſco-rufeſcentibus margine obtuſis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 8.

cochleatus. 205. L. membranaceus lobatus plicatus obſcuro-virens, ſcutellis rufis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 13. *t.* 2. *f.* 9.

pinaſtri. 205*. L. aſcendens lobatus criſpus, margine pulverulento flavo. *Hoffm. lich. faſc.* 2. *p.* 33. *t.* 7. *f.* 1. & *t.* 22. *f.* 2.

fraudulentus. 206. L. tenuis ſuperne glaucus inferne candidus nigro-maculatus, ſcutellis terminalibus. *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 244. *Dill. muſc. t.* 22. *f.* 58. *an glauci varietas?*

ſemipin-natus. 204*. L. fronde ſemipinnata canaliculata cinerea. *Leers flor. herb. ed.* 2. *p.* 261. *Dill. muſc. t.* 20. *f.* 46.

damæcor-nis. 207. L. multipartito-dichotomus glaber ſubtus tomentoſus, apicibus bifidis, peltis marginalibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 146.

lacerus. 209. L. depreſſus rigidus irregularis inciſus glaber ſubtus tomentoſus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 146.

flavens. 210. L. foliis lineari-teretibus ramoſis fulvis, ſcutellis planis marginalibus concoloribus. *Swarts. nov. pl. gen. & ſp. p.* 146.

cerato-phyllus. 211. L. rectus, foliolis obtuſis cornigeris. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 147.

diapha-nus. 212. L. membranaceus pellucidus cæruleſcens tenerrimus plicato-undulatus, laciniis criſpis, ſcutellis ſparſis ferrugineis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 147.

marginel-lus. 213. L. membranaceus pellucidus lobatus plicato-undulatus, ſcutellis marginalibus minutis ferrugineis albomarginatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 147.

veſiculo-ſus. 214. L. membranaceus pellucidus lobatus undulatus veſiculoſus, veſiculis turbinatis inferne apertis, apice ſcutelliger, ſcutellis convexis rufis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 147.

diſſectus. 215. L. depreſſus laciniato-lobatus obtuſus lævis utrinque albidus, peltis concavis ſparſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 147.

tomento-ſus. 216. L. depreſſus membranaceus rotundatus inciſo-lobatus læviſſimus, lobis bifidis inferne villoſo-tomentoſus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 147.

roridus. 217. L. foliis pulpoſis calcariis glauco polline villoſis, ſcutellis atris. *Leers flor. herb. ed.* 2. *p.* 260.

pulpoſus. 218. L. foliis pulpoſis calcariis fuſcis, ſcutellis atris. *Leers flor. herb. ed.* 2. *p.* 260.

lobatus. 219. L. fronde rotunde lobata glauca polline concolore ſcabra ſubtus hirta atra. *Leers flor. herb. ed.* 2. *p.* 261. *Michel. nov. pl. gen. t.* 45. *f.* 1.

ſerratus. 220. L. viridis concolor, ſcutellis planis ſerratis. *Leers flor. herb. p.* 261.

lacinio-ſus. 221. L. repens lobatus glaber, lobis ſinuatis, ſcutellis fulvis. *Hudſ. flor. angl. p.* 449. *Dill. muſc. t.* 26. *f.* 99.

cornicu-222. L. erectiuſculus ſublacunoſus glaber, laciniis anguſtis latus. corniculatis. *Relh. flor. cantabr. p.* 433. *Dill. muſc. t.* 21. *f.* 54.

****** *Coriacei*, Pettigeræ.

fluviati-223. L. repens lobatus obtuſus, lobis margine integerrimis, lis. ſupra viridis, ſubtus ochroleucus parum lacunoſus. *Weber ſpic. flor. gœtt. p.* 265. *t.* 4.

aquati-224. L. repens lobatus obtuſus, peltis hemiſphæricis maxi- cus. mis. *Dill. muſc. t.* 20. *f.* 44.

ſcopulo-225. L. rectus compreſſus linearis nitidus, lateribus verrucoſis. rum. *Dill. muſc. t.* 20. *f.* 60.

reſupina-225*. L. repens lobatus, peltis marginalibus poſticis. *Flor.* tus. *dan. t.* 764.

venoſus. 226. L. repens ovatus planus ſubtus venoſus villoſus, peltis marginalibus horizontalibus. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 6. *f.* 2.

aphtho-228. L. repens lobatus obtuſus planus, verrucis ſparſis, pelta ſus. marginali aſcendente. *Flor. dan. t.* 767. *f.* 1.

verruci-229. L. repens lobatus obtuſus planus, lobis pulmariis ſu- fer. perne lente viridibus verrucoſis ſubtus maxima parte atris, peltis lateralibus marginatis. *Weber ſpic. fl. gœtt. p.* 273.

arcticus. 230. L. repens lobatus obtuſus planus lævis ſubtus avenius villoſus.

antariti-231. L. repens lobatus obtuſus planus glaber ſupra lacunoſus cus. ſubtus bullatus, peltis planis ampliſſimis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 370. *t.* 10. *f.* 1.

caninus. 232. L. repens lobatus obtuſus planus ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali aſcendente. *Flor. dan. t.* 767. *f.* 2.

rufus. 233. L. repens profunde lobatus, marginibus obtuſis introflexis, ſubtus villoſus cirris nigricantibus, peltis marginalibus aſcendentibus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 508. *n.* 101. *Dill. muſc. t.* 27. *f.* 103.

polydac-234. L. repens planus lobatus ſubtus venoſo-villoſus, lobis tylos. digitatis divaricatis peltigeris, peltis ovatis aſcendentibus. *Roth. flor. germ.* 1. *pl.* 508. *Hoffm. p. lich. faſc.* 1. *t.* 4. *f.* 1.

horizon-235. L. repens planus ſubtus avenius, peltis marginalibus ho- talis. rizontalibus. *Flor. dan. t.* 533. β) *Flor. dan. t.* 765.

ſilvaticus. 236. L. repens laciniatus lacunoſus, peltis marginalibus aſcendentibus foſſuliſque albis ſphæricis, oſculo regulari. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 4. *f.* 2.

perlatus.237. L. repens lobatus glaber ſubtus ater, ſcutellis pedunculatis integris. *Dill. muſc. t. 20. f. 39. β) Dill. muſc. t. 20. f. 42.*

ſaccatus.238. L. repens ſubrotundus, peltis depreſſis ſubtus ſaccatis. *Flor. dan. t. 532. f. 3.*

croceus.239. L. repens ſubrotundus planus ſubtus venoſus villoſus croceus, peltis ſparſis adnatis. *Flor. dan. t. 263.*

ſarcoides.240. L. gelatinoſus carneus, ſcutellis ſimilibus. *Jacq. miſc. auſtr. 2. t. 22. an tremellæ potius ſpecies?*

perfora-241. L. repens lobatus glaber ciliatus ſubtus ater, lobis extitus. mis aurantiis, peltis perforatis. *Jacq. Collect. 1. p. 116. t. 3.*

fuligino-242. L. repens ſinuato-lobatus ſcaber ſubtus ſpongioſo-villoſus. ſus lacunoſus, ſcutellis planis ferrugineis margine pallidis. *Diſc. crypt. Brit. faſc. 1. p. 13. Dill. muſc. t. 29. f. 100.*

******* *Umbilicati*, Umbilicariæ.

miniatus.243. L. gibbus punctatus ſubtus fulvus. *Jacq. miſc. auſtr. 2. t. 10. f. 3.*

exaſpera-245. L. undique lævis ſuperius aſper, tuberculis contortis tus. nigris. *Hoffm. pl. lich. faſc. 1. p. 7. t. 2. f. 1. 2.*

valleus. 244. L. ſubtus hirſutiſſimus. *Dill. muſc. t. 82. f. 5. Hoffm. pl. lich. II. 1. p. 9. t. 26. f. 3.*

puſtula-245*. L. ſubtus lacunoſus furfure nigro aſperſus. *Flor. dan.* tus. *t. 597. n. 2.*

proboſci-246. L. peltis turbinatis truncatis perforatis. *Hedw. crypt. II.* deus. *1. t. 1. A.*

deuſtus. 247. L. undique lævis ſupra cinereus, tuberculis nigris. *Wulf. ap. Jacq. coll. 3. t. 15. f. 3.*

poly- 250. L. polyphyllus undique lævis atrovinea crenatus. *Dill.* phyllus. *muſc. t. 10. f. 129. & 3. t. 2. f. 4.*

eroſus. 251. L. diaphanus inferne albens fibroſus. *Weber ſpic. flor. gœtt. p. 259.*

polyrhi-252. L. polyphyllus utrinque lævis polyrhizos. *Dill. muſc.* zos. *t. 30. f. 130. Hoffm. pl. lich. faſc. 1. t. 2. f. 3. 4.*

jacquini. 253. L. utrinque lævis plicato-criſpus lobatus ſubtus papilloſus ater ſupra peltis convexo-depreſſis concoloribus notatus. *Jacq. miſc. auſtr. 2. t. 9. f. 3.*

meſen- tericus. 254. L. utrinque lævis plicato-criſpus lobatus ſubtus glaber ſupra pellatus. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 85. *t.* 9. *f.* 5.

anthra- cinus. 255. L. undique lævis plicato-criſpus lobatus, peltis omnino nullis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 9. *f.* 4.

viridis. 256. L. ſubtus niger ſupra viridis, punctis elevatis. *Suppl. p.* 451.

floccu- loſus. 335. L. coriaceus ſuborbiculatus criſpo-lobatus fuſco-niger ſupra ſquamoſo-flocculoſus ſubtus lævis ſublacunoſus. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 99. *t.* 1. *f.* 2.

******** *Scyphiferi.*

folia- ceus. 257. L. foliis aſcendentibus multifido-laciniatis ſubtus niveis ſcyphiferis, ſcyphulis conicis breviſſimis. *Hudſ. flor. angl. p.* 457. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 12.

ſimplex. 258. L. ſimpliciſſimus, ſcyphulis conicis margine integerrimis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 510.

coccife- rus. 259. L. ſimplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 7.

cornuco- pioides. 260. L. ſimplex folio brevior, tuberculis coccineis. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 9. *an mera cocciferi varietas?*

pyxida- tus. 261. L. ſimplex crenulatus, tuberculis fuſcis. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 6. B. C. *et f.* 8. B. β) Lichen prolifer. *Syſt. nat.* XII. 4. *p.* 552. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 6. D.

fimbria- tus. 262. L. ſimplex denticulatus, ſtipite cylindrico. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 8. 9. *an mera pyxidati varietas?*

gracilis. 263. L. dichotomo-ramoſus, tuberculis fuſcis. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 13. C. β) Lichen polycerus. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 535. *Dill. muſc. t.* 15. *f.* 16. E. *an ſola ætate minore a deformi diſtinctus?*

filifor- mis. 264. L. ſimplex integerrimus filiformis, tuberculis fuſcis. *Hudſ. flor. angl. p.* 456. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 10.

digita- tus. 265. L. ramoſiſſimus, ramis cylindricis, calicibus integris nodoſis. *Dill. muſc. t.* 15. *f.* 19. β) Lichen impetiginoſus. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 538. *n.* 1552.

ventrico- ſus. 266. L. ramoſiſſimus ventricoſus, ſcyphis dentatis, tuberculis fuſcis. *Dill. muſc. t.* 15. *f.* 17.

deformis. 267. L. ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calicibus dentatis *For. lapp. t.* 11. *f.* 3.

cornutus. 268. L. ſimpliciuſculus ſubventricoſus, calicibus integris. *Hoffm. plant. lichen.* II. 1. *p.* 1. *t.* 25. *f.* 1. *β*) Lichen clavæformis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 556. *an mera pyxidati varietas ?*

radiatus. 269. L. ſubramoſus cylindricus elongatus, ſcyphis inæqualiter dentatis radiatiſque, tuberculis fuſcis. *Schreb. ſpic. flor. lipſ.* 122. *Dill. muſc. t.* 15. *f.* 16.

flammeus. 272. L. tuboloſus ramoſus retuſus croceus. *Suppl. p.* 451. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 3. *f.* 1. *an fruticuloſis potius adſcribendus ?*

********* *Fruticuloſi*, Coralloides.

botrytis. 270. L. ſubramoſus, tuberculis terminalibus ſphæricis flavobruneis maximis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 512.

triſtis. 271. L. ceſpitoſus, ramis compreſſis ramoſis ſuperne nigricantibus ſcutelliferis. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 1966. *t.* 47. *f.* 1.

rangiferinus. 273. L. perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. *α*) alpeſtris. *Flor. dan. t.* 180. *β*) ſilvaticus. *Flor. dan. t.* 539.

furcatus. 274. L. tuboloſus ramoſus, ramis erectis furcatis. *Hudſ. flor. angl. p.* 458. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 27.

ſpinoſus. 275. L. tuboloſus ſpinoſus ramoſiſſimus, ramulis tuberculatis ſubdigitatis. *Hudſ. flor. angl. p.* 459. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 25.

hiſpidus. 276. L. ſolidus ramoſiſſimus badius, ramis divaricatis ſubcompreſſis glabris ſpinuloſis, angulis obtuſis. *Lightf. flor. ſcot.* 883. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 3. *f.* 2. 3.

uncialis. 277. L. perforatus, ramulis breviſſimis acutis. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 22. *β*) Lichen ceranoides. *Dill. muſ. t.* 16. *f.* 21. *γ*) Lichen ramoſus. *Hall. hiſt ſtirp. helv. n.* 1961.

ſubuliformis. 278. L. tuboloſus filiformis ſubulatus ſimplex ceſpitoſus aſcendens lævis albiſſimus, ramis pauciſſimis breviſſimis ſæpe nullis. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *p.* 15. *t.* 29. *f.* 1-3. *Ehrhart hann. Magaz.* 1784. *n.* 9. *an vere diſtincta ſpecies ?*

ſubulatus. 279. L. ſubdichotomus, ramis ſimplicibus ſubulatis. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 26.

Cuinam tribui inſerendi lichenes a Clariſſ. Fabricio in *Angliæ fodinis carbonariis urbi Whitehaven vicinis reperti*, & *apud* Ill. Ferber *neue Beytr. zur Mineralg. verſch. Länder*, &c. I. *p.* 405. *nominati cryptarum atque urceolatus ?*

vermicel-laris. 280. L. lævis ſubulatus candidus ſubramoſus, ramis diffuſis, tuberculis lateralibus globoſis. *Linn. fil. muſc. p.* 37. *Wulf. ap. Jacq. collect.* 2. *t.* 12. *f.* 2.

globifer. 281. L. ſolidus lævis, tuberculis globoſis cavis terminalibus. *Mant. p.* 133. *Dill. muſc. t.* 17. *f.* 35.

paſchalis. 282. L. ſolidus tectus, foliolis cruſtaceis. *Flor. dan. t.* 251.

ramuloſus 283. L. ſolidus ramoſus tectus, foliolis filamentoſis, tuberculis globoſis ſolidis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 147.

fragilis. 284. L. ſolidus, ramulis teretibus obtuſis. *Dill. muſc. t.* 17. *f.* 34.

ſertularia. 340. L. ſolidus multifidus albus baſi ferrugineus. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 542. *n.* 1553.

ceſpitoſus. 285. L. erectus ſolidus deſiſſime ceſpitoſus ramoſiſſimus, ramis teretibus furcatis obtuſis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 513.

ſiliquoſus. 286. L. ſolidus ſubramoſus, tuberculis lateralibus concavis. *Hudſ. flor. angl. p.* 460. *Dill. muſc. t.* 17. *f.* 38.

aculeatus. 287. L. compreſſus ramoſiſſimus ſolidus caſtaneus, ramis furcatis ſpinuloſis, tuberculis radiatis. *Weber ſpicil. flor. goett. p.* 207. *Hoffm. pl. lich. faſc.* 1. *t.* 5. *f.* 2.

quiſquiliaris. 288. L. cinereus ſcaber, ramis brevibus acutis furfure albido tectis, ſcutellis nigerrimis. *Leers flor. herbom. n.* 993. *Mich. nov. pl. gen. t.* 53. *f.* 8.

melanocarpus. 289. L. ſolidus ramoſus albidus, ramulis foliolisque compreſſis, tuberculis globoſis depreſſis atro-tomentoſis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p* 147.

aggregatus. 290. L. perforatus ramoſiſſimus, ramulis erectis, tuberculis granuloſis aggregatis terminalibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 147.

ſpadiceus. 290*. L. erectus ramoſiſſimus fiſtuloſus, ramis vagis ſpinoſiſſimis, ſcutellis terminalibus magnis laceris ſpinoſis ramiferis. *Roth. bot. Mag.* 4. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 1. *an idem cum aculeato?*

verruciger. 291. L. ſolidus, ramulis teretibus capitatis. *Suppl. p.* 451.

Papillaria. 292. L. fiſtuloſus aphyllus albidus, ramis pauciſſimis obtuſis breviſſimis, tuberculis terminalibus carneis. *Ehrh. Hann. Mag.* 1783. *p.* 218. *Dill. muſc. t.* 16. *f.* 28.

Roccella. 293. L. ſolidus aphyllus ſubramoſus, tuberculis alternis. *Pluckn. alm. t.* 205. *f.* 6.

decipiens. 294. L. ſimplex compreſſiuſculus ſupra lateritius ſubtus margineque albus, ſcutellis nigris convexis marginalibus. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 8. *t.* 1. *f.* B.

cinchonæ. 295. L. teres erectus ramoſiſſimus fulvus. *Wilden. bot. Mag.* 4. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 3.

madreporæformis. 331. L. e viridi canus, cauliculis erectis fiſtuloſis denſiſſime aggregatis apicem verſus digitato-ſubramoſis, ramulorum apicibus dilute fuſcis. *Wulf. ap. Jacq. collect.* 3. *p.* 105. *t.* 3. *f.* 2.

fucinus. 332. L. ater tereti-compreſſus ramoſus, ramulis utrinque tuberculoſo-denticulatis, ſcutellis ſubterminalibus concoloribus ſeſſilibus pedunculatiſque. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 143. *t.* 12. *f.* 3.

muſcicola. L. cruſtæformis ramoſiſſimus, ramis breviſſimis contextis atroviridibus, ſcutellis concoloribus. *Dickſ. crypt. Brit.* 2. *p.* 23. *t.* 6. *f.* 9.

********** *Filamentoſi*, Uſneæ.

floridus. 296. L. ramoſus erectus, ſcutellis radiatis. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *t.* 30. *f.* 2. *Tenax.*

plicatus. 297. L. pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis. *Dill. muſc. t.* 11. *f.* 1. *Tenax.*

barbatus. 298. L. pendulus ſubarticulatus, ramis patentibus. *Dill. muſc. t.* 12. *f.* 6. *Tenax.*

citricolorus. 341. L. erectus ramoſiſſimus flavus ruſeſcens, ramis ſubulatis. *Dill. muſc. t.* 13. *f.* 16.

albidus. 342. L. albus filamentis ſubramoſis longiſſimis complicatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 548. *n.* 1569.

ſaxoſus. 343. L. niger durus. *Dill. muſc.* 2. *t.* 13. *f.* 8.

hippotrichioides. 344. L. ſubſimplex niger capillaris. *Dill. muſc. t.* 13. *f.* 11.

ſubvireſcens. 344. *a.* L. erectus dichotomo-ramoſus, ramis divaricatis apice furcatis nigris. *Hoffm. pl. lichen.* II. 1. *p.* 7. *t.* 26. *f.* 2.

radiciformis. 300. L. teres ramoſiſſimus glaber radiciformis. *Linn. fil. muſc. p.* 37. *an hujus familiæ ?*

ſetoſus. 301. L. ſimplex ſubcompreſſus nigricans, tuberculis globoſis acuminatis atris. *Leyſſ. flor. hal. n.* 1171.

307. L.

divarica-302. L. pendulus angulatus articulatus intus tomentoſus, ra-
tus. mis divaricatis, peltis orbiculatis ſeſſilibus. *Dill. muſc. t.* 12. *f.* 5. *Tenax.*

bicolor. 303. L. ramoſiſſimus erectiuſculus teres inarticulatus glaber inanis nitidus infra nigricans ſupra ſordide albus, ramis patentiſſimis ſubulatis. *Ehrh. hann. Magaz.* 1784. *n.* 9.

uſnea. 304. L. pendulus compreſſus ramoſus lævis. *Mant. p.* 131. *Dill. muſc. t.* 14. *f.* 31. & *t.* 54. *f.* 10.

jubatus. 305. L. pendulus, axillis compreſſis. *Dill. muſc. t.* 12. *f.* 7. *Fragilis.*

lanatus. 306. L. ramoſiſſimus decumbens implicatus opacus. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 10. *f.* 5. *Fragilis.*

pubeſcens. 307. L. ramoſiſſimus decumbens implexus nitidus. *Jacq. miſc. auſtr. t.* 9. *f.* 7. *Fragilis.*

chalybei-308. L. ramoſus divaricatus decumbens implicato-flexuoſus.
formis. *Flor. dan. t.* 262. *Fragilis.*

hirtus. 309. L. ramoſiſſimus erectus, tuberculis farinaceis ſparſis. *Hoffman. pl. lichen.* II. 1. *p.* 17. *t.* 30. *f.* 1. *Tenax.*

vulpinus. 310. L. ramoſiſſimus erectus faſtigiatus inæquali-anguloſus. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 10. *f.* 4. *Fragilis.*

articula-311. L. articulatus, ramulis tenuiſſime punctatis. *Dill.*
tus. *muſc. t.* 11. *f.* 4. *Tenax.*

aurantia-311*. L. ramoſus aurantiacus apicibus ater, ſcutellis ſupra
co-ater. atris ſubtus aurantiis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 369. *t.* 11. *f.* 2.

capenſis. 312. L. ramoſus erectus ciliatus flavus, peltis fulvis radiatis. *Suppl. p.* 451. *Hoffm. pl. lichen. faſc.* 2. *p.* 48. *t.* 10. *f.* 2.

flavidus. 313. L. dichotomo-ramoſus teres erectiuſculus inanis ochroleucos, ramis divaricatis apice furcatis nigris. *Ehrh. Hann. Mag.* 1784. *n.* 9.

gujanen-314. L. purpuraſcens ramoſiſſimus. *Aubl. pl. guj.* 2. *p.* 971.
ſis. *an diſtincta ſpecies.*

reticula-314*. L. ramoſiſſimus decumbens ater, opacus, filamentis re-
tus. ticulatis coadunatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 187. *t.* 13. *f.* 6.

Tttt

1205. FUCUS. *Globuli* carpomorphi, vel *ſemina* graniformia ſub punctis perforatis latentia.

* Veſiculoſi ſ. *veſiculis mucifluis in ſubſtantia frondium aggregatis.*

uvarius. 1. F. caule filiformi ramoſo, foliis confertis ovatis fornicatis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 13. *f.* 1.

lendigerus. 2. F. caule filiformi, ramoſo, foliis lanceolatis ſerratis, veſiculis racemoſis filiculoſis tuberculoſis.

natans. 3. F. caule filiformi ramoſo, foliis lanceolatis ſerratis, veſiculis globoſis pedunculatis. *Rumpf. amb.* 6. *t.* 76. *f.* 1. 2.

acinarius. 4. F. caule filiformi ramoſo, foliis linearibus integerrimis, veſiculis globoſis pedunculatis. *Mant. p.* 508. *Seb. muſ.* 3. *t.* 101. *f.* 3.

ſalicifolius. 5. F. caule ſimplici planiuſculo, foliis lanceolato-linearibus integerrimis, veſiculis globoſis axillaribus ſeſſilibus. *S. G. Gmelin. fuc. p.* 98. *Buxb. cent.* 3. *t.* 65. *n.* 1.

turbinatus. 6. F. caule filiformi ſubramoſo, veſiculis racemoſis, una turbinata folio cordato crenato peltata. *S. G. Gmel. fuc. t.* 5. *f.* 1.

ſerratus. 7. F. fronde plana dichotoma coſtata ſerrato-dentata, veſiculis terminalibus tuberculoſis. *Reaumur. act. Pariſ.* 1711. *t.* 9. *f.* 1.

veſiculoſus. 8. F. fronde plana dichotoma coſtata integerrima, veſiculis axillaribus geminis, terminalibus tuberculatis. *Borrich. act. Hafn.* 1671. *t.* 7.

divaricatus. 9. F. fronde plana dichotoma integerrima, axillis divaricatis, veſiculis axillaribus geminis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 5. *an mera veſiculoſi varietas?*

inflatus. 10. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata ovato-lanceolata inflata, apice diviſo.

ceranoides. 11. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, veſiculis tuberculatis bifidis terminalibus. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 13. *β*) Fucus lacerus. *Sp. pl. p.* 1627. *n.* 4.

ſpiralis. 12. F. fronde plana dichotoma integerrima punctata, inferne lineari-canaliculata, veſiculis tuberculatis geminis. *Flor. dan. t.* 286. *an veſiculoſi varietas?*

canaliculatus. 13. F. fronde plana dichotoma integerrima canaliculata lineari, veſiculis tuberculatis bipartitis obtuſis. *Flor. dan. t.* 244. *β*) Fucus exciſus. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 715. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 11.

geniculatus. 14. F. caule ramisque genicnlatis, fronde dicothoma pellucida æquali, veſicnlis terminalibus. *S. G. Gmelin fuc. p.* 75. *t.* 1. A. *f.* 3.

diſtichus. 15. F. fronde plana dicothomà integerrimà lineari, veſiculis tuberculatis mucronatis. *Flor. dan. t.* 351.

peucedanifolius. 16. F. caule compreſſo ramis ramulsique alternis punctis creberrimis geminis exaſperatis, frondibus ſubdichotomis lanceolato-oblongis, veſiculis terminalibus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 76. *t.* 1. A. *f.* 4.

articulatus. 17. F. caule plano ſubdichotomo articulatò, frondibus lanceolatis geminato-denticulatis, denticulo altero veſicnlam ovatam tuberculatam portante. *S. G. Gmelin fuc. p.* 77.

nodoſus. 18. F. fronde compreſſa dichotoma, foliis diſtichis integerrimis, veſiculis innatis ſolitariis dilatatis. *Fl. dan. t.* 146.

pyriferus. 19. F. ſtirpe filiformi dichotoma, frondibus membranaceis enſiformibus ſolitariis ſerratis, terminalibus petiolo inflatis. *Mant. p.* 311.

ſiliquoſus. 20. F. fronde compreſſa ramoſa, foliis diſtichis alternis integerrimis, veſiculis pedunculatis oblongis mucronatis. *Flor. dan. t.* 106.

ſiliculoſus. 21. F. fronde filiformi-compreſſa, foliis alternis ſubſerratis, veſiculis ſubgloboſis pedunculatis mucronatis.

denticulatus. 22. F. caule tereti ramoſo, foliis linearibus denticulatis, veſiculis globoſis pedunculatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191.

undulatus. 23. F. caule tereti ſubramoſo, foliis confertis ſeſſilibus ovalibus denticulatis undulato-criſpis, veſiculis pedunculatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191.

ſubrepandus. 24. F. caule compreſſo, ramis alternis, foliis lineari-lanceolatis ſubrepando-dentatis, veſiculis pedunculatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 192.

elongatus. 25. F. fronde filiformi compreſſa dichotoma articulata, geniculis tumidiuſculis. *Reaum. act. Pariſ.* 1712. *p.* 24. *f.* 2.

Roſa marina. 26. F. caule tereti carnoſo ramoſo, foliis perfoliatis verticillatis ſubternis annulò in medio notatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 102. *t.* 5. *f.* 2. & 2. a.

loreus. 27. F. fronde filiformi compreſſa dichotoma undique utrinque tuberculata. *Flor. dan. t.* 710. *an hujus tribus?*

fœniculaceus. 28. F. fronde filiformi ramoſiſſima, veſiculis ovatis terminatis foliolis multipartitis obtuſi apice granuloſis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 86. *t.* 2. a. *f.* 3. β) Fucus barbatus. *Sp. plant. n.* 19.

Myrica. 29. F. caule hirto ramoſiſſimo, ramis alternis tenuiſſime alternatim denticulatis, veſiculis globoſis pellucidis pedunculatis ramos terminantibus in dentes exeuntibus. *S. G. Gmelin fuc. p.* 88. *t.* 3. *f.* 1.

abrotanoides. 30. F. caulibus filiformibus teretibus ramoſis, frondibus lineari-multifidis integerrimis, veſiculis ramorum ramulorumque medio immerſis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 89. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 17.

baccatus. 31. F. caule lignoſo teretiuſculo ramoſo, veſiculis lateralibus pedunculatis immerſisque. *S. G. Gmelin fuc. p.* 90. *t.* 3. *f.* 2. *an diſtincta ſatis ſpecies?*

triqueter. 32. F. fronde ancipiti ramoſa, foliis petiolatis denticulatis, veſiculis immerſis oblongis triquetris. *Mant. p.* 312.

granulatus. 33. F. fronde filiformi ramoſiſſima, ramulis accumulatis, veſiculis ſubrotundis cumulatis, ramulis foliisque acutis omnibus innatis. *Flor. dan. t.* 591.

ſelaginoides. 34. F. fronde filiformi ramoſiſſima, ramis dichotomis, foliis ſubulatis alternis baſi veſiculoſis. *Mant. p.* 134. *S. G. Gmelin fuc. p.* 83. *t.* 2. a. *f.* 1.

concatenatus. 35. F. fronde filiformi ramoſiſſima, ramulis dichotomis, veſiculis moniliformibus diſtantibus innatis, foliis ſubulatis.

racemoſus. 36. F. caule tereti repenti-ramoſo aphyllo, veſiculis obovatis conferte racemoſis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191.

trinodis. 37. F. caule tereti ramoſo, ramulis in tres veſiculas inflectis apice ſubulatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 192.

ſeticuloſus. 38. F. teres ramoſus ſparſim papilloſus, ramis baſi in veſicam papilloſam ampliatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 190.

penicilliformis. 39. F. caule plano firmo alato, foliis amplexicaulibus oppoſitis ovato-oblongis, veſiculis ad foliorum exortum ternis. *Seb. muſ.* 3. *p.* 186. *t.* 98. *f.* 1. *an vere diſtincta ſpecies?*

edulis. 40. F. caule tereti glabro ramoſo, ramulis confertis erectis apice bifidis. *Rumpf. amb.* 6. *p.* 181. *t.* 74. *f.* 3. & *t.* 76. A. B. C.

angulatus. 41. F. caule planiuſculo, ramis divaricatis dichotomis apice bifidis, verrucis lateralibus axillaribusque ſparſis minutis opacis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 112.

viridis. 42. F. ſtirpe tereti, ramis ramoſiſſimis capillaceis. *Flor. dan. t.* 887. *an hujus tribus?*

rotundus. 43. F. mollis, caule tereti dichotomo, verrucis difformibus caulium ramorumque medio immerſis. *S. G. Gm. fuc. p.* 110. *t.* 6. *f.* 3.

furcellatus. 44. F. fronde filiformi dichotoma ramoſiſſima acuminata. *Flor. dan. t.* 419.

faſtigiatus. 45. F. fronde filiformi dichotoma ramoſiſſima faſtigiata obtuſa. *Flor. dan. t.* 393.

lanoſus. 46. F. frondibus capillaceis dichotomis ramoſiſſimis ſcabris.

** globuliferi, *globulis ſimplicibus per plantam ſparſis.*

pſeudoceranoides. 47. F. caulibus ramoſis infra teretibus, globulis inſignibus lateralibus congeſtis pellucidis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 119. *t.* 7. *f.* 4. *an vere diſtincta ſpecies?*

lichenoides. 48. F. cartilagineus pellucidus albus, caule ſuperne flexuoſo ramoſiſſimo, ramulis denticulatis ſubdichotomis, globulis pellucidis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 120. *t.* 8. *f.* 1. 2.

Burſa paſtoris. 49. F. caule ſuperne ramoſo, ramis pinnato-ramoſis, ramulis denticulatis, extimorum ad apicem ſquamulis reniformibus alatis ſeſſilibus apice mucronatis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 121. *t.* 8. *f.* 3.

triangularis. 50. F. caule ramisque linearibus triquetris ſerratis, denticulis trifariam imbricatis patentibus bimucronatis, globulis ſeriatis ſeſſilibus. *S. G. Gm. fuc. p.* 122. *t.* 8. *f.* 4.

capitatus. 51. F. caule tereti-depreſſo, ramis teretibus ſubulatis alternis confertiſſimis, globulis racemoſis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 123.

corymbiferus. 52. F. fronde lineari plana dichotoma elongata nigra, laciniis arrectis alternis diſtantibus in denticulos exeuntibus, globulis terminalibus creberrimis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 124. *t.* 9.

dentatus. 53. F. membranaceus enervis rubens, fronde ſubpinnata, laciniis denticulatis creberrime punctatis. *Mant. p.* 135. *Flor. dan. t.* 354.

Pilularia. 54. F. caule plano, ramis alternis, fronde pinnatifida, laciniis lanceolatis ſerratis mucronatis, globulis ſolitariis.

Tttt 3

gemluisque ſeſſilibus pedunculatisque. *S. G. Gmelin fuc. p.* 126. *t.* 10. *f.* 2.

hirſutus. 55. F. fronde filiformi tereti dichotoma obtecta undique hirſutie. *Mant. p.* 134. *t.* 11. *f.* 1.

ericoides. 56. F. filiformis ramoſiſſimus hirtus. *S. G. Gm. fuc. t.* 11. *f.* 2.

aculeatus. 57. F. fronde filiformi compreſſa ramoſiſſima, dentibus marginalibus ſubulatis alternis erectis. *Flor. dan. t.* 355. β) Fucus muſcoides. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 317. *S. G. Gmel. fuc. t.* 12.

lycopodioides. 58. F. fronde filiformi tereti ſubramoſa obtecta undique ſetis. *Flor. dan. t.* 357.

diſcors. 59. F. fronde tereti inermi aculeatiſſima, foliis diſtichis ſubpinnatis lineari-lanceolatis ſerratis.

marginalis. 142. F. ſubcartilagineus, fronde filiformi tereti compreſſa ramoſiſſima, margine laterali utroque ſupra tuberculis umbilicatis obſito. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 153.

muſciformis. 143. F. fronde membranacea filiformi ramoſiſſima, ramulis ſetaceis, marginibus caulis ramorumque ciliatis. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 154. *t.* 14. *f.* 3.

Tendo. 60. F. fronde filiformi ſimplici cartilaginea ſubdiaphana. *Amoen. ac.* 4. *t.* 3. *f.* 2.

Filum. 61. F. fronde filiformi ſubfragili opaca. *Flor. dan. t.* 821.

longiſſimus. 62. F. cartilagineus, caule erecto tereti, ramis longiſſimis, globulis lateralibus ſeſſilibus. *S. G. Gm. fuc. p.* 134. *t.* 13.

ſcorpioides. 63. F. lividus, caule tereti lignoſo, ramis apice capillaribus ſupra dentatis, dentibus tumidiuſculis, recurvatis. *Flor. dan. t.* 887.

confervoides. 64. F. filiformis teres ramoſiſſimus, ramis ſimplicibus, globulis lateralibus. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 14. *f.* 1.

albus. 65. F. filiformis teretiuſculus ſubdichotomus, geniculis tumidiuſculis, ramis diſtantibus acutis. *Hudſ. flor. angl. p.* 470. *n.* 20.

purpureus. 66. F. filiformis teres ramoſiſſimus, ramis alternis, ramulis confertis globuliferis. *Hudſ. flor. angl. p.* 471. *n.* 22.

corallinoides. 67. F. caulibus tereti-triquetris, ramis alternis patentibus, ramulis utrinque denticulatis ſuperne dichotomis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 141.

plicatus. 68. F. capillaris uniformis ramoſiſſimus implicatus ſubdiaphanus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 142. *t.* 14. *f.* 2.

corneus. 69. F. cartilagineus, caule teretiuſculo compreſſo ramoſiſſimo, ramis ſubpinnatis, laciniis acutis globuliferis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 144. *t.* 14. *f.* 3.

capillaceus. 70. F. cartilagineo-membranaceus, caule teretiuſculo, medio complanato, ramis oppoſitis congeſtis, foliolis ſetaceis apice globuliferis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 146. *t.* 15. *f.* 1.

rudis. 71. F. caule tereti ramoſiſſimo, ramulis alternis faſciculatis breviſſimis tuberculatis ſcabris. *S. G. Gmelin fuc. p.* 147. *t.* 15. *f.* 2.

aphyllanthos. 72. F. cartilagineus, caulibus teretibus implexis, ſetis terminalibus ſubulatis apice incraſſatis vel bifariam divaricatis, globulis ad divaricationem pellucidis. *S. G. Gm. fuc.* 148. *Buxb. cent.* 2. *t.* 9. *f.* 1.

ſericeus. 73. F. caule planiuſculo ramoſo, ramis ſuperioribus corymboſis, ſetis tenuiſſimis creberrimis per paria oppoſitus. *S. G. Gm. fuc. p.* 149. *t.* 15. *f.* 3.

ſerra. 74. F. caule cartilagineo ſimplici proſtrato ſetis ſubulatis per paria oppoſitis obſeſſo. *S. G. Gmel. fuc. p.* 150. *Buxb. cent.* 2. *t.* 8. *f.* 3.

ſertularioides. 75. F. cartilagineus, caule erecto depreſſo tenuiſſimo ramoſo, frondibus ſetiformibus imbricatis pinnatis, pinnis numeroſiſſimis incurvis integerrimis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 151. *t.* 15. *f.* 4.

plumoſus. 76. F. frondibus cartilagineis lanceolatis bipinnatis glumoſis, caule filiformi compreſſo ramoſo. *Mant. p.* 134. *Flor. dan. t.* 350.

Oſmunda. 77. F. caulibus teretibus ramoſiſſimis, apice obtuſo incraſſatis globuliferis, frondibus copioſiſſimis cartilagineis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 155. *t.* 16. *f.* 2.

pinnatifidus. 78. F. frondibus planis ramoſis, ramis dentato-pinnatifidis margine calloſis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 156. *t.* 16. *f.* 3.

abrotanifolius. 79. F. fronde filiformi compreſſa bipinnata, apicibus veſiculoſis dilatatis terminatis globulis hinc tuberculatis. *S. G. Gmel. fuc. t.* 17. *f.* 1.

cartilagineus. 80. F. fronde cartilaginea compreſſa ſupra decompoſito-pinnata, laciniis linearibus. *Giſeck. pl. ic. faſc.* 1. *t.* 25.
β) Fucus placomium. *S. G. Gmel. fuc. p.* 153. *t.* 16. *f.* 1.

piſtillatus. 81. F. cartilagineus, caule depreſſo ramoſo, ramis ſetiferis, ſetis ſubulatis ex oppoſito pinnatis, apice globuliferis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 159. *t.* 18. *f.* 1.

crinitus. 82. F. cartilagineus, caule plano ramoſiſſimo, ramulis denticulatis, dentibus ſimplicibus dichotomisque, globulis ſparſis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 160. *t.* 18. *f.* 2. *an hujus tribus?*

ſpinuloſus. 83. F. cartilagineus, caule ramoſiſſimo inferne depreſſo teretiuſculo, ramis explanatis patentibus, ramulis ſuboppoſitis utrinque pinnatim ſetiferis, ſetis ſubulatis apice incraſſatis. *S. G. Gmelin fuc. p.* 161. *t.* 18. *f.* 3.

vermicularis. 84. F. mollis pellucidus, caulibus teretibus ramoſis, frondibus teretibus alternatim ſubpinnatis petiolatis breviſſimis apice tumeſcentibus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 162. *t.* 18. *f.* 4.

gigantinus. 85. F. fronde cartilaginea filiformi-compreſſa dichotoma, globulis pedunculatis terminalibus ſubjacente ariſta.

ſpinoſus. 86. F. aphyllus cartilagineus ramoſus, denticulis verticillatoternis. *Mant. p.* 313. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 15. *f.* 1.

ſpermophorus. 87. F. fronde membranacea dichotoma compreſſa capillacea, globulis pedunculatis lateralibus, foliis linearibus multifidis.

papilloſus. 88. F. aphyllus, caule tereti ramoſo, undique ſeriebus ſpiralibus papillarum apice multilobarum. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 190.

ceſpitoſus. 89. F. caule tereti ramoſo confertim papilloſo, papillis attenuatis ſimplicibus ramuloſis. *Forsk. flor æg. arab. p.* 190.

uvifer. 90. F. teres, ramis ſparſis, glandulis confertis ovatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 192. *an cum 2 præcedentibus hujus tribus?*

*** peniciliferi, *corpuſculis ovatis penicillo terminatis.*

Gærtnera. 91. F. caulibus filiformibus, ramis numeroſis trifariam alternis, mediis longiſſimis, corpuſculis peniciliferis ternis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 164. *t.* 19.

Baillouviana. 92. F. caule ſupra planiuſculo ramoſo, filamentis penicillorum minutiſſimis congeſtis laxis fluitantibus. *Griſel. epiſt. cum ic.*

Baſtera. 93. F. caule tenui ſuperne ramoſo, corpuſculis monoſpermis ovatis alternis. *Baſt. op. ſubſ.* 2. *l.* 3. *p.* 127. *t.* 12. *f.*

Digitized by Google

**** membranacei, *fronde pellucida colorata, prolibus deciduis.*

volubilis. 94. F. fronde plana ſpirali perfoliata repando-dentata. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *t.* 13. *f.* 2.

ſanguineus. 95. F. frondibus membranaceis ovato-oblongis integerrimis petiolatis, caule tereti ramoſo. *Mant. p.* 136. *Flor. dan. t.* 349.

ciliatus. 96. F. frondibus membranaceis lanceolatis proliferis ciliatis. *Mant. p.* 136. *S. G. Gmel. fuc. t.* 20. *f.* 2. β) Fucus ciliatus. *S. G. Gmel. fuc. p.* 176. *t.* 21. *f.* 1.

holoſetaceus. 97. F. frondibus membranaceis ſubpinnato-ramoſis enervibus, diſco & margine ſetis ſimplicibus dichotomisque. *S. G. Gmel. fuc. p.* 177. *t.* 21. *f.* 2.

ligulatus. 98. F. frondibus membranaceis planis enerviis, margine ſetis longiſſimis ſimplicibus dichotomisque ciliato. *S. G. Gmel. fuc. p.* 178. *t.* 21. *f.* 3.

laceratus. 99. F. frondibus membranaceis aveniis glaberrimis margine undulato-ciliatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 179. *t.* 21. *f.* 4.

criſpus. 100. F. frondibus membranaceis dichotomis, laciniis dilatatis. *Mant. p.* 134. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 8. *f.* 6.

criſpatus. 101. F. frondibus membranaceis ſublinearibus ramoſiſſimis criſpis coloratis. *Flor. dan. t.* 826.

alatus. 102. F. frondibus membranaceis ſubdichotomis coſtatis, laciniis alternis decurrentibus bifidis. *Mant. p.* 135. *Flor. dan. t.* 352.

rubens. 103. F. frondibus membranaceis oblongis undulatis ſinuatis, ſtirpe tereti ramoſa. *Mant. cent.* 32. *t.* 32. *an idem cum F. Palmetta?*

venoſus. 104. F. fronde plana oblonga picta venis verrucoſis. *Mant. p.* 312.

vittatus. 105. F. frondibus membranaceis diviſis enſiformibus dentato-criſpatis. *Flor. dan. t.* 353. β) Fucus cornatus. *Mant. p.* 312.

ramentaceus. 106. F. frondibus filiformibus ſimplicibus, hinc ramentis foliaceis confertis. *Flor. dan. t.* 356.

contortus. 107. F. frondibus planis enervibus apicem verſus proliferis ad axillas ſubcontortis margine denticulatis utrinque ſubundulatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 181. *t.* 22. *f.* 1.

laciniatus. 108. F. frondibus membranaceis ramoſis, ramis dilatatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 181. *t.* 22. *f.* 2.

Palmetta. 109. F. caule plano ramoſo, frondibus membranaceis aveniis multifido-palmatis crenatis undulatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 183. *t.* 22. *f.* 3. & *t.* 23.

crenatus. 110. F. caule tereti ramoſo, frondibus membranaceis ovatis nervoſis crenatis ſubundulatis pinnato. *S. G. Gmel. fuc. p.* 182. *t.* 24. *f.* 1.

polypodioides. 111. F. caule teretiuſculo flexuoſo ramoſo, foliis membranaceis enervibus alternatim pinnatis obtuſis integerrimis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 186. *Mart. cent. t.* 32. *n.* 1.

Koelreuteri. 112. F. membranaceo-cartilagineus, caule breviſſimo tereti ramoſo, frondibus integris linearibus, adultioribus papilloſis. *Koelreut. act. Petrop.* 11. *p.* 424. *t.* 23. *f.* 1. 2.

digitatus. 113. F. fronde palmata, foliolis enſiformibus, ſtirpe tereti. *Mant. p.* 134. *Flor. dan. t.* 392.

bicornis. 114. F. fronde membranacea pulverulenta dilatata apice bifida. *S. G. Gmel. fuc. p.* 192.

ſerrulatus. 115. F. caulibus teretibus ramoſis, foliis linearibus ſerrulatis ſimplicibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 189.

linearis. 116. F. frondibus planis linearibus dichotomis ſenſim anguſtioribus apice acutis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 190.

plumaris. 117. F. caule tereti repente ſurſum ramoſo, ramis plumiformibus foliatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 190.

laminoſus. 118. F. frondibus planis dichotomis ſenſim latioribus margine nudis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191.

foliifer. 119. F. frondibus planis ſenſim dilatatis dichotomis, extimis verrucoſis margine & apice folia lineari-lanceolata integra protrudentibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191.

truncatus. 120. F. frondibus membranaceis trichotomis tetrachotomiſque, laciniis truncatis apice crenato-criſpis. *Pall. it.* 3. *p.* 760.

glacialis. 121. F. fronde plana lineari dichotomo multifida ramoſiſſima ramentis ſubtiliſſimis ciliata. *Pall. it.* 3. *p.* 760.

filicinus. 144. F. fronde coriacea teretiuſcula ramoſiſſima ramis in orbem diffuſis apicem verſus ramoſo-frondoſis. *Wulf. ap. Jacq. col.* 3. *p.* 157. *t.* 15. *f.* 2.

fruticuloſus. 145. F. caule coriaceo tereti filiformi ſupra decompoſito-ramoſiſſimo, ramis ſubſetaceis alternatim laxe ramuloſis, ramulis exiguis ſubpinnato-denticulatis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 3. *p.* 159. *t.* 16. *f.* 1.

***** radicati, *radice ramoſa affixi, bullis frondium muciſluis.*

palmatus. 122. F. fronde palmata plana. *S. G. Gmel. fuc. t.* 26.

buccinalis. 123. F. ſtirpe fiſtuloſa, fronde pinnato-palmata coriacea, foliolis enſiformibus integerrimis. *Mant. p.* 312.

eſculentus. 124. F. fronde ſimplici indiviſa enſiformi, ſtirpe tetragona pinnata folium percurrente. *Mant. p.* 135. *Flor. dan. t.* 417.

ſaccharinus. 125. F. fronde ſubſimplici enſiformi, ſtirpe tereti breviſſima. *Flor. dan. t.* 416.

bifidus. 126. F. cartilagineus, frondibus ſubſeſſilibus planis glabris hinc inde veſiculoſis apicem verſus anguſtatis trifidis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 201. *t.* 29. *f.* 2.

anguſtifolius. 127. F. frondibus ſubſeſſilibus membranaceo-cartilagineis ſimpliciſſimis ſenſim dilatatis apice rotundatis. *S. G. Gmel. fuc. p.* 205.

polyphyllus. 128. F. cartilagineus, caule teretiuſculo ad apicem plano utrinque dentato, frondibus ſenſim dilatatis integris. *S. G. Gmel. fuc. p.* 206. *t.* 31. *f.* 1.

Flagellum. 129. F. ſtirpe ſimpliciſſima aphylla coriaceo-cartilaginea. *S. G. Gmelin fuc. p.* 208.

aceroſus. 130. F. aphyllus, caulibus teretibus ramoſis, ramis diſtichis confertis, undique ſetis filiformibus patentibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 190.

fragilis. 131. F. caulibus filiformibus dichotomis fragilibus faſtigiatis aphyllis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 190.

debilis. 132. F. caulibus teretibus ramoſis ſubfaſtigiatis tubuloſis debilibus aphyllis, *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191.

cuneiformis. 133. F. aphyllus, ramis alternis triquetris articulatis, articulis cuneiformibus, angulis ſubulatis dentatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 191. *an hujus generis?*

viſcidus. 134. F. caulibus teretibus dichotomis ramoſis faſtigiatis apicibus bicornibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 192.

prolifer. 135. F. frondeſcens viridis, articulis ovatis planis proliferis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 192.

hypnoides. 136. F. caule ramulisque vage ſparſis filiformibus tereti-compreſſis cartilagineis pinnatis, pinnis ſubulatis. *Wulſen ap. Jacq. collect.* 1. *p.* 352.

flavus. 137. F. ſpongioſus, ramis erectis ſubquinquangularibus laciniato-dentatis areolatis nitidis. *Suppl. p.* 452. *an hujus tribus?*

pinnatus. 138. F. caule repente ramoſiſſimo, frondibus ſimplici-pinnatis, pinnis obtuſis æqualibus approximatis, peltis verticillatis. *Suppl. p.* 452.

****** Agara, *caule frondi ipſi applicato foraminibus cribri inſtar pertuſæ.*

Agarum. 139. F. caule erecto plano, fronde orbiculata, margine ra-rius dentato. *S. G. Gmel. ſuc. p.* 210. *t.* 32.

Clathrus. 140. F. caule tereti ſulcato, fronde orbiculata, margine integerrimo. *S. G. Gmel. ſuc. p.* 211. *t.* 33. *an diſtinctus ab Agaro?*

bractea-tus. 141. F. frondibus lato-lanceolatis, margine ſinuato-proliferis crenatis. *Seb. muſ.* 3. *t.* 103. *n.* 1.

1206. ULVA. *Gemmæ* vel *Gongyli* rotundi in membrana diaphana.

pavonia. 1. U. plana reniformis ſeſſilis decuſſatim ſtriata. *Sp. pl. p.* 1630. Fucus pavonius. *Ellis corall. t.* 33. *f.* C.

ſquamaria. 2. U. plana reniformis ſupra longitudinaliter, ſubtus univerſim & concentrice ſtriata, *S. G. Gmel. fuc. p.* 171. *t.* 20. *f.* 1.

montana. 3. U. plana reniformis ſeſſilis aggregata zonata ſubtus incana. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 148.

umbilicalis. 4. U. plana orbicularis ſeſſilis peltata coriacea. *Dill. muſc. t.* 8. *f.* 3.

latiſſima. 5. U. plana oblonga undulata membranacea viridis.

purpurea. 6. U. plana oblonga coriacea purpuraſcens ſiccata purpureo-violacea. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 524.

lanceolata. 7. U. plana lanceolata. *Dill. muſc. t.* 9. *f.* 5.

reticulata. 8. U. fronde reticulata, ramis linearibus planis varie perforatis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 187.

inteſtinalis. 9. U. tubuloſa ſimplex æqualis. *Dill. muſc. t. 9. f. 7.*

Priapus. 10. U. tubuloſa ſimplex intus cellnloſa ſubtus bulboſa. *S. G. Gmel. fuc. p. 231. t. 31. f. 2.*

glandiformis. 11. U. tubuloſa ſimplex glaberrima integerrima utrinque obtuſa. *S. G. Gmel. fuc. p. 232.*

lumbricalis. 12. U. tubuloſa iſthmis intercepta. *Mant. p. 311.*

compreſſa. 13. U. tubuloſa ramoſa compreſſa. *Dill. muſc. t. 9. f. 8.*

rugoſa. 14. U. tubuloſa ramoſa rugoſa. *Mant. p. 311.*

articulata. 15. U. tubuloſa ramoſiſſima articulata, articulis cylindricis, ramis oppoſitis. *Moriſ. hiſt. pl. 3. t. 8. f. 14.*

vermicularis. 16. U tubuloſa filiformis ſubramoſa aggregata ſurſum incraſſata, iſthmis intercepta candida. *Roth. flor. germ. 1. p. 523.*

confervoides. 17. U. filiformis articulata, articulis alternatim compreſſis. *Dill. muſc. t. 6. f. 39.*

ſtellata. 18. U. aggregata ſubſeſſilis ſubovata ſimpliciſſima, utriculis intercutaneis translucentibus in ſtellam caudatam digeſtis. *Walſen apud Jacq. Coll. 1. p. 351.*

oryziformis. 19. U. articulis veſicularibus congeſtis cohærentibus. *Forsk. flor. æg. arab. p. 188.*

moccana. 20. U. veſiculis ovatis compreſſis, apicis foramine oblongo. *Forsk. flor. æg. arab. p. 188.*

cuneata. 21. U. caule tereti undique imbricato, veſiculis cuneiformibus compreſſis apice perforatis, limbo dilatato concavo. *Forsk. flor. æg. arab. p. 188.*

labyrinthiformis. 22. U. cellulis labyrinthiformibus prominentiisque clavatis. *Vandell therm. 120. t. 2.*

Linza. 23. U. fronde oblonga bullata. *Flor. dan. t. 889.*

papilloſa. 24. U. lanceolato-ſubulata undique papillis muricata. *S. G. Gmel fuc. t. 6. f. 4.*

Lactuca. 25. U. palmata prolifera membranacea, ramentis inferne anguſtatis. *Dill. muſc. t. 8. f. 1.*

ramoſa. 26. U. fronde ramoſa plana undulata purpurea. *Hudſ. flor. angl. p. 476.*

dichotoma. 27. U. fronde dichotoma viridi. *Hudſ. flor. angl. p. 476.*

Sagarum. 28. U. fuſca ſuperne punctis elevatis granulata, ſubtus plana. *S. G. Gmelin fuc.* 228. *Buxb. comm. Petr.* 3. *t.* 14. *f.* 3.

porrifolia. 29. U. fronde tenui lævi dilute viridi plana integra furſum anguſtata. *Dill. muſc. p.* 46. *t.* 9. *f.* 5.

calenduli-folia. 30. U. atrovirens ſubſtipitata, ſupra verrucis irregularibus rugoſa. *Dill. muſc. p.* 46. *t.* 9. *n.* 4.

1207. CONFERVA. *Fibræ* ſimplices aut ramoſæ, intra quas *gemmæ* globuloſæ.

* *filamentis ſimplicibus.*

⊢ *æqualibus.*

rivularis. 1. C. filamentis ſimpliciſſimis longiſſimis. *Flor. dan. t.* 881.

fontinalis. 2. C. filamentis ſimpliciſſimis digito brevioribus. *Flor. dan. t.* 651. *f.* 3.

punctalis. 3. C. punctorum ſerie longitudinali. *O. Fr. Müller. nov. act. petrop. p.* 3. *hiſt.* 90. *t.* 1. *f.* 1.

porticalis. 4. C. punctorum lineis transverſis arcuatis. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 90. *t.* 1. *f.* 2. 3.

pectinalis. 5. C. filamentis transverſim confertim ſtriatis. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 91. *t.* 1. *f.* 4. 7.

piſcium. 63. C. filamentis imbricatis pellucidis ſubclavatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 553.

Chætophora. 60. C. filamentis e baſi orbiculari parallelis. *O. F. Müller. flor. dan. t.* 660.

lobata. 61. C. graminea filamentis e baſi lobata parallelis. *Schranck Naturf.* 19. *t.* 7. *f.* 2. 3.

lanceolata. 62. C. filamentis e baſi ſimplici lanceolata obtuſa. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 490.

moniliformis. 6. C. filamentis ſerie corpuſculorum ovalium. *O. F. Müller n. act. Stock.* 1783. *p.* 77. *t.* 3. *f.* 1. 5.

⊢⊢ *filamentis geniculatis.*

fluviatilis. 7. C. filamentis ſimpliciſſimis ſetiformibus rectis, geniculis craſſioribus angulatis. *Dill. muſc. t.* 7. *f.* 47. 48.

filiformis. 8. C. ſimpliciſſima, globulorum glomerulis duobus in quovis articulo longitudinaliter diſpoſitis. *Schranck ap. v. Moll oberd. Beytr.* 1787. *p.* 136. *t.* 2. *f.* 1366.

capillaris. 9. C. articulis alternatim compreſſis. *Dill. muſc. t.* 5. *f.* 25.

jugalis. 10. C. filamentis ſæpe conjugatis globiferis. *Flor. dan. t.* 883.

armillaris. 11. C. articulis tripartitis, diſco roſaceo. *O. F. Müller nov. act. Stock.* 1783. *p.* 80. *t.* 3. *f.* 6. 7.

ſerpentina. 12. C. articulis elongatis æqualibus. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 92. *t.* 1. *f.* 8. 11.

transverſina. 13. C. articulis inæqualibus, faſcia duplici. *O. F. Müller n. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 93. *t.* 1. *f.* 12.

ſteliina. 14. C. articulis brevibus æqualibus, puncto radiato duplici. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 93. *t.* 2. *f.* 1.

decimina. 15. C. articulis quadruplici notatis. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 93. *t.* 2.

quinina. 16. C. articulis æqualibus, lineis in zic zac obliquis. *O. Fr. Müller n. act. petrop.* 3. *p.* 94. *t.* 2. *f.* 4. 5.

** *filamentis ramoſis.*

† *æqualibus.*

bulloſa. 17. C. filamentis bullas aëreas includentibus. *Dill. muſc. t.* 3. *f.* 11.

canalicularis. 18. C. filamentis baſin verſus ramoſioribus. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 15.

amphibia. 19. C. filamentis exſiccatione coeuntibus in aculeos. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 15.

littoralis. 20. C. filamentis ramoſiſſimis elongatis ſcabriuſculis. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 19.

æruginoſa. 21. C. filamentis mollibus digito brevioribus viridiſſimis. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 20.

ſeticuloſa. 22. C. teres viridis, ſetulis ſparſis numeroſis brevibus. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 188.

plana. 23. C. compreſſa rubro-violacea, ramis diſtichis confertis. *Forsk. flor. æg. arab. p.* 188.

furcata. 24. C. filamentis apice ramoſis, ramis ſubſimplicibus. *Dill. muſc. t.* 2. *f.* 6. *β*) *Dill. muſc. t.* 3. *f.* 10.

An hujus generis & ejus tribus cohortisve Conferva thermalis Forsk. fl. æg. ar. p. 189.

fœniculacea. 25. C. filamentis ramoſiſſimis, ramis ramulisque longiſſimis ſparſis. *Dill. muſc. t. 2. f.* 8.

rigida. 26. C. filamentis ramoſiſſimis, ramulis breviſſimis alternis. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 16.

tomentoſa. 27. C. filamentis ramoſiſſimis, ramis ſimplicibus confertis fuſcis. *Dill. muſc. t.* 3. *f.* 12. 13.

ſpongioſa. 28. C. ramulis ſimplicibus imbricatis. *Moriſ. hiſt. pl.* 3. *t.* 9. *f.* 67.

nigra. 29. C. ramis faſciculatis breviſſimis. *Hudſ. flor. angl. p.* 481.

ſcoparia. 30. C. filamentis proliferis faſtigiatis hirtis. *Dill. muſc. t.* 4. *f.* 23.

cancellata. 31. C. filis ramoſis, filamentis alternis brevibus multipartitis digitatis. *Dill. muſ. t.* 4. *f.* 22.

reticulata. 32. C. filamentis reticulato-coadunatis. *Dill. muſ. t.* 4. *f.* 14.

dichotoma. 33. C. filamentis dichotomis. *Dill. muſc. t.* 3. *f.* 9.

veſicata. 34. C. filamentis ſubramoſis medio & apice in veſicam productis. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 95. *t.* 2. *f.* 6.

burſata. 35. C. filamentis divaricatis veſicas laterales emittentibus. *O. Fr. Müller nov. act. petrop.* 3. *hiſt. p.* 96. *t.* 2. *f.* 10.

ſaccata. 36. C. filamentis in idem latus pluries divaricatis area globifera alternatim expletis. *O. F. Müller nov. act petrop.* 3. *hiſt. p.* 96. *t.* 2. *f.* 11.

thermalis. 64. C. filamentis ramoſiſſimis, ramis immerſis membranæ ope combinatis. *Schranck flor. bav. p.* 556. *n.* 1594. •

infuſionum. 65. C. filamentis intricatis, junioribus ſolitariis ramoſis. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 556. *n.* 1595.

†† *filamentis geniculatis.*

gelatinoſa. 37. C. filis moniliformibus, articulis globoſis gelatinoſis. *Weis crypt. flor. goett. p.* 33. *ic.*

Helminthochorton. 38. C. rufeſcens filamentis dichotomis, ramis horizontalibus. *Gazette de ſanté.* 1773. *n.* 5.

corallina. 39. C. filis dichotomis albis, ramulis acutis, geniculis purpureis. *Dill. muſc. t.* 6. *f.* 36.

catenata. 40. C. articulis cylindricis. *Dill. muſc. t.* 5. *f.* 27.

pellucida. 41. C. filamentis ramoſiſſimis, articulis cylindricis, ramis oppoſitis. *Hudſ. flor. angl. p.* 483.

42. C.

ſericea. 42. C. filamentis ramoſiſſimis e centro confertiſſimis elongatis viridibus, ramulis confertis tenuiſſimis. *Leyſſ. flor. hal. n.* 1254.

polymorpha. 43. C. ramis faſciculatis. *Flor. dan. t.* 395.

flexuoſa. 44. C. filamentis flexuoſis, ramis intricatis pinnatis, exterioribus longiſſimis ſimplicibus. *Flor. dan. t.* 882.

fulva. 45. C. ramis ramuliſque breviſſimis alternis. *Hudſ. flor. angl. p.* 484.

plicata. 46. C. filamentis ramoſiſſimis implexis. *Dill. muſc. t. 6. f.* 19.

vagabunda. 47. C. filamentis flexuoſis, ramis ramuliſque brevioribus. *Dill. muſc. t. 5. f.* 32.

glomerata. 48. C. ramulis brevioribus multifidis. *Flor. dan. t. 651. f.* 2.

trichodes. 49. C. ramis faſciculatis confertis viridibus. *Dill. muſc. t. 5. f.* 33.

fucoides. 50. C. filamentis ramoſiſſimis, ramulis multifidis faſciculatiſque. *Hudſ. flor. angl. p.* 485.

fuſca. 51. C. filamentis ramoſiſſimis, ramulis alternis ſimplicibus. *Hudſ. flor. angl. p.* 486.

rupeſtris. 52. C. filamentis ramoſiſſimis viridibus. *Dill. muſc. t. 5. f.* 29.

elongata. 53. C. filamentis ramoſiſſimis, ramulis longiſſimis diſtantibus acutis. *Dill. muſc. t. 6. f.* 38.

pennata. 54. C. ramis duplicato-pinnatis fuſcis. *Hudſ. flor. angl. p.* 486.

Ægagropila. 55. C. filamentis ramoſiſſimis e centro confertiſſimis globum conſtituentibus.

corallinoides. 56. C. filamentis dichotomis. *Dill. muſc. t. 6. f.* 37. *β*) *Dill. muſc. t. 5. f* 36.

tubuloſa. 57. C. articulis alternatim compreſſis. *Dill. muſc. t. 6. f.* 39.

paraſitica. 58. C. filis pinnatis. *Hudſ. flor. angl. p.* 486.

cateuulata. 59. C. articulis linearibus apice nodoſis, medio nigropunctatis. *Dill. muſc. t. 7. f.* 48.

1208. BYSSUS. *Fibræ* ſimplices uniformes lanuginoſæ.

ſeptica. 1. B. capillacea molliſſima parallela fragiliſſima pallida. *An agarici varietas aut rudimentum?*

Flos aquæ. 2. B. filamentis plumoſis natantibus. β) *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 1.

cancellata. 3. B. filis exacte undique cancellata. *Lederm. microſc. t.* 72.

phoſphorea. 4. B. lanuginoſa violacea lignis adnaſcens. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 6.

velutina. 5. B. capillacea viridis, filamentis ramoſis. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 14.

petræa. 6. B. capillacea atra, filamentis ramoſis breviſſimis erectis denſiſſime ſtipatis, panno holoſericeo ſimilis. *Wulfen Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 101.

ſanguinea. 7. B. capillacea velutina perennis coccinea, cortici adnaſcens. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 148.

aurea. 8. B. capillacea pulverulenta, gemmis ſparſis, filamentis ſimplicibus ramoſisque. *Flor. dan. t.* 718. *f.* 1.

coriacea. 9. B. perennis denſiſſima albicans. *Schreb. ſpic. flor. lipſ. p.* 144.

alutoſa. 10. B. alba membranacea tenera alutæ ſimilis. *Falck. it.* 2. *p.* 279.

nigra. 11. B. filamentis ramoſis rigidis atris, ſaxis adnaſcens. *Hudſ. flor. angl. p.* 487.

fulva. 12. B. filamentis ramoſis fulvis. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 17.

barbata. 13. B. filamentis erectiuſculis, ſummitatibus ramoſis ſubfaſtigiatis fulvis. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 19.

candida. 14. B. filamentis ramoſiſſimis, ramis faſtigiatis albidis. *Dill. muſc. t.* 1. *f.* 15. *an hydni potius ſpecies?*

bombycina. 15. B. lanuginoſa albiſſima, filamentis longioribus implexis, lignis adnaſcens. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1081.

atra. 16. B. filamentoſo-pulverulenta atra. *Wiggers prim. fl. holſ. p.* 92.

cryptarum. 17. B. capillacea perennis cinerea tenax rupi innata.

radiciformis. 18. B. nivea tenerrima, filamentis ramoſis pendulis, globis flocculis hinc inde adhærentibus. *Leſk. it.* 1. *p.* 92.

globoſa. 19. B. alba, filamentis in globum glomeratis. *Leſk. it.* 1. *p.* 92. *t.* 3. *Scop. diſſ. hiſt. nat.* 1. *p.* 84.

aquatica. 20. B. hyalina, filamentis ſimplicibus apice clavatis. *Flor. dan. t.* 896.

conoidea. 21. B. capitulis conico-acuminatis, ſtipite ſetaceo. *Flor. dan. t.* 897. *n.* 2. *an hujus generis?*

Flos cobalti. 22. B. capillacea perennis roſea, filamentis tenerrimis, ſericei panni inſtar arcte intertextis. *Wulf. ap. Jacq. coll. 2. p.* 175. *t.* 12. *f.* 1.

tremelloides. 23. B. ex luteo fuſceſcens gelatinoſa, fibris intricatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 552. *n.* 1585.

FUNGI.

1209. AGARICUS. *Fungus* ſubtus lamelloſus.

* *ſtipitati.*

† validi, *pileo pleno*, *ſtipite valido.*

‡ *ſtipite vulva & annulo cincto.*

cæſareus. 1. A. pileo convexo aureo, carne ochroleuca, lamellis medio latioribus, minoribus mediis breviſſimis. *Bulliard herb. Franc. t.* 120.

muſcarius. 2. A. pileo ſanguineo, verrucis lamellis ſtipiteque albis, hoc baſi globoſo. *Kern. Schwaemm. t.* 33. β) *Schæff. fung. t.* 28. γ) *Balt. fung.* 1. 27. *t.* 27.

margaritiferus. 3. A. pileo palleſcente verrucis carneis tuberculiſque albidis aſpero, lamellis albis. *Bulliard herb. Franc. t.* 316. β) *Schæff. fung. t.* 261.

maculatus. 4. A. pileo badio lividove, margine verrucis albis inæquali, lamellis albidis brevibus latis. *Schæff. fung. t.* 90. *Bull. herb. Franc.* 2. Agaricus phalloides.

Mappa. 5. A. pileo convexo ex flaveſcenti cineraſcente, lamellis alternatim longioribus ſtipiteque flaveſcentibus. *Schæff. fung. t.* 20.

ſolitarius. 6. A. pileo convexo, medio parumper concavo verrucis ſquamiſve convolutis inæquali, lamellis liberis. *Bulliard. herb. Franc. t.* 48. β) Agaricus verrucoſus. *Bolton* II: 47. *t.* 47.

ſubgracilis. 7. A. pileo hemiſphærico glabro caneſcente, lamellis albis, ſtipite fiſtuloſo. *Batſch al. fung.* 59.

vernus. 8. A. totus albus, pileo plano humidiuſculo, medio impreſſo, ſtipite farcto baſi bulboſo, lamellis numeroſis diviſis. *Bulliard herb. Franc. t.* 108. β) *Bolton fung.* 2. *t.* 48.

‡ ‡ *ſtipite volva cincto, annullo nullo.*

giganteus. 9. A. albus pileo ſubſquamoſo, lamellis craſſis, ſtipite craſſo cylindrico. *Batſch el. fung.* 51.

Vvvv 2

plumbeus. 10. A. pileo medio fuſceſcente marginem verſus livido ſtriato, lamellis duplici ordine poſitis albidis poſterius obtuſis ſublividis, ſtipite fiſtuloſo baſi bulboſo. *Schæff. fung. t.* 85. 86. *β) Schæff. fung. t.* 257. *γ) Schæff. fung. t.* 244. *δ) Bull. herb. Franc. t.* 512. *ε) Bolton fung.* II. 49. *t.* 49.

badius. 11. A. pileo ex caſtaneo fulvo, margine plicato, lamellis flaveſcentibus integris æqualibus, ſtipite thalaſſino ſubæquali baſi bulboſo. *Schæff. t.* 245.

fulvus. 12. A. pileo fulveſcente medio ſubmaculato marginem verſus plicato, lamellis ochroleucis inæqualibus, ſtipite elongato albo fuſco-floccoſo baſi bulboſo. *Schæff. fung. t.* 95.

denudatus. 13. A. pileo convexo cucullo ex luteo fuſco obvoluto, margine nudo vireſcente fibroſo, ſtipite albido farcto baſi bulboſo. *Schæff. fung. t.* 98.

griſeo-albus. 14. A. pileo caneſcente impellucido lucido, marginis plicis acute carinatis, carina fuliginoſo-pulverulenta, lamellis confertis inæqualibus ſtipiteque farcto pulverulentis albidis. *Batſch. el fung. cent. p.* 85.

nævius. 15. A. pileo convexo albo ambino-radiato, lamellis inæqualibus cinnamomeis poſterius liberis, ſtipite cinereo deorſum incraſſato. *Bulliard herb. Franc. t.* 264.

trilobus. 16. A. pileo glabro fulvo, margine ſtriato, lamellis dilute cinnamomeis æqualibus antrorſum dilatatis obtuſis ſimplici ordine poſitis, ſtipite flavicante baſi tuberoſo. *Bolton fung. p.* 38. *t.* 38.

lucens. 395. A. luteſcens, pileo ſupra lucido ſubtus fuſco. *Bulliard herb. Franc. t.* 431. *f.* 1.

helvolus. 396. A. helvolus, ſtipite exalbido. *Bull. herb. Franc. t.* 431. *f.* 5. *β) Bull. herb. Franc. t.* 431. *f.* 4.

præaltus. 17. A. pileo hemiſphærico, junioris tomentoſo, ſtipite quadruplo longiore gracili cinereo, lamellis ferreis. *Mich. nov. pl. gen. p.* 189. *t.* 81. *f.* 3.

vaginatus. 18. A. albus, pileo plano, medio papilloſo, margine ſtriato, lamellis diviſis apice acutis, ſtipite fiſtuloſo bulboſo, baſi latente. *Bull. herb. Franc. t.* 98. *an ſatis diſtinctus a plumbeo?*

minor. 19. A. pileo ex cervino cæruleſcente tela araneoſa obvoluto, lamellis rarioribus latis cinnamomeis ſtipiti farcto contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 330. *β) Bull. herb. Franc. t.* 431. *f.* 2. 3.

† † † *ſtipite annulato, volva nulla.*

procerus. 20. A. pileo medio papilloſo, centro fruſtulis transverſis ſeriatis, diſco floccis ſparſis atris vario, ſtipite concolore ſquamoſo elongato baſi bulboſo, colore lamelliſque albis. *Flor. dan. t.* 772.

bulboſus. 21. A. pileo glaberrimo integerrimo carneo niveo, ſtipite lineari concolore, baſi ſemiovata ſupra truncata, lamellis pallidiſſime flaventibus ſtipiti contiguis. *Schæff. fung. t.* 241.

piſtillaris. 22. A. pileo ſpadiceo-flavente, margine undulato-plicato, ſtipite concolore clavato farcto, lamellis dilute lateritiis confertis. *Batſch el.* 55. *β*) Agaricus putridus. *Scop. flor. carn.* 2. *n.* 1468.

obſcurus. 23. A. pileo convexo obſcure caſtaneo piloſo-ſquamoſo, lamellis latis duplici ſerie digeſtis, ſtipite æquali fuſco, annulo albo. *Schæff. fung. t.* 74.

excoriatus. 24. A. pileo convexo ex lateritio dilute cinereo, diſco tela dilute carnea tecto, lamellis inæqualibus ſtipiteque fiſtuloſo baſi bulboſo albidis. *Schæff. fung. t.* 18, 19.

campeſtris. 25. A. pileo convexo caneſcente, maculis piloſo-ſquamoſis, lamellis inæqualibus introrſum rotundatis (adulti) ruſeſcentibus, ſtipite albido recti. *Bull. herb. Franc. t.* 134. *β*) *Bolton fung.* 2. *t.* 45. *γ*) *Schæff. fung. t.* 310. 311.

pratenſis. 26. A. pileo convexo albido vel ex thalaſſino dilute cinereo ſtriato, lamellis ſordide carneis, ſtipite craſſo albido, baſi inflexa fuſceſcente. *Schæff. fung. t.* 96.

laceratus. 27. A. pileo ex carneo fuſceſcente maculis ſquamoſis medio majoribus vario, margine lacero, lamellis ſordide carneis, ſtipite fuſceſcente fiſtuloſo. *Schæff. fung. t.* 242.

nitens. 28. A. pileo convexo flaveſcente nitido, lamellis atris nigro-punctatis diviſis, ſtipite farcto baſi tuberoſo. *Bull. herb. Franc. t.* 84. *β*) *Schæff. fung. t.* 210.

radicoſus. 29. A. pileo convexo fuſco albo-maculato, lamellis numeroſis ſubſerratis umbrinis, ſtipite ſquamoſo, radice fuſiformi fibrilloſa. *Bull. herb. Franc. t.* 160.

ſquamoſus. 30. A. pileo convexo umbonato fulvo ſquamis erectis aſpero, margine undulato, lamellis ligneis triplici ordine digeſtis, ſtipite infra annulum ſquamoſo. *Bull. herb. Franc. t.* 266, *nonne idem cum floccoſo?*

floccoſus. 31. A. pileo convexo piloſo-ſquamoſo lamellis flavicantibus, ſtipite farcto annuloque ſquamoſis. *Schaeff. fung. t.* 61. *Batſch el. fung. t.* 38. Agaricus flammeus. β) Agaricus piloſus. *Schaeff. fung. t.* 80. γ) *Schaeff. fung. t.* 409. δ) Agaricus amanitea. *Batſch el. fung. cent.* 1. 109. *f.* 113. ε) Agaricus cæſius. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 113. *f.* 114. ζ) Agaricus Pallor. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 115. *f.* 115.

imbricatus. 32. A. pileo pallide ſulphureo ſericeo-unctuoſo faſciculis ſericeis obducto, lamellis quintuplici ſerie digeſtis ex flavo ſubolivaceis, ſtipite elongato ſuperne pallido inferne ferrugineo. *Batſch el. fung.* 149.

villoſus. 33. A. pileo fulvo-villoſo, lamellis confertis triplici ordine digeſtis dilute cinereis, cortica alba, ſtipite fragili ſordide albo aſcendente. *Bolt. fung. p.* 42. *t.* 42.

vitellinus. 351. A. totus ſulphureus, pileo conico faſciculatim tomentoſo margine undulato, lamellis liberis lanceolatis in unam ſeriem digeſtis, ſtipite glabro deorſum craſſiori. *Bolton fung.* 2. *t.* 50.

mutabilis. 34. A. pileo glabro fuſco-ochraceo, lamellis dilute fuſcis, ſtipite pallidiori lineari ſuperne ſquarroſo, inferne lævi albo. *Schaeff. fung. t.* 9.

durus. 364. A. pileo convexo luteſcente, lamellis numeroſis pallidis triplicis ordinis, ſtipite fragili velo fugaci. *Bolton fung.* 2. *t.* 67. *f.* 1.

orichalceus. 370. A. bulboſus ſtipite flavente, pileo livido ex flavente pallidiſſime virente, diſco lamellisque elongatis ferrugineis. *Batſch el. fung. cent* 2. *p.* 1. *t.* 31. *f.* 184.

olivaſcens. 371. A. bulboſus lividus ex cinereo olivaſcens, pileo ſubviſcido umbonato, ſtipite magis cineraſcente, lamellis dilatatis annuloque bruuneis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 3. *t.* 31. *f.* 185.

ferruginaſcens. 372. A. bulboſus, pileo pulvinato craſſo glabro ex albido ſubferrugineo, ſtipite ſericeo-fibroſo albo, annulo ex ferrugineobrunneo, laminis anguſtis ochraceismargine ſubfuſcis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 9. *t.* 32. *f.* 187.

ſubantiquatus. 383. A. pileo brunneo maculato, diſco brunneo, ſtipite lævi elongato, lamellis ordine triplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 59. *t.* 37. *f.* 205.

arcuatus. 394. A. lamellis arcuatis. *Bull. herb. Franc. t.* 443. *an diſtincta ſpecies?*

† † † † *ſtipite annulo volvaque deſtituto.*

virgineus. 35. A. niveus, lamellis arcuatim per ſtipitem cylindricum farctum decurrentibus. *Jacq. miſc. auſtr. 2. t. 15. f. 1. Schæff fung. t. 39. 232. Batſch el. fung. cent. 2. f. 200.* β) Agaricus eburneus. *Bulliard herb. Franc. t. 118.* γ) Agaricus denticulatus. *Bolton fung. 4. t. 4.* δ) *Schæff. fung. t. 307.*

integer. 36. A. ſolitarius, pileo viſcido purpureo, lamellis albis integris æqualibus. *Bolton fung. 1. t. 1.*

Ruſſula. 37. A. fragrans dulcis ſolitarius, pileo rubro, carne albida tenera firma, lamellis craſſis æqualibus rigidis. *Krapf æſterr. Schw. 1. t. 1. f. 1-7. & t. 2. f. 4-6.* β) *Schæff. fung. t. 75.* γ) *Krapf. æſterr. Schw. 1. t. 4. f. 1-4. 7. & t. 5. f. 1. 2.*

emeticus. 38. A. acris graveolens ſolitarius, pileo ſanguineo, lamellis æqualibus craſſis fragilibus apice bifurcis ſtipiti farcto tereti intus albo continuis. *Schæff. fung. t. 15. 16. 254.*

cyanoxanthus. 39. A. pileo pallido vel ſubrubello, margine cæruleſcente, lamellis æqualibus albidis craſſis, ſtipite farcto brevi terete. *Krapff æſterr. Schw. t. 6. f. 1-6. t. 7. f. 1-7. & t. 8. f. 1. 2. 4. 7.*

xerampelinus. 40. A. pileo carnoſo punctato obſolete purpureo, lamellis craſſis flavis, ſtipite elongato tereti farcto albido purpuraſcente-obumbrato. *Schæff. fung. t. 214. 215.* β) Agaricus olivaceus. *Schæff. fung. t. 204.*

vireſcens. 41. A. pileo vario luridove viſcido, lamellis albidis æqualibus, ſtipite tereti farcto. *Krapf. æſterr. Schw. t. 9. f. 6-7 & t. 10. f. 1. 2. 3. 7.*

glutinoſus 42. A. pileo viſcido nitente ochroleuco exſiccatione nigreſcente, lamellis concoloribus craſſis ramoſis æqualibus, ſtipite tereti farcto incurvo baſi incraſſato. *Krapf. æſterr. Schw. t. 11. f. 1-7.*

violaceus. 43. A. pileo convexo aſpero punctato, margine violaceo, lamellis dilute badiis margine purpuraſcentibus, ſtipite cæruleſcente craſſo baſi bulboſo. *Kern. Schw. t. 1. f. 1.* β) Agaricus cæruleſcens. *Schæff. fung. t. 34.* γ) Agaricus amethyſtinus. *Schæff. fung. t. 56.* δ) Agaricus glaucopus. *Schæff. fung. t. 53.*

araneoſus. 44. A. pileo ſpadiceo, margine filis araneoſis fimbriato, lamellis latis poſterius diviſis ſtipiti albido brevi craſſo concoloribus. *Bulliard herb. Franc. t.* 96.

ventricoſus. 45. A. pileo convexo lævi croceo badioque, lamellis dilute ſulphureis decurrentibus, brevioribus interſitis, ſtipite brevi ventricoſo ochroleuco laterali. *Schæff. fung. t.* 71. 72. *an mera araneoſi varietas?*

armeniacus. 46. A. pileo caſtaneo-ferrugineo, ſtipite albido farcto baſi incraſſato, lamellis rubentibus. *Schæff. fung. t.* 81.

ſericeus. 47. A. pileo luteo maculis obſoletis ſquamoſo, ſtipite brevi baſi bulboſo ſulphureo, lamellis concoloribus. *Schæff. fung. t.* 24.

varius. 48. A. pileo ſpadiceo, lamellis flexoſis purpuraſcentibus margine flaveſcentibus, ſtipite tereti farcto albido, inferne ſpadiceo incraſſato. *Schæff. fung. t.* 42. 54.

rutilus. 49. A. pileo aurantio umbonato, lamellis flavis, ſtipite tereti farcto flavicante, ſuperne purpuraſcente. *Schæff. fung. t.* 219.

croceus. 352. A. luteus, ſtipitis parte inferiori pileoque conico villoſis, lamellis numeroſis denſis ſtipitisque parte ſuperiori albis. *Bolton fung.* 2. *t.* 51. *f.* 2.

fulvidus. 357. A. fulvus, pileo convexo glabro, lamellis remotis craſſis triplici ſerie decurrentibus, ſtipite dilutiori. *Bolton fung.* 2. *t.* 56.

Georgii. A. pileo flavo convexo, lamellis albis. *Sterb. fung. t.* 11. *f.* 3.

clypeatus. A. pileo hemiſphærico acuminato viſcido, lamellis ſtipiteque elongato cylindrico albis.

fragilis. A. pileo convexo viſcido pellucido lamellisque luteis. *Vaill. fl. pariſ. t.* 11. *f.* 16-18.

gilvus. 50. A. pileo luteſcente, lamellis craſſis ochroleucis, ſtipite albo tereti inferne incraſſato. *Schæff. fung. t.* 221. *an aurantii varietas?*

truncatus. 51. A. pileo obſcure lateritio, lamellis rubellis vel ſordide albis, ſtipite brevi craſſo farcto albido inferne fuſceſcente. *Schæff. fung. t.* 251.

punctatus. 52. A. pileo granulato aurantio margine flavo, diſco conico, lamellis flavis baſi aurantiis, ſtipite elongato tereti farcto flavo. *Schæff. fung. t.* 21.

vaccinus. 53. A. pileo vaccino obſcurius maculato, ſtipite concolore tereti inferne incraſſato, lamellis dilute fuſcis. *Schæff. fung. t.* 25. *An hujus cohortis? ſtipes fiſtuloſus annulatus.*

luteus. 54. A pileo granulato aureo, diſco ſpadiceo obumbrato, lamellis ſtipiteque tereti farcto baſi tuberoſo flavicantibus. *Schæff. fung. t.* 41.

ferrugineus. 55. A. pileo ferrugineo-fuſco fibroſo-ſtriato, lamellis fuſceſcentibus, ſtipite tereti farcto inferne incraſſato. *Schæff. fung. t.* 37.

ſtriatus. 56. A. pileo caſtaneo, margine dilutius ſtriato, ſtipite tereti craſſo brevi farcto albido. *Schæff. fung. t.* 38.

ceraneus. 57. A. pileo punctato pallide lateritio, lamellis olivaceis, ſtipite tereti longitudinaliter ſtriato fiſtuloſo albo. *Schæff. fung. t.* 40.

mollis. 58. A. pileo campanulato albente-croceo, carne molli, pileo elongato ſubconcolore glauco. *Batſch el. fung.* 45. *f.* 15. *Bull. herb. Franc.* 1. *t.* 400.

Rudolphi. 59. A. gregarius, pileo ovali-conico obtuſo ſcabro ferrugineo, ſtipite flexuoſo ſulphureo, inferne opaco fuſco. *Batſch el. fung.* 45. *f.* 23.

ſubgranulatus. 60. A. pileo ſicco aſpero fuſco craſſo, margine attenuato revoluto, lamellis concoloribus ſinuatis, ſtipite pallidiore ſtriato fiſtuloſo baſi bulboſo. *Batſch el. fung.* 45. *f.* 22.

adhærens. 61. A. pileo atro glutinoſo, lamellis ſordidis ramoſis ſubdecurrentibus, ſtipite farcto tereti albido. *Schæff. fung. t.* 36. *β*) *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 43. *t.* 35. *f.* 200.

terreus. 62. A. pileo umbrino maculis piloſis fuſceſcentibus vario, lamellis ſtipiteque tereti farcto inferne incraſſato albis. *Schæff. fung. t.* 64. *β*) Agaricus luridus. *Schæff. fung. t.* 69. *γ*) Agaricus multiformis. *Schæff. fung. t.* 14.

mitratus. 63. A. pileo ſulphureo-ferrugineo maculis piloſis parvis conſertis adſperſo, lamellis fulvo-violaceis, ſtipite ſquamoſo fiſtuloſo flaveſcente. *Schæff. fung. t.* 84.

undulatus. 64. A. pileo obtuſe conico cano maculis obſcurioribus inæqualibus angulofis transverſim ſeriatis vario, lamellis ſordide albis, ſtipite tereti brevi albido baſi bulboſo. *Schæff. fung. t.* 89.

ſpadiceus. 65. A. pileo viſcido depreſſo ſpadiceo, lamellis fuſcis difformibus, extimis minimis, ſtipite cano clavato ſericeo-fibroſo. *Batſch el. fung.* 49. *f.* 16.

ochraceus. 66. A. pileo ochraceo nitente ſubcampanulato, ſtipite concolore ſubclavato ſericeo-fibroſo, lamellis ferrugineo-fuſcis anguſtis. *Batſch el. fung.* 51.

faſtigiatus. 67. A. pileo conico umbonato luteo longitudinaliter ſtriato, lamellis fuſceſcentibus, ſtipite tereti farcto elongato lineari flaveſcente. *Schæff. fung. t.* 26. β) Agaricus conicus. *Schæff. fung. t.* 2.

latus. 68. A. pileo convexo marino fuſcove ſicco, lamellis numeroſis latiſſimis teneris triplici ſerie diſpoſitis, ſtipite tereti recto farcto ſordide albo. *Bolton fung.* 2. *t.* 2.

pompoſus. 69. A. pileo rotundo coccineo, lamellis numeroſis anguſtis teneris olivaceis triplici ſerie diſpoſitis, ſine acuminato ſtipiti flavicanti inferne fuſco anguſtiori contiguis. *Bolton fung.* 5. *t.* 5. β) Agaricus aureus. *Bulliard herb. Franc. t.* 92. *an diſtinctus ſatis a lateritio Schæff.?*

cæruleſceus. 70. A. pileo hemiſphærico ſicco aſpero cæſio, lamellis craſſis albis ſerie triplici diſpoſitis, ſtipiti ſubconcolori recto tereti contiguis. *Bolton fung.* 12. *t.* 12.

cinnamomeus. 71. A. tenax pileo ſicco lævi rufo, lamellis teneris coriaceis dilute cinnamomeis triplici ordine diſpoſitis, ſtipite luteo inferne anguſtato compreſſo fibroſo. *Schæff. fung. t.* 4. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 158. *n.* 117. *t.* 117.

elephantinus. 72. A. pileo craſſo hemiſphærico ſubluteo viſcido, lamellis diſtantibus craſſis latis cereis triplici ſerie digeſtis, ſtipite albo craſſo ſpongioſo baſi fibrilloſo. *Bolt. fung.* 28. *t.* 28.

politus. 73. A. pileo convexo thalaſſino lævigato, lamellis numeroſis latiuſculis ferrugineis flexilibus duplici ordine poſitis, ſtipite brevi farcto terete fuſco. *Bolton fung.* 30. *t.* 30. *vix diſtinctus a Beryllo.*

molliſſimus. 74. A. pileo pulvinato, molli murino, lamellis anguſtis teneris albidis inæqualibus triplici ordine diſpoſitis, ſtipite bulboſo craſſo ſpongioſo. *Bolton fung.* 40. *t.* 40.

Offa. 75. A. pileo convexo lubrice humido fuſco pellucido, margine undulato, lamellis concoloribus poſterius rotundatis liberis, ſtipite tomentoſo farcto terete. *Bulliard herb. Franc. t.* 308.

turbinatus. 76. A. pileo flavicante convexo, lamellis numeroſis diviſis dilute ligneis, ſtipite craſſo inferne bulboſo undulato. *Bull. herb. Franc. t.* 110.

lycoperdo-noides. 77. A. pulverulentus, pileo rotundo craſſo flaveſcente, lamellis brevibus ex atro flavis, ſtipite terete brevi. *Bulliard herb. Franc. t.* 167.

contiguus. 78. A. pileo convexo luteo tomentoſo, margine involuto, lamellis boleti poros mentientibus, ſtipitique brevi craſſo concoloribus. *Bulliard herb. Franc. t.* 240. *vix diſtinctus ab involuto.*

involutus. 79. A. pileo lævi ſubviſcido fibroſo ſpadiceo fuſco convexo, diſco depreſſo, margine involuto, lamellis anguſtis craſſiuſculis denſis ramoſis flaveſcentibus, ſtipiti concolori lævi venoſo contiguis. *Batſch el. fung. cent.* 39. *f.* 61. *Schæff. fung. t.* 72. β) Agaricus ſubinvolutus. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 57. *t.* 37. *f.* 204. γ) Agaricus aſcendens. *Bolt. fung.* 11. *t.* 55.

libertatis. 80. A. pileo obſcuro fuſceſcente umbonato parvo, margine caneſcente involuto, lamellis canis ſemipellucidis anguſtis inæqualibus arcuatis integris bifidisque, ſtipite elongato cano ſolido bulboſo. *Batſch el. fung. cent.* 43. *f.* 62. β) Agaricus peltigerus. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 17. *t.* 32. *f.* 190. γ) Agaricus Clavus. *Batſch ib. p.* 41. *t.* 35. *f.* 199.

pileatus. 81. A. pileo opaco ſicco ferrugineo cano-tomentoſo umbonato parvo, lamellis anguſtis craſſis confertis, paucioribus bifidis cum ſtipite elongato fiſtuloſo bulboſo flaveſcentibus. *Batſch el. fung. cent.* 47. *f.* 63.

nivoſus. 82. A. niveus, pileo parvo convexo, margine ſtipiteque craſſo elongato ſolido furfuraceo-pruinoſis, lamellis anguſtis confertis ſtipiti continuis, brevioribus intermiſtis. *Batſch el. fung. cent.* 49. *f.* 64.

nimbatus. 83. A. pileo humeſcente glabro cano fuſco obumbrato, limbo albo, lamellis latis triplicis longitudinis albis ſtipiti concolori furfuraceo contiguis. *Batſch el. fung. cent.* 50 *f.* 65.

puſillus. 84. A. pileo glabro ſubconico cano medio fuſco obumbrato margine intusque albo, lamellis latis truncatis albidis, ſtipite ſubfurfuraceo cano-cæruleſcente intus atro. *Batſch el. fung. cent.* 51. *f.* 66. *an vere diſtincta ſpecies?*

tuberoſus. 85. A. albidus, pileo convexo margine ſubplicato, lamellis (junioris) decurrentibus, ſtipite tenui farcto tomentoſo infra bulboſo. *Bull. herb. Franc. t.* 256.

craſſipes. 86. A. pileo fuſco ſicco convexo, margine involuto, ſtipite concolore fuſiformi, lamellis dilute fuſcis diviſis. *Schæff. fung. t.* 87.

coralliuus. 87. A. pileo lævi fuſceſcente convexo parvo, lamellis diſtantibus minutis ſubdecurrentibus, ſtipite medio craſſiori. *Scop. diſſ. hiſt. nat.* 1. *p.* 109. *t.* 9. *f.* F.

fuſipes. 88. A. pileo dilute umbrino rimoſo, margine undulato, lamellis concoloribus rarioribus truncatis, ſtipite deorſum attenuato. *Schæff. fung. t.* 87. (*fig. ſup.*) 88. 260. β) Agaricus luxurians. *Batſch el. fung.* 28. *p.* 49.

longipes. 89. A. pileo conico fuliginoſo, ſtipite concolote ſtriato farcto deorſum turgido infra terram denuo attenuato, lamellis latis inæqualibus cano-fuliginoſis. *Bulliard herb. Franc.* t. 232. *an vere diſtinctus a clypeato?*

ædematoſus. 90. A. pileo ſubconico hepatico pulverulento, lamellis anguſtis ſubdecurrentibus ſtipiteque farcto carnoſo medio craſſiore ruſeſcentibus. *Schæff. fung. t.* 259.

rigidus. 91. A. pileo craſſo hepatico, (ſeneſcentis) margine rimoſo, lamellis anguſtis rigidis fragilibus duplici ſerie poſitis flaveſcentibus, ſtipite elongato inæquali fuſco griſeo. *Bolton fung.* 43. *t.* 43.

laricinus. 92. A. pileo convexo anguſto fulvo, lamellis anguſtis craſſis albis duplici ſerie poſitis, ſtipite fuſco ramoſo craſſo ſpongioſo. *Bolton fung.* 19. *t.* 19.

faſciatus. 93. A. pileo ſubconico ſpadiceo, lamellis paucioribus parvis brevibus purpuraſcentibus, ſtipite anguſto terete farcto fuſceſcente faſciato *Schæff. fung. t.* 223.

ruſeſcens. 94. A. ruſeſcens, pileo ſtriato, centro excavato, lamellis decurrentibus, ſtipite tereti. *Schæff. fung. t.* 55.

hepaticus. 95. A. pileo convexo lævi ſicco, margine involuto lamellisque carneo-ſpadiceis, ſtipite pallidiori ſicco opaco lineari inæquali. *Batſch el. fung.* 43.

flavidus. 96. A. pileo ochroleuco, lamellis albidis, ſtipite tereti flexuoſo inferne craſſiori fuſceſcente ſuperne flaveſcente. *Schæff. fung. t.* 35.

tuberculoſus. 97. A. pileo convexo vitellino, margine tuberculato ſtriato, ſtipite lineari breviuſculo ſtriato concolore ſuperne albo, lamellis latis brevibus inæqualibus ſulphureis. *Schæff. fung. t.* 79.

leoninus. 98. A. pileo umbonato luteo, margine ſtriato, lamellis brevibus latis inæqualibus carneis, ſtipite elongato tenui farcto flaveſcente flexuoſo ſtriato. *Schæff. fung. t.* 48.

faſcicularis. 99. A. pileo luteo, lamellis cinereis margine flavicantibus, ſtipite flavo lineari elongato. *Schæff. fung. t.* 49. 35. *Batſch el. fung.* 83. t. 29.

pallidus. 100. A. ochroleucus, pileo convexo, lamellis congeſtis diviſis, ſtipite brevi farcto tereti. *Schæff. fung. t.* 50.

incertus. 101. A. ſparſim ſquamuloſus, pileo badio, lamellis luteſcentibus, ſtipite elongato ſubclavato flaveſcente deorſum fuſceſcente. *Schæff. fung. t.* 62.

viſcoſus. 102. A. pileo lævi coriaceo viſcido convexo pallide ochraceo, lamellis concoloribus diſtantibus margine inferiori ſinuatis ſuperiori undulatis triplicis longitudinis, ſtipite ſolido. *Batſch el. fung. cent.* 63. *f.* 70.

umbrinus. 103. A. pileo humeſcente ochraceo-albo, margine pellucido tenui, lamellis concoloribus latiſſimis decurrentibus, minoribus interſitis, ſtipite brevi craſſo farcto. *Batſch el. fung. cent.* 65. *f.* 71.

riſigallinus. 104. A. pileo lævi lato deformi tenui ochraceo-luteſcente, lamellis l[illegible]culis oblongis integris luteſcente-carneis flexuoſis, ſtipite brevi opaco albo. *Batſch el. fung. cent.* 67. *f.* 72.

defoſſus. 105. A. pileo lævi rigido pulvinato, lamellis ſubæqualibus caneſcenti-cæruleſcentibus, ſtipite ſericeo-fibroſo baſi bulboſo. *Batſch el fung. cent.* 69. *f.* 73.

ſubpurpuraſcens. 106. A. pileo lævi ſubviſcido pulvinato cinereo-fuſceſcente, lamellis latis triplicis ordinis furfureque a velo ſuperſtite ferrugineis, ſtipite ſericeo-fibroſo lilacino baſi bulboſo. *Batſh el. fung. cent.* 73. *f.* 74.

ſubannulatus. 107. A. pileo pallide fuſco lævigato venoſo pulvinato, lamellis anguſtis oblongis utrinque obtuſis teneris confertis rubellis, minoribus interſitis, ſtipite lævi baſi bulboſo flavente ſupra annulum ſpurium albo. *Batſch el. fung. cent.* 75. *f.* 75.

impuber. 108. A. ſiccus, pileo carneo-fulvo lanato ſquamis lanatis mollibus obſeſſo margine repando, ſtipite pallidiore fiſtuloſo, lamellis ſubcarneis. *Batſch el. fung.* 155. *f.* 116.

ſquamuloſus. 109. A. ſiccus, pileo obſcure flavo ſquamulis villoſis brunneis appreſſis tenerrimis denſiſſime obſito, lamellis latis extrorſum anguſtatis luteſcente-ferrugineis triplici ordine digeſtis, ſtipite flaveſcente ſericeo-fibroſo. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 19. *t.* 33. *f.* 190.

ſubferrugineus. 373. A. bulboſus fibroſus, lividus ex brunneo canus, ſtipite craſſo, laminis laxis ferrugineis ordine triplici. *Batſch el. fung. cent. 2. p. 7. t. 31. f. 186.*

elatior. 374. A. pileo anguſto ex ochraceo carneo, ſtipite albo elongato torto ſericeo-fibroſo, lamellis ordine quadruplici ferrugineo-fulveſcentibus. *Batſch el. fung. cent. 2. p. 11. t. 32. f. 188.*

Fuſus. 375. A. teſtaceus, pileo glabro rimoſo, ſtipite ſericeo-fibroſo ſurſum incraſſato, laminis pallidioribus ordine triplici. *Batſch el. fung. cent. 2. p. 13. t. 32. f. 189.*

nebularis. 376. A. griſeus, pileo obſcuriore glabro margine involuto, ſtipite pallidiore fibroſo-hiſpido baſi albo-tomentoſo, laminis utrinque anguſtis pallide ochraceis, ordine triplici. *Batſch el. fung. cent. 2. p. 25. t. 33. f. 193.*

laterinus. 377. A. lateritius, pileo pulvinato ſubviſcido, ſtipite pallidiore floccoſo-aſpero, lamellis fulveſcentibus anguſtis. *Batſch el. fung. cent. 2. p. 29. t. 33. f. 195. Bull. herb. Franc. 2. t. 308.*

diſcors. 378. A. albus, ſtipite floccis inferne longitudinalibus ſuperne tranſverſis aſpero, pileo umbonato, deflexo ſubliveſcente ſubviſcido. *Batſch el. fung. cent. 2. p. 31. t. 34. f. 196.*

ſeneſcens. 379. A. ochraceus mutabilis, ſtipite floccis pallidis tranſverſim ſtriatis ſquamoſo, pileo viſcido, lamellis latis pallidis fulveſcentibus, ordine quadruplici. *Batſch el. fung. cent. 2. p. 35. t. 34. f. 197.*

ſubteſtaceus. 380. A. opacus ex ochraceo carneus, ſtipite floccis hirto, pileo glabro ſubviſcido, laminis fulveſcentibus triplici ordine. *Batſch el. fung. cent. 2. p. 39. t. 35. f. 198.*

cruentatus. 381. A. opacus rigidus ex ochraceo niveus, lamellis ordine quadruplici diſpoſitis margine ſtipite maculis, pileo punctis & zonis purpuraſcentibus vario. *Batſch el. fung. cent. 2. p. 47. t. 36. f. 201.*

madreporeus. 382. A. rigidus fragilis, pileo cinereo fuſco-fibroſo, ſtipite niveo lamellis dilatatis griſeo-liveſcentibus, ordine triplici. *Batſch el. fung. cent. 2. p. 53. t. 36 f. 203.*

horizontalis. 110. A. pileo convexo ſubhemiſphærico, lamellis horizontalibus, ſtipite fiſtuloſo annulato, annulo reflexo ſulcato. *Hoffm. Blætterſchw. t. 5. f. 1. an una cum 4 ſequentibus hujus cohortis?*

teſtaceus. 111. A. pileo albido, margine pallidiſſime ochraceo, centro luteſcente, lamellis albis, ſtipite elongato baſi aſcendente pallide ochraceo. *Planer fung. Erf. p.* 14. *n.* 49.

ſuaveolens. 112. A. cineraſcenti albus opacus, lamellis triplici ordine poſitis, ſtipite lineari elongato ſubflexuoſo fiſtuloſo. *Planer fung. Erf. p.* 14. *n.* 50.

violaceofulvus. 113. A. pileo convexo violaceo, ſtipite lineari concolore, lamellis umbrinis. *Planer fung. Erf. p.* 17. *n.* 65.

holoſericeus. 114. A. pileo campanulato tomentoſo brunneo-ferrugineo, ſtipite elongato gracili fuſco ſurſum luteo, lamellis pallidiſſimis. *Planer fung. Erf. p.* 17. *n.* 67.

⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ *pileo infundibuliformi vel obliquo.*

infundibuliformis. 115. A. ſiccus albus ſenio ſubtinctus, pileo maximo umbonato, lamellis inæqualibus ramoſis, ſtipite lævi. *Buxb. cent.* 4. *t.* 1.

ſubalutaceus. 384. A. ſubruſeſcens ſubcoriaceus, pileo margine involuto, ſtipite albo-tomentoſo vel floccoſo, lamellis ordine quadruplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 27. *t.* 33. *f.* 194.

cochleariformis. 116. A. ſiccus albidus, pilei margine undulatim ſtriato, lamellis craſſis ramoſis, ſtipite obliquo brevi craſſo. *Schæff. fung. t.* 225.

flammeus. 117. A. luteus, pileo lacerato-ſquamoſo, ſquamis diverſicoloribus, lamellis crenatis, ſtipite brevi farcto. *Schæff. fung. t.* 29. 30.

tubæformis. 118. A. pileo pallide aureo, lamellis decurrentibus ſimplicibus ſubdentatis albis, ſtipite longo tereti fuſiformi recurvo. *Schæff. fung. t.* 248. 249.

cyathiformis. 119. A. albidus vel pallidus, lamellis decurrentibus anguſtis diviſis, ſtipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 248.

impreſſus. 120. A. pileo obconico griſeo, margine revoluto plicato, lamellis numeroſis vireſcentibus, ſtipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 38.

ſanguinolentus. 121. A. ſtipite farcto pileoque ſangnineis, lamellis ſimplicibus apice fiſſis albidis fragilibus ſtipiti continuis. *Bulliard herb. Franc. t.* 42.

obconicus. 122. A. murinus, pilei margine undulato, lamellis decurrentibus utrinque acuminatis duplici ordine digeſtis, ſtipite farcto ſurſum dilatato. *Bulliard herb. Franc. t.* 286.

furcatus. 123. A. pileo farinoſo viridi-cinereo, lamellis furcatis ſtipiti farcto ſpongioſo continuis. *Bulliard herb. Franc.* t. 26.

atro-tomentoſus. 124. A. pileo obliquo ſubſcabro ferrugineo-fuſco, lamellis pallide ochraceis diſtincte adnatis, ſtipite brevi craſſo tereti ſubincurvo fuliginoſo tomentoſo. *Batſch el. fung.* 89. *f.* 32.

caliciformis. 125. A. pileo lævi carneo-fulveſcente, margine involuto, ſtipite craſſo concolore griſeo-tomentoſo ſurſum ampliato, lamellis pallide ochraceo-carneis decurrentibus. *Schæff. fung. t.* 252.

degener. 126. A. pileo carneo-fulveſcente circulis concentricis ſaturatioribus picto, margine lacero, ſtipite concolore lineari elongato ſurſum ampliato, lamellis pallide carneo-ochraceis decurrentibus. *Schæff. fung. t.* 243.

liveſcens. 127. A. humeſcens, pileo cinereo-livido, lamellis inæqualibus ut plurimum integerrimis contiguis ſtipitique elongato ſubfibroſo ſubconcoloribus. *Batſch el. fung. cent.* 55. *f.* 67.

cervinus. 128. A. ſtipite in pileum oblique reflexum dilatato cervino ſubtus tuberoſo tomentoſo, lamellis anguſtiſſimis albis inæqualiter decurrentibus. *Hoffm. nomencl. fung. n.* 139. *t.* 2. *f.* 2.

neptuneus. 129. A. glaber ochraceo-carneus, ſtipite ſubelongato in pileum dilatato, lamellis anguſtis diſtantibus ſæpe bifidis. *Batſch el. fung. cent.* 161. *f.* 118.

alutaceus. 130. A. glaber pallide carneus, pileo biſcido, lamellis latiuſculis inæqualibus. *Batſch el. fung. cent.* 163. *f.* 119.

alabaſtrinus. 131. A. totus niveus diaphanus, pileo obliquo umbonato, lamellis rarioribus ſubdecurrentibus, ſtipite ſurſum incraſſato, baſi pallide roſeo. *Plan. fung. Erf. p.* 5. *n.* 8.

flabellatus. 132. A. pileo difformi fuſco vel lurido vario, lamellis ſubrepandis ſtipiteque brevi cylindrico ſordide albis. *Schæff. fung. t.* 43. 44.

ſemipetiolatus. 133. A. pileo ochraceo-croceo ſubcarneo ſubfaſciato, margine undulato, ſtipite concolore farcto obconico, lamellis pallidioribus ramoſis. *Schæff. fung. t.* 208.

tremulus. 134. A. nigro-fuſcus lividus faſciatus, lamellis ſordide albis, ſtipite tereti farcto. *Schæff. fung. t.* 224.

craſſus. 135. A. pileo obliquo tomentoſo fuſco-olivaceo, lamellis bifidis ſubramoſis flavis, ſtipite craſſo dilatato luteo, tomento olivaceo. *Plan. fung. Erf. p.* 5. *n.* 7.

136. A.

ſtreatus.136. A. pileo coriaceo ſtipiteque planiuſculo pallide ochraceis, lamellis umbrinis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 104.

⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ *pileo dimidiato, ſtipite laterali.*

dimidiatus. 137. A. pileo ſquamiformi maculis latis tubellis vario, lamellis pallide ſulphureis, ſtipite brevi albido. *Schæff. fung.* *t.* 233.

aggregatus. 138. A. gregarius, pileo fuſco, margine lobato criſpo, lamellis rufeſcentibus ramoſis ſubdecurrentibus, ſtipite craſſo curvo farcto fuſceſcenti-albo. *Schæff. fung.* *t.* 305. 306.

palmatus. 139. A. gregarius, pileo convexo obliquo ſpadiceo vel obſcure ligneo, lamellis concoloribus inæqualibus margine undulatis, ſtipite albido farcto brevi. *Bull. herb. Franc.* *t.* 216.

petalodes. 140. A. pileo violaceo-fuſco, margine undulato, lamellis confertis decurrentibus flavicantibus, ſtipite albido farcto. *Bull. herb. Franç.* *t.* 226. β) *Batſch el. fung.* 89. *t.* 8. *f.* 33.

conchatus. 141. A. pallide cinnamomeus; pileo conchiformi, lamellis inæqualibus longioribus decurrentibus, ſtipite arcuato farcto. *Bull. herb. Franc.* *t.* 298.

fallax. 142. A. fuceſcenti-aurantius, pileo ſemiorbiculari, lamellis latiuſculis, tribus brevioribus inter duas longiores poſitis, ſtipite brevi horizontali. *Bull. herb. Franc.* *t.* 324.

glaucus. 143. A. canus pileo ſericeo tenello, lamellis diſtantibus alterne brevioribus, ſtipite albidiore brevi pruinato. *Batſch el. fung. cent.* 170. *f.* 123.

ſturſtedtienſis. 144. A. ochraceo-pallens, ſtipite brevi poſterius lato tomentoſo pede adnato. *Batſch el. fung. cent.* 171. *f.* 124.

bucinalis. 385. A. tener ex cæſio albus, pileo membranaceo foveate, lamellis in ſtipitem brevem flexuoſum decurrentibus. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 85. *t.* 39. *f.* 214.

fragillimus. 386. A. ochraceus pileo convexo fragilli, medio umbilicato, ſtipite gracili brevi. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 87. *t.* 39. *f.* 215.

obeſus. 387. A. craſſus ochroleucus, pileo pulvinato inæquali, ſtipite brevi rufeſcente. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 89. *t.* 39. *f.* 216.

flabelliformis. A. ceſpitoſus, pileo ſubfurfuraceo pallido, lamellis ſubcinnamomeis, ſtipite laterali compreſſo apice dilatato. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 140. Agaricus ſtypticus.

K 2 2

ichoratus. 154. A. pileo opaco tenello ſicco ochraceo-fulvo, vertice depreſſo, margine croceo elevato, lamellis inæqualibus extrorſum bifidis cum ſtipite pallide ochraceis. *Batſch el. fung. cent.* 37. *f.* 60.

cimicarius. 155. A. ferrugineo-fulvus, pileo opaco humeſcente infundibuliformi, lamellis triplicis longitudinis per regulas ſæpe connexis, ſtipite teretiuſculo fiſtuloſo. *Baſch el. fung. cent.* 59. *f.* 69. *nonne mera ruſeſcentis varietas?*

opacus. 156. A. ſuccum acrem album fundens, pileo rigido humeſcente viſcoſo, fuſceſcente-cinereo, vertice excavato obſolete concentrice faſciato, lamellis latis triplicis longitudinis utrinque anguſtioribus ochraceo-carneis, ſtipite albido. *Batſch el. fung. cent.* 57. *f.* 68. *an varietas agacris?*

piperatus. 157. A. albus ſuccum acrem fundens, pileo lævi fragili, vertice (ſeneſcentis) excavato, margine deflexo, lamellis inæqualibus irregularibus anguſtis, ſtipite farcto utrinque anguſtato. *Bolton fung.* 21. *t.* 21. *Schæff. fung. t.* 83.

Bulliardi. 158. A. acris, pileo lævi dilute cinnamomeo, vertice excavato, margine inflexo crenulato, lamellis duplicis longitudinis, ſtipite tereti craſſo. *Bull. herb. Franc. t.* 292.

amarus. 159. A. ſuccum acrem fundens, pileo ochroleuco, vertice (adulti) excavato, margine undulato, ſtipite concolore craſſo tereti farcto, lamellis ramoſis flavicantibus. *Kern Schw. t.* 9. *f.* 1.

acris. 360. A. pileo diſtorto mutabili fuſceſcente, lamellis triplicis ordinis, ſtipite compreſſo ſulcato deorſum anguſtato. *Bolton fung.* 2. *t.* 60. *nonne plumbeo affinis?*

┬ ┬ *læves, membranacei, vix carnoſi.*

⊢ Coriacei, *pileo lamelliſque coriaceis.*

melleus. 160. A. pileo convexo pallide ſulphureo ferrugineoque, margine pallido ſtriato, lamellis albidis, ſtipite elongato tereti ſublineari fiſtuloſo cereo. *Schæff. fung. t.* 45.

caryophyllæus. 161. A. pileo convexo exſolete aureo, vertice elevato ſubferrugineo, margine crenulato, lamellis pallide cinnamomeis, ſtipite flavicante tenui tereti farcto. *Schæff. fung. t.* 77.

cereolus. 162. A. pileo campanulato pallide ſulphureo, margine ochraceo ferrugineo, lamellis cinereo-fuſcis, ſtipite elongato niveo farcto. *Schæff. fung. t.* 51.

lacrimalis. 163. A. pileo depreſſo fuſceſcente ochraceove, lamellis ochraceo-fuſcis inæqualibus ſtipite obſcuriori elongato lineari baſi bulboſo. *Batſch el. fung.* 75. *f.* 7. 8.

auricomus. 164. A. pileo lævi ſicco depreſſo, medio elevato, luteo fuſco-radiato, lamellis anguſtis fuſco-cinereis duplicis longitudinis, ſtipite lineari brevi ſemipellucido fuſceſcente. *Batſch el. fung.* 75. *f.* 21.

farinoſus. 165. A. farinoſus, pileo conico depreſſo lævi pallidiſſime ochraceo, medio flavicante, lamellis exſolete terreis, ſtipite elongato lineari albido ſemipellucido baſi bulboſo, *Schæff. t.* 205. *an hujus cohortis?*

candicans. 166. A. pileo convexo ſubviſcido nitente flavicante, lamellis fuſcis, ſtipite lineari albo farcto annulato. *Schæff. fung. t.* 21.

umbilicatus. 167. A. ochroleucus, pilei vertice umbilicato flavicante, lamellis, ſubdecurrentibus, ſtipite tereti farcto ſurſum ampliato. *Schæff. fung. t.* 207.

decurrens. 168. A. ochroleucus, pilei vertice umbilicato, margine plicato-ſtriato, lamellis decurrentibus, minoribus interſitis, ſtipite elongato tereti fiſtuloſo. *Schæff. fung. t.* 232. *an varietas umbilicati?*

fuſceſcens. 169. A. pileo convexo fuſco, lamellis fuſco-fulventibus, ſtipite lineari ſubelongato pallido fiſtuloſo. *Schæff. fung. t.* 60.

collinus. 170. A. pileo convexo umbonato albo vel pallide-ochraceo nitente, ſtipite concolore elongato ſemipellucido fiſtuloſo, lamellis griſeo-albis. *Schæff fung. t.* 220.

criſtatus. 171. A. pileo lacteo ſquamis faſciculatis ſpadiceis vario, lamellis teneris albis triplici ordine digeſtis, ſtipite tereti fiſtuloſo fuſceſcente. *Bolton fung.* 7. *t.* 7. *Bull. herb. Franc. t.* 405. *β*) *Bulliard herb. Franc. t.* 70. *t.* 506. *f.* 2.

tigrinus. A. pileo convexo ſquamato albido, centro depreſſo, lamellis decurrentibus luteſcentibus. *Bull. herb. Franc. t.* 70.

caſtaneus. 172. A. pileo lævi ſericeo caſtaneo, lamellis teneris rubello-fuſcis, tertii ordinis breviſſimis, ſtipite lineari albo fiſtuloſo elaſtico. *Bulliard herb. Franc. t.* 268.

irregularis. 173. A. pileo ſordido viſcido ſpadiceo, margine lobato-undulato, lamellis diſtantibus obſcure carneis triplici ordine digeſtis, ſtipite tereti lævi fiſtuloſo cineraſcente duro. *Bolton fung* 13 *t.* 13.

elaſticus. 174. A. pileo convexo ferrugineo, carne cortinaque elaſticis lamelliſque triplici ordine digeſtis latiuſculis diſtantibus albis, ſtipite inæquali farcto elaſtico ferrugineo. *Bolton fung.* 16. *t.* 16.

plum[illegible] ſu[illegible] 175. A. pileo hemiſphærico murino ſquamulis lanatis obſeſſo, lamellis latis numeroſis albis flexilibus triplici ordine poſitis, ſtipite lineari elongato ſquamato. *Bolton fung.* 33. *t.* 33.

nigro-villoſus. 176. A. pileo humeſcente tomentoſo nigricante (adulti) cucullato, margine inæquali, ſtipite lineari albo, lamellis introrſum latioribus (ſeneſcentis) rubellis. *Bulliard herb. Franc. t.* 214.

fiſſus. 177. A. pileo conico fuſco, margine ſtriato olivaceo, lamellis latis numeroſis tenuibus flexilibus aurantio-carneis triplici ordine poſitis, ſtipite murino elaſtico fiſtuloſo compreſſo. *Bolt. fung.* 35. *t.* 35.

rubens. 178. A. ruberimus mollis, pileo opaco, lamellis latis teneris pellucidis triplici ordine digeſtis, ſtipite farcto elongato. *Bolton fung.* 36. *t.* 36. *an ſatis diſtinctus a ſanguineo?*

ramealis. 179. A. pileo (adulti) excavato albo, medio fuſco rubellove, lamellis numeroſis diviſis ſtipiteque farcto tereti albidis. *Bulliard herb. Franc. t.* 336.

velutipes. 180. A. gregarius, pileo convexo flavo lævi, lamellis ligneis, minoribus interſitis, ſtipite fiſtuloſo inferne tomentoſo nigro ſuperne igneo. *Bulliard herb. Franc. t.* 344. *Curtis flor. Lond.*

ardeſiacus. 181. A. pileo hemiſphærico concentrice ſtriato ſtipiteque fiſtuloſo ſuperne cæruleſcentibus, hoc inferne albo, lamellis latis igneis inter binas longiores quinis brevioribus. *Bulliard herb. Franc. t.* 348.

repens. 182. A. pileo convexo flavicante, centro depreſſo, lamellis concoloribus diviſis, ſtipite repente fiſtuloſo fibroſo-ramoſo, ramis rubris. *Bulliard herb. Franc. t.* 90.

croceus. 183. A. pileo croceo lævi ſicco truncato-conico, vertice mammillari, margine repando-lacero, lamellis rarioribus, ſtipite flavicante farcto tereti. *Bulliard herb. Franc. t.* 50. β) Agaricus coccineus. *Schæff. fung. t.* 302. γ) Agaricus pſittacinus. *Schæff. fung. t.* 301.

Hyacin-thus. 184. A. pileo conico luteo-vel vireſcenti-fuſco, lamellis pallidioribus, ſtipite elongato lineari recto fiſtuloſo. *Batſch el. fung.* 81. *t.* 28. *an diſtinctus ſatis a faſtigiato ?*

vinoſus. 185. A. fuſcus vinum olens ſubacris, pileo orbiculari ſicco, medio verrucoſo, lamellis confertis, ſtipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 54.

auratus. 365. A. pileo convexo viſcido ſtipiteque fiſtuloſo extrorſus aurantiis, lamellis ſulphureis. *Bolton fung.* 2. *t.* 67. *f.* 2.

ſciſſus. 366. A. ſulphureus pileo ſubconico margine lacero, lamellis latiſſimis baſi anguſtis triplicis ordinis, ſtipite fiſtuloſo contorto. *Bolton fung.* 2. *t.* 68.

ſuperſti-tioſus. 185. A. albidus, pileo orbiculari ſicco, centro impreſſo luteo, lamellis ſubflexuoſis duplicis longitudinis; ſtipite lineari ſuperne fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 56.

ramoſus. 187. A. albus, pileo orbiculari ſicco, margine convexiuſculo, lamellis minoribus paucioribus inter longiores, ſtipitibus pluribus farctis flexuoſis e communi trunco. *Bull. herb. Franc. t.* 102.

pilulifor-mis. 188. A. pileo ſicco globoſo ſuſceſcente, margine albido, lamellis albis diviſis, ſtipite fiſtuloſo albido ſuperne incraſſato. *Bull. herb. Franc. t.* 112.

contor-tus. 189. A. pileo ſicco umbrino convexo, vertice papilloſo, lamellis fragilibus ſtipiteque ſpirali albidis. *Bulliard herb. Franc. t.* 36.

amari-cans. 190. A. pileo unguinoſo flavo-viridi, ſtipite concolore ſubflexuoſo fiſtuloſo, lamellis viridibus, minoribus inter longiores poſitis. *Bulliard herb. Franc. t.* 30.

cyaneus. 191. A. unguinoſus, pileo rotundo cæruleo, vertice mammillari ſuſceſcente, margine albo-floccoſo, ſtipite concolore ſubtomentoſo, lamellis umbrinis diviſis. *Bulliard herb. Franc. t.* 170. *an diverſus a Beryllo ?*

Beryllus. 192. A. pileo convexo conico flavo extrorſum thalaſſino fibroſo, lamellis inæqualibus pallide rubellis, ſtipite elongato lineari flaveſcente, annulo nigricante. *Schæff. fung. t.* 1. Agaricus viridulus.

moſcha-tus. 193. A. moſchum olens, pileo plano thalaſſino ſicco, lamellis numeroſis diviſis, ſtipiteque lineari firmo albidis. *Bull. herb. Franc. t.* 176.

ſulphu- reus. 194. A. ſulphureus, pileo ſubconico ſicco, lamellis numeroſis triplici ordine digeſtis, longioribus ſtipiti fibroſo contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 168.

olivaceus. 195. A. pileo convexo-conico lævi integro aureo, centro ferrugineo, lamellis numeroſis confertis olivaceis margine ſinuatis quintuplicis longitudinis, ſtipitibus aggregatis divaricatis aſcendentibus elongatis linearibus fiſtuloſis, annulo ſtriato. *Mich. nov. pl. gen. p.* 199. *t.* 80. *f.* 7.

abbreviatus. 196. A. pileo obtuſe conico ferrugineo aut fuliginoſo, lamellis albidis aut flaveſcentibus, ſtipite elongato exalbido (feneſcentis) fiſtuloſo. *Schæff. fung. t.* 250. & 253.

ſubcorneus. 197. A. pileo conico depreſſo caſtaneo, margine aurantio, lamellis craſſis inæqualibus, ſtipiteque elongato lineari flexuoſo fiſtuloſo pallidis. *Batſch el. fung.* 83.

ſanguineus. 198. A. ſanguineus, pileo convexo lævi, lamellis diviſis, ſtipite tereti lineari farcto, annulo fibroſo aurantio. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 15. *f.* 3.

cereus. 199. A. pileo hemiſphærico ſicco lævi cereo, lamellis tenuibus diſtantibus integris diviſiſque flaveſcentibus, ſtipite tereti lineari flavo, medio fiſtuloſo. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 105. *t.* 15. *f.* 2.

ſordidus. 200. A. lamellis ſimplicibus rectis pileoque plano livido-fuſcis, centro umbilicato, margine depreſſo, ſtipite baſi craſſiore. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 56. *t.* 3. *f.* 1.

flavo-flocoſus. 201. A. pileo umbonato ſulphureo ocrhaceo obumbrato furfuraceo, margine crenulato ſtipiteque farcto ſubferrugineo floccis furfuraceis inæquali, lamellis ſubquadruplicis longitudinis albentibus. *Batſch el. fung. cent.* 117. *f.* 97.

circumſeptus. 202. A. pileo ſubcarneo ante marginem ſtipiteque medio ſæpe floccis furfuraceis cincto, lamellis latis ferrugineis triplicis longitudinis. *Batſch el. fung. cent.* 119. *f.* 98.

roſellus. 203. A. pileo ſubcarneo convexiuſculo opaco, lamellis laxis triplicis longitudine ſtipiteque farcto toto fibroſo rubellis. *Batſch el. fung. cent.* 121. *f.* 99.

ſubcarneus. 204. A. humeſcens, pileo mutabili ochraceo, ſtipite fiſtuloſo recto fibroſo, lamelliſque carneolis, his ſemipellucidis triplicis longitudinis, longiſſimis ſtipiti adnatis. *Batſch el. fung. cent.* 123. *f.* 100.

cineraſ-205. A. pileo glabrato ſtipiteque fibrilloſo farcto fuſco-cine-
cens. reis, lamellis flaveſcentibus quadruplicis ordinis, longio-
ribus ſtipite affixis. *Batſch el. fung. cent.* 125. *f.* 101.

obſoleſ-206. A. pileo pulvinato lævi ochraceo-carneo, lamellis latiuſ-
cens. culis lividis, ſtipiti concolori farcto ſpongioſo affixis ſub-
quadruplici ordine diſpoſitis. *Batſch el. fung. cent.* 127.
f. 102. β) Agaricus obſoletus. *Batſch el. fung. cent.* 129.
f. 103.

treme- 207. A. pileo pallide carneo, medio craſſiuſculo, ſtipite fibro-
bundus. ſo torto fiſtuloſo, lamellis inæqualibus pileo ſoli adnatis.
Batſch el. fung. cent. 129. *f.* 104. β) *Batſch el. fung.
cent.* 2. *p.* 73. *t.* 38. *f.* 209. γ) *Batſch el. fung. cent.* 2.
p. 75. *t.* 38. *f.* 210.

cino- 208. A. humeſcens, pileo tenero ſtipiteque fibroſo fiſtuloſo
brunneus. carneo-caneſcentibus, lamellis brunneis ſubquadruplicis
longitudinis, extremo margine farinaceo. *Batſch el. fung.
cent.* 133. *f.* 105.

candido-209. A. pileo umbonato ſtipiteque ſolido validiuſculo baſi
bulboſus. bulboſo pileum ſuſtentante albis ſericeo-nitentibus, la-
mellis lividis ſubtriplicis longitudinis, extimo margine
albo. *Batſch el. fung. cent.* 133. *f.* 106.

auriveni-210. A. pileo umbonato obſcurius fibroſo-venoſo ſtipiteque
us. obſolete fibroſo baſi bulboſo flaventibus, lamellis inæ-
qualibus pileo ſoli adnatis margine crenato furfuraceo-
albis. *Batſch el. fung. cent.* 137. *f.* 107. *Bull. herb. Franc.
t.* 388.

albula-211. A. pileo lævi pulvinato hemiſphærico depreſſo luteſcente,
tus. ſtipite albo ſericeo-nitente farcto bulboſo pileum ſuſten-
tante, lamellis ſemiorbiculatis pileo ſoli adnatis livido-
fulvellis triplicis ordinis. *Batſch el. fung. cent.* 137. *f.* 108.

coria- 212. A. pileo depreſſo-convexo carneo-ochraceo, ſtipite
ceus. farcto elongato torto, pileum ſuſtentante lamelliſque pileo
ſoli adnatis pallidioribus. *Batſch el. fung. cent.* 139. *f.* 109.

tomentoſ-213. A. pileo convexo-conico tomentoſo fulvo, ſtipite gracili,
ſus. annulo fugaci. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 241. *t.* 2. *f.* 1.

muſco- 214. A. pileo impreſſo ſtriato flavo-fuſco, ſtipite brevi baſi in-
rum. craſſato, lamellis horizontalibus pallidioribus. *Hoffm.
nomencl. fung.* 1. *n.* 242. *t.* 5. *f.* 3.

ſemiglo-215. A. pileo glabro ſemigloboſo flaveſcente, ſtipite ſubconco-
batus. lore opaco, medio nigro-pruinato gracili elongato pi-

leum ſuſtentante, lamellis cinereis obſcurius maculatis, majoribus ſtipiti adnexis. *Batſch el. fung. cent.* 141. *f.* 110. *β*) Agaricus clypeatus. *Bolton fung.* 2. 57. *t.* 57.

diffuſus. 216. A. pileo tenero lævi livido-carneo, lamellis elongatis violaceo-fulvis quadruplicis ordinis, majoribus ſtipiti adnexis, ſtipite niveo elongato fiſtuloſo pileum ſuſtentante. *Batſch el. fung. cent.* 143. *f.* 111.

purpureus. 217. A. pileo hemiſphærico ſtipiteque brevi fiſtuloſo purpureis, lamellis triplicis ordinis albidis. *Bolton fung.* 41. *t.* 41. *f.* B.

contortilis. 218. A. pileo fuſco ſtriato undulato, lamellis ſtipiteque brevi carneis. *Bolton fung.* 41. *t.* 41. *f.* A.

granuloſus. 219. A. pileo albo-granulato ſtipiteque lineari valido ochraceo-ferrugineis; lamellis albis. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 24.

hiſpidus. 220. A. pileo brunneo, vertice hiſpido, ſtipite lineari valido lamelliſque pallidiſſime concoloribus. *Batſch el. fung.* 81. *f.* 25.

fuliginatus. 221. A. pileo conico ſtriis niveis caneſcentibus & obſolete fuligineis ſubſquamoſo, ſtipite lineari ſubelongato valido lamelliſque niveis. *Batſch el. fung.* 81. *f.* 26.

atroſquamoſus. 222. A. pileo fuſceſcente-niveo maculis ſtriatis nigris ſubſquamoſo, ſtipite ſubulato valido lamelliſque albis. *Batſch el. fung.* 81. *f.* 27. *β*) Agaricus conſpurcatus. *Willd. prodr. fl. berol. n.* 1104. *Mich. nov. pl. gen. t.* 78. *f.* 6-8. *an diſtincta ſatis a criſtato ſpecies?*

umbraculum. 223. A. pileo rorido depreſſo-conico lamelliſque rarioribus triplicis longitudinis fuſceſcenti-cinereis, ſtipite ſubulato albo ſtriato torto. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 4.

Placenta. 224. A. pileo depreſſo umbonato cinereo fuſceſcente, lamellis carneo-albis, ſtipite lineari elongato valido fibroſo torto. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 18. *nonne forſan olypanti varietas?*

murinus. 225. A. pileo depreſſo atro, lamellis ſtipiteque elongato lineari valido atro-ſtriato cinereis. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 19.

farinaceus. 226. A. pileo rubro-violaceo convexo, vertice ſubdepreſſo, lamellis violaceis, ſtipite fuſceſcente. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1117. *Schæff. fung. t.* 8. *t.* 12. *t.* 13. *f.* 1-3. *t.* 223.

janthinus. 227. A. violaceo-rubens, pileo ſubconvexo, lamellis diſtantibus convexis decurrentibus, ſtipite elongato lineari. *Schæff. fung. t.* 13. *f.* 2. 4. 5-8.

laccatus. 228. A. ſubcarneus, pileo ſtriato convexo, vertice depreſſo, ſtipite tereti recto. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 20.

majalis. 229. A. ſuaveolens, pileo convexo ſicco dilute coriaceo, ſtipite concolore deorſum incraſſato, lamellis membranaceis ſubdecurrentibus utrinque acuminatis. *Bull. herb. Franc.* *t.* 142.

mammoſus. 230. A. ſuaveolens dilute fuſcus, pileo difformi, lamellis latiuſculis diviſis a ſtipite lineari farcto ſpirali diſtantibus. *Bull. herb. Franc. t.* 144.

alliatus. 231. A. allium redolens ſapienſque canus, pilei margine undulato ſtriato, lamellis diviſis ſtipiti contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 153. *vix diſtinctus ab alliaceo.*

alliaceus. 232. A. allium ſapiens reddenſque, pileo convexo glabro e fuſco-palleſcente, lamellis albidis, ſtipite atro nitido fiſtuloſo. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 82.

plicatus. 233. A. allium ſapiens olenſque, pileo planiuſculo, margine luteo-rufo undulato-plicato, lamellis inæqualibus albidis ſtipite tereti lineari rufo. *Schæff. fung. t.* 99. *f.* 2. 5-8.

abietis. 234. A. pileo glaberrimo ſubviſcido depreſſo-convexo, lamellis albidis, ſtipite lineari elongato fulvo. *Schæff. fung. t.* 99. *f.* 1. 3. 4.

pineti. 235. A. ceſpitoſus, pileo depreſſo-convexo umbonato glaberrimo ſubniveo, lamellis ſubconcoloribus inæqualibus, ſtipite gracili lineari obſcuro. *Batſch el. fung.* 73. *f.* 9.

eſculentus. 236. A. pileo convexo terreo, ſtipite gracili fiſtuloſo ſordide ochroleuco, lamellis albis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 14. *f.* 4.

Clavus. 237. A. pileo planiuſculo umbonato luteo, margine ſtriato plicatove, lamellis ſordide albis, ſtipite lineari tereti farcto, inferne torto. *Schæff. fung. t.* 59.

fibrilloſus. 238. A. pileo convexo lamelliſque paucioribus griſeis, ſtipite gracili lineari fiſtuloſo ſubſpadiceo. *Schæff. fung. t.* 236. *an mera Clavi varietas?*

crenulatus. 239. A. pileo dilute cinnamomeo albo-pulverulento, margine crenato, lamellis ſtipiteque gracili fiſtuloſo concoloribus *Schæff. fung. t.* 226.

ſubcoriaceus. 240. A. pileo convexiuſculo fuſceſcente-ochraceo, margine integro, lamellis fuſco-lividis, ſtipite lineari elongato ſubgracili flavicante. *Schæff. fung. t.* 203.

atro ru- 241. A. pileo convexo umbonato hepatico albido-ſtriato, margine crenato, lamellis ſtipiteque lineari gracili elon-
fus. gato fiſtuloſo pallidioribus. *Schæff. fung. t.* 234.

ſetaceus. 242. A. pileo umbonato miniato, lamellis aureis, ſtipite elongato ſubſubulato pallide ſulphureo. *Schæff. fung. t.* 222.

angulatus. 243. A. albus pileo plano. margine fimbriato repando-angulato, lamellis raris, ſtipite elongato gracili. *Mich. nov. pl. gen. p.* 146. *t.* 74 *f.* 4.

Clavis. 244. A. ſuaveolens, pileo rotundo luteo-fuſco, lamellis ramis diviſis ſtipiti nigricanti tereti brevi farcto contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 148.

Fibula. 245. A. ochroleucus, pileo rotundo infundibuliformi, lamellis decurrentibus, ſtipite lineari lævi farcto. *Bull. herb. Franc. t.* 186.

Campa- 246. A. pileo conico-convexo umbilicato glabro ſtriato ſtipite-
nella. que tereti farcto fragili gracili croceis, lamellis pallide ſulphureis. *Schæff. fung. t.* 230.

minutus. 247. A. parvus, pileo campanulato fuſceſcente ſtriato, ſtipite brevi incurvo. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 277. *t.* 6. *f.* 3. 4.

ferrugi- 248. A. pileo minuto conico luteſcente, medio ferrugineo,
natus. lamellis ſtipiteque elongato torto ſubſubulato pallidiſſime fuſceſcentibus. *Batſch el. fung. cent.* 109. *f.* 92.

hypni. 249. A. pileo umbonato pallide ochraceo, margine plicato ferrugineo, lamellis ferrugineis triplicis ordinis, intimis ſtipiti gracili fiſtuloſo affixis. *Batſch el. fung. cent.* 117. *f.* 96.

ſtriatellus. 250. A. pileo conico ſubovato albo griſeo-flavente denſe plicato, lamellis plumbeis inæqualibus, ſtipite filiformi fiſtuloſo albo. *Schæff. fung. t.* 211.

Fumus. 251. A. pileo conico ſubovato acuminato fuſco vel flavente, lamellis rubris, ſtipite lineari elongato pallidiori. *Schæff. fung. t.* 63. 70. 229.

fuligina- 252. A. pileo conico ſubovato acuminato atro ſcabro, ſti-
rius. pite valido ſubconcolore ſuperius albente, lamellis carneis. *Batſch el. fung.* 71. *f.* 40.

contrac- 253. A. pileo nigro-fuſceſcente ſtriato oblongo, margine con-
tus. tracto albidiore, ſtipite fibroſo flexuoſo ſtriato ſubconcolore, baſi hiſpidula albidiore. *Batſch el. fung. cent. f.* 85.

ſubferru-gineus. 373. A. bulboſus fibroſus, lividus ex brunneo canus, ſtipite craſſo, laminis laxis ferrugineis ordine triplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 7. *t.* 31. *f.* 186.

elatior. 374. A. pileo anguſto ex ochraceo carneo, ſtipite albo elongato torto ſericeo-fibroſo, lamellis ordine quadruplici ferrugineo-fulveſcentibus. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 11. *t.* 32. *f.* 188.

Fuſus. 375. A. teſtaceus, pileo glabro rimoſo, ſtipite ſericeo fibroſo ſurſum incraſſato, laminis pallidioribus ordine triplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 13. *t.* 32. *f.* 189.

nebularis. 376. A. griſeus, pileo obſcuriore glabro margine involuto, ſtipite pallidiore fibroſo-hiſpido baſi albo-tomentoſo, laminis utrinque anguſtis pallide ochraceis, ordine triplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 25. *t.* 33. *f.* 193.

laterinus. 377. A. laterititus, pileo pulvinato ſubviſcido, ſtipite pallidiore floccoſo-aſpero, lamellis fulveſcentibus anguſtis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 29. *t.* 33. *f.* 195. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 308.

diſcors. 378. A. albus, ſtipite floccis inferne longitudinalibus ſuperne tranſverſis aſpero, pileo umbonato, deflexo ſubliveſcente ſubviſcido. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 31. *t.* 34. *f.* 196.

ſeneſcens. 379. A. ochraceus mutabilis, ſtipite floccis pallidis tranſverſim ſtriatis ſquamoſo, pileo viſcido, lamellis latis pallidis fulveſcentibus, ordine quadruplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 35. *t.* 34. *f.* 197.

ſubteſtaceus. 380. A. opacus ex ochraceo carneus, ſtipite floccis hirto, pileo glabro ſubviſcido, laminis fulveſcentibus triplici ordine. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 39. *t.* 35. *f.* 198.

cruentatus. 381. A. opacus rigidus ex ochraceo niveus, lamellis ordine quadruplici diſpoſitis margine ſtipite maculis, pileo punctis & zonis purpuraſcentibus vario. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 47. *t.* 36. *f.* 201.

madreporeus. 382. A. rigidus fragilis, pileo cinereo fuſco-fibroſo, ſtipite niveo lamellis dilatatis griſeo-liveſcentibus, ordine triplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 53. *t.* 36 *f.* 203.

horizontalis. 110. A. pileo convexo ſubhemiſphærico, lamellis horizontalibus, ſtipite fiſtuloſo annulato, annulo reflexo ſulcato. *Hoffm. Blætterſchw. t.* 5. *f.* 1. *an una cum* 4 *ſequentibus hujus cohortis?*

teſtaceus. 111. A. pileo albido, margine pallidiſſime ochraceo, centro luteſcente, lamellis albis, ſtipite elongato baſi aſcendente pallide ochraceo. *Planer fung. Erf. p.* 14. *n.* 49.

ſuaveolens. 112. A. cineraſcenti albus opacus, lamellis triplici ordine poſitis, ſtipite lineari elongato ſubflexuoſo fiſtuloſo. *Planer fung. Erf. p.* 14. *n.* 50.

violaceofulvus. 113. A. pileo convexo violaceo, ſtipite lineari concolore, lamellis umbrinis. *Planer fung. Erf. p.* 17. *n.* 65.

holoſericeus. 114. A. pileo campanulato tomentoſo brunneo-ferrugineo, ſtipite elongato gracili fuſco ſurſum luteo, lamellis pallidiſſimis. *Planer fung. Erf. p.* 17. *n.* 67.

†††††† *pileo infundibuliformi vel obliquo.*

infundibuliformis. 115. A. ſiccus albus ſenio ſubtinctus, pileo maximo umbonato, lamellis inæqualibus ramoſis, ſtipite lævi. *Buxb. cent.* 4. *t.* 1.

ſubalutaceus. 384. A. ſubruſeſcens ſubcoriaceus, pileo margine involuto, ſtipite albo-tomentoſo vel floccoſo, lamellis ordine quadruplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 27. *t.* 33. *f.* 194.

cochleariformis. 116. A. ſiccus albidus, pilei margine undulatim ſtriato, lamellis craſſis ramoſis, ſtipite obliquo brevi craſſo. *Schæff. fung. t.* 225.

flammeus. 117. A. luteus, pileo lacerato-ſquamoſo, ſquamis diverſicoloribus, lamellis crenatis, ſtipite brevi farcto. *Schæff. fung. t.* 29. 30.

tubæformis. 118. A. pileo pallide aureo, lamellis decurrentibus ſimplicibus ſubdentatis albis, ſtipite longo tereti fuſiformi recurvo. *Schæff. fung. t.* 248. 249.

cyathiformis. 119. A. albidus vel pallidus, lamellis decurrentibus anguſtis diviſis, ſtipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 248.

impreſſus. 120. A. pileo obconico griſeo, margine revoluto plicato, lamellis numeroſis vireſcentibus, ſtipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 38.

ſanguinolentus. 121. A. ſtipite farcto pileoque ſanguineis, lamellis ſimplicibus apice fiſſis albidis fragilibus ſtipiti continuis. *Bulliard herb. Franc. t.* 42.

obconicus. 122. A. murinus, pilei margine undulato, lamellis decurrentibus utrinque acuminatis duplici ordine digeſtis, ſtipite farcto ſurſum dilatato. *Bulliard herb. Franc. t.* 286.

furcatus. 123. A. pileo farinoſo viridi-cinereo, lamellis furcatis ſtipiti farcto ſpongioſo continuis. *Bulliard herb. Franc. t.* 26.

atro-tomentoſus. 124. A. pileo obliquo ſubſcabro ferrugineo-fuſco, lamellis pallide ochraceis diſtincte adnatis, ſtipite brevi craſſo tereti ſubincurvo fuliginoſo tomentoſo. *Batſch el. fung.* 89. *f.* 32.

caliciformis. 125. A. pileo lævi carneo-fulveſcente, margine involuto, ſtipite craſſo concolore griſeo-tomentoſo ſurſum ampliato, lamellis pallide ochraceo-carneis decurrentibus. *Schæff. fung. t.* 252.

degener. 126. A. pileo carneo-fulveſcente circulis concentricis ſaturatioribus picto, margine lacero, ſtipite concolore lineari elongato ſurſum ampliato, lamellis pallide carneo-ochraceis decurrentibus. *Schæff. fung. t.* 243.

liveſcens. 127. A. humeſcens, pileo cinereo-livido, lamellis inæqualibus ut plurimum integerrimis contiguis ſtipiteque elongato ſubfibroſo ſubconcoloribus. *Batſch el. fung. cent.* 55. *f.* 67.

cervinus. 128. A. ſtipite in pileum oblique reflexum dilatato cervino ſubtus tuberoſo tomentoſo, lamellis anguſtiſſimis albis inæqualiter decurrentibus. *Hoffm. nomencl. fung. n.* 139. *t.* 2. *f.* 2.

neptuneus. 129. A. glaber ochraceo-carneus, ſtipite ſubelongato in pileum dilatato, lamellis anguſtis diſtantibus ſæpe bifidis. *Batſch el. fung. cent.* 161. *f.* 118.

alutaceus. 130. A. glaber pallide carneus, pileo bitcido, lamellis latiuſculis inæqualibus. *Batſch el. fung. cent.* 163. *f.* 119.

alabaſtrinus. 131. A. totus niveus diaphanus, pileo obliquo umbonato, lamellis rarioribus ſubdecurrentibus, ſtipite ſurſum incraſſato, baſi pallide roſeo. *Plan. fung. Erf. p.* 5. *n.* 8.

flabellatus. 132. A. pileo difformi fuſco vel lurido vario, lamellis ſubrepandis ſtipiteque brevi cylindrico ſordide albis. *Schæff. fung. t.* 43. 44.

ſemipetiolatus. 133. A. pileo ochraceo-croceo ſubcarneo ſubfaſciato, margine undulato, ſtipite concolore farcto obconico, lamellis pallidioribus ramoſis. *Schæff. fung. t.* 208.

tremulus. 134. A. nigro-fuſcus lividus faſciatus, lamellis ſordide albis, ſtipite tereti farcto. *Schæff. fung. t.* 224.

craſſus. 135. A. pileo obliquo tomentoſo fuſco-olivaceo, lamellis bifidis ſubramoſis flavis, ſtipite craſſo dilatato luteo, tomento olivaceo. *Plan. fung. Erf. p.* 5. *n.* 7.

136. A.

oſtreatus. 136. A. pileo coriaceo ſtipiteque planiuſculo pallide ochraceis, lamellis umbrinis. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 104.

⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ ⊢ *pileo dimidiato, ſtipite laterali.*

dimidiatus. 137. A. pileo ſquamiformi maculis latis tubellis vario, lamellis pallide ſulphureis, ſtipite brevi albido. *Schæff. fung.* *t.* 233.

aggregatus. 138. A. gregarius, pileo fuſco, margine lobato criſpo, lamellis rufeſcentibus ramoſis ſubdecurrentibus, ſtipite craſſo curvo farcto fuſceſcenti-albo. *Schæff. fung. t.* 305. 306.

palmatus. 139. A. gregarius, pileo convexo obliquo ſpadiceo vel obſcure ligneo, lamellis concoloribus inæqualibus margine undulatis, ſtipite albido farcto brevi. *Bull. herb. Franc. t.* 216.

petalodes. 140. A. pileo violaceo-fuſco, margine undulato, lamellis confertis decurentibus flavicantibus, ſtipite albido farcto. *Bull. herb. Franç. t.* 226. β) *Batſch el. fung.* 89. *t.* 8. *f.* 33.

conchatus. 141. A. pallide cinnamomeus, pileo conchiformi, lamellis inæqualibus longioribus decurrentibus, ſtipite arcuato farcto. *Bull. herb. Franc. t.* 298.

fallax. 142. A. fuceſcenti-aurantius, pileo ſemiorbiculari, lamellis latiuſculis, tribus brevioribus inter duas longiores poſitis, ſtipite brevi horizontali. *Bull. herb. Franc. t.* 324.

glaucus. 143. A. canus pileo ſericeo tenello, lamellis diſtantibus alterne brevioribus, ſtipite albidiore brevi pruinato. *Batſch el. fung. cent.* 170. *f.* 123.

flurſtedtienſis. 144. A. othraceo-pallens, ſtipite brevi poſterius lato tomentoſo pede adnato. *Batſch el. fung. cent.* 171. *f.* 124.

bucinalis. 385. A. tener ex cæſio albus, pileo membranaceo foyente, lamellis in ſtipitem brevem flexuoſum decurrentibus, *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 85. *t.* 39. *f.* 214.

fragillimus. 386. A. ochraceus pileo convexo fragilli, medio umbilicato, ſtipite gracili brevi. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 87. *t.* 39. *f.* 215.

obeſus. 387. A. craſſus ochroleucus, pileo pulvinato inæquali, ſtipite brevi rufeſcente. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 89. *t.* 39. *f.* 216.

flabelliformis. A. ceſpitoſus, pileo ſubfurfuraceo pallido, lamellis ſubcinnamomeis, ſtipite laterali compreſſo apice dilatato. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 140. Agaricus ſtypticus.

Xxxx 2

ichoratus. 154. A. pileo opaco tenello ſicco ochraceo-fulvo, vertice depreſſo, margine croceo elevato, lamellis inæqualibus extrorſum bifidis cum ſtipite pallide ochraceis. *Batſch el. fung. cent.* 37. *f.* 60.

cimicarius. 155. A. ferrugineo-fulvus, pileo opaco humeſcente infundibuliformi, lamellis triplicis longitudinis per regulas ſæpe connexis, ſtipite teretiuſculo fiſtuloſo. *Batſch el. fung. cent.* 59. *f.* 69. *nonne mera ruſeſcentis varietas?*

opacus. 156. A. ſuccum acrem album fundens, pileo rigido humeſcente viſcoſo, fuſceſcente-cinereo, vertice excavato obſolete concentrice faſciato, lamellis latis triplicis longitudinis utrinque anguſtioribus ochraceo-carneis, ſtipite albido. *Batſch el. fung. cent.* 57. *f.* 68. *an varietas agacris?*

piperatus. 157. A. albus ſuccum acrem fundens, pileo lævi fragili, vertice (ſeneſcentis) excavato, margine deflexo, lamellis inæqualibus irregularibus anguſtis, ſtipite farcto utrinque anguſtato. *Bolton fung.* 21. *t.* 21. *Schæff. fung. t.* 83.

Bulliardi. 158. A. acris, pileo lævi dilute cinnamomeo, vertice excavato, margine inflexo crenulato, lamellis duplicis longitudinis, ſtipite tereti craſſo. *Bull. herb. Franc. t.* 292.

amarus. 159. A. ſuccum acrem fundens, pileo ochroleuco, vertice (adulti) excavato, margine undulato, ſtipite concolore craſſo tereti farcto, lamellis ramoſis flavicantibus. *Kern Schw. t.* 9. *f.* 1.

acris. 360. A. pileo diſtorto mutabili fuſceſcente, lamellis triplicis ordinis, ſtipite compreſſo ſulcato deorſum anguſtato. *Bolton fung.* 2. *t.* 60. *nonne plumbeo affinis?*

┬ ┬ *læves, membranacei, vix carnoſi.*

⊢ Coriacei, *pileo lamelliſque coriaceis.*

melleus. 160. A. pileo convexo pallide ſulphureo ferrugineoque, margine pallido ſtriato, lamellis albidis, ſtipite elongato tereti ſublineari fiſtuloſo cereo. *Schæff. fung. t.* 45.

caryophyllæus. 161. A. pileo convexo exſoleте aureo, vertice elevato ſubferrugineo, margine crenulato, lamellis pallide cinnamomeis, ſtipite flavicante tenui tereti farcto. *Schæff. fung. t.* 77.

cereolus. 162. A. pileo campanulato pallide ſulphureo, margine ochraceo ferrugineo, lamellis cinereo-fuſcis, ſtipite elongato niveo farcto. *Schæff. fung. t.* 51.

lacrimalis. 163. A. pileo depreſſo fuſceſcente ochraceove, lamellis ochraceo-fuſcis inæqualibus ſtipite obſcuriori elongato lineari baſi bulboſo. *Batſch el. fung.* 75. *f.* 7. 8.

auricomus. 164. A. pileo lævi ſicco depreſſo, medio elevato, luteo fuſco-radiato, lamellis anguſtis fuſco-cinereis duplicis longitudinis, ſtipite lineari brevi ſemipellucido fuſceſcente. *Batſch el. fung.* 75. *f.* 21.

farinoſus. 165. A. farinoſus, pileo conico depreſſo lævi pallidiſſime ochraceo, medio flavicante, lamellis exſolete terreis, ſtipite elongato lineari albido ſemipellucido baſi bulboſo, *Schæff. t.* 205. *an hujus cohortis?*

candicans. 166. A. pileo convexo ſubviſcido nitente flavicante, lamellis fuſcis, ſtipite lineari albo farcto annulato. *Schæff. fung, t.* 21.

umbilicatus. 167. A. ochroleucus, pilei vertice umbilicato flavicante, lamellis, ſubdecurrentibus, ſtipite tereti farcto ſurſum ampliato. *Schæff. fung. t.* 207.

decurrens. 168. A. ochroleucus, pilei vertice umbilicato, margine plicato-ſtriato, lamellis decurrentibus, minoribus interſitis, ſtipite elongato tereti fiſtuloſo. *Schæff. fung. t.* 232. *an varietas umbilicati?*

fuſceſcens. 169. A. pileo convexo fuſco, lamellis fuſco-fulventibus, ſtipite lineari ſubelongato pallido fiſtuloſo. *Schæff. fung. t.* 60.

collinus. 170. A. pileo convexo umbonato albo vel pallide-ochraceo nitente, ſtipite concolore elongato ſemipellucido fiſtuloſo, lamellis griſeo-albis. *Schæff fung. t.* 220.

criſtatus. 171. A. pileo lacteo ſquamis faſciculatis ſpadiceis vario, lamellis teneris albis triplici ordine digeſtis, ſtipite tereti fiſtuloſo fuſceſcente. *Bolton fung.* 7. *t.* 7. *Bull. herb. Franc. t.* 405. *β*) *Bulliard herb. Franc. t.* 70. *t.* 506. *f.* 2.

tigrinus. A. pileo convexo ſquamato albido, centro depreſſo, lamellis decurrentibus luteſcentibus. *Bull. herb. Franc. t.* 70.

caſtaneus. 172. A. pileo lævi ſericeo caſtaneo, lamellis teneris rubello-fuſcis, tertii ordinis breviſſimis, ſtipite lineari albo fiſtuloſo elaſtico. *Bulliard herb. Franc. t.* 268.

irregularis. 173. A. pileo ſordido viſcido ſpadiceo, margine lobato-undulato, lamellis diſtantibus obſcure carneis triplici ordine digeſtis, ſtipite tereti lævi fiſtuloſo cineraſcente duro. *Bolton fung* 13 *t.* 13.

elaſticus. 174. A. pileo convexo ferrugineo, carne cortinaque elaſticis lamelliſque triplici ordine digeſtis latiuſculis diſtantibus albis, ſtipite inæquali farcto elaſtico ferrugineo. *Bolton fung.* 16. *t.* 16.

plum[illegible] ſ[illegible] 175. A. pileo hemiſphærico murino ſquamulis lanatis obſeſſo, lamellis latis numeroſis albis flexilibus triplici ordine poſitis, ſtipite lineari elongato ſquamato. *Bolton fung.* 33. *t.* 33.

nigro-villoſus. 176. A. pileo humeſcente tomentoſo nigricante (adulti) cucullato, margine inæquali, ſtipite lineari albo, lamellis introrſum latioribus (ſeneſcentis) rubellis. *Bulliard herb. Franc. t.* 214.

fiſſus. 177. A. pileo conico fuſco, margine ſtriato olivaceo, lamellis latis numeroſis tenuibus flexilibus aurantio-carneis triplici ordine poſitis, ſtipite murino elaſtico fiſtuloſo compreſſo. *Bolt. fung.* 35. *t.* 35.

rubens. 178. A. ruberimus mollis, pileo opaco, lamellis latis teneris pellucidis triplici ordine digeſtis, ſtipite farcto elongato. *Bolton fung.* 36. *t.* 36. *an ſatis diſtinctus a ſanguineo?*

ramealis. 179. A. pileo (adulti) excavato albo, medio fuſco rubellove, lamellis numeroſis diviſis ſtipiteque farcto tereti albidis. *Bulliard herb. Franc. t.* 336.

velutipes. 180. A. gregarius, pileo convexo flavo lævi, lamellis ligneis, minoribus interſitis, ſtipite fiſtuloſo inferne tomentoſo nigro ſuperne igneo. *Bulliard herb. Franc. t.* 344. *Curtis flor. Lond.*

ardeſiacus. 181. A. pileo hemiſphærico concentrice ſtriato ſtipiteque fiſtuloſo ſuperne cæruleſcentibus, hoc inferne albo, lamellis latis igneis inter binas longiores quinis brevioribus. *Bulliard herb. Franc. t.* 348.

repens. 182. A. pileo convexo flavicante, centro depreſſo, lamellis concoloribus diviſis, ſtipite repente fiſtuloſo fibroſo-ramoſo, ramis rubris. *Bulliard herb. Franc. t.* 90.

croceus. 183. A. pileo croceo lævi ſicco truncato-conico, vertice mammillari, margine repando-lacero, lamellis rarioribus, ſtipite flavicante farcto tereti. *Bulliard herb. Franc. t.* 50. *β)* Agaricus coccineus. *Schæff. fung. t.* 302. *γ)* Agaricus pſittacinus. *Schæff. fung. t.* 301.

Hyacin-thus. 184. A. pileo conico luteo-vel vireſcenti-fuſco, lamellis pallidioribus, ſtipite elongato lineari recto fiſtuloſo. *Batſch el. fung.* 81. *t.* 28. *an diſtinctus ſatis a faſtigiato ?*

vinoſus. 185. A. fuſcus vinum olens ſubacris, pileo orbiculari ſicco, medio verrucoſo, lamellis confertis, ſtipite farcto. *Bulliard herb. Franc. t.* 54.

auratus. 365. A. pileo convexo viſcido ſtipiteque fiſtuloſo e[illegible]us aurantiis, lamellis ſulphureis. *Bolton fung.* 2. *t.* 67. *f.* 2.

ſciſſus. 366. A. ſulphureus pileo ſubconico margine lacero, lamellis latiſſimis baſi anguſtis triplicis ordinis, ſtipite fiſtuloſo contorto. *Bolton fung.* 2. *t.* 68.

ſuperſti-tioſus. 186. A. albidus, pileo orbiculari ſicco, centro impreſſo luteo, lamellis ſubflexuoſis duplicis longitudinis; ſtipite lineari ſuperne fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 56.

ramoſus. 187. A. albus, pileo orbiculari ſicco, margine convexiuſculo, lamellis minoribus paucioribus inter longiores, ſtipitibus pluribus farctis flexuoſis e communi trunco. *Bull. herb. Franc. t.* 102.

pilulifor-mis. 188. A. pileo ſicco globoſo fuſceſcente, margine albido, lamellis albis diviſis, ſtipite fiſtuloſo albido ſuperne incraſſato. *Bull. herb. Franc. t.* 112.

contor-tus. 189. A. pileo ſicco umbrino convexo, vertice papilloſo, lamellis fragilibus ſtipiteque ſpirali albidis. *Bulliard herb. Franc. t.* 36.

amari-cans. 190. A. pileo unguinoſo flavo-viridi, ſtipite concolore ſubflexuoſo fiſtuloſo, lamellis viridibus, minoribus inter longiores poſitis. *Bulliard herb. Franc. t.* 30.

cyaneus. 191. A. unguinoſus, pileo rotundo cæruleo, vertice mammillari fuſceſcente, margine albo-floccoſo, ſtipite concolore ſubtomentoſo, lamellis umbrinis diviſis. *Bulliard herb. Franc. t.* 170. *an diverſus a Beryllo ?*

Beryllus. 192. A. pileo convexo conico flavo extrorſum thalaſſino fibroſo, lamellis inæqualibus pallide rubellis, ſtipite elongato lineari flaveſcente, annulo nigricante. *Schæff. fung. t.* 1. Agaricus viridulus.

moſcha-tus. 193. A. moſchum olens, pileo plano thalaſſino ſicco, lamellis numeroſis diviſis, ſtipiteque lineari firmo albidis. *Bull. herb. Franc. t.* 176.

ſulphureus. 194. A. ſulphureus, pileo ſubconico ſicco, lamellis numeroſis triplici ordine digeſtis, longioribus ſtipiti fibroſo contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 168.

olivaceus. 195. A. pileo convexo-conico lævi integro aureo, centro ferrugineo, lamellis numeroſis confertis olivaceis margine ſinuatis quintuplicis longitudinis, ſtipitibus aggregatis divaricatis aſcendentibus elongatis linearibus fiſtuloſis, annulo ſtriato. *Mich. nov. pl. gen. p.* 199. *t.* 80. *f.* 7.

abbreviatus. 196. A. pileo obtuſe conico ferrugineo aut fuliginoſo, lamellis albidis aut flaveſcentibus, ſtipite elongato exalbido (ſeneſcentis) fiſtuloſo. *Schæff. fung. t.* 250. & 253.

ſubcorneus. 197. A. pileo conico depreſſo caſtaneo, margine aurantio, lamellis craſſis inæqualibus, ſtipiteque elongato lineari flexuoſo fiſtuloſo pallidis. *Batſch el. fung.* 83.

ſanguineus. 198. A. ſanguineus, pileo convexo lævi, lamellis diviſis, ſtipite tereti lineari farcto, annulo fibroſo aurantio. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 15. *f.* 3.

cereus. 199. A. pileo hemiſphærico ſicco lævi cereo, lamellis tenuibus diſtantibus integris diviſiſque flaveſcentibus, ſtipite tereti lineari flavo, medio fiſtuloſo. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 105. *t.* 15. *f.* 2.

ſordidus. 200. A. lamellis ſimplicibus rectis pileoque plano livido-fuſcis, centro umbilicato, margine depreſſo, ſtipite baſi craſſiore. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 56. *t.* 3. *f.* 1.

flavo-flocceſus. 201. A. pileo umbonato ſulphureo ocrhaceo obumbrato furfuraceo, margine crenulato ſtipiteque farcto ſubferrugineo floccis furfuraceis inæquali, lamellis ſubquadruplicis longitudinis albentibus. *Batſch el. fung. cent.* 117. *f.* 97.

circumſeptus. 202. A. pileo ſubcarneo ante marginem ſtipiteque medio ſæpe floccis furfuraceis cincto, lamellis latis ferrugineis triplicis longitudinis. *Batſch el. fung. cent.* 119. *f.* 98.

roſellus. 203. A. pileo ſubcarneo convexiuſculo opaco, lamellis laxis triplicis longitudine ſtipiteque farcto toto fibroſo rubellis. *Batſch el. fung. cent.* 121. *f.* 99.

ſubcarneus. 204. A. humeſcens, pileo mutabili ochraceo, ſtipite fiſtuloſo recto fibroſo, lamelliſque carneolis, his ſemipellucidis triplicis longitudinis, longiſſimis ſtipiti adnatis. *Batſch el. fung. cent.* 123. *f.* 100.

cineraſcens. 205. A. pileo glabrato ſtipiteque fibrilloſo farcto fuſco-cinereis, lamellis flaveſcentibus quadruplicis ordinis, longioribus ſtipite affixis. *Batſch el. fung. cent.* 125. *f.* 101.

obſoleſcens. 206. A. pileo pulvinato lævi ochraceo-carneo, lamellis latiuſculis lividis, ſtipiti concolori farcto ſpongioſo affixis ſubquadruplici ordine diſpoſitis. *Batſch el. fung. cent.* 127. *f.* 102. β) Agaricus obſoletus. *Batſch el. fung. cent.* 129. *f.* 103.

tremebundus. 207. A. pileo pallide carneo, medio craſſiuſculo, ſtipite fibroſo toto fiſtuloſo, lamellis inæqualibus pileo ſoli adnatis. *Batſch el. fung. cent.* 129. *f.* 104. β) *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 73. *t.* 38. *f.* 209. γ) *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 75. *t.* 38. *f.* 210.

cano-brunneus. 208. A. humeſcens, pileo tenero ſtipiteque fibroſo fiſtuloſo carneo-caneſcentibus, lamellis brunneis ſubquadruplicis longitudinis, extremo margine farinaceo. *Batſch el. fung. cent.* 133. *f.* 105.

candido-bulboſus. 209. A. pileo umbonato ſtipiteque ſolido validiuſculo baſi bulboſo pileum ſuſtentante albis ſericeo-nitentibus, lamellis lividis ſubtriplicis longitudinis, extimo margine albo. *Batſch el. fung. cent.* 133. *f.* 106.

aurivenius. 210. A. pileo umbonato obſcurius fibroſo-venoſo ſtipiteque obſolete fibroſo baſi bulboſo flaventibus, lamellis inæqualibus pileo ſoli adnatis margine crenato furfuraceo-albis. *Batſch el. fung. cent.* 137. *f.* 107. *Bull. herb. Franc. t.* 388.

bulbularis. 211. A. pileo lævi pulvinato hemiſphærico depreſſo luteſcente, ſtipite albo ſericeo-nitente farcto bulboſo pileum ſuſtentante, lamellis ſemiorbicularis pileo ſoli adnatis livido-fulvellis triplicis ordinis. *Batſch el. fung. cent.* 137. *f.* 108.

coriaceus. 212. A. pileo depreſſo-convexo carneo-ochraceo, ſtipite farcto elongato torto, pileum ſuſtentante lamellisque pileo ſoli adnatis pallidioribus. *Batſch el. fung. cent.* 139. *f.* 109.

tomentoſus. 213. A. pileo convexo-conico tomentoſo fulvo, ſtipite gracili, annulo fugaci. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 241. *t.* 2. *f.* 1.

muſco-[illegible]. 214. A. pileo impreſſo dilatato flavo-fuſco, ſtipite brevi baſi incraſſato, lamellis horizontalibus pallidioribus. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 242. *t.* 5. *f.* 3.

ſemiglobatus. 215. A. pileo glabro ſemigloboſo flaveſcente, ſtipite ſubconcolore opaco, medio nigro-granulato gracili elongato pi-

leum ſuſtentante, lamellis cinereis obſcurius maculatis, majoribus ſtipiti adnexis. *Batſch el. fung. cent.* 141. *f.* 110. *β*) Agaricus clypeatus. *Bolton fung.* 2. 57. *t.* 57.

diffuſus. 216. A. pileo tenero lævi livido-carneo, lamellis elongatis violaceo-fulvis quadruplicis ordinis, majoribus ſtipiti adnexis, ſtipite niveo elongato fiſtuloſo pileum ſuſtentante. *Batſch el. fung. cent.* 143. *f.* 111.

purpureus. 217. A. pileo hemiſphærico ſtipiteque brevi fiſtuloſo purpureis, lamellis triplicis ordinis albidis. *Bolton fung.* 41. *t.* 41 *f.* B.

contortilis. 218. A. pileo fuſco ſtriato undulato, lamellis ſtipiteque brevi carneis. *Bolton fung.* 41. *t.* 41. *f.* A.

granuloſus. 219. A. pileo albo-granulato ſtipiteque lineari valido ochraceo-ferrugineis, lamellis albis. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 24.

hiſpidus. 220. A. pileo brunneo, vertice hiſpido, ſtipite lineari valido lamellisque pallidiſſime concoloribus. *Batſch el. fung.* 81. *f.* 25.

fuliginatus. 221. A. pileo conico ſtriis niveis caneſcentibus & obſolete fuligineis ſubſquamoſo, ſtipite lineari ſubelongato valido lamellisque niveis. *Batſch el. fung.* 81. *f.* 26.

atro-ſquamoſus. 222. A. pileo fuſceſcente-niveo maculis ſtriatis nigris ſubſquamoſo, ſtipite ſubulato valido lamellisque albis. *Batſch el. fung.* 81. *f.* 27. *β*) Agaricus conſpurcatus. *Willd. prodr. fl. berol. n.* 1104. *Mich. nov. pl. gen. t.* 78. *f.* 6-8. *an diſtincta ſatis a criſtato ſpecies?*

umbraculum. 223. A. pileo rorido depreſſo-conico lamellisque rarioribus triplicis longitudinis fuſceſcenti-cinereis, ſtipite ſubulato albo ſtriato torto. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 4.

Placenta. 224. A. pileo depreſſo umbonato cinereo fuſceſcente, lamellis carneo-albis, ſtipite lineari elongato valido fibroſo torto. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 18. *nonne forſan olypanti varietas?*

murinus. 225. A. pileo depreſſo atro, lamellis ſtipiteque elongato lineari valido atro-ſtriato cinereis. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 19.

farinaceus. 226. A. pileo rubro-violaceo convexo, vertice ſubdepreſſo, lamellis violaceis, ſtipite fuſceſcente. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1117. *Schæff. fung. t.* 8. *t.* 12. *t.* 13. *f.* 1-3. *t.* 223.

ianthinus. 227. A. violaceo-rubens, pileo ſubconvexo, lamellis diſtantibus convexis decurrentibus, ſtipite elongato lineari. *Schæff. fung. t.* 13. *f.* 2. 4. 5-8.

laccatus. 228. A. ſubcarneus, pileo ſtriato convexo, vertice depreſſo, ſtipite tereti recto. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 20.

majalis. 229. A. ſuaveolens, pileo convexo ſicco dilute coriaceo, ſtipite concolore deorſum incraſſato, lamellis membranaceis ſubdecurrentibus utrinque acuminatis. *Bull. herb. Franc. t.* 142.

mammoſus. 230. A. ſuaveolens dilute fuſcus, pileo difformi, lamellis latiuſculis divifis a ſtipite lineari farcto ſpirali diſtantibus. *Bull. herb. Franc. t.* 144.

alliatus. 231. A. allium redolens ſapienſque canus, pilei margine undulato ſtriato, lamellis diviſis ſtipiti contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 153. *vix diſtinctus ab alliaceo.*

alliaceus. 232. A. allium ſapiens reddenſque, pileo convexo glabro e fuſco-palleſcente, lamellis albidis, ſtipite atro nitido fiſtuloſo. *Jacq. flor. auſtr.* 1. *t.* 82.

plicatus. 233. A. allium ſapiens olenſque, pileo planiuſculo, margine luteo-rufo undulato-plicato, lamellis inæqualibus albidis ſtipite tereti lineari rufo. *Schæff. fung. t.* 99. *f.* 2. 5-8.

abietis. 234. A. pileo glaberrimo ſubviſcido depreſſo-convexo, lamellis albidis, ſtipite lineari elongato fulvo. *Schæff. fung. t.* 99. *f.* 1. 3. 4.

pineti. 235. A. ceſpitoſus, pileo depreſſo-convexo umbonato glaberrimo ſubniveo, lamellis ſubconcoloribus inæqualibus, ſtipite gracili lineari obſcuro. *Batſch el. fung.* 73. *f.* 9.

eſculentus. 236. A. pileo convexo terreo, ſtipite gracili fiſtuloſo ſordide ochroleuco, lamellis albis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *t.* 14. *f.* 4.

Clavus. 237. A. pileo planiuſculo umbonato luteo, margine ſtriato plicatove, lamellis ſordide albis, ſtipite lineari tereti farcto, inferne torto. *Schæff. fung. t.* 59.

fibrilloſus. 238. A. pileo convexo lamelliſque paucioribus griſeis, ſtipite gracili lineari fiſtuloſo ſubſpadiceo. *Schæff. fung. t.* 236. *an mera Clavi varietas?*

crenulatus. 239. A. pileo dilute cinnamomeo albo-pulverulento, margine crenato, lamellis ſtipiteque gracili fiſtuloſo concoloribus *Schæff. fung. t.* 226.

ſubcoriaceus. 240. A. pileo convexiuſculo fuſceſcente-ochraceo, margine integro, lamellis fuſco-lividis, ſtipite lineari elongato ſubgracili flavicante. *Schæff. fung. t.* 203.

atro ru-fus. 241. A. pileo convexo umbonato hepatico albido-ſtriato, margine crenato, lamellis ſtipiteque lineari gracili elongato fiſtuloſo pallidioribus. *Schaeff. fung. t.* 234.

ſetaceus. 242. A. pileo umbonato miniato, lamellis aureis, ſtipite elongato ſubſubulato pallide ſulphureo. *Schaeff. fung. t.* 222.

angulatus. 243. A. albus pileo plano, margine fimbriato repando-angulato, lamellis raris, ſtipite elongato gracili. *Mich. nov. pl. gen. p.* 146. *t.* 74 *f.* 4.

Clavis. 244. A. ſuaveolens, pileo rotundo luteo-fuſco, lamellis ramis diviſis ſtipiti nigricanti tereti brevi farcto contiguis. *Bull. herb. Franc. t.* 148.

Fibula. 245. A. ochroleucus, pileo rotundo infundibuliformi, lamellis decurrentibus, ſtipite lineari laevi farcto. *Bull. herb. Franc. t.* 186.

Campanella. 246. A. pileo conico-convexo umbilicato glabro ſtriato ſtipiteque tereti farcto fragili gracili croceis, lamellis pallide ſulphureis. *Schaeff. fung. t.* 230.

minutus. 247. A. parvus, pileo campanulato fuſceſcente ſtriato, ſtipite brevi incurvo. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.*277. *t.*6. *f.*3.4.

ferruginatus. 248. A. pileo minuto conico luteſcente, medio ferrugineo, lamellis ſtipiteque elongato torto ſubſubulato pallidiſſime fuſceſcentibus. *Batſch el. fung. cent.* 109. *f.* 92.

hypni. 249. A. pileo umbonato pallide ochraceo, margine plicato ferrugineo, lamellis ferrugineis triplicis ordinis, intimis ſtipiti gracili fiſtuloſo affixis. *Batſch el. fung. cent.* 117. *f.* 96.

ſtriatellus. 250. A. pileo conico ſubovato albo griſeo-flavente denſe plicato, lamellis plumbeis inaequalibus, ſtipite filiformi fiſtuloſo albo. *Schaeff. fung. t.* 211.

Fumus. 251. A. pileo conico ſubovato acuminato fuſco vel flavente, lamellis rubris, ſtipite lineari elongato pallidiori. *Schaeff. fung. t.* 63. 70. 229.

fuliginarius. 252. A. pileo conico ſubovato acuminato atro ſcabro, ſtipite valido ſubconcolore ſuperius albente, lamellis carneis. *Batſch el. fung.* 71. *f.* 40.

contractus. 253. A. pileo nigro-fuſceſcente ſtriato oblongo, margine conſtricto albidiore, ſtipite fibroſo flexuoſo ſtriato ſubconcolore, baſi hiſpidula albidiore. *Batſch el. fung. cent. f.* 85.

glandifer. 254. A. pileo oblongo nigro-fuſco ſtriato, margine conſtricto albo, ſtipite lineari nigro-fuſco, lamellis albis elongatis. *Batſch el. fung. cent.* 99. *f.* 86.

atro-cyaneus. 255. A. niger cyaneo-pruinatus, pileo cucullato denſe ſtriato-ſulcato, margine extremo lamelliſque albidioribus, ſtipite elongato lineari ſtriato-ſulcato. *Batſch el. fung. cent.* 1101. *f.* 87.

luridus. 256. A. pileo glabro humeſcente ochraceo-cineraſcente, ſtipite lineari albo baſi clavato lamellis duplicis ordinis ſpadiceis. *Batſch el. fung. cent.* 107. *f.* 90.

rimoſus. 389. A. pileo fuſco-griſeo pruinato ſæpius albo-rimoſo, ſtipite ſericeo fibroſo niveo, laminis albidis latis laxis ſubundulatis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 63. *t.* 37. *f.* 206.

marginatus. 390. A. pileo glabro ſubferrugineo margine membranaceo, ſtipite fibrilloſo ex livido ochraceo baſi niveo, lamellis ferrugineis triplicis ordinis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 65. *t.* 37. *f.* 207.

alterabilis. 391. A. pileo luteſcente depreſſo-conico, ſtipite fibrilloſo, lamellis fuſco ferrugineis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 69. *t.* 38. *f.* 208.

viſceralis. 392. A. ex hepatico fulvus, pileo convexo fovente ſtipite gracili baſi albo, lamellis craſſis rarioribus, ordine triplici. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 77. *t.* 38. *f.* 211.

chryſodon. 393. A. albus pilei margine crenato luteſcente, ſtipite ſuperne luteo-pruinato, laminis margine ſulphureo-pruinatis. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 79. *t.* 38. *f.* 212.

†† tenelli, *pileo lamelliſve & ſtipite pellucidis, ut plurimum concoloribus, illo ſtriato, plicato.*

gracilis. 353. A. pileo ſubconico elaſtico ſicco, lamellis paucis trifidis rubris ſtipite prælongo gracili. *Bolton fung.* 2. *t.* 51. *f.* 1.

ſulphuratus. 257. A. pileo luteſcente-cano convexo plicis latis inæquali, lamellis albidis duplicis ordinis, ſtipite lineari elongato fiſtuloſo ſulphureo. *Schæff. fung. t.* 31.

aduſtus. 258. A. fuſcus, pileo convexo-conico late plicato extorſum pallide griſeo, ſtipite lineari elongato fiſtuloſo. *Schæff. fung. t.* 32.

piloſulus. 259. A. fuſco-cineraſcens, pileo convexo ad latera late plicato, margine dentato-repando, lamellis duplicis longitu-

Digitized by Google

dinis, ſtipite filiformi inferne ad latera piloſo. *Batſch el. fung.* 67. *f.* 2.

Tintinabulum. 260. A. cinereus, pileo ſemiovato integro ad latera denſe ſtriato, ſtipite lineari elongato flavicante. *Batſch el. fung.* 67. *f.* 3. *Schæff. fung. t.* 237. Agaricus palleſcens.

minutulus. 261. A. pileo campanulato obſolete aureo, lamellis raris flavicantibus, ſtipite tereti farcto curvulo albido. *Schæff. fung. t.* 308.

hirtus. 262. A. pileo conico ſtipiteque fiſtuloſo ſub tomento tenero glabris ſtriatis cinereis, lamellis concoloribus numeroſis diviſis utrinque acuminatis duplicis ordinis. *Bull. herb. Franc. t.* 138.

androſaceus. 263. A. pileo conico pellucido ſtriato crenato lamelliſque albidis, ſtipite gracili obſcuro. *Schæff. fung. t.* 239.

trichopus. A. albus, pileo campanulato ſubſtriato, ſtipite procero ſetaceo caudato albo. *Scop. flor. carn. ed.* 2. *n.* 1493.

bicolor. 264. A. lamellis raris diſtantibus pileoque caduco (ſeneſcentis) fuſceſcentibus, ſtipite capillari duro pellucido nigro. *Bolton fung.* 32. *t.* 32.

nothus. 265. A. albidus cineraſcens flavicanſve, lamellis decurrentibus, carne albo, ſtipite gracili farcto. *Bull. her. Franc. t.* 276.

umbellatus. 266. A. albidus, pileo convexo ſubconico tandem planiuſculo umbonato plicato, lamellis diſtantibus, ſtipite gracili terete fiſtuloſo. *Schæff. fung. t.* 309.

umbelliferus. 267. A. minutus albus pellucidus, pileo hemiſphærico, margine plicato, lamellis diſtantibus, ſtipite filiformi. *Bolton fung.* 39. *t.* 39. *f.* A.

candidus. 268. A. minutus albus, pileo hemiſphærico margine involuto, lamellis flexilibus, ſtipite tereti flexuoſo. *Bolton fung. t.* 39. *f.* D.

radiatus. 269. A. pileo cinereo radiate plicato ſtipiteque filiformi pellucidis. *Bolton fung.* 39. *t.* 39. *f.* C.

perforans. 270. A. pileo hemiſphærico marginato ſtriato, ſtipite ſetaceo nigro perforante. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 304. *t.* 4. *f.* 2. *an ſatis diſtinctus ab androſaceo?*

membranaceus. 271. A. pileo campanulato murino fuſco-ſtriato, ſtipite elongato fiſtuloſo ſubtus incraſſato. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 305. *t.* 6. *f.* 1.

nuceus. 367. A. pileo globoſo caſtaneo, margine lobato incurvo, lamellis undulatis triplicis ordinis, ſtipite gracili albo fiſtuloſo. *Bolton fung.* 2. *t.* 70.

ſulcatus. 282. A. cinereus pileo conico, vertice acuminato fuſceſcente, ſtipite elongato lineari deorſum incraſſato. *Schæff. fung. t.* 52. *f.* 7. 9. *an mera conici varietas?*

griſeus. 283. A. pileo conico explanato umbonato opaco plicis latis obtuſis arato, ſtipite elongato baſi fibrilloſo, lamellis triplicis longitudinis. *Batſch el. fung.* 87. *f.* 80.

clavularis. 284. A. tener vireſcenti-albus, pileo ſubhemiſphærico umbilicato obſolete plicato, lamellis paucioribus inæqualibus, ſtipite gracili baſi bulboſo. *Batſch el. fung. cent.* 89. *f.* 81.

Mucor. 285. A. minutiſſimus griſeus, pileo convexo, lamellis paucis, ſtipite tenero pellucido, baſi bulbo annulari inſerta. *Batſch el. fung. cent.* 91. *f.* 82.

ſacchari-nus. 286. A. albus, pileo conico-explanato opaco laxe plicato undulato, lamellis paucis anguſtis craſſis, ſtipite ſubulato rubente. *Batſch. el. fung. cent.* 93. *f.* 83.

acicularis. 287. A. minimus albidus, pileo hemiſphærico, lamellis paucis craſſiuſculis, ſtipite ſetaceo. *Hoffm. nomencl. fung.* 1. *n.* 322. *t.* 5. *f.* 2.

† † † *partim in liquorem nigrum diffluentes aut lamellis nigris inſtructi.*

momenta-neus. 288. A. pileo conico ſubpapilloſo cineraſcente-fuſco ſtriato crenulato, lamellis ſtipiteque fiſtuloſo lineari canis. *Bull. herb. Franc. t.* 128.

ſpadiceo-griſeus. 289. A. pileo pallido, umbone magis flavo, margine tenuiſſime ſtriato griſeo, lamellis (teneſcentis) nigreſcentibus, ſtipite elongato fiſtuloſo albido ſurſum graciliori. *Schæff. fung. t.* 237.

papyra-ceus. 290. A. albus, pileo hemiſphærico membranaceo, lamellis triplicis ordinis diſtantibus ætate nigreſcentibus, ſtipite fiſtuloſo. *Bolt. fung.* 11. *t.* 11.

umbilica-ris. 291. A. coriaceus albidus in liquorem fuſcum deliqueſcens, lamellis triplicis ordinis diſtantibus, ſtipite farcto. *Bolton fung.* 17. *t.* 17.

faſcicula-tus. 292. A. fuſceſcendo diffluens, pileo convexo lævi luteo, lamellis numeroſis anguſtis olivaceis, ſtipite flexuoſo fiſtuloſo flavo. *Bolton fung.* 29. *Vix diſtinctus a faſciculari.*

acumina-293. A. pileo conico acuminato pallide murino, lamellis atris, tus. ſtipite tereti anguſto fiſtuloſo atrorubente. *Schæff. fung. t.* 202.

ſordidu-294. A. pileo ſquamoſo ſordide luteo, lamellis terreis nigro-lus. pulverulentis, demum atris, ſtipite gracili elongato fiſtuloſo fuſceſcente. *Schæff. fung. t.* 210.

carbona-295. A. pileo conico nitente plumbeo, lamellis ſubquadrupli-rius. cis longitudinis nigris margine albidis, ſtipite ſemipellucido inferne ſpadiceo. *Batſch el. fung.* 69. *f.* 6. β) *Batſch el. fung. cent.* 107. *f.* 91.

ſubatra-296. A. pileo opaco umbonato denſe & alternatim plicato ſtria-tus. to ſtipiteque elongato fiſtuloſo ochraceo caneſcentibus, lamellis confertis bruneo-atris margine albidis. *Batſch el. fung. cent.* 103. *f.* 89.

marcoti-297. A. pileo convexo extrorſum plicis furcatis radiato, lamel-cus. lis cineraſcentibus alternis integris & dimidiatis, ſtipite ſubulato albo. *Batſch el. fung.* 79. *f.* 77.

ciliaris. 354. A. pileo conico ochroleuco, primo niveo-rorido, poſtea glutinoſo, margine ciliato, lamellis triplici ordine diſpoſitis, ſtipite albo baſi incraſſato. *Bolton fung.* 2. *t.* 53.

tricolor. 355. A. pileo campanulato fuſco ſtriato glabro, lamellis atris margine criſpis, ſtipite fiſtuloſo. *Bolton fung.* 2. *t.* 54.

papilliger. 298. A. pileo campanulato lacero griſeo-furfuroſo, margine ſtriato, vertice papillifero, ſtipite lineari pellucido nigro-pulverulento, lamellis atris margine niveis longioribus brevioribuſque alternis. *Batſch el. fung. cent.* 81. *f.* 78.

lacrima-299. A. pileo campanulato luteo, lamellis ſuccum atrum ſtil-bundus. lantibus fuſceſcentibus nigro maculatis inæqualibus. *Bull. herb. Franc. t.* 194.

clypei- 358. A. pileo viſcido umbonato, lamellis utrinque acuminatis formis. triplici ordine digeſtis prima ætate murinis, ſtipite longo cylindrico. *Bolton fung.* 2. *t.* 57.

††† Fuliginoſi, *pileo opaco conico, lamellis seneſcendo fuliginoſis tandem in ſeniem nigram diſfluentibus, ſtipite fiſtuloſo.*

congrega-300. A. gregarius, pileo flaveſcente-cano crenulato digiti-tus. formi, lamellis diviſis ſtipiteque lineari recto albidis. *Bull. herb. Franc. t.* 94.

301. A.

ſuccineus. 301. A. pileo convexo-campanulato lacero glabro pallide aurantio ſtriato, lamellis plumbeis, ſtipite ſubelongato albo. *Schæff. fung. t. 6.*

aqueus. 302. A. pileo glabro lacero cano-fuſceſcente leviter ſtriato plicatoque, lamellis nigro-fuſcis, ſtipite ſubelongato albo. *Schæff. fung. t.* 17.

tortus. 303. A. pileo lacero ſubcarneo confertiſſime ſtriato-ſulcato, lamellis atris, ſtipite elongato albo torto valido. *Schæff. fung. t.* 201.

cinereus. 304. A. pileo caneſcente umbonato confertiſſime ſtriato, lamellis connatis, ſtipite elongato fuſceſcente albo. *Schæff. fung. t.* 100.

margaritaceus. 305. A. pileo argenteo purpuraſcente miſto extrorſum ſtriato, ſtipite tereti ſqualido inferne incraſſato. *Schæff. fung. t.* 216.

ovatus. 306. A. pileo ſquamato ſtriato cano, ſtipite annulato elongato albo terete deorſum craſſiori, volva ovata ſquamoſa. *Schæff. fung. t.* 7.

Vaillantii. 307. A. gregarius, pileo ſtriato cinereo ovato tandem ſpadiceo campanulato, lamellis latiuſculis ſerrulatis, ſtipite lineari tereti albo. *Vaill. flor. par. t.* 12. *f.* 10. 11. *β*) Agaricus cylindricus. *Schæff. fung. t.* 8. γ) Agaricus fugax. *Schæff. fung. t.* 67. 68.

Balanus. 308. A. pileo dilute ochraceo demum fuſceſcente extorſum ſulcato lacero revoluto, lamellis livido-rubellis, ſtipite elongato gracili tereti albido. *Schæff. fung. t.* 66.

porcellaneus. 309. A. pileo aquoſe albo ſtriis longitudinalibus purpuraſcentibus ſquamiſque luteſcentibus vario fuſiformi demum campanulato, lamellis utrinque acuminatis, ſtipite flexuoſo. *Schæff. fung. t.* 47. 48.

ſqualidus. 310. A. pileo viſcido olivaceo cinereo, margine inæquali, lamellis æqualibus numeroſis confertis latiuſculis, ſtipite duro flexuoſo. *Bolton fung.* 25. *t.* 25. *an diſtinctus ſatis ab aqueo?*

domeſticus. 311. A. pileo primum ovato floccis fuſceſcentibus aſpero, margine undulato lacero, lamellis æqualibus latiuſculis numeroſis, ſtipite niveo. *Bolt. fung.* 26. *t.* 26.

papillionaceus. 312. A. pileo convexo-conico ſublacero, lamellis latiuſculis cinereo-vireſcentibus maculatis, ſtipite flexuoſo. *Bull. herb. Franc. t.* 83.

fimipu-tris. 313. A. pileo umbrino (ſeneſcentis) plano, margine inæquali, lamellis concoloribus nigro-maculatis diviſis, ſtipite nigro-annulato deorſum incraſſato. *Bull. herb. Franc. t.* 66.

pullatus. 314. A. pileo campanulato plicato atro viſcido, ſtipite elongato ventricoſo argenteo. *Bolton fung.* 20. *t.* 20. *an diſtinctus ſatis a cinereo ?*

ſtercora-rius. 315. A. pileo convexo diaphano cineraſcente nigro, margine lacero revoluto, lamellis canis, ſtipite ſubobliquo anguſto inferne incraſſato. *Bull. herb. Franc. t.* 68.

campa-nulatus. 316. A. pellucidus, pileo campanulato vario ſtriato, lamellis cinereis aſcendentibus duplici ordine poſitis, ſtipite lineari gracili nudo. *Bolt. fung.* 31. *t.* 31.

atramen-tarius. 317. A. gregarius, pileo humeſcente lævi plicato fuſco hinc inde maculato, lamellis latiuſculis diviſis albidis, ſtipite tereti lineari. *Bulliard herb. Franc. t.* 164.

Digitalis 318. A. pileo ſemiovato crenulato livido-caneſcente extrorſum confertiſſime ſtriato, vertice glabro ferrugineo, lamellis triplicis longitudinis atris, ſtipite aſcendente elongato pallidiſſimo. *Batſch el. fung.* 61. *f.* 1.

ſobolife-rus. 319. A. pileo conico ſtriato-piloſo, ſtipite ſobolifero albido. *Hoffm. nomencl. fung. n.* 357. *t.* 3. *f.* 1.

micaceus. 320. A. pileo humeſcente atro ſtriato lamelliſque primo albidis partialis micantibus conſitis. *Bull. herb. Franc. t.* 246.

picaceus. 321. A. ater, pileo ſtriato rudimentis cuculli albis vario, lamellis latiuſculis duplicis longitudinis, ſtipite albo inferne craſſiuſculo. *Bulliard herb. Franc. t.* 206.

roſtratus. 322. A. pileo conico-campanulato ſtriato plumbeo caducis cuculli rudimentis aſpero, lamellis atris, ſtipite albido, medio incraſſato deorſum ſubulato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 80. *f.* 5.

goſſypi-nus. 396. A. ſtipite fiſtuloſo, albido, junioris tomentoſo. *Bull. herb. Franc. t.* 425. *f.* 2.

** acaules.

glandulo-ſus. A. ſubacaulis fuſcus ſubtus albus, granulis interſitis. *Bull. herb. Franc.* 1. *t.* 426.

depluens. 323. A. ſubacaulis, pileo cano-ſericeo dimidiato opaco, lamellis latiuſculis fuſco-rubellis margine arcuatis quadruplicis longitudinis. *Batſch el. fung.* 167. *f.* 122.

perennis. 324. A. ſubacaulis ſuberoſo-coriaceus pallide ochraceus, lamellis pallidioribus. *Plan. fung. Erf. p.* 8. *n.* 25. *an coriaceus ?*

dichrous. 325. A. pileo ſpadiceo nigricanti miſto, margine repando-lobato, lamellis bifidis pallide ſulphureo-ochraceis. *Schæff. fung. t.* 246.

applicatus. 326. A. inverſus orbicularis cinereo-nigricans, lamellis in centro contingentibus albido-cæruleſcentibus centrum impreſſo-adnatum tendentibus. *Batſch el. fung. cent.* 171. *f.* 125.

violaceo-fulvens. 327. A. violaceo fulvus, pileo coriaceo aſpero ſemiorbiculato. *Batſch el. fung.* 95. *f.* 39.

Lingua. 328. A. ſemiorbicularis glaber fulvus, lamellis purpureis. *Mich. nov. pl. gen. p.* 123. *t.* 65. *f.* 3.

fulveſcens. 329. A. coriaceo villoſus albicans, lamellis fulvis. *Vaill. flor. par. t.* 1. *f.* 4.

ceſpitoſus. 330. A. ſpatulatus convexus luteus glabriuſculus, lamellis tereis. *Mich. nov. pl. gen. p.* 123. *t.* 65. *f.* 5. 6. β) Agaricus ochraceus. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1095.

niveus. A. ſubacaulis albus tener ſiccus, pileo glabro ſubtus pallide ferrugineo, margine (feneſcentis) inæquali. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 288.

verſicolor. 331. A. ſuberoſo-coriaceus tomentoſus fuſco-griſeoque faſciatus, lamellis albis ſimplicibus tenuibus. *Plan. fung. Erf. p.* 4. *n.* 3.

ſtriatulus. 332. A. ferrugineus pubeſcens, margine integro, lamellis alternis interruptis cinereis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 148.

radians. 333. A. flabelliformis albidus villoſus, margine inciſo crenato, lamellis concoloribus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 148.

gelatinoſus. 334. A. pileo diformi albido ſublanato, lamellis ochroleucis ſimplicibus inæqualibus. *Schæff. fung. t.* 213.

planus. 369. A. erectus planus ſemicircularis margine undulatus fuſcus, lamellis lanceolatis triplicis ordinis. *Bolton fung.* 2. *t.* 72. *f.* 3.

plumatus. 370. A. pileo multiformi apice crenato revoluto pennas ſtruthionis referente. *Walt. flor. carol. p.* 261.

fagineus. 397. A. pileo ſuberoſo tomentoſo albido, lamellis cervinis margine ſubvenoſis. *Schrader an diſtincta ſatis ſpecies?*

MERULIUS. *Fungus* ſubtus venoſus.

* *ſtipitati.*

cornucopioides. 1. M. fuſcus tenax, pileo lobato, venis ſubquadruplici ordine decurrentibus. *Bolton fung.* 8. *t.* 8. β) *Schæff. fung. t.* 275.

umbonatus. 2. M. pileo umbonato cinereo, ſtipite concolori tereti, venis albis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 109. *t.* 16. *f.* 1. Agaricus muſcoides.

Cyathus. 3. M. coloris lignei, pileo infundibuliformi, venis decurrentibus, ſtipite tereti fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 208.

infundibuliformis. 4. M. murinus mollis, pileo infundibuliformi, venis argenteis, ſtipite compreſſo rugoſo fiſtuloſo. *Bolt. fung.* 34. *t.* 34.

helvelloides. 5. M. pileo infundibuliformi zonato, ſtipite fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 294. *t.* 46. Helvella tubæformis.

agaricoides. 6. M. mollis luteſcens pileo infundibuliformi zonato, ſtipite fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 208. Agaricus cornucopioides.

cantharelloides. 7. M. ſtipite aurantio fiſtuloſo bulboſo, pileo fuſceſcenti unicolore. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 297. *t.* 473. *f.* 3. Hevella cantharelloides.

hydropipes. 8. M. fuſco-nigricans, ſtipite ad baſin fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 292. *t.* 465. *f.* 2. *An diſtincta hujus generis ſpecies?*

aurantiacus. 9. M. pileo ſicco aurantio, venis rubris, ſtipite tereti lineari farcto. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 101. *t.* 14. *f.* 3.

alectorolophoides. 10. M. obſcure aureus, pileo punctato, margine lobato, venis rectis. *Schæff. fung. t.* 206. *An mera varietas aurantiaci? β) Schæff. fung. t.* 212.

criſpus. 11. M. coriaceus, pileo infundibuliformi, margine criſpo, ſtipite ſolido. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 293. *t.* 465 *f.* 1.

Cantharellus. 12. M. vitelinus ſuaveolens, pileo (ſeneſcentis) excavato, margine undulato lobato, venis ſubcriſpis decurrentibus, ſtipite tereti farcto ſurſum dilatato. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 722. Agaricus Chantarellus. *Schæff. fung. t.* 82. *Bolton fung.* 2. *t.* 62.

pruinatus. 13. M. pileo plano crenulato fuſco-cinereo, venis cinereo-griſeis pruinatis, ſtipite luteo lineari elongato valido. *Batſch el. fung.* 93. *f.* 35. *An diſtincta ſatis ſpecies?*

ſquamula. 14. M. pileo albente convexo-plano, venis rarioribus obſoletis radiantibus, ſtipite tenerrimo ſubulato-ſetaceo. *Batſch el. fung. cont.* 95. *f.* 84.

inflexus. 15. M. luteus pileo infundibuliformi, margine inflexo criſpo, venis luteſcentibus decurrentibus, ſtipite aureo, medio incraſſato ſurſum attenuato, *Vaill. flor. par. t.* 11. *f.* 9. 10. *β) Vaill. flor. par. t.* 11. *f.* 11-13. *ad ſequent.*

fiſſus. 16. M. pileo infundibuliformi fiſſo cinereo, venis decurrentibus. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 534.

muſcigenus. 17. M. griſeo-luteſcens ſubacaulis dimiatus ſuborbiculatus. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 288. Agaricus muſcigenus.

pezizoides. 18. M. ſubacaulis infundibuliformis, diſco patente ſinuato-punctato, venis obſoletis. *Schaeff. fung. t.* 165. 166. *Syſt. Nat. Ed.* XII. 2. Peziza iufundibuliformis.

* * *acaules.*

niveus. 19. M. lævis horizontalis niveus ſubtus fuſcus. *Bull. herb. Franc.* 2. *t.* 152.

alneus. 20. M. coriaceus albidus cano-tomentoſus ſemiorbicularis, margine repando, venis ramoſis. *Bulliard herb. Franc. t.* 346. *An forſan diſtincti generis ?*

ſquamoſus. 21. M. membranaceus, pileo rubiginoſo ſquamoſo, venis cervinis. *Schrader.*

reticulatus. 22. M. verticulis ſubrotundus membranaceus lævis canus, venis reticulatis cineraſcentibus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 289. *t.* 498. *f.* 1. Helvella utiruga.

dimidiatus. 23. M. membranaceus horizontalis lævis fuſceſcens. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 290. *t.* 498. *f.* 2.

alutaceus. 24. M. coriaceus ſupra griſeus erectus villoſus. *Bull. herb. Franc. t.* 394.

lichenoides. 25. M. laminis depreſſis decumbentibus connatis ex centro dilatatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 575. *n.* 1633.

betulina. 26. M. coriaceus villoſus ſuborbicularis margine obtuſo, venis confertis anaſtomoſantibus ochroleucis flaviſve. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 723. Agaricus betulinus. *Bull. herb. Franc. t.* 290. Auricularia tremelloides. *β*) *Batſch. el. fung. p.* 95. *n.* 138. *f.* 34. Agaricus Chantarellus.

quercinus. 27. M. ſuberoſo-coriaceus planus villoſus ſemiorbicularis annulis diverſi coloris pictus, venis confertis cartilagineis anaſtomoſantibus albidis vel fuſceſcentibus. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 723. Agaricus quercinus. *Schaeff. fung. t.* 57. *Bull. herb. Franc. t.* 362. 442. *f.* 1.

labyrinthiformis. 28. M. lignoſus fuſcus deformis, venis pallidioribus labyrinthiformibus. *Schaeff. fung. t.* 231. *Nonne mera quercini varietas ?*

vaſtator. 29. M. orbicularis (adultus) aureus, venis criſpis centrum verſus in plicas abeuntibus, tuberculis intus albis utplurimum agregatis caulescentibus intermediis. *Tode Abh. hall. Geſ.* 1. *p.* 351. *t.* 2. *f.* 1-4.

ſerpens. 30. M. coriaceus niveus orbicularis, venis criſpis fuſceſcentibus medium verſus in plicas tranſeuntibus. *Tode Abh. hall. Geſ.* 1. *p.* 355.

1210. BOLETUS. *Fungus* ſubtus poroſus.

* *ſtipitati.*

perennis. 1. B. perennis, pileo utrinque planiuſculo peltato fuſco, poris punctiformibus ochraceo-albis, ſtipite laevi. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 334. *t.* 28. & *t.* 449. *f.* 2.

nummularius. 2. B. perennis, pileo albo, centro concavo papillato, margine deflexo, ſtipite baſi nigro. *Bull. herb. Franc. t.* 124. *An ſatis diſtinctus a leptocephalo?*

leptocephalus. 3. B. pileo plano tenui ſupra cervino ſubtus albo. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 142. *t.* 12.

dimidiatus. 4. B. perennis, pileo dimidiato undulato laevi, poris albis. *Thunb. flor. jap. p.* 348. *t.* 39.

viſcidus. 5. B. pileo pulvinato viſcido, poris teretibus convexis immerſis diſtinctis, ſtipite lacero. *Schaeff. fung. t.* 103. 104.

granulatus. 6. B. pileo pulvinato viſcido, poris teretibus ſubangulatiſque truncatis, angulo granulato.

luteus. 7. B. pileo pulvinato viſcido poriſque rotundatis convexis flaviſſimis, ſtipite annulato. *Schaeff. fung. t.* 114. & 115. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 316. *t.* 332.

bovinus. 8. B. pileo pulvinato glabro marginato, poris acutis compoſitis, porulis angulatis brevioribus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 322.* *t.* 60. 494. β) Boletus aeſtivus. *Schlotterb. act. helv.* 4. *p.* 54. *t.* 5. *f.* 2.

mutabilis. 9. B. pileo pulvinato fuſco, tubis flaveſcentibus rubiſve, ſtipite incraſſato brevi fuſceſcente rubellove. *Schaeff. fung. t.* 108. 133. β) Boletus bulboſus. *Schaeff. fung. t.* 134. 135.

ferrugineus. 10. B. pileo pulvinato ochraceo-fuſco glabro poris ferrugineo-brunneis, ſtipite ſubferrugineo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 318. *t.* 451. *f.* 2. *Batſch el. fung. cent. p.* 185. *f.* 128. β) Boletus ſuſpectus. *Gled. meth. fung. p.* 66. *n.* 1. *var.* 1.

ſuberoſus.11. B. pileo pulvinato ſtramineo, poris flavis, ſtipite brevi baſi tuberoſo. *Bull. herb. Franc. t.* 100.

cereus. 12. B. pileo pulvinato pullo, poris ochroleucis, ſtipite albido. *Bull. herb. Franc. t.* 385.

cinnamo-13. B. cinnamomeus fragilis, pileo concavo villoſo in centro meus. infundibuliformi fulvo, poris annulatis. *Jacq. collect.* 1. *p.* 116. *t.* 2.

aurantia-14. B. pileo fulvo-caneſcente, ſtipite rugoſo maculoſo. *Bull.* cus. *herb. Franc. t.* 236.

exaſpera-105. B. pileo flaveſcente margine deflexo hiſpidulo, poris tus. rhomboideis albis, ſtipite fuſceſcenti. *Schrader. Mich. nov. pl. gen. t.* 70. *f.* 5.

faſcicula-106. B. pileo fuſco faſciculatim piloſo, poris flaveſcentibus, tus. ſtipite lævi fuſceſcenti. *Schrader.*

palleſcens. 107. B. lævis, pileo planiuſculo flaveſcente poris tenuiſſimis, ſtipite ſubgracili ſubcompreſſo. *Schrader.*

fuſcidulus. B. pileo plano acute caſtaneo, poris ſubrotundis flaveſcentibus, ſtipite ſubflexuoſo. *Schrader.*

puſillus. B. pileo convexo cinereo, poris ſubangulatis albidis, ſtipite craſſiuſculo. *Schrader.*

ſupinus. 15. A. pileo caſtaneo, margine coſtato ſinuatoque, poris albidis. *Flor. dan. t.* 894. β) Boletus caſtaneus. *Weber ſuppl. flor. holſ. p.* 13.

biennis. 95. B. pileo infundibuliformis crenato ruſeſcente ad marginem albido, carne alba coriacea. *Bull. herb. de la Franc. t.* 449. *f.* 1.

lacteus. 16. B. pileo convexo peltato orbiculato fuſco, ſtipite lineari valido diffuſo poriſque linearibus confertiſſimis catenulatis niveis. *Batſch el. fung. p.* 103. *f.* 42. β) *Schæff. fung. t.* 111. 265. 266. γ) *Mich. nov. pl. gen. t.* 71. *f.* 1. δ) *Schæff. fung. t.* 127.

ramoſiſſi-17. B. ramoſiſſimus, pileis numeroſis hemiſphæricis multiplex. mus. *Jacq. flor. auſtr.* 2. *t.* 172.

frondoſus. 18. B. frondoſus ceſpitoſus fuſcus, frondibus imbricatis planiuſculis reflexis, poris albis. *Schæff. fung. t.* 128. 129.

ſtrobili- 19. B. pileo hemiſphærico teſſelato-ſquamoſo fuſco, poris formis. angulatis albis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 17. *t.* 3. *f.* 2.

fragilis. 20. B. pileo peltato pallidiſſime flavo, poris pallide ſulphureo-virentibus, ſtipite diffuſo valido craſſo albo tereriuſculo. *Schæff. fung. t.* 121. 122. 264. 3.

carolinianus. 85. B. pileo aſcendente ſubdimidiato pulvinato marginato, poris minutiſſimis fulvis. *Walt. flor. carol. p.* 262.

procerus. 21. B. pileo parvo convexo glabro ſtipiteque longo ſubfuſiformi ſubolivaceis, poris tenuiſſimis numeroſis albidis. *Bolt. fung.* 2. *t.* 86. *An diſtincta ſatis ſpecies ?*

hirſutus. 22. B. cinereus, pileo rimoſo, poris latis irregularibus, ſtipite elongato valido ſublineari hirſuto-ſquamuloſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 71. *f.* 2.

ſubtomentoſus. 23. B. pileo ſubtomentoſo ſtipiteque flavis, poris ſubangulatis difformibus fulvis planis. *Bull. herb. Franc. t.* 490. *f.* 3. *β*) *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 317. *t.* 451. *f.* 1. Boletus paraſiticus.

ſquamoſus. 24. B. pileo flaveſcente ſquamoſo, poris difformibus oblonge flexuoſis niveis, ſtipite laterali. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 344. *t.* 19. & *t.* 312.

infundibuliformis. 25. B. fulvens, ſtipite in pileum infundibuliformem dilatato, poris dilatatis brevibus. *Mich. nov. pl. gen. t.* 70. *f.* 4. 8. 10.

lucidus. 26. B. pileo coriaceo caſtaneo lucido concentrice ſulcato, poris minutiſſimis albis, ſtipite laterali. *Leyſſ. fl. hal. n.* 1245.

hypocrateriformis. 90. B. albus pileo coriaceo depreſſo, ſtipite æquali. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 621. *n.* 1749. *An Hydnum ſublamelloſum ?*

umbilicatus. 91. B. pileo coriaceo depreſſo, merito excavato, margine fuſco, ſtipite baſi bulboſo, poris connexis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 621. *n.* 1748.

Bulliardi. 27. B. hepaticus ſubtus dilutior, pileo viſcido, ſtipite laterali. *Bull. herb. Franc. t.* 74.

ſubveſcus. 92. B. carnoſus, pileo convexo ſubtus miniato, carne flavicante ad aërem nigreſcente, ſtipite brevi craſſo rufeſcente. *Schranck flor. bavar.* 2. *p.* 620. *n.* 1747. *Schæff. fung. t.* 107. *An a mutabili ſatis diſtinctus ?*

lapidum. 93. B. carnoſus, pileo convexo ſupra fuſco ſubtus flavo, carne alba, ſtipite ſolido ſubrugoſo exalbido. *Schæff. fung. t.* 105.

nigreſcens. 94. B. carnoſus, pileo viſcido fuſco, carne alba ad aërem cæruleſcente. *Pallas it.* 1. *p.* 31. *An mutabilis forſan varietas?*

Digitized by Google

ſcaber. 28. B. mollis ſpongioſus albidus, pileo ſuperne griſeo, poris longiſſimis, ſtipite rugoſiſſimo. *Bull. herb. Franc. t.* 132.

obliquatus. 29. B. exſiccabillis badius nitidus coriaceo-ſuberoſus, pileo obliquo fluctuante, tubis albo-ferrugineis, ſtipite laterali. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 335. *t.* 7. & 459.

elegans. 30. B. ſubacaulis tenax auriformis, ſupra nitens ſpadiceus. *Bulliard herb. Franc. t.* 46.

ramulorum. 31. B. coriaceus, pileo orbiculari, ſtipite laterali. *Bulliard herb. Franc. t.* 124. *β)* Boletus flabelliformis. *Leyſſ. fl. hal. ed.* 1. *n.* 1093.

Batſchii. B. perennis, pileo glabro ferrugineo ad marginem lacero crenato, ſtipite laterali. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 181. *f.* 129.

fagineus. B. ſubſtipitatus, pileo nitido albido, poris ſubrotundis ruſeſcentibus ſtipite laterali. *Schrader.*

** *acaules.*

agaricoides. 32. B. coriaceus lævis, poris angulatis lineari-oblongis undulatis. *Tunb. flor. jap. p.* 347.

lacrymans. 33. B. coriaceus ſemiovalis aurantiacus rugoſo-reticulatus, faſcia marginali lata nivea fornicata. *Wulfen. ap. Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 111. *t.* 8. *f.* 2.

rufus. 109. B. explanatus coriaceus rufus, poris minutiſſimis rotundatis. *Scrader.*

citrinus. B. pulvinatus inbricatus flavus lævis, poris tenuiſſimis concentricis. *Lemmig. fl. poſoon. p.* 525.

criſtatus. B. faſciculatus ſquamoſus, poris minutiſſimis, lobis laciniato fimbriato-criſtatis. *Geld. meth. fung. p.* 75. *n.* VIII.

tuberculoſus. B. durus tuberculoſus, ex albo cinereoque fulveſcens, poris minutiſſimis connexis. *Geld. meth. fung. p.* 80. *n.* 12. *var. c.*

lobatus. 34. B. coriaceus convexus lobatus flavus lævis, poris tenuiſſimis. *Willd. prodr. flor. Berol. n.* 1136.

faſciatus. 35. B. durus ſuperne inæqualis fuſcus nigro-faſciatus, poris albis tenuiſſimis. *Swarts nov. pl. gen. p.* 149.

microporus. 36. B. ligneus durus difformis inæqualis, poris inæqualibus impalpabilibus pallidis. *Brown jam. p.* 77. *Poria* 4.

hydnoides. 37. B. craſſus ſetis craſſis ramoſis erectis danſis nigris ſuperne tectus, poris tenuiſſimis teretibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 149.

Favus. 38. B. ſubpulvinatus ſcaber ſetis erectis ramoſis, poris patulis angulatis. *Flor. dan. t.* 893. *Bull. herb. Franc. t.* 421.

lipſienſis. 39. B. pulvinatus ſuberoſus ſupra glaber incrementis convexis tuberculiſque gradatus, margine declivi faſciato. *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 130.

ſuberoſus. 40. B. pulvinatus albus lævis, poris acutis difformibus. *β*) *Bull. herb. Franc. t.* 491. *f.* 1. *γ*) *Bolt. fung.* II. 78. *t.* 78.

nitens. 41. B. pulvinatus læviuſculus nitens varie rubicundus, poris albis flavidiſve. *Schæff. fung. t.* 109. 110.

fomentarius. 42. B. pulvinatus inæqualis obtuſus, poris teretibus æqualibus glaucis.

igniarius. 43. B. pulvinatus lævis, poris tenuiſſimis. *Bull. herb. Franc. t.* 82. 401. & 454. *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 1305.

purgans. 44. B. pulvinatus ſubconicus ſuberoſo-carnoſus levis inæqualis ſupra incrementis convexis circulariter fimbriatus & gradatus. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *n.* 6. *t.* 20. 21.

cinnabarinus. 45. B. pulvinatus totus intus & foris ruber. *Jacq. flor. auſtr.* 4. *t.* 304.

ſanguineus. 59. B. ſubmembranaceus ruber, poris impalpabilibus.

villoſus. 46. B. ſubmembranaceus fuſcus griſeo-albidus villoſus, poris difformibus dentatis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 148.

membranaceus. 47. B. ſubmembranaceus prolifer gregarius lævis radiatus-albus, poris eroſis difformibus. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 148.

betulinus. 48. B. gregarius, pileo pellicula rufeſcente tecto. *Bulliard herb. Franc. t.* 312. *An diſtinctus ſatis a fomentario?*

Calceolus. 99. B. ſubacaulis excavatus, margine elevato repando. *Bull. herb. Franc. t.* 300. & 494. *f.* 2.

ſalignus. 100. B. ſuaveolens unicolor albidus intus niveus dimidiatus ſupra lævis, tubis breviſſimis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 340. *t.* 433. *f.* 1.

fraxineus. 101. B. dimidiatus glaber intus luteſcens ſubtus lateritius, pilei margine albo, tubis brevibus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 341. *t.* 433. *f.* 2.

ſulphureus. 102. B. viſcidus mollis dimidiatus aureus ſubtus ſulphureus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 347. *t.* 429. *Schæff. fung. t.* 131. 132.

ramoſus. 103. B. albidus fragilis utrinque poroſus ramoſus, ramis cylindricis. *Bull. herb. Franc. t.* 418.

Digitized by Google

decipiens. B. coriaceus dimidiatus ſupra villoſus faſciatus, tubis dædaleis ſubrutilo-cinereis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 365. *t.* 408. & 501. *f.* 3. *Willdenow bot. Mag.*

imbricatus. 49. B. gregarius luteſcens, pileis fimbriatis. *Bulliard herb. Franc. t.* 366.

ſcalaris. 86. B. ſubacaulis, pileo excavato ſcalæ inſtar coccimellæ quaſi circumvoluto. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 617. *n.* 1737.

ferruginoſus. B. reſupinatus explanatus inæqualis coriaceus fuſco-ferrugineus, poris ſubrotundis. *Scrader.*

abietinus. B. reſupinatus effuſo-reflexus, pileo tenui hirſuto albido, poris angulatis margine acutis fuſcis. *Perſoon.*

ſalicinus. B. reſupinatus ſuberoſus late effuſus undulato-rugoſus cinnamomeus. *Perſoon.*

verſicolor. 50. B. faſciis diſcoloribus, poris albis. *Bull. herb. Franc. t.* 86.

hiſpidus. 51. B. ſupra viſcidus piloſus badius. *Bulliard. herb. Franc.* 1. *p.* 251. *t.* 210. & 493. *An vere diſtinctus ab. hepatico ?*

ſuaveolens. 52. B. totus albus ſuperne lævis, poris inæqualibus. *Bull. herb. Franc. t.* 310.

fuſcus. 53. B. lateralis membranaceus ſuberoſo-lignoſus, ſupra lævis fuſcus ſubfaſciatus, poris brevibus ſubcircularibus caneſcentibus. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 178. *f.* 127.

aduſtus. 54. B. fuſceſcens, margine nigro, poris tenuiſſimis reticulatis. *Willden prodr. flor. berol. n.* 1138. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 339. *t.* 445. *f.* 1. B. *imberbis.*

fulvus. 55. B. totus fulvus inæqualis, poris tenuiſſimis æqualibus teretibus. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1134.

globatus. 56. B. convexus ſubglobatus rufus lævis, poris teretibus flavis. *Willden prodr. flor. berol. n.* 1133.

reſupinatus. 57. B. reſupinatus ſubtus glabriuſculus albus, ſuperne poris impulpabilibus fuſcis. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 149.

hirſutulus. 58. B. ſemicircularis plano-convexus niveus ſupra hirſutus, lineis concentricis alternis depreſſis. *Wulff. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 149.

odoratus. 59. B. plano-convexus ſubpulvinatus aurantiacus, poris angulatis, caryophyllum olens. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 2. *p.* 150.

cornutus. 82. B. coriaceus lobatus, lobis linguiformibus. *Bolton fung.* 2. *t.* 76.

hepaticus. 84. B lævis carnoſus ſanguineus mollis dimidiatus tubulis liberis inæqualibus. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 314. *t.* 74. 464. 497. *An diſtinċti generis?*

ſebaceus. 60. B. undulatus late expanſus albido-ſpadiceus. *Leyſſ. flor. hal. n.* 1250.

papyrace-89. B. albus ſiccus papyraceus, poris inconſpicuis. *Schranck* us. *flor. bav.* 2. *p.* 618. *n.* 1739.

Medulla 75. B. cruſtaceus albus effuſus difformis. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. panis. *p.* 141. *t.* 11.

obliquus. 76. B. ligneus poris obliquis roſtratis inæqualibus. *Bolton fung.* 2. *t.* 74.

1211. HYDNUM. *Fungus* ſubtus fibris ſubulatis echinatus.

* *ſtipitata.*

imbrica- 1. H. fuſcum, pileo ſubconvexo ſquamoſo, ſquamis imbricatis ſubereċtis. *Schæff. fung. t.* 140. H. ſquamoſum. *Batſ. el. fung. f.* 43. *Bull. herb. Franc. t.* 409. tum.

carnoſum. 2. H. pileo convexo glabro rubello, aculeis griſeis ſtipiteque ſubconcoloribus. *Schæff. fung. t.* 273.

ſublamel- 3. H. album ſeneſcens ochroleucum, pileo infundibuliformi, papillis duplicatis tortuoſis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 306. *t.* 453. *f.* A–F. loſum.

zonatum. 4. H. pileo conico excavato coriaceo faſciato ſtipiteque lævi atris, aculeis griſeo-albis. *Schæff. fung. t.* 272.

repandum. 5. H. pileo convexo rufo ſubtus albo, ſtipite baſi incraſſato. *Flor. dan. t.* 310. *β*) *Schæff. fung. t.* 318. *γ*) *Bolton fung.* II. 88. *t.* 88.

tomento- 6. H. pileo plano-infundibuliformi. *Flor. dan. t.* 534. *f.* 3. ſum.

coralloi- 7. H. albidum ramoſiſſimum, ramis compreſſis, apicibus des. deflexis. *Schæff. fung. t.* 142. Hydnum ramoſum. *Bull. herb. Franc. t.* 390.

---

* *An diſtinċta ſpecies Boletus canceolatus a* Cl. Fabricio *in fodinis carbonariis prope Whitehaven repertus & ab* Ill. Ferber *n. Beytr. zur Mineralg. f.* 1. *p.* 405. *memoratus?*

Digitized by Google

floriforme. 8. H. coriaceum, pileo turbinato velutino purpuraſcente, ſtipite nigro ſubliguoſo. *Schæff. fung. t.* 146.

hybridum. 28. H. rufeſcens vel atrum, pileo infundibuliformi ad marginem crenato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 307. *t.* 451. *f.* F. I.

cyathiforme. 9. H. gregarium, pileo infundibuliformi faſciato fibroſo elaſtico, ſtipite brevi. *Bulliard herb. Franc. t.* 156. β) Hydnum cinereum. *Bull. herb. Franc. t.* 419.

ſuberoſum. 10. H. lignoſo-ſuberoſum, pileo colorato ſupra fovento-plicato, margine acuto criſpove, ſtipite obconico. *Batſch el. fung. f.* 45. 221. 222. 223.

clandeſtinum. 11. H. carnoſum albidum, pileo obtuſato ſupra glabro, ſtipite obconico. *Schæff. fung. t.* 144. 145.

Auriſcalpium. 12. H. pileo dimidiato hirſuto fuſco inferne albicante, ſtipite fuſco. *Curt. flor. Lond. t.* 190.

gelatinoſum. 13. H. gelatinoſum, pileo dimidiato ſupra glaberrimo. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 239.

** *acaulia.*

paraſiticum. 14. H. arcuato-rugoſum ſubvilloſum. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 12. *f.* 5. *An potius agaricus aut merulius?*

rubicundum. 15. H. album, aculeis rufeſcentibus breviſſimis. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 13. *f.* 6.

candidum. 16. H. album, aculeis longis concoloribus. *Will. bot. Mag.* 4. *p.* 14. *f.* 7.

Erinaceum. 17. H. ſubacaule convexum cordiforme ochroleucum, aculeis longiuſculis apice ſubulatis imbricatis lubro-fuſcis gradatim pendulis. *Bulliard herb. Franc. t.* 34.

agaricoides. 18. H. convexum læve pallidum ſubtus ferrugineum. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 149.

reſupinatum. 19. H. planum imbricatum ſubtus ſcabrum ſupra ſetis ramentaceis ferrugineis tectum. *Swarts nov. pl. gen. et ſp. p.* 149.

ſericeum. 20. H. imbricatum planum molle utrinque ſericeum exalbido-vireſcens. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 149.

Occarium. 21. H. villoſum album, aculeis magnis oblongis obtuſis planis. *Mich. nov. plant. gen. t.* 64. *f.* 3.

pectiniforme. 22. H. villoſum album, aculeis ſubulatis validis abbreviatis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 64. *f.* 4. 5.

hyſtrici-num. 23. H. ſubclavatum album, aculeis elongatis validis ſubulatis patenti-arrectis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 64. *f.* 1.

carolinia-num. 24. H. ovatum, ſupra ſubtuſque echinatum. *Walt. flor. carol. p.*263. *An forſan thælæphora?*

ſtalacti-cum. 25. H. ramoſiſſimum, ſtipite immerſo craſſiſſimo, ramis ramuliſque aculeis ramoſiſſimis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 624. *n.* 1756. *An potius coralloides?*

clatroides. 26. H. ſtrigoſum ramoſiſſimum hinc papilloſum inde villoſum. *Pall. it.* 2. *p.* 744. *t.* K.

papyrace-um. 27. H. membranaceum niveum ſupra læve, ſubtus aculeis ſimplicibus multifidiſque. *Wulf. ap. Jacq. coll.* 1. *p.* 345.

mucidum. H. effuſum album, aculeis teretibus integerrimis. *Perſoon fung. ined.*

ochrace-um. H. effuſo-reflexum, pileo coriaceo tenui zonato ochraceo, aculeis minutis ochraceo-carneis. *Perſoon.*

Barba jo-vis. H. membranaceum, ſtramineo-rufeſcens, aculeis multifidis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.*303. *t.* 481. *f.*2. *An hujus generis?*

THÆLÆPHORA. *Fungus* ſuberoſus ſubtus papillatus fructificans.

† *horizontales.*

meſente-riformis. 1. Th. ſubſtipitata imbricata flocceſo-faſciata fuſca, margine laciniato albido. *Willd. prodr. fl. berol. t.* 7. *f.* 15. *Schæff. fung. t.* 328. Elvela caryophyllea. *Batſch. el. fung. t.* 24. *f.* 41. Agaricus triſtis. *Bull. herb. Franc. t.* 274. & *t.* 483. *f.* 6. 7.

meſente-rica. 2. Th. acaulis gelatinoſo-coriacea imbricata tortuoſa ſupra villoſa faſciata, ſubtus glabra violacea. *Mich. nov. pl. gen. t.* 66. *f.* 4. *Bull. herb. Franc. t.* 290. Auricularia tremelloides.

hirſuta. 3. Th. acaulis imbricata coriacea ſupra villoſa faſciata variegata ſubtus glabra pallida. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Helvella pineti. *Bolt. fung. t.* 82. Boletus auriformis. *Bull. herb. Franc. t.* 274. 483. *f.* 1. 3. Auricularia reflexa.

lilacea. 4. Th. acaulis ochraceo-pallida ſupra tomentoſa ſpadiceo-faſciata, margine extimo ſupra ſubtuſque [illegible]ſco-lilacino. *Batſch. el. fung. cent.* 1. *p.* 187. *f.* 131. Elvela lilacina, *An diſtincta ſatis ſpecies?*

ſericea. 5. Th. acaulis imbricata coriacea ſupra ſericea faſciata palleſcens ſubtus glabra flaveſcens. *Schrader fung. ined.*

ſtriata. 6. Th. acaulis ſubimbricata coriacea ſupra ſtriata tomentoſa fuſco-ferruginea ſubtus piloſo-exalbida. *Schrader fung. ined.*

rubiginoſa. 7. Th. acaulis imbricata rubiginoſa ſupra tomentoſa ſubtus piloſa. *Bull. herb. Franc. t.* 378. Auricularia ferruginea.

variegata. 8. Th. acaulis imbricata membranacea ſupra ſericea faſciata variegata ſubtus piloſa ochracea. *Schrader fung. ined.*

fuſca. 9. Th. acaulis ſubimbricata membranacea ſupra tomentoſa faſciata fuſca ſubtus nivea. *Schrader fung. ined.*

┼ ┼ *explanatæ.*

undulata. 10. Th. coriaceo-lignoſa ſupra glabra carnea ſubtus undulata fuſco-purpurea. *Schrader fung. ined.*

applanata. 11. Th. appreſſa coriaceo-lignoſa ſupra glabra flava ſubtus tomentoſa. *Schrader fung. ined.*

ferruginoſa. 12. Th. membranacea ſupra albida, ſubtus tomentoſa ferruginea. *Schrader fung. ined.*

glabra. 13. Th. lævis exalbida. *Willd. prodr. fl. Berol. n.* 1104.

carnea. 14. Th. membranacea ſupra glabra carnea ſubtus tenuiſſime tomentoſa nigra. *Bull. herb. Franc. t.* 436. Auricularia corticalis.

phylacteris. 15. Th. membranacea plicata ſupra glabra fuliginoſo-fuſca ſubtus tomentoſa. *Bull. herb. Franc. t.* 436. *f.* 2. Auricularia phylacteris.

papyracea. 16. Th. membranacea tenuiſſima ſupra glabra carnea ſubtus tomentoſa nivea. *Schrader fung. ined.* β) *Bull. herb. Franc. t.* 402. Auricularia papyrina.

alutacea. 17. Th. membranacea tenuiſſima ſupra exalbida ſubtus tomentoſa albida. *Schrader fung. ined.*

┼ ┼ ┼ *effuſæ.*

crocea. 18. Th. tenuis fragilis tota crocea. *Schrader fung. ined.*

XYLOSTROMA. *Fungus* expanſus coriaceus deformis interpolatus lævis æqualis, ſeminibus globuloſis minutiſſimis intus fungi fibrillis inſidentibus.

giganteum. 1. XYLOSTROMA. *Tode fung. meklenb. ſel.* 1. *p.* 36. *t.* 6. *f.* 51.

HELOTIUM. *Fungus* pileo carnoſo-membranaceo convexo-hemiſphærico ſubtus lævi ſemina nuda portante.

glabrum. 1. H. pileo plano ſtipiteque glabris. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 22. *t.* 4. *f.* 35. β) *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 95. *t.* 473. *f.* 1.

cucullatum. 2. H. ferrugineum flavum, ſtipite lineari gracili, pileo ſemiovali. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 189. *f.* 132. Elvella cucullata.

unctuoſum. 3. H. pileo ſubtus ſtipiteque glabris, pileo ſupra unctuoſo, margine calloſo. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 193. *f.* 134. Elvella unctuoſa.

hirſutum. 4. H. pileo ſupra ſtipiteque hirſutis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 23. *t.* 4. *f.* 36.

agaricoides. 5. H. candidum, ſtipite longo baſi piloſo ſubtuberoſo. *Bolton fung.* 3. *p.* 98. *t.* 98. *f.* 1.

aureum. 6. H. luteum, pileo lato craſſiuſculo, ſtipite brevi. *Bolton fung.* 3. *p.* 98. *t.* 98. *f.* 2.

1216. **CLAVARIA.** *Fungus* elongatus (ſimilaris) ſubſolidus in ſuperficie omni fructificans.

* acaules.

† indiviſæ.

piſtillaris. 1. Cl. clavæformis ſimpliciſſima glabra ſolida. *Schæff. fung.* *t.* 169.

glabra. 2. Cl. clavæformis ſimpliciſſima glabra fiſtuloſa. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 212. *t.* 463. *f.* 1.

3. Cl.

atra. 3. Cl. clavata integerrima ſubcompreſſa tomentoſa atra. *Schr. Schm. anal. pl. t. 25. β) Mich. n. pl. gen. t. 87. f. 8.*

ophioglof- ſoides. 4. Cl. clavata integerrima compreſſa obtuſa. *Bulliard herb. Franc. t. 372. An forſan helvellæ propior ?*

ſimplicif- ſima. 5. Cl. ſimpliciſſima teres ſubulata flava apice fuſca. *Willd. prodr. flor. berol. n. 1180. Baumg. fl. Lipſ. t. 4. f. 2. a.*

atro-pur- purea. 6. Cl. clavata tereti-pliculata, cute glabra fulvo-atra. *Batſch el. fung. p. 133. f. 47. β)* Clavaria rugoſa. *Bull. herb. Franc. t. 448. f. 2. An forſan helvellæ ſpecies ?*

ſerpenti- na. 7. Cl. viridis, clava oblonga. *Schranck flor. bav. 2. p. 571. n. 1623.*

viridis. 8. Cl. ceſpitoſa integerrima viridis, clava integra rugoſa. *Schrader.*

cornea. 9. Cl. lanceolato-ſubulata valida fulvens gelatinoſa. *Batſch el. fung. p. 139. n. 15. Bull. herb. Franc. 1. p. 204. t. 463. f. 4.*

reſinoſo- rum. 10. Cl. conico-oblonga obtuſa valida abbreviata gelatinoſa. *Mich. nov. pl. gen. t. 92. f. 1.*

tubuloſa. 11. Cl. ſimplex teres gracilis tubuloſa, pilis deciduis veſtita. *Bull. herb. Franc. 1. p. 213. t. 463. f. 2.*

purpurea. 12. Cl. ceſpitoſa ruſo-fuſca ſubcompreſſa apice acuminata. *Flor. dan. t. 837. f. 2.*

inæqua- lis. 13. Cl. ceſpitoſa compreſſo-lata apice acuminata. *Flor. dan. t. 836. f. 1.*

ceſpitoſa. 14. Cl. ceſpitoſa ſimpliciſſima baſi nonnunquam unita oblongo-clavata farcta aquoſe luteola. *Jacq. miſc. auſtr. 2. p. 98. t. 12. f. 2.*

elveloi- des. 15. Cl. ceſpitoſa ſimpliciſſima craſſiſſima baſi unita obverſe pyramidata ſtriata. *Jacq. miſc. auſtr. 2. p. 99. t. 12. f. 5.*

fuſca. 16. Cl. ceſpitoſa fuſca ſubſimplex compreſſa baſi coalita tomentoſa apice interdum furcata. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p. 150.*

ſubdiviſa. 17. Cl. ſubdiviſa minuta fuſceſcens. *Willden. prodr. flor. berol. n. 1185.*

An diſtinctum genus Tabularia, ab Clariſſ. Fabricio *apud* Ill. Ferber *n. Beytr. 2, Mineralg. 1. p. 405. memorata, & quæ ejus notæ ?*

Zzzz

✝ ✝ *ramoſæ*, Coralloidæ, ſ. Ramariæ.

vermicularis. 18. Cl. rugoſa, ramorum extimorum apice obtuſo. *Hall. ſtirp. helv. hiſt. n.* 2202.

anthocephala. 19. Cl. ruſeſcens ramoſa, planis apice albo ſublobato-crenatis. *Bull. herb. Franc. t.* 452. *f.* 1. *An hujus generis?*

cornuta. 20. Cl. ramis ſimpliciſſimis conoideis plano-truncatis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 98. *t.* 14. *f.* 2. *An eadem cum demæcorni?*

coralloides. 21. Cl. ramis confertis ramoſiſſimis inæqualibus. *Schæff. fung. t.* 175. 177. *β*) *Bulliard herb. Franc. t.* 354. *γ*) *Bull. herb. Franc. t.* 452. *f.* 2.

plebeia. 22. Cl. ramoſiſſima, ramis ſimpliciuſculis ſubovatis apice denticulatis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 101. *t.* 13. *β*) Caput meduſæ. *Bull. herb. Franc. t.* 412.

faſtigiata. 23. Cl. ramis confertis ramoſiſſimis faſtigiatis obtuſis luteis. *Bulliard herb. Franc. t.* 358. D. E.

muſcoides. 24. Cl. ramis ramoſis acuminatis inæqualibus luteis. *Flor. dan. t.* 775. *β*) *Flor. dan. t.* 836. *f.* 2. *γ*) *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 2.

criſpa. 25. Cl. foliacea ramoſiſſima, ramis planis criſpis per oras ſerratis. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 100. *t.* 14. *f.* 1.

bifida. 26. Cl. bifida, laciniis ſubbifidis. *Kœnig apud. Retz. obſ. bot.* 5. *p.* 32. *Bull. herb. Franc. t.* 263.

Cornu Alces. 27. Cl. albens fuſiformis, apice truncato lobulato lacero criſtato. *Schæff. fung. t.* 291. *Bolt. fung.* III. 115. *t.* 115.

Cornu Cervi. 28. Cl. ochracea, ramis apicem verſus ſenſim attenuatis acutiuſculis teretibus. *Schæff. fung. t.* 289. *β*) *Schæff. fung. t.* 273.

damæcornis. 29. Cl. alba ſupra truncata ſubramoſa, ramis extimis compreſſis palmatis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 666. *n.* 1845.

corticalis. 30. Cl. firma exalbida, ramis brevibus rudibus vagis apice ſubbarbatis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 231. *f.* 162.

brachiata. 31. Cl. lanceolata alba, ramis lanceolatis vagis ſubdiviſis ſubbrachiatis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 233. *f.* 163.

* * ſtipitatæ, *capitulo diſtincto ſolo ſemina elidente.*

gracilis. 32. Cl. ſtipite pellucido, capite clavato. *Bolt. fung.* III. 111. *t.* 111. *f.* 1.

fiſtuloſa. 33. Cl. ceſpitoſa alba fiſtuloſa deorſum craſſ ſurſum ſenſim acuminata. *Michel. nov. pl. gen. p.* 209. *t.* 87. *f.* 13.

granulata. 34. Cl. clavata alba ſimpliciſſima fiſtuloſa teres, radice granulata nigra. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1179.

paraſitica. 35. Cl. clavata nigra ſimpliciſſima, ſtipite tereti capitulo oblongo-tereti obtuſo papilloſo. *Willden. prodr. flor. ber. n.* 1178. *Holm. nov. act. dan.* 1. *p.* 302. *f.* 12.

placorhiza. 36. Cl. ſimpliciſſima tenuiſſima clavata fiſtuloſa fuſca, clava ſubulata albida, radice lentiformi clava. *Reich. Schr. berl. Naturf.* 1. *p.* 315. *t.* 9. *f.* 4. 5.

capillaris. 37. Cl. ſtipite capillari violaceo lævi fiſtuloſo, capitulo albo clavato. *Holm. nov. act. dan.* 1. *p.* 287. *f.* 2.

farinoſa. 38. Cl. ſanguinea albo-farinoſa, ramis abbreviatis truncatis crenulatis. *Holm. bav. act. dan.* 1. *p.* 299. *f.* 6.

media. 39. Cl. candidoflaveſcens, capitulo ſimpliciſſimo obtuſo integro. *Flor. dan. t.* 775. *f.* 2. & *t.* 837. *f.* 1.

aſcendens. 40. Cl. ceſpitoſa ſimpliciſſima farcta acuminata alba. *Flor. dan. t.* 837. *f.* 1.

delicatula. 41. Cl. candida, capitulo ſimpliciſſimo integro obtuſo. *Gled. meth. fung. p.* 29. *t. e.* β) Clavaria alba. *Baumgart. fl. Lipſ. p.* 652.

cylindrica. 42. Cl. luteo rufa, capitulo integro ſimpliciſſimo tenuiſſimo longiſſimo. *Mich. nov. pl. gen. p.* 208. *t.* 87. *f.* 7.

pedunculata. 43. Cl. nigra, ſtipite elongato gracili hirto, capitulo valido ſubovato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 87. *f.* 8.

lumbricalis. 44. Cl. ceſpitoſa alba vel lutea lanceolato-clavata teres. *Mich. nov. pl. gen. t.* 87. *f.* 10. 11.

polymorpha. 45. Cl. rufa ceſpitoſa apice ſæpius fiſſa, ſtipite flexuoſo. *Flor. dan. t.* 73. *f.* 1.

phalloides. 46. Cl. ſimplex fiſtuloſa, ſtipite niveo undulato, apice capitato ovato-oblongo aurantio. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 214. *t.* 3. *f.* 3. *An hujus generis ?*

1204. TREMELLA. *Fungus* gelatinoſus uniformis diaphanus, ſeminibus latitantibus.

granulata. 1. Tr. ſphærica aggregata viridis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 720. Ulva granulata. *Flor. dan. t.* 705.

Piſum. 2. Tr. globoſa farcta viridis. *Mant. p.* 136. Ulva Piſum. *Flor. dan. t.* 660. *f.* 2.

moniliformis. 3. Tr. globoſa pallide viridis in lineas diſpoſita. *Will. prodr. flor. berol. n.* 1224.

cavernoſa. 4. Tr. ſubgloboſa ſolitaria rugoſo-plicata intus varia. *Forſk. flor. æg. arab. p.* 187. Ulva cavernoſa.

fucata. 5. Tr. ſubgloboſa ſubacaulis granuloſa coccionellæ colore. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 218. *t.* 455. *f.* 2.

pruniformis. 6. Tr. ſubgloboſa ſolitaria intus ſubulata. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 720. Ulva pruniformis. *Weig. obſ. bot. t.* 2. *f.* 4.

hemiſphærica. 7. Tr. hemiſphærica ſparſa. *Weig. obſ. bot. t.* 2. *f.* 3.

punctiformis. 8. Tr. ſurdide aurantia acaulis e globulis irregularibus conflata. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 561. *n.* 1602.

adnata. 9. Tr. rotunda imbricata livida.

difformis. 10. Tr. ſubrotunda ſinuata difformis.

arborea. 11. Tr. ſubrotunda ſeſſilis undulata nigreſcens. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 37. *t.* 8. *f.* 1.

ſtipitata. 12. Tr. tota rubra diaphana ſtipitata, corpore cylindrico. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1225.

orbicularis. 13. Tr. ſeſſilis pateriformis ſordide viridis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 560. *n.* 1601. *An hujus generis ?*

rufa. 14. Tr. longitudinaliter dimidiato-infundibuliformis. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 143. *t.* 14.

meteorica. 15. Tr. ſinuoſo-gyroſa alba ſubtus membrana coarctata. *Perſoon.*

veſicaria. 16. Tr. griſeo-fuſca membranacea ſaccata. *Bull. herb. Franc. t.* 427. *f.* 3.

clavariæformis. 17. Tr. gregaria ſimplex aurantiaca compreſſo-ſubulata ſubgyrem data bicornifve. *Wulf. ap. Jacq. Coll.* 2. *p.* 174. *An hujus generis ?*

viridis. 18. Tr. oblonga læte viridis convexa. *Willden. prodr. flor. berol. n.* 1222.

lithophila. 19. Tr. fuſco-viridis oblongo-convexa. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 17.

ſepincola. 20. Tr. convexa ſparſa crocea diaphana. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 18.

meſenterica. 21. Tr. ſubrotunda ſeſſilis plicato-undulata aurea. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *t.* 13.

Noſtoc. 22. Tr. plicata undulata. *Flor. dan. t.* 885. *f.* 1. *Bull. herb. Franc. t.* 184.

perſiſtens. 23. Tr. membranacea plicata rubra. *Bull herb. Franc. t.* 304.

cinnabarina. 24. Tr. plicata mollis craſſa ramoſa rubra. *Bulliard herb. Franc. t.* 306.

juniperina. 25. Tr. plicata ſeſſilis aſcendens flava. *Mant. p.* 508. *Bull. herb. Franc. t.* 427. *f.* 1.

Sagarum. 26. Tr. membranacea ſinuata ruſo-fuſca. *Flor. dan. t.* 885. *f.* 3.

undulata. 27. Tr. aſcendens ſinuato-undulata purpurea. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 32. *t.* 7. *f.* 1.

uſtulata. 28. Tr. membranacea nigra lævis plicata. *Bull. herb. Franc. t.* 420. *f.* 2.

ancephaloides. 29. Tr. oblonga ſeſſilis dilute carnea plicato-rugoſa. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 17. *f.* 14.

cerebrina. 30. Tr. carnoſa in gyros plicata. *Bull. herb. Franc. t.* 386.

inteſtinalis. 31. Tr. tortuoſa nigro-virens. *Flor. dan. t.* 805. *f.* 2.

torta. 32. Tr. flaveſcens minuta inteſtinorum inſtar torta. *Willd. bot. mag.* 4. *p.* 18.

alii. 33. Tr. ſeſſilis membranacea labyrinthiformis griſea intus alba. *Holm. nov. act. dan.* 1. *p.* 286. *f.* 1.

violacea. 34. Tr. ſeſſilis rugoſa violacea inferne lævis. *Relh. flor. cant. p.* 442. *n.* 899. *An a perſiſtente ſatis diſtincta!*

plana. 35. Tr. expanſa plana undulata atrovirens. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 95.

ruberrima. 36. Tr. ruberrima criſpo-undata ſinuoſo-plicata. *Wulf. Schr. berl. Naturf.* VIII. 1. *p.* 155.

verticalis. 37. Tr. verticalis atra elaſtica varie plicata recens pollinem tenuiſſimum explodens. *Bull. herb. Franc. t.* 272.

criſpa. 38. Tr. terreſtris tenera criſpa. *Schreb. ſpic. flor. Lipſ. p.* 140.

atra. 39. Tr. atra ſeſſilis minutim criſpata. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 562. *n.* 1606.

digitata. 40. Tr. linearis dentata fulva. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 33. *t.* 7. *f.* 2.

hydnoidea. 41. Tr. compreſſo-plana difformibus digitata hirſuta. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 145. *t.* 16. *Nonne eadem cum Puccinia?*

verrucoſa. 42. Tr. ſeſſilis tuberculoſa ſolida. *Hoffm. veg. crypt.* 1. *p.* 39. *t.* 8. *f.* 2.

glanduloſa. 43. Tr. ſubſeſſilis diaphana nigra intus fuliginoſa glandulis conſperſa. *Bull. herb. Franc. t.* 420. *f.* 1.

miliaris. 44. Tr. rubra, verrucis confluentibus ſicco fiſſis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 563. *n.* 1609.

rubra. 45. Tr. ſupra tomentoſa ſubtus glabra nitida, punctis ſparſis. *Flor. dan. t.* 884.

rubella. 46. Tr. rubra, ſtipite brevi. *Schæff. fung. t.* 323. 324. Ulva purpurea.

annulata. 47. Tr. oblonga fuſca ætate annulata. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 17. *f.* 15.

deliqueſcens. 48. Tr. flava adultior flaveſcens deliqueſcens. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 219. *t.* 455. *f.* 3.

coralloides. 49. Tr. rubra fruticuloſa, ramis brachiatis obtuſis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 562. *n.* 1608. *An tremella?*

1212. PHALLUS. *Fungus* ſubtus lævis, ſupra cellulis reticulatus.

fungoides. 1. Ph. pileo acute lobato glabriuſculo, ſtipite glabro ſurſum attenuato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 9.

undoſus. 2. Ph. pileo conico margine criſpo, rugis undulatis anaſtomoſantibus, ſtipite ſulcato-teſſellato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 84. *f.* 2.

Gigas. 3. Ph. pileo conico margine ſubundulato, rugis flexuoſis anaſtomoſantibus, ſtipite clavato ſquamoſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 84. *f.* 1.

Rete. 4. Ph. pileo conico margine crenato-ſinuato, rugis anaſtomoſantibus areoliſque decurrentibus, ſtipite clavato integro. *Mich. nov pl. gen. t.* 34. *f.* 3.

inpudicus. 5. Ph. pileo conico margine crenulato vertice perforato, ſtipite baſi volvato. *Schaeff. fung. t.* 196. *f.* 198.

caninus. 6. Ph. pileo conico anguſto acuto impervio ſtipiteque celluloſis, hoc volvato. *Curt. flor. Lond. t.* 235. *Schaeff. fung. t.* 335.

Mokuſin. 7. Ph. pileo acuto quinquepartito, laciniis conniventibus, ſtipite pentagono, volva radicali. *Suppl. p.* 452.

Anaſtomoſis. 8. Ph. pileo oblongo margine adnato, rugis decurrentibus anaſtomoſantibus, ſtipite craſſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 85. *f.* 3.

eſculentus. 9. Ph. pileo ovato margine adnato, rugis undulatis undique anaſtomoſantibus, ſtipite tenuiori. *Schaeff. t* 298-300.

patulus. 10. Ph. pileo rugoſo ſupra ſubconico ſubtus libero. *Schaeff. fung. t.* 199. *f.* 1. 3.

1213. CLATHRUS. *Fungus* ſubrotundus ramis carnoſis inter ſe continuis cancellatus.

cancellatus. 1. Clathrus. *Schaeff. fung.* 4. (*tab. tit.*) *Bull. herb. Franc. t.* 441.

1214. HELVELLA. *Fungus* pileo inflato difformi concavoque lævi ſemina ſuperne elaſtice protrudente.

* ſtipitatæ.

gelatinoſa. 1. H. ſtipite fiſtuloſo, pileo convexo lævi ſubtus undulato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 296. *t.* 473. *f.* 2.

fuliginoſa. 2. H. pileo inflato angulato plicato nigricante, ſtipite fiſtuloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 242.

revoluta. 3. H. ſtipite fiſtuloſo compreſſiuſculo, pileo plano depreſſo, margine revoluto integerrimo. *Vaill. flor. par. p.* 58. *t.* 13. *f.* 7-9.

pezizoides. 4. H. ſtipite fiſtuloſo, pileo deflexo-bilobo liberoſubtus ſcabro. *Act. Afzel. n. act. Stockh.* 1783. *p.* 299. *t.* 10. *f.* 2. a. b. c.

brunnea. 5. H. ſtipite fiſtuloſo lævi, pileo deflexo adnato-rugoſo brunneo. *Schæff. fung. t.* 159-161. *β) Michel. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 8.

Mitra. 6. H. ſtipite fiſtuloſo ſulcis lacuniſque inæquali pileo deflexo multilobato adnato. *Schæff. fung. t.* 154. 162. *β) Juſſieu act. pariſ. ad.* 1728. *t.* 14. *γ) Schæff. fung. t.* 322.

ſulcata. 7. H. ſtipite ſolido rimoſo regulariter ſulcato, pileo deflexo bilobo adnato. *Ad. Afzel. n. act. Stockh. ad.*1783. *p.*297. *t.* 10. *f.* 1. *β*) Helvella alba. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 541. *γ*) Helvella cinerea. *Batt. fung. t.* 3. F. B.

atra. 8. H. ſtipite ſolido, pileo deflexo bilobo libero ſubtus ſcabro. *Flor. dan. t.* 534. *f.* 1.

horizontalis. 9. H. ſtipite ſolido tereti, pileo plano infundibuliformi, margine horizontali crenulato. *Ad. Afzel. n. act. Stockh.* 1783. *p.* 302. *t.* 10. *f* 3. a. b.

clavata. 10. H. ſtipite ſubcompreſſo albido pileum intrante, pileo deflexo. *Schæff. fung. t.* 149. *Bolt. fung.* III. *t.* 97.

calicifor-mis. 11. H pileo ochraceo glabro ſubtus ſtipiteque brevi carneis furfuraceo - granuloſis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 197. *f.* 135.

hiſpida. 12. H. pileo plano aut concavo exterius ſubaſpero. *Bolton. fung.* III. 96. *t.*96. *β*) Elvella villoſa. *Schæff. fung. t.*321.

æruginoſa. 13. H. minima viridiſſima, pileo difformi. *Flor. dan. t.* 534. *f.* 2.

cerasina. 14. H. ſubſeſſilis gregaria pyriformi - campanulata rubra, margine dentato. *Wulfen. ap. Jacq. Collect.* 1. *p.* 347.

** acaules. *An forſan pezizis jungendæ ?*

cochleata. 15. H. turbinata cochleata albicans, intus aurantiaco coccinea. *Schæff. fung. t.* 150. *Syſt. nat.* XII. 2. Peziza cochleata.

liliacea. 16 H. gregaria ceracea plano-concava lilacina; margine elevato tumidiuſculo. *Wulf. ap. Jacq. Collect.* 1. *p.* 317. *An cum præcedente atque ſequentibus hujus generis? nonne potius pezizæ ?*

ciliaris. 17. H. ceracea hemiſphærico-concava coccinea, margine nigro-ciliato. *Mich. nov. pl. gen. p.* 206. *n.* 12.

verſicolor 18 H. membranacea, faſciis diſcoloribus ſubtus lævis alba. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 149.

atrata. 19. H. membranacea fragilis utrinque lævis nigra. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 149.

pallida. 20. H. coriacea fragilis utrinque lævis ſupra fuſca ſubtus albeſcens. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 150.

tremelli-21. H. coriacea undulata lævis plumbea ſubtus incana villoſa. na. *Swartz nov. pl. gen. & ſp. p.* 149.

coccinea. 22. H. ſubgloboſo-campanulata intus coccinea, margine integro. *Schæff. fung. t.* 148. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 269. *t.* 474. Peziza coccinea.

meſenteri-23. H. gelatinoſo-coriacea rugoſa reſupinata ſupra ſpongioca. ſo-villoſa cinerea ſubtus lævis violacea. *Mich. n. plant. gen.* 26. *p.* 124. *t.* 66. *f.* 4.

1215. PEZIZA. *Fungus* ſæpe concavus, ſine capſulis aut ſeminibus nudo oculo conſpicuis.

† ſtipitatæ.

coriacea. 1. P. infundibuliformis, ſtipite tortuoſo. *Bulliard herb. Franc. t.* 438. *f.* 1.

Tuba. 2. P. fulva conico-dilatata, ſtipite lineari elongato radicato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 10.

carpini. 31. P. ochraceo-albens, ſtipite lineari elongato in cyathum planiuſculum terminato. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 217. *f.* 150.

echinophi-3. P. craſſiuſcula firma fragilis glabra ſubfuliginoſa in ſtipila. tem craſſum deſinens, patera ſcutellato-cupulari ferruginea. *Bull. herb. Franc. t.* 500. *f.* 1.

tenella. 4. P. alba, ſtipite gracili elongato in cyathum excavatum ſubdiffuſo. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 217. *f.* 151.

tuberoſa. 5. P. ſtipite gracili elongato in cyathum fuſcum intus dilutiorem terminato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 39. *t.* 10. *B.*

ſceptrum. 6. P. depreſſo-globoſa griſea extrinſecus rugoſo-coſtata, ore contracto rugarum apicibus dentato, ſtipite albo elongato diſtincte inſerto. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 3.

bulboſa. 7. P. rotundata exterius albo-punctata intus atra, ſtipite bulbilloſo elongato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 26. *t.* 10. *C.*

Hirudo. 8. P. cinereo-fuſca, ſtipite elongato furſum diffuſo in diſcum ſuperne pulvinatum reflexum cicatrice notatum, margine ferrugineo. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 214. *f.* 149.

Halleri. 9. P. ſordide lutea, ſtipite longiſſimo patella parabolica margine punctato ſerrata. *Hall. hiſt. ſtirp. helv. n.* 2225. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *t.* 13. *f.* 2.

Fungoidaſter. 10. P. ſtipite exili gracili elongato albido patella fuſceſcente terminato. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 53. *t.* 19. A.

villoſa. 11. P. ſtipite mediocri elongato patellaque convexo-marginata villoſa, villis connexis furſum ſpectantibus. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 54. *t.* 19. B.

Craterella. 12. P. albicans ſtipite gracili elongato patellaque ampliuſcula æqualiter marginata breviſſime tomentoſis. *Hedw. crypt.* II. 2. *p.* 55. *t.* 19.

quercina. 13. P ſubfuſceſcens tomentoſa, ſtipite elongato, patella concava lævi nigra. *Schrader.*

Caliculus. 14. P. convexa hemiſphærica patens, ſtipite ſubelongato linceari valido diſtincte inſerto. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 5. 11. *Batſch el. fung. p.* 125. *f.* 57.

nutans. 14*. P. ſtipite* filiformi erectiuſculo, cyatho nutante acute conico. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 12. 13.

varia. 15. P. lævis fuſceſcens, ſtipite cartilagineo in cyathum dilatato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 26. *t.* 6. *f.* D.

violacea. 16. P. lævis dilute violacea, ſtipite in cyathum violaceum dilatato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 32. *t.* 8. *f.* A.

Infundibulum. 17. P. hemiſphærica ferruginea, ſtipite furſum incraſſato cum medio pileo confluente. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 211. *f.* 147.

ſulphurea. 18. P. convexo-depreſſa patens, ſtipite confluente brevi valido. *Batſch el. fung. p.* 122. *n.* 18. *cent.* 1. *p.* 210. *f.* 147.

Crater. 19. P. cano fuſceſcens depreſſo-convexa pateris ſubundulata, ſtipite ſubelongato ſubſubulato valido. *Schæff. fung t.* 167.

dubia. 20. P. albens farta ſupra plana ſubtus convexa, ſtipite diſtincto deorſum incraſſato. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 209. *f.* 145.

caliciformis. 21. P. convexa intus fuſceſcens exterius cineraſcens. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1174. *Hedw. cryptogam.* II. 3. *p.* 78. *t.* 22. *f.* B.

ciliaris. 22. P. infundibuliformis nivea, ciliis longis. *Schrader.*

umbrina. 23. P. pulvinata umbrina, patella planiuſcula concolore. *Schrader.*

urceolata. 24. P. luteſcens urceolata, margine ciliato. *B. h. Fr. t.* 416. *f.* 4.

clandeſtina. 25. P. villoſa cinerea intus lævis. *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 5.

purpurea. 26. P. purpurea, ſtipite coriaceo, in cyathum exterius axalbidum terminato. *Hedw. crypt.* II. 3. *p.* 77. *t.* 22. *f.* A.

paleacea. 27. P. minima fuſca, margine palearum ordinibus coronato. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13. *f.* 8.

urticæ. 28. P. margine radiis cuneiformibus demum cirratis cincto. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13 *f.* 7.

ſtipitata. 29. P. hemiſphærica exterius fuſco hiſpida, ſtipite cylindrico. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1164. β). Octoſperma ſetigera. *Schranck. flor. bav.* 2. *p.* 506.

pyriformis. 30. P. albicans, ſtipite gracili in patellam pyriformem terminato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 38. *t.* 10. A.

pedunculata. 31*. P. plana orbiculata rufeſcens ſtipitata. *Pallas it.* 1. *p.* 5C3.

hians. 32. P. intus fulva exterius alba, ſtipite lævi conico in cyathum infundibuliformi-foveatum diffuſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 6.

convivalis. 33. P. albicans acute conica patens, ſtipite ſubdiſtincto lineari brevi. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 14.

ſigillatoria. 34. P. alba inverſe conico patens, ſtipite confluente brevi. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 204. *f.* 142.

cruciformis. 35. P. procumbens oblonga truncato-aperta, ore ſubconſtricto, ſtipite brevi. *Mich. nov. pl. gen. t.* 68. *f.* 16.

virginea. 36. P. nivea depreſſo-convexa patens circularis, ſtipite brevi lineari valido. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 15.

minutiſſima. 37. P. alba minutiſſima convexo-depreſſa patens, ſtipite brevi diſtincto. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 206. *f.* 143.

miniata. 38. P. ruberrima convexo-depreſſa farcta leniter excavata, ſtipite brevi ſubconfluente. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 210. *f.* 144.

bolaris. 39. P. convexo-depreſſa patens intus fulva opaca extrinſecus ochraceo-carnea deorſum fulva, ſtipite brevi. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 222. *f.* 155.

candidiſſi- 40. P. infundibuliformis nivea, ſtipite breviſſimo. *Mich. nov.*
ma. *pl. gen. p.* 205. *t.* 86. *f.* 15.

minima. 41. P. plano-convexa, margine nudo, ſtipite breviſſimo. *Muray comm. gœtt.* 1772. *p.* 82. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *t.* 13. *f.* 5.

citrina. 42. P. flava plana, ſtipite breviſſimo anguſto. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 33. *t.* 8. B.

albidula. 43. P. lævis albida plana, margine convexo, ſtipite breviſſimo. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 36. *t.* 9. B.

luteſcens. 44. P. lævis luteſcens, plana margine inflexo, ſtipite breviſſimo anguſto. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 37. *t.* 9. C.

cupularis. 45. P. globoſo-campanulata lutea margine crenata, ſtipite breviſſimo. *Flor. dan. t.* 469. *f.* 3.

infundibu- 46. P. ſubſtipitata conico-dilatata intus fuſca exterius alba.
liformis. *Schæff. fung. t.* 152.

diſcolor. 47. P. ſubſeſſilis exterius fuſca intus dilute ochracea. *Hedw. cryptog.* II. 3. *p.* 80. *t.* 22. *f.* C.

ſpadicea. 48. P. ſubſeſſilis ſaturate ſpadicea ſuperne nitens inferne ſcabra, margine crenulato. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 93. *t.* 39. *f.* 217.

lactea. 49. P. ſubſeſſilis alba plana exterius villoſiſſima. *Bulliard herb. Franc. t.* 376. *f.* 3.

† † ſeſſiles.

cyathoi- 51. P. cyathiformis, margine obtuſo erecto. *Raj. ſtirp. angl.*
des. 5. 2. *t.* 24. *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 3.

tremel- 52. P. infundibuliformis, margine crenato. *Bull. herb. Franc.*
loides. *t.* 410. *f.* 1.

Crucibu- 53. P. ſubalbide inverſe conica ſubtpdis hians. *Mich. nov.*
lum. *pl. gen. t.* 86. *f.* 1.

cupreſſi. 54. P. lutea ſeſſilis inverſe conico-oblonga truncato-ſubcavata. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 20.

ſarcoides. 55. P. purpurea lobulis criſpa plicata hemiſphærica infundibuliformis floriformis. *Bolton fung.* III. 101. *t.* 101. *f.* 2.

ſepulcra- 56. P. ventricoſa depreſſa ochracea, ore baſi anguſtiore acuto.
lis. *Schæff. fung. t.* 280.

coronata. 57. P. inverſe ovata ventricoſa albo-griſea, margine erecto dentato. *Batſch el. fung. p.* 121. *Mich. n. pl. gen. t.* 80. *f.* 2. *β*) *Bolton fung.* III. *t.* 106. *f.* 2.

pinguis 58. P. urceolata ſanguinea, tomento cano obducta. *Bull. herb. Franc. t.* 396. *f.* 1.

lanuginoſa. P. lanuginoſa fuſca intus canis, juniores margine brevi.

lacera. 59. P. campanulata ſeſſilis [illegible]icans, margine lacero. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1166.

flava. 60. P. globoſo-campanulata flava intus pubeſcens exterius glaberrima, margine integro. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 150.

nigreſcens. 61. P. globoſo-campanulata obliqua intus glabra atra exterius incano-villoſa, margine integro. *Swarts nov. pl. gen. & ſp. p.* 150.

Diadema. 62. P. nigra globoſa extrinſecus rugoſo-coſtata, vertice late aperto, ore contracto marginato-crenato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 86. *f.* 18.

Hæmaſtigma. 63. P. ſeſſilis ſubglobоſa minuta dilute ſanguinea. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 21. *t.* 5. B. *f.* 1. 5.

Labellum. 64. P. hemiſphærica fragilis cerea diaphana ciliata exterius piloſa. *Bull. herb. Franc. t.* 204.

rhizophora. 65. P. hemiſphærica convexa fuſca inferne albido-concava, radicibus ſimplicibus teretibus. *Reich. berl. Naturf. Beſch.* 3. *p.* 214. *t.* 4. *f.* 4. 6.

hemiſphærica. 66. P. hæmiſphærica concava atra exterius tomentoſa intus lævis. *Wulfen. Schr. berl. Naturf.* 8. *p.* 141.

hiſpida. 67. P. hemiſphærica exterius fuſca hiſpida intus lævis glauca. *Schæff. fung. t.* 151.

hirta. 68. P. hæmiſphærica extrinſecus piloſa ſpadicea intus coccinea glabra. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 15. *t.* 3. *f.* B. 1-6.

puſtulata. 69. P. ſubhemiſphærica ſeſſilis extrinſecus albo-punctata. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 23. *t.* 6. A. *f.* 1. 5.

crenata. 70. P. turbinata margine crenulata intus fuſca extrinſecus albido pulvere conſperſa. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1165. *β*) *Bull. herb. Franc. t.* 396. *f.* 3.

epiphylla. 71. P. ſubturbinata fuſca, margine crenulato. *Naturf.* 19. *p.* 126. *t.* 7. *f.* 5-3.

hypocrateriformis. 72. P. hypocrateriformis flava lævis ſeneſcens plana, margine glabro. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 596.

fimetaria. 73. P. ſeſſilis carnoſa fragilis ochroleuca patellata, margine calloſo crenulato. *Bull. herb. Franc. t.* 376. *f.* 1.

calloſa. 74. P. cæruleſcens ſcutellata ſubvilloſa intus lævis, margine caloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 1.

araneoſa. 75. P. concava margine crenulata tela araneoſa veſtita. *Bull. herb. Franc. t.* 280.

tomentoſa. 76. P. concava tomentoſa nivea intus lævis albida. *Schrader.*

hiſpidula. 77. P. concava extrinſecus hiſpidula nigra intus lævis albida. *Schader.*

hirſuta. 78. P. concava extrinſecus nigra villis flavis hirſuta flava intus lævis carnea. *Schrader.*

pulla. 79. P. concava coriacea fuſca undique lævis nitida. *Schrader.*

membranacea. 80. P. minima concava albida ſubdiaphana. *Schrader.*

hirtella. 80. *a*) P. concava dilute nigra extrinſecus fuſco-piloſa, margine albido. *Schrader.*

puſilla. 81. P. plana albida ſubdiaphana extrinſecus tenuiſſime tomentoſa. *Schrader.*

nigra. 81. *b*) P. plana marginata ſcabra nigra. *Schrader.*

atra. 82. P. concava atra. *Hall. ſtirp. helv. n.* 2243.

viridans. 83. P. ſeſſilis cava, margine viridi. *Hedw. cryptogam.* II. *t. p.* 24. *t.* 6. B.

ciliata. 84. P. fulva concava exterius lævis, margine ciliato. *Bull. herb. Franc. t.* 438. *f.* 2.

granulata. 85. P. fulva concava exterius granuloſa, margine nudo. *Bull. herb. Franc. t.* 438. *f.* 3.

leporina. 86. P. coriacea ſpatulata concava fuſca extrinſecus albida. *Schæff. fung. t.* 156.

marchica. 87. P. gregaria fuſca concavo-compreſſa lobata extrinſecus ochracea papillata. *Willd. bot. Mag.* 4. *p.* 14. *f.* 9.

floccoſa. 88. P. ſemiovalis vel oblonga cava margine involuta intus fuſco extrinſecus cana floccis cinereis diſtantibus conſperſa. *Batſch el. fung. cont.* 1. *p.* 225. *f.* 156.

cartilaginea. 89. P. coccifer pulvinata glabra. *Bolton fung.* III. 101. *f.* 1.

jenenſis. 90. P. ſeſſilis craſſa membranacea ſulphurea patens convexo-depreſſa exterius tomentoſa. *Batſch el. fung. p.* 125. *n.* 21. *cent.* 1. *p.* 221. *f.* 153.

Schenkii. 91. P. membranacea convexo-depreſſa patens atra intus nitidiſſima, margine brunneo. *Batſch el. fung. p.* 126. *n.* 27. *f.* 52.

pulvinata. 92. P. ſeſſilis ochraceo-caneſcens farta, margine pulvinato, diſco glabro. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 95. *t.* 39. *f.* 219.

livida. 93. P. plana livido-violaceo-glabra extrinſecus pulvinata. *Schrader.*

immarginata. 94. P. orbicularis miniata, margine nullo. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 504.

vireſcens. 95. P. minuta dilute viridis, margine nullo. *Schrader.*

aquifolii. 96. P. minutiſſima plana membrana hyalina obvoluta. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13. *f.* 10.

rugoſa. 97. P. explanata marginata rugoſa nigra. *Schrader.*

expaleſcens. 98. P. ſeſſilis plana cana lævis. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 504. *An vere diſtincta a chryſocoma ?*

cærulea. 99. P. plana cærulea, margine obtuſo ciliato. *Bolton fung.* III. 108. *t.* 108. *f.* 2.

crocea. 100. P. plana crocea utrinque glabra. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 107.

ſtercorea. 101. P. plana flava extrinſecus hirſuta. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 106.

palpebralis. 102. P. aurantia plana longe ciliata. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 106.

chryſocoma. 103. P. ſeſſilis læviſſima luteſcens plana. *Bulliard herb. Franc. t.* 376. *f.* 2.

ſcutellara. 104. P. plana margine convexo piloſo. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 12. *t.* 3. A.

flava. 105. P. plana orbiculata flava. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1175.

cinerea. 106. P. plana diaphana cinerea. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1173.

nivea. 107. P. nivea tota plana vel anguſta marginata. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1172. *Batſch el. fung. f.* 56.

fulva. 108. P. plana fulva, margine convexo glabro. *Vaill. flor. pariſ. t.* 13. *f.* 14.

griſea. 109. P. opaca cinerea tota plana vel anguſte marginata. *Batſch el. fung. p.* 118. *f.* 55.

Seminulum. 110. P. atra lævigata explanata. *Batſch el. fung. p.* 118. *n.* 3.

comitialis. 111. P. ſeſſilis plana caneſcens ſuperficie marginali externa fuſca nigro-venoſa in marginem erectum lobato-coronatum producta. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 217. *f.* 152.

applanata. 112. P. expanſa plana rugoſa cinnamomea ſubtus pallidior. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 22. *t.* 5. C.

carnea. 113. P. infra ventricoſa ſuperne plana margine inæquali, *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 31. *t.* 7. B.

nana. 114. P. lævis cinnamomeo rubella ſubtus anguſtata ſupra plana, annulo obſcuriori craſſo. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 35. *t.* 9. A.

leucoloma. 115. P. minuta depreſſa ruberrima, margine albo fimbriato. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 17. *t.* 4. A.

olivacea. 115*. P. membranacea orbicularis plana intus nigra opaca extrinſecus ruguloſa olivacea, margine anguſto convexo. *Batſch el. fung. p.* 127. *f.* 51.

punicea. 116. P. ſeſſilis orbicularis opaca farta ſupra miniata, margine pallido. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 97. *t.* 39. *f.* 220.

crinita. 117. P. ſeſſilis orbicularis cana nigro-piloſa intus lævis ſanguinea. *Bull. herb. Franc. t.* 416. *f.* 2.

viridis. 118. P. viridis complanata, margine calloſo. *Bull. herb. Franc. t.* 876. *f.* 4.

Pileolus. 118*. P. nigra minutiſſima ſubcordata margine fimbriata. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 271. *t.* 13. *f.* 12.

criſpa. 119. P. cinerea reflexa, margine criſpo ſinuato-lobato. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 197. *f.* 137.

hepatica. 120. P. atropurpurea reflexa diſco ſæpius ſcrobiculo notata. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 199. *f.* 138.

pinati. 121. P. caneſcente-alba reflexa, margine ochraceo fuſceſcente ſubluriđo. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 201. *f.* 140.

papyracea. 122. P. membranacea fuſceſcens. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 620. *n.* 1761.

123. P.

minuta. 123. P. ſeſſilis fuſca, margine concolori æquali. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 25. A. 6. C.

porphyroſperma. 124. P. minuta ſeſſilis ſordide viridis ſubhirta. *Hedw. crypt.* II. 1. *p.* 30. *t.* 7. A.

aceris. 125. P. junior cinerea ſeneſcens nigra, margine albo lacero. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 507.

cerea. 125*. P. pellucida ceracea, margine eroso. *Bull. herb. Fr. t.* 44.

exilis. 126. P. ſupra flavâ ſubtus lanuginoſa alba. *Flor. dan. t.* 779. *f.* 2.

bicolor. 127. P. villoſa niveâ intus lævis fulva. *Bull. h. Fr. t.* 410. *f.* 3.

ſanioſa. 128. P. ſeſſilis coriacea pulvinata extrinſecus pulverulenta umbrina intus glabra e fuſco purpurea. *Schrader.*

limbata. 129. P. ſeſſilis viridis, margine nigro. *Bolton fung.* III. 109. t. 109. *f.* 1.

† † † *gelatinoſæ.*

Acetabulum. 130. P. cyathiformis ſeſſilis exterius angulata, venis ramoſis. *Schæff. fung. t.* 150. 155. 156. *Bulliard herb. Franc. t.* 485. *f.* 4.

porphyrea. 131. P. cylindrica truncato-foveata intus ſanguineo-fulva nitidiſſima exterius carneo-fulva. *Batſch el. fung. p.* 129. *f.* 53.

elaſtica. 132. P. carnoſa polymorpha intus atra extrinſecus angulo-ſo-fuſco-brunnea. *Hedw. cript.* II. 1. *p.* 28. *t.* 6. E.

polymorpha. 133. P. atra ſupra rugoſa inæqualis concava viſcoſa. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 236. *t.* 116. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon truncatum.

Auricula. 134. P. rugoſa auriformis concava. *Syſt. nat.* XII. 2. Tremella Auricula. *Blackw. herb. t.* 334.

gelatinoſa. 135. P. ferruginea in ſtipitem brevem ſubiateralem baſi attenuatum deſinens, patella planiuſcula. *Bull. herb. Franc. t.* 460. *f.* 2.

VOLUTELLA. *Fungus* hypocrateriformis ſtipitatus, pilei ſuperficie ſuperiori punctato-umbilicata, margine primum revoluto, ſeminibus ſimilaribus, ſtipite brevi ſetaceo.

volvata. 1. V. coriacea ſparſa, volva marginali diſcreta diſſiliente, ſeminibus unguinoſis. *Tod. fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 28. *t.* 5. *f.* 43.

Aaaaa

nuda. 2. V. nuda fugaciſſima ſparſa, pileo plano nudo demum diſciformi. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 29. *t.* 6. *f.* 44. *Batſch el. fung. cont.* 1. *t.* 27. *f.* 148. *Cum volutellæ genus a Forskæhlio conſtitutum* Vahlii *curatius examen non ſuſtinuerit, inventoris nomen huic generi reſtituo.*

TYMPANIS. *Fungus* cyathiformis, cupula ſupra volvata, ſeminibus ſiccis confertis in pulverem fatiſcentibus.

ſaligna. 1. TYMPANIS. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 24. *t.* 4. *f.* 37.

MYROTHECIUM. *Fungus* ſeſſilis cyathiformis, cupula ſupra volvata, ſeminibus lento-viſcidis.

roridum. 1. M. bombacinum niveum, thecis hemiſphæricis connatis roridis, margine in volvam continuato, ſeminibus turgidis fuſcis. *Tode fung. meklenb. ſel.* 1. *p.* 25. *t.* 5. *f.* 38.

inundatum. 2. M. candidum bombacino-membranaceum, thecis polymorphis connatis inundatis, margine in volvam continuato, ſeminibus viridi nigreſcentibus. *Tode fung. meklenb. ſel.* 1. *p.* 25. *t.* 5. *f.* 39.

Stercoreum. 3. M. membranaceum nigrum aggregatum, ſeminibus turgidis albido-fuſceſcentibus. *Tode fung. meklenb.* 1. *p.* 26. *t.* 5. *f.* 40.

hiſpidum. 4. M. coriaceum hiſpidum fuſcum ſparſum, cupulæ margine in volvam continuato, ſeminibus fuſceſcentibus diaphanis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 27. *t.* 5. *f.* 42.

dubium. 5. M. parabolicum aggregatum, cupula cortice volvaque marginali deſtituta, ſeminibus nigreſcentibus pauco. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 27. *t.* 5. *f.* 42.

EPICHYSIUM. *Fungus* rotundato-concavus, ſeminibus ecaudato-globoſis, filo ramoſo intus reptanti affixis.

argenteum. 1. EPICHYSIUM. *Tode fung. mekl. ſel.* 2. *p.* 1. *t.* 8. *f.* 60.

CYATHUS. *Fungus* campanulatus cylindricusve capſulas lentiformes intus gerens.

laevis. 1. C. campanulatus exterius villoſus intus laevis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.*725. Pezziza lentifera. *Flor. dan. t.*105. *Bull. herb. Franc. t.* 300. A. B.

ſtriatus. 2. C. campanulatus exterius hirſutus intus ſtriatus. *Flor. dan. t.* 469. *f.* 1. *Schaeff. fung. t.* 178.

cylindricus. 3. C. cylindricus arhizos totus glaber. *Wilden. prodr. flor. Berol. n.* 1161.

deformis. 4. C. arhizos rugoſus albus, capſulis oblongis brunneis. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 14. *f.* 8.

crucibuliformis. 5. C. ventricoſus glaber aureus. *Schaeff. fung. t.* 179. 181.

fructiger. 6. C. cyathiformis totus laevis albidus ſtipitatus. *Bull. herb. Franc. t.* 228.

coronarius. 7. cyathiformis utrinque glaber, limbo laciniato erecto. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 140. *t.* 10. *An hujus generis?*

Cupula. 8. C. globoſus glaber, ore late patulo ſubconſtricto lobato crenulato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 102. *f.* 4.

ATRACTOBOLUS. *Fungus* ſeſſilis cupularis operculatus, veſicula ſeminifera fuſiformi ejicienda.

annularis. 1. Atractobolus. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 45. *t.* 7. *f.* 59. *Batſch el. fung. cent.* 1. *t.* 26. *f.* 139.

ASCOBOLUS. *Fungus* hemiſphaericus, *Veſicula* oblonga diſco ſparſim ſubimmerſa elaſtice ejiciens ſemina. *Perſoon fung. ined.*

pezizoides. 1. Ascobolus. *Bull. herb. Franc. t.* 376. *f.* 1. & *t.* 438. *f.* 4. Peziza ſtercoraria.

THELEOBOLUS. *Fungus* ſeſſilis gelatinoſus ſolidus, placenta ſeminifera dejicienda.

ſtercoreus. 1. Theleobolus. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 41. *t* 7 *f.* 56.

SPHÆROBOLUS. *Fungus* ſeſſilis globoſo-concavus radiatim dehiſcens, capſulam globoſam ejaculans.

ſtellatus. 1. Sph. globoſus volvatus liber. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon carpobolus. *Flor. dan. t.* 895.

roſaceus. 2. Sph. urceolatus nudus immerſus. *Tode fung. mekl. fel.* 1. *p.* 44. *t.* 7. *f.* 57.

PILOBOLUS. *Fungus* ſtipitatus, ſtipite capillari ſupra ventricoſo hydrophoro, pileo hemiſphærico ſemina elaſtice ejiciente.

cryſtallinus. 1. P. pileo compreſſo glutinoſo atro. *Wigg. prim. fl. holſ. p.* 110. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* III. *t.* 480. *f.* 1. Mucor urceolatus.

conglomeratus. 2. P. capſulis luteis ſphæricis ſeſſilibus conglomeratis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 557.

roridus. 3. pileo globoſo nigro. *Bolton fung.* 3. *t.* 132. *f.* 4.

PUCCINIA. *Fungus* cylindricus ſeminibus caudatis radiatim poſitis elaſtice proſilientibus farctus.

ſimplex. 1. P. corpore ſimpliciſſimo obtuſo. *Willden. prodr. flor. ber. n.* 1186.

byſſoides. 2. P. ramoſus, ramis primum glabris clavatis niveis, tum depreſſis piloſis cinereis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 200. *t.* 415. *f.* 2.

1217. LYCOPERDON. *Fungus*, fila ſeminifera cum thecæ parietibus internis connexa.

* *ſolida, ſubterranea, radice deſtituta.*

cervinum. 1. L. globoſum ſolidiuſculum, centro fariniferò. *Bolt. fung.* III. 116. *t.* 116.

ſcabrium. 2. L. ſuſceſcens ſcabrum ſubgloboſum. *Willd. prodr. flor. ber. n.* 1192.

æſtivum. 3. L. ſubgloboſum glabrum. *Wulf. ap. Jacq. Coll.* 1. *p.* 349.

** *pulverulenta, ſupra terram creſcentia, plurima radicata.*

Proteus. 4. L. ſubrotundum ſubſtipitatum lacero-dehiſcens, carne alba, ſeminibus atris. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 148. α) L. cepæforme. *t.* 435. *f.* 2. β) L. ovoideum. *t.* 435. *f.* 3. B. & *t.* 475. *f.* B. C. D. M. N. P. γ) L. pyriforme. *t.* 32. *t.* 340. δ *t.* 475. *f.* B. D. M. ꝺ) L. hyemale. *t.* 72. & *t.* 475. *f.* E. ε) L. lacunoſum. *t.* 72. ζ) L. hirtum. *t.* 340. & *t.* 475. *f.* A. B. C. D. F. G. H. I. M. η) L. excepuliforme. *t.* 450. *f.* 2. & *t.* 475. *f.* F. G. H. I. *An forſan diverſæ ſpecies?*

verrucoſum. 5. L. ſubrotundum verrucoſum. *Bull. herb. Franc. t.* 22.

circumſciſſum. 6. L. ſubſeſſile ſubrotundum exaſperatum, parte inferiore perſiſtente circumſciſſo-lacera, polline brunneo. *Schæff. fung. t.* 186. 189-191. β) *Bull. herb. Fr. t.* 340.

ſpadiceum. 7. L. ſubrotundum ſolidiuſculum radicatum ſpadiceum. *Schæff. fung. t.* 188.

ſquamoſum. 8. L. depreſſo-globoſum acuminatum, acumine truncato-aperto, ſtipite elongato ſquamoſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 7.

admorſum. 9. L. ſubgloboſum ſcabriuſculum, parte infera perſiſtente circumſciſſo-lacera, ſtipite abbreviato valido. *Schæff. fung. t.* 187.

capitatum. 10. L. ſubgloboſum glabrum, ſtipite valido incraſſato, radicibus ſuſiformibus flexuoſis. *Mich. nov. pl. gen. t.* 98. *f.* 1.

diſpar. 11. L. ſubgloboſum fuſcum, ſtipite lineari valido brevi diſtincte albo, polline atro-purpureo. *Schæff. fung. t.* 188.

gemmatum. 12. L. ſtipitatum ſubgloboſum aculeis acutis denſe obſitum. *Willd. prodr. flor. ber. n.* 1195. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 1.

aurantium. 13. L. ſphæroidale baſi rugoſum ſtipitatum laciniis obtuſe emarginatis dehiſcens. *Bulliard herb. Fr. t.* 279. β) *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 125. *t.* 41. *f.* 229. Lycoperdum defoſſum.

equinum. 14. L. ſphæricum circumſciſſum, ſtipite cylindrico. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1198. *An hujus generis?*

Boviſta. 15. L. globoſum lacero dehiſcens, ſtipite validiſſimo clavato ventricoſo, carne alba, ſeminibus atris. *Schæff. fung. t.* 292. 295.

puſillum. 16. L. atrum globoſum ſeſſile, orificio anguſto. *Batſch el. fung. cent.* 2. *p.* 123. *t.* 41. *f.* 228.

goſſypinum. 17. L. globoſum ſubacaule albidum atro-villoſum. *Bull. herb. Franc. t.* 435. *f.* 1.

ſurfuraceum. 18. L. ſeſſile globoſum, ſuperficie ſurfuraceo ſquamoſa. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 6.

polyrhizon. 19. L. globoſum æquale lacero dehiſcens, ſtipite breviſſimo incraſſato, radice brevi ramoſiſſima, polline ſordide purpureo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 99. *f.* 2.

rufum. 20. L. globoſum circumſciſſum, ſtipite brevi. *Schmid. ic. plant. p.* 91. *t.* 24.

lanatum. 21. L. globoſum piloſo-hirtum, ſtipite ſubelongato valido incraſſato lineari. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 2.

giganteum. 22. L. ochraceo-album glabrum ſeſſile deforme globoſum, filamentis teneris denſis flavo-virentibus. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 237. *f.* 165.

ardeſiacum. 23. L. cæruleſcens globoſo-acuminatum. *Bulliard herb. Fr.* 1. *p.* 146. *t.* 192.

lacerum. 24. L. ſubſeſſile globoſo-pyriforme depreſſum, parte infera perſiſtente circumſciſſo-lacera, polline virente. *Schæff. fung. t.* 193. 194.

muricatum. 25. L. ſeſſile pyriforme extrinſecus muricatum, ore ſubrotundo. *Willd. prodr. flor. berol. n.* 1194. *Mich. nov. pl. gen. t.* 97. *f.* 5. *β*) *Schæff. fung. t.* 184. *γ*) *Bull. herb. Franc. t.* 430.

ſubalpinum. 26. L. album turbinatum læve horizontaliter dehiſcens. *Schr. flor. bav.* 2. *p.* 627. *n.* 1764. *an diſtincta ſpecies?*

Infundibulum. 27. L. infundibuliforme ſordide albidum interius celluloſum. *Willden. bot. Mag.* 4. *p.* 15. *f.* 11.

phalloides. 28. L. deflexum campanulatum ſupra pulverulentum calyptratum, ſubtus glabrum liberum, ſtipite volvato. *Woodward angl.* 74. *p.* 423. *t.* 16.

utriforme. 29. ſubcylindricum ſubhiſpidum rufeſcens ſolidum. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 153. *t.* 450. *f.* 1.

piſtillare. 30. L. clavatum, ſtipite torto. *Mant. p.* 313.

carcinomale. 31. L. clavatum, ſtipite cylindrico recto. *Suppl. p.* 453.

herculeum. 32. L. truncato-clavatum extrinſecus album ſcarioſum. *Pall. it.* 1. *p.* 553. *n.* 132.

arhizon. 33. L. ferrugineum celluloſum, cellulis ſubſtantia ſpongioſo filamentoſa repletis. *Scop. del. inſubr.* 1. *p.* 40. *t.* 18.

Hypoxylon. 34. L. rufeſcens, ſtipite albido filiformi. *Pall. it.* 1. *p.* 503. *n.* 133.

pruinatum. 35. L. ſeſſile lævigatum cinereum pruinatum, cicatrice radicali obſoleta, ore anguſtato lobato, filamentis laxis brunneis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 239. *f.* 166.

*** ſtellata.

ſtellatum. 36. L. volva multifida, capitulo ſubrotundo ſeſſili, ore integro. *Flor. dan. t.* 360.

Geaſter. 37. L. volva multifida, capitulo oblongo ſeſſili acuminato; ore piloſo. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100. *f.* 1.

pedicellatum. 38. L. volva multifida, capitulo oblongo-acuminato pedicellato, ore fimbriato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100 *f.* 2.

radicans. 39. L. volva multifida, capitulo globoſo ſeſſili, ore ſtellato. *Schæff. fung. t.* 182. *Nonne idem cum Geaſtro?*

corollinum. 40. L. volva multifida, capitulo ſeſſili globoſo acuminato, ore fimbriato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100. *f.* 3.

multifidum. 41. L. volva multifida, laciniis dilatatis fiſſis, capitulo ſeſſili globoſo, ore ſtellato. *Mich. nov. pl. gen. t.* 100. *f.* 5.

feneſtratum. 42. L. volva multifida fornicata, tunica exteriori filamentoſa, capitulo nigricante ſtipitato, radice fibroſa. *Sch. fung. t.* 183. β) *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 168. a. γ) *Batſch el. fung. f.* 168. b. *An ſatis diſtinctum a petiolato?*

coliforme. 43. L. volva multifida patente, capitulo depreſſo-ſphærico, pedunculis oſculisque numeroſis. *Dickſ. crypt. Brit. faſc.* 1. *p.* 24. *t.* 3. *f.* 4.

**** paraſitica in farinam fatiſcentia. *An hujus generis?*

piſiforme. 44. L. globoſum ſcabrum, ore perforato. β) *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 137. *t.* 7.

Epidendrum. 45. L. cortice farinaque purpurea. *Flor. dan. t.* 720.

ramoſum. 46. L. pyriforme ſcabrum, radice filiformi ramoſiſſima prolifera. *Jacq. flor. auſtr.* 3. *t.* 224.

corticale. 47. L. luteo-fuſceſcens glabrum, pulvere concolore. *Batſch el. fung. p.* 155. *Nonne ſtemonitis?*

nitidulum. 48. L. luteum fragile nitens, pulvere atro arenaceo. *Sch. fung. t.* 192.

ſcabridum. 49. L. brunneum induratum ſcabrum. *Batſch el. fung. t.* 155.

gregarium. 50. L. congeſtum ſphæricum, cortice fuſco nitente, pulvere aureo. *Retz. obſ. bot.* 1. *p.* 33.

SPUMARIA. *Folliculi* ramoſi intus filis ſeminiferis repleti, cortice celluloſo furfuraceo tecti.

Perſoon fung. ined.

Mucilago. 1. SPUMARIA. *Bull. herb. Franc.* 1. *t.* 326. Reticularia alba. *Mich. n. pl. gen. t.* 96. *f.* 2. *Leyſſ. fl. hal.* Mucor ſpongioſus.

FULIGO. *Fungus* cortice celluloſo-fibroſo, fibris per maſſam ſeminalem reticulatim penetrantibus.

ſeptica. 1. F. flava laciniata. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 727. Mucor ſepticus. *Flor. dan. t.* 778. *β*) Reticularia hortenſis. *Bull. herb. Franc. t.* 424. *f.* 2.

capitata. 2. F. flava capitata. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2135.

panicea. 3. F. minima alba ſeſſilis panici granum referens. *Gled. meth. fung. p.* 159. *n.* 11. *var.* b.

Lycoperdon. 4. F. marſupialis ſeſſilis alba intus atra. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 9. *t.* 446. *f.* 4. & *t.* 476. *f.* 1. *β*) *Bolt. fung.* III. *t.* 133. *f.* 1.

STEMONITIS. *Fungus*, cortice (fugaci membranaceove), thecæ rupto fila ſeminifera reticulato-compacta elaſtice ſeſe expandentia.

† *receptaculo ſubulato fila ſeminifera penetrante.*
† *capitulo elongato.*

typhina. 1. St. fuſco-rubens ſtipite tereti æquali. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 724. Clathrus nudus. *Bull. herb. Franc. p.* 119. *t.* 477. *f.* 1. *Bolt. fung. t.* 93. *f.* 1.

fuſca. 2. St. ſtipite nigro baſi dilatato, capitulo fuſco. *Bull. herb. Franc. t.* 477. *f.* 2.

Embolus. 3. St. ſtipite nigro albo-villoſo, capitulo fuſco. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Mucor Embolus. *Hall. enum. ſtirp. Helv. t.* 1. *f.* 1. *An vere diſtincta a typhina?*

†† *capitulo rotundato.*

nigra. 4. St. tota nigra. *Perſoon fung. ined.*

†† *filis ſeminiferis receptaculo hemiſphærico integro inſidentibus*, Arcyriæ.

crocea. 5. *a*) St. coccinea, receptaculo ſubtus ſtriato, filis ſeminiferis oblongo-ovatis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 724. Clathrus denudatus. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *t.* 6.

recutita. 5. *b*) St. albida filis ovatis, ſtipite brevi. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 724. Clathrus recutitus.

incarnata. 6. St. tota dilute incarnata, filis ſeminiferis ovato-oblongis formæ fluxilis. *Perſoon func. ined. ic.*

nutans. 7. St. flavicans, ſtipite breviſſimo, capitulo longiſſimo decumbente. *Bull. herb. Franc. p.* 122. *t.* 502. *f.* 3.

cinerea. 8. St. leucophæa, capitulis ſubcylindricis baſi complanatis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 129. *t.* 477. *f.* 3.

leucocephala. 9. St. receptaculo infundibuliformi, filis ſeminiferis ſubprominulis furfuraceo-albis. *Perſoon fung. ined. ic.*

nivea. 10. St. ſtipite flaveſcente filiformi, receptaculo globoſo niveo. *Hoffmann cryptog. veget.* 2. *t.* 4. *f.* 1.

Sphærocephala. 11. St. ſtipite filiformi nigro, capitulo globoſo cinereo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Mucor ſphærocephalus. *Hoffm. veget. crypt.* 2. *t.* 4. *f.* 2. *An hujus generis?*

lichenoides. 12. St. ſtipite ſubulato nigro, capitulo lentiformi cinereo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Muchor lichenoides. *Hoffm. crypt. veget.* 2. *t.* 4. *f.* 13. *Batſch fung. t.* 26. *f.* 133. *An hujus generis?*

furfuracea. 13. St. ſtipite filiformi, capitulo ſubglobofo fuſco glabro, ſeminibus viridibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 1726. Mucor furfuraceus. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 267. *f.* 178. *An diſtincti forſan generis, perinde ac* 11 & 12?

fulva. 14. St. capitulo globoſo coccineo, filis ſeminiferis fuſcis. *Bolton fung. t.* 93. *f.* 3. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Mucor fulvus.

flava. 15. St. capitulo globoſo, filis ſeminiferis flavis. *Bolton fung. t.* 94. *f.* 1.

olivacea. 16. St. capitulo globoſo ſtipiteque olivaceis. *Bolton fung. t.* 94. *f.* 2.

ſemitrichoides. 17. St. ſtipite ſimplici ſtriato, capitulo globoſo parte dimidia ſuperiori cancellato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 125. *t.* 387. *f.* 1.

cancellata. 18. St. ſtipite ſimplici, capitulo globoſo exterius cancellato, receptaculo nullo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 124. *t.* 387. *f.* 2. *Batſch el. fung. t.* 42. *f.* 242. Mucor cancellatus. *Nonne una cum præcedenti diſtincti generis?*

††† *cortice toto membranaceo irregulariter diſſiliente.* Tricticæ.

† *ſtipitatæ.*

botrytis. 19. St. faſciculata, capitulo pyriformi purpureo. *Hoffm. cript. veget.* 2. *t.* 1. *f.* 1. Trichoa pyriformis.

faſciculata. 20. St. chalybea faſciculata, capitulo ſubturbinato, ſtipite breviſſimo. *Perſoon fung. ined.*

graniformis. 21. St. rubra, ſtipite cylindrico ſimplici, capitulo globoſo, ſeminibus coccineis. *Hoffm. crypt. veget.* 2. *t.* 1. *f.* 2. Trichia graniformis.

rufa. 22. St. tota rufa capitulo ſubrotundo. *Hoffm. crypt. veget.* 2. *t.* 2. *f.* 5. Trichia rufa.

coccinea. 23. St. rubra, ſtipite cylindrico ſimplici. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 126. *t.* 368. *f.* 1.

antiades. 24. St. ſtipite craſſiuſculo ſulcato ſubramoſo, capitulo globoſo luteo-ſubfuliginoſo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 127. *t.* 368. *f.* 2.

violacea. 25. St. ſtipite nigro, capitulo lentiformi depreſſo, filis ſeminiferis albis, ſeminibus violaceis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 448. *Hoffm. veget. crypt.* 2. *t.* 2. *f.* 1.

cinnabarina. 26. St. gregaria ruberrima clavata. *Roth. flor. german.*

pyriformis. 27. St. lutea lucida, capitulo turbinato in ſtipitem cylindricum ſenſim deſinente. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 129. *t.* 417. *f.* 2.

pomiformis. 27. St. fulva, ſtipite breviſſimo, capitulo globoſo, filis ſeminiferis fulvis. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 448.

ficoides. 28. St. fuſco-nigrans, capitulo turbinato-elongato in ſtipitem baſi turgidum ſenſim deſinente. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 130. *t.* 417. *f.* 3.

turbinata. 30. St. aurantio-ſubferruginea, capitulo apice compreſſo in ſtipitem cylindricum ſenſim deſinente. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 132. *t.* 484. *f.* 1.

aurantia. 31. St. ſtipite nigro ſtriato baſi ventricoſo, capitulo orbiculari exterius luteo intus fuſco-nigricante. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 133. *t.* 484. *f.* 2.

globulifera. 32. St. capitulo orbiculari, ſeminibus nigro-fuſceſcentibus inter globulos diſcolores diſperſis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 134. *t.* 484. *f.* 3.

viridis. 33. St. ſtipite filiformi, capitulo orbiculari umbilicato granuloſo vireſcente, ſeminibus fuſco-nigricantibus. *Bulliard herb. Franc.* 1. *p.* 135. *t.* 407. *f.* 1.

bicolor. 34. St. ſtipite filiformi, capitulo orbiculari umbilicato granuloſo exterius niveo, filis ſeminiferis luteis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 136. *t.* 407. *f.* 2.

alba. 35. St. ſtipite cylindrico ſimplici, capitulo globoſo umbilicato granuloſo cano, ſeminibus filisque atris. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 137. *t.* 407. *f.* 3. & *t.* 470. *f.* 1.

argillacea. 36. St. ſtipite nigreſcente, capitulo globoſo terreo. *Perſ. fung. ined.*

floriformis. 37. St. ſtipite filiformi, capitulo luteo-ſtramineo primum globoſo demum ſtellatim patente. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 142. *t.* 371.

leucopus. 38. St. ſtipite niveo baſi dilatato, capitulis elongatis nigricantibus, ſeminibus ellipticis. *Bull. herb. Franc. t.* 502. *f.* 2. *An diſtinctæ tribus?*

⊢⊢ acaules.

veſparia. 39. St. cylindrica rufeſcens, ſeminibus rufis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 172. Lycoperdon veſparium.

veſiculoſa. 40. St. globuloſa, ſeminibus ferrugineo-ochraceis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *f.* 171. Lycoperdon veſiculoſum.

bombacina. 41. St. ſubgloboſa-ferruginea, ſeminibus concoloribus. *Batſch. el. fung. p.* 153. *n.* 28. Lycoperdon bombacinum.

favaginea. 42. St. globoſa lutea, ſeminibus concoloribus. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 257. *f.* 173. Lycoperdon favagineum. *Bolton fung. t.* 94. *f.* 3. *Bull. herb. Franc. t.* 417. *f.* 4.

vitellina. 43. St. ſubrotunda glabra lutea, ore fuſco. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 138. *t.* 5. Lycoperdon luteum. *An forſan varietas fuliginis ſepticæ?*

Trichia. 44. St. globoſa purpurea. *Roth. flor. germ.* 1. *p.* 449.

globularis. 45. St. orbicularis extrinſecus atra intus aurea. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 132. *t.* 417. *f.* 5.

ſulphurea. 46. St. pyriformis ſulphurea, filis ſeminiferis pallidioribus. *Wiggers fl. holſ. p.* 110. *n.* 1153.

varia. 47. St. capitulis decumbentibus oblongis ſubreniformibusque. *Perſoon fung. ined.*

lumbricalis. 48. St. filiformis lutea. *Batſch el. fung. f.* 172. Lycoperdon lumbricale.

MICROCARPON. *Fungus*, Theca membranacea *Schrader.* (irregulariter dehiſcens) ſeminibus filamentis reticulato-compactis baſi fixis interſitis repleta.

nigrum. 1. Microcarpon. *Schrader fung. ined.*

CRIBRARIA. *Fungus*, Theca membrana duplici inſtructa, externa tenella fugaci interna reticulata ſemina filamentis orba per foramina emittentia.

pallida. 1. CRIBRARIA. *Schrader fung. ined.*

RETICULARIA. *Fungus* ſubrotundus, theca rigida ſeminibus inter fila reticulata diſperſis repleta.

† *ſtipitatæ.*

fragilis. 1. R. obovata fuſca, cortice nitido, ſeminibus nigris, ſtipite breviſſimo. *Dickſ. crypt. Brit.* 1. *p.* 25. *t.* 3. Lycoperdon fragile.

utricularis. 2. R. ſtipite breviſſimo tenuiſſimo, capitulo ovato. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 128. *t.* 417. *f.* 1. Sphærocarpus utricularis.

hemiſphærica. 3. R. ſtipite ſimplici, capitulo hemiſphærico. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 93. *t.* 446. *f.* 1.

ramoſa. 4. R. ſtipite ramoſo, capitulis ſubgloboſis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 89. *t.* 380. *f.* 3.

†† *acaules.*

Lycoperdon. 5. R. facciformis cinerea fuſceſcensve. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 95. *t.* 476. *f.* 2-4.

Lycogala. 6. R. albida, ſeminibus fuſcis. *Bolton fung. t.* 96. *f.* 1. Mucor Lycogala.

Epixylon. 7. R. pulvinata ex cinereo nigricans. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 90. *t.* 472. *f.* 1.

cæſia. 8. R. globoſo-ovata nigro-cæſia ſenſim albicans. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 139. *t.* 470. *f.* 2. Reticularia capſulifera.

cinerea. 9. R. cinereo-cæſia globoſa ſcabra, ſeminibus atris, filis albis. *Batſch el. fung. cont.* 1. *p.* 249. *f.* 169. Lycoperdon cinereum. *An ſatis diſtincta a cæſia?*

complanata. 10. R. cinereo-cæſia depreſſa diffuſa, ſeminibus atris, filis albis. *Batſch el. fung. cont.* 1. *p.* 251. *f.* 170. Lycoperdon complanatum.

ſphæroidalis. 11. R. ſuborbicularis albicans. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 94. *t.* 446. *f.* 2.

angulata. 12. R. ſubdepreſſa angulata alba. *Perſoon fung. ined.* in foliis.

ſinuoſa. 13. R. laminis duabus parallelis flexuoſis. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 94. *t.* 446. *f.* 3.

Uſtilago. 14. R. fuſco-nigricans. *Syſt. nat. Ed.* XII. 1. *p.* 1326. *n.* 4. Chaos Uſtilago. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 90. *t.* 472. *f.* 2. Reticularia ſegetum. *An forte diſtincti generis?*

nigra. 15. R. ſeneſcens nigra, ſeminibus nigris. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 88. *t.* 380. *f.* 2.

alba. 16. R. ovata alba, ſeminibus nigris. *Schranck flor. bav.* 2. *p.* 635. *An ſatis diſtincta a nigra?*

TUBIFERA. *Fungus*, Thecæ (membranæ expanſæ ſuperimpoſitæ) inter ſe connatæ ſeminibus nudiuſculis repletæ.

cylindrica. 1. R. cylindrica ferruginea, apice acuminato primum niveo. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 140. *t.* 470. *f.* 3.

fragiformis. 2. R. cylindrico-clavata primum roſea poſt ferruginea. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 141. *t.* 384.

ferruginoſa. 3. R. glabra veſicularis verſicolor, ſeminibus terreis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 263. *f.* 175. *Jacq. miſc. auſtr.* 2. *p.* 144. *t.* 15. Tubulifera arachnoidea. *Fl. dan. t.* 659 *f.* 2.

ÆCIDIUM. *Fungus*, Theca (membranacea) utrinque glabra ſeminibus nudis non cohærentibus plena.

Perſoon fung. ined.

† *thecæ cortice diſtincto membranaceo.*

† *cæſpitoſa.*

cornutum. 1. Æ. flavum, thecis longiſſimis ſubarcuatis olivaceo-griſeis. *Flor. dan. t.* 838.

rhamni. 2. Æ. thecis cylindricis roſeis, ſeminibus aurantiis. *Perſ.*

cancellatum. 3. Æ. thecis latere fiſſis apice integris. *Suppl. p.* 443. Lycoperdon cancellatum. *Flor. dan. t.* 704.

penicillatum. 4. Æ. flavum, thecis rectis dehiſcentibus. *Flor. dan. t.* 839. *An ſatis diſtinctum a cancellato?*

berberidis. 5. *Æ.* orbiculare ſubconvexum, thecis prominentibus ſeminibusque flavis. *Jacq. coll. auſtr.* 1. *p.* 122. *t.* 4. *f.* 1. Lycoperdon pauciforme.

evonymi. 6. *Æ.* craſſum effuſum, thecis prominentibus ſeminibusque aurantiis. *Perſoon.*

rubellum. 7. *Æ.* rubrum. α) rumicis, thecis congeſtis ſeminibusque albis β) groſſulariæ, thecis ſparſis ſeminibusque pallidis. *Perſoon.*

tuſſilaginis. 8. *Æ.* thecis ſubprominentibus flavis, ſeminibus aurantiis. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon epiphyllum.

†† *thecis ſolitariis.*

pini. 9. *Æ.* oblongo-compreſſum pallidum, ſeminibus aurantiis. *Willden bot. Mag.* 4. *t.* 4. *f.* 12.

euphorbiæ. 10. *Æ.* confertum cylindricum, ore reflexo, ſeminibus aurantiis. *Perſoon.*

anemones. 11. *Æ.* ſparſum ſubgloboſum pallidum, ſeminibus concoloribus. *Perſoon.*

ſcutellatum. 12. *Æ.* ſparſum albidum, ſeminibus fuſcis. *Schranck fl. bav. n.* 1776. Lycoperdon ſcutellatum.

pyrolæ. 13. *Æ.* ſparſum depreſſum luteum, ſeminibus concoloribus. *Perſoon.*

⊢⊢ *cortice diſtincto orbata, ſeminibus ſub epidermide effuſis.*

fuſcum. 14. *Æ.* ſeminibus fuſcis. *Perſoon.*

nigrum. 15. *Æ.* ſubrotundum ſeminibus nigricantibus. *Perſoon.*

flavum. 16. *Æ.* oblongum, ſeminibus flavis. *Perſoon.*

candidum. 17. *Æ.* difforme effuſum, ſeminibus candidis. *Perſoon.*

lineare. 18. *Æ.* lineare, ſeminibus fuſco-atris. *Schranck fl. bav. n.* 1852. Lycoperdon lineare.

SPHÆRIA. *Fungus*, Thecæ ſubrotundis ſeminibus nudis gelatinoſis repletæ.

* *cauleſcentes, pileo multicapſulari.*

⊢ *molles.*

agariciformis. 1. Sph. ſtipite flavo tereti, pileo ovato caſtaneo, radice tuberoſa volvata intus nigra. *Bolton fung. p.* 130. *t.* 130. *Fl. dan. t.* 570.

entomorhiza. 2. Sph. pileo ſubrotundo fuſco, ſtipite longo attenuato. *Dickſ. cryptog. Brit.* 1. *p.* 22. *t.* 3. *f.* 3.

militaris. 3. Sph. pileo clavato elongato rubro, ſtipite læviuſculo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Clavaria militaris. *Flor. dan. t.* 637. *f.* 1. *Bolton fung. t.* 128.

ophiogloſſoides. 4. Sph. pileo clavato atro-viridi, ſtipite longiuſculo baſi intusque flavo. *Bull. herb. Franc. t.* 440. *f.* 2.

† † *ſuberoſæ.*

truncata. 5. Sph. nivea plana, thecis nigricantibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Peziza punctata. *Bolton fung. t.* 127. *f.* 2.

Carcharias. 6. Sph. pileo rugoſo ſubramoſo, thecis apicem ambientibus. *Weig. obſ. bot. t.* 3. *f.* 6.

digitata. 7. Sph. nigra ramoſa, pileo tereti acuminato. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Clavaria digitata. *Bull. herb. Franc. t.* 220.

bulboſa. 8. Sph. pileo ramoſo ſubtereti, radice bulboſa. *Perſoon fung. ined. ic.*

Hypoxylon. 9. Sph. pileo ramoſo compreſſo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 725. Clavaria Hypoxylon. *Bull. herb. Franc. t.* 180. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *t.* 3. *f.* 1.

flexuoſa. 10. Sph. ſimpliciſſima ſubulata, pileo flexuoſo. *Schranck flor. bavar.* 2. *t.* 1844.

* *compoſitæ.*

caſtorea. 11. Sph. aggregato-ſparſa æqualis nigra monoſticha ſubgloboſa, volva fuſca fugaci, ſphærulis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 28. *t.* 12. *f.* 100.

æruginoſa. 12. Sph. ſparſa oblonga convexa ſparſa monoſticha, ſubſtantia ſphærulisque atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 27. *t.* 12. *f.* 99.

atro-purpurea. 13. Sph. ſparſa atropurpurea monoſticha rotundato-plana, ſphærulis ovalibus papillatis connatis nigris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 32. *t.* 13. *f.* 105.

decidua. 14. Sph. aggregata oblongo-convexa monoſticha, ſubſtantia flava, globulis globoſo-papillatis rubris prominentibus deciduis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 31. *t.* 13. *f.* 104.

ribis. 15. Sph. aggregata convexo-oblonga purpuraſcens monoſticha, globulis ovalibus papillatis prominulis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 31. *t.* 12. *f.* 103.

16. Sph.

lenta. 16. Sph. aggregata lentiformis lenta pulla monoſticha, glebulis globoſis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 30. *t.* 12. *f.* 102.

natans. 17. Sph. aggregata atra ſubrotunda convexo-plana monoſticha, cortice ſuperne colliculoſo ſubſtantiam viſcidulam indureſcentem includente, glebulis aggregatis albis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 27. *t.* 12. *f.* 98.

Cucurbitula. 18. Sph. aggregata convexa plana monoſticha, glebulis ovalibus contabeſcendo concavis inſitis rubris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 38. *t.* 14 *f.* 110.

ſanguinaria. 19. Sph. limitata glauca monoſticha rotundato-polymorpha cruſtacea, glebulis globoſis obſolete papillatis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 40. *t.* 14. *f.* 112.

inſitiva. 20. Sph. corticalis plana lineari-acuminata candida monoſticha, velo cum ſubſtantia connato, glebulis papillatis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 36. *t.* 13. *f.* 108.

Macula. 21. Sph. planiſſima atra monoſticha polymorpha, glebulis globoſo-papillatis, ſingulis velo fugaci tectis. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 33. *t.* 13. *f.* 106.

Placenta. 22. Sph. rotundo-complanata tuberculoſa monoſticha, glebulis globoſo-acuminatis connatis atris. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 26. *t.* 12. *f.* 97.

Talus. 23. Sph. nivea monoſticha tuberculoſa, tuberculis truncatis polymorphis, glebulis globoſis atris. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 23. *t.* 11. *f.* 80. 92. 95.

radians. 24. Sph. aggregato-ſparſa ſubtuberculoſa ſubgloboſa atra ſubmonoſticha, volva pulverulenta fulva, glebulis atris. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 29. *t.* 12. *f.* 101.

tunicata. 25. Sph. ſubcauleſcens fuſca monoſticha ſubovalis tuberoſo-bicorticata ſtilo-cirrifera, tunicis glebulisque biformibus connatis, velis particularibus confluentibus fugacibusque. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 59. *t.* 17. *f.* 130.

gelatinoſa. 26. Sph. pulvinato-gelatinoſa lutea monoſticha globifera, globulis ſpermaticis ſtramineis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 48. *t.* 16. *f.* 123. 124.

fragifera. 27. Sph. plana nigra monoſticha ſtilifera, ſtilis ſpermaticis e ſingulis capſulis ſucceſſive protruſis breviſſimis coadunatis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 55. *t.* 17. *f.* 132.

deuſta. 28. Sph. nigra polymorpha convexo-bicorticata monoſticha ſtilifera, glebulis biformibus, ſtilis ſpermaticis

obſolete nodoſis ſubuncinatis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 55. *t.* 17. *f.* 129. Sphæria verſipellis.

Hyſtrix, 29. Sph. nigra ovalis convexo-plana aggregata monoſticha ſtilifera, ſtilis ſpermaticis proceris ſuperne ſubincraſſatis cum glebulis connatis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 53. *t.* 16. *f.* 127.

Ceratoſpermum. 30. Sph. nigra aggregata ſubrotunda pulvinato-convexa ſtilifera, glebulis bifariis, ſtilis ſpermaticis ſcabro-rudibus cum glebulis connatis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 53. *t.* 17. *f.* 131. *Bull. herb. Franc. t.* 492. *f.* 1.

ſuccenturiata, 31. Sph. oblongo-pulvinata ſparſa bicorticata atra, glebulis ſuccenturiatis ſimplicibusque. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 37. *t.* 14. *f.* 109.

convergens. 32. Sph. aggregata roſacea, glebulis atris excipuliformibus liberis convergentibus. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 39. *t.* 14. *f.* 111.

ceſpitoſa. 33. Sph. aggregata globoſo-ceſpitoſa atra lamellata, lamellis radiatis ſubtus connatis apice glebuliferis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 41. *t.* 14. *f.* 113.

fiſſivela. 34. Sph. globoſa atra, maſſa glutinoſo-farinacea rimas agente capſularum congeriem obtegente. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 18. *t.* 10. *f.* 86.

carpini. 35. Sph. atra, ſpiculis minutiſſimis terminata. *Batſch el. fung. p.* 274. *t.* 30. *f.* 187. Sphæria ſpiculoſa. β) *Batſch el. fung. cont.* 2. *t.* 41 *f.* 231. Sphæria coryli.

bullata. 36. Sph. convexa nigra intus alba. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 5. *t.* 2. *f.* 1.

Stigma. 37. Sph. corticalis nigra punctata. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 7. *t.* 2. *f.* 2.

pulvinata. 38. Sph. atra convexo-tuberculoſa. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 3. *An diſtincta vere ſpecies?*

vireſcens. 39. Sph. convexo-plana nigra intus vireſcens. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 4.

diſciformis. 40. Sph. ſubrotunda plana punctata. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 15. *t.* 4. *f.* 1.

papillata. 41. Sph. papillis minutiſſimis atris apice pertuſis cruſtæ fuſcæ vel nigricanti innatis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 19. *t.* 4. *f.* 3. *An hujus tribus diſtinctæ ſpecies?*

fragiformis. 42. Sph. convexa obſcure rubra. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 20. *t.* 5. *f.* 1.

coronata. 43. Sph. oſtiolis epidermide perforata ſpinuloſis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 24. *t.* 5. *f.* 4. 5.

puſtulata. 44. Sph. lentiformis perforata. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 26. *t.* 5. *f.* 3.

cirrata. 45. Sph. atra, oſtiolis cirrhoſis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 27. *t.* 6. *f.* 1.

nivea. 46. Sph. tuberculoſa, tuberculis truncatis niveis. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 28. *t.* 6. *f.* 3.

granuloſa. 47. Sph. cinereo-nigricans tenax, loculis prominulis numeroſiſſimis in congeriem cruſtaceam connatis. *Bull. herb. Franc. t.* 482. *f.* 2.

melanogramma. 48. Sph. fuliginoſo-nigricans irregulariter bullata, loculis hiantibus. *Bull. herb. Franc. t.* 492. *f.* 1.

globularis. 49. Sph. aggregata globoſa clauſa nigra opaca indurata. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 271. *f.* 180.

acinoſa. 50. Sph. aggregata globoſa clauſa nigro-fuſca verrucoſa ſparſim piloſa. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 269. *f.* 179. *An hujus tribus?*

byſſina. 51. Sph. aggregata fulva, cortice floccoſo niveo. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 84.

Bombarda. 52. Sph. aggregata oblonga nigro-fuſca, glebulis albis. *Batſch el. fung. cent.* 1. *p.* 271. *f.* 181. *An diſtincta hujus generis & tribue ſpecies?*

cancellata. 53. Sph. ſubcompoſita atra aggregato-ſparſa rotundo-ovalis convexa monoſticha, velo prominente, glebulis connatis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 34. *t.* 13. *f.* 107.

*** *ſimplices.*

tubæformis. 54. Sph. aggregata atra globoſa collabeſcendo cupularis ſtilifera, ſtilo ſpermatico connato craſſiuſculo bicolori, *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 51. *t.* 16. *f.* 128.

Lingua. 55. Sph. aggregata atra ſubovalis pulvinata collabeſcendo concavo-rugoſa ſtilifera, ſtilo ſpermatico breviuſculo decumbente. *Tode fung. meckl.* 2. *p.* 51. *t.* 16. *f.* 126.

Gnomon. 56. Sph. aggregata nigra globoſa collabeſcendo concava ſtilifera, ſtilo ſpermatico procero ſubrecto. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 50. *t.* 16. *f.* 125.

Acroſper-mum. 57. Sph. conferto-aggregata pulla globifera cylindrico-ventricoſa collabeſcendo ſtrigoſa. *Tode fung. mekl. p.* 47. *t.* 15. *f.* 119.

Peziza. 58. Sph. aggregata hydrophora rubens globoſa collabeſcendo concava. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 46. *t.* 15. *f.* 122.

penetrans. 59. Sph. globoſo-acuminata collabeſcendo excavata aggregata nigra globifera, globo ſpermatico nigro. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 45. *t.* 9. *f.* 74. & *t.* 15. *f.* 121.

dubia. 60. Sph. elongato-attenuata aggregata griſea globifera, guttula ſpermatica diaphana albo-luteſcente. *Tode fung. meckl.* 2. *p.* 45. *t.* 15. *f.* 118.

ſubulata. 61. Sph. ſubulato-granulata aggregata fuſca globifera, globo ſpermatico flavo atreſcente. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 44. *t.* 15. *f.* 117.

conica. 62. Sph. conico-tomentoſa aggregata globifera, globo ſpermatico flavo atreſcente. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 43. *t.* 15. *f.* 116.

parabolica. 63. Sph. globifera parabolica lævis aggregata nigra, globo ſpermatico livido. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 43. *t.* 15. *f.* 115.

cylindrica. 64. Sph. globifera cylindrica ſparſa nigra, globo ſpermatico candido. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 42. *t.* 15. *f.* 114.

moriformis. 65. Sph. aggregato-ſparſa atra ovalis tuberculoſa. *Tode fung. meklenb.* 2. *p.* 22. *t.* 11. *f.* 90. 91.

epiſphæria. 66. Sph. aggregato-ſparſa purpurea globoſa, collabeſcendo complanata, papilla convexo-oblonga. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 21. *t.* 11. *f.* 89.

complanata. 67. Sph. aggregata mammiformis pulla collabeſcendo complanata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 21. *t.* 11. *f.* 88.

artocreas. 68. Sph. ſparſa atra mammiformis contabeſcendo convexo-complanata, plica annulari. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 20. *t.* 9. *f.* 73.

confluens. 69. Sph. confluens atra papillata, volva fugaci. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 19. *t.* 10. *f.* 87.

inquinans. 70. Sph. aggregata obvelato-papillata atra immerſa, ſeminum gichis ſetis cylindricis. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 17. *t.* 10. *f.* 85.

gregaria. 71. Sph. irregulariter aggregata miniata, cruſta alba tenera. *Weig. obſ. bot. p.* 43. *t.* 2. *f.* 10.

epiphylla. 72. Sph. cruſtacea alba, ſphærulis nigris cortice atro. *Wigg. prim. fl. holſ. p.* 84.

byſſacea. 73. Sph. ſolitaria minima atra, cruſta nivea pulverulenta. *Weigel obſ. bot. p.* 42. *t.* 2. *f.* 9.

hemiſphærica. 74. Sph. aggregata hemiſphærica nigra intus alba. *Schr. fl. bav.* 2. *p.* 66.

muſcoſa. 75. Sph. hemiſphærica ſpadicea rugoſa. *Weig.obſ.bot.p.*42.

mucida. 76. Sph. conferto-aggregata globoſa tomentoſa, cortice papillaque atris, tomento mucido. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 15. *t.* 9. *f.* 75. *t.* 10. *f.* 82.

rugoſa. 77. Sph. aggregata globoſo-rugoſa nigerrima intus nigra. *Weig. obſ. bot. p.* 43. *t.* 2. *f.* 12.

ſphincterica. 78. Sph. pyriformis nigra villoſa, apice excavato plicato. *Bull. herb. Franc. t.* 444. *f.* 1.

hiſpida. 79. Sph. ſparſa pyriformis hiſpida atra. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 17. *t.* 10. *f.* 84.

calva. 80. Sph. ſparſa atra papillata, hemiſphærio ſuperiori glabro inferiori hiſpido. *Tode fung. meckl.* 2. *p.* 16. *t.* 10. *f.* 83.

mollis. 81. Sph. aggregata atra nitidiuſcula ſubpapillata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 8. *t.* 9. *f.* 66.

triſtis. 82. Sph. aggregata atra immerſa minima granulata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 9. *t.* 9. *f.* 67

cinnavarina. 83. Sph. ſparſo-aggregata rubra ovalis granulata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 9. *t.* 9. *f.* 68.

byſſiſeda. 84. Sph. ſparſa mammiformis bicorticata, cruſtæ filamentoſæ innaſcens. *Tode fung. mekl.* 2. *p.*10. *t.* 9. *f.* 69. 70.

mobilis. 85. Sph. conferta globoſa mobilis, papilla decidua. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 11. *t.* 9. *f.* 71.

acuta. 86. Sph. ſolitaria minima atra. *Hoffm. veget. crypt.* 1. *p.* 22. 23. *t.* 5. *f.* 2.

porphyrogona. 87. Sph. aggregata phialæformis atra, cruſtæ tenuiſſimæ violaceæ innata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 12. *t.* 9. *f.* 72.

macroſtoma. 88. Sph. aggregato-ſparſa globoſa, orificio largo labiato. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 12. 13. *t.* 9. *f.* 76-78.

roſtrata. 89. Sph. ſparſo-aggregata globoſa longiſſime roſtrata. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 14. *t.* 10. *f.* 79. 80.

comata. 90. Sph. aggregata globoſa vertice capillata, capillis faſtigiatis conniventibus. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 15. *t.* 10. *f.* 81.

ciliaris. 91. Sph. gregaria ex albo nigricans, loculis cirrhiferis. *Bull. herb. Franc. t.* 488. *f.* 1.

phœnicea. 92. Sph. minima ſparſa globoſo-elliptica rubra glabra. *Bull. herb. Franc. t.* 487. *f.* 3. *Weigel obſ. bot. t.* 2. *f.* 10. Sph. mori.

miliacea. 93. Sph. unilocularis gregaria ſubglobofo-turbinata ex albo nigricans, ſuperficie granuloſa. *Bull. herb. Fr. t.* 444. *f.* 3.

HYSTERIUM. *Fungus* ſeſſilis cavus, ſupra rima transverſa, ſeminibus globoſis ecaudatis diſcum obducentibus.

candidum. 1. H. aggregatum ſubforme papyraceum. *Tode fung. mekl. fcl.* 2. *p.* 4. *t.* 8. *f.* 62.

cæruleum. 2. H. ſparſum oblongo-ovale membranaceum cruſtaceum. *Tode fung. mekl. fel* 2. *p.* 4. *t.* 8. *f* 60.

VERMICULARIA. *Capſula* globoſa ſeſſilis, corporibus vermiformibus liberis ſeminiferis repleta.

Pſeudoſphæria. 1. V. aggregata, capſula granulata nigra, filamentis gemmiferis nudis albis. *Tode fung. mekl. fcl.* 1. *p.* 31. *t.* 6. *f.* 46.

pubeſcens. 2. V. ſparſa, capſula pubeſcente bicolore, filamentis gemmiferis nudis canis. *Tode fung. mekl. fcl.* 1. *p.* 31. *t.* 6. *f.* 47.

hiſpida. 3. V. pulvinata ſparſa, capſula nigra hiſpida, volva verticis fugaci, filamentis gemmiferis demerſis albidis. *Tode fung. mekl. fcl.* 1. *p.* 32. *t.* 6. *f.* 48.

PYRENIUM. *Fungus* globoſus ſeſſilis integerrimus, ſemina nuda conglobata nuclei inſtar includens.

lignorum. 1. P. ſparſum candidum, cortice bombacino, nucleo æruginoſo fatiſcente. *Tode fung. mekl. fcl. p.* 33. *t.* 3. *f.* 29.

aureum. 2. P. ſparſum aureum, cortice tomentoſo, nucleo ſubaurantio fatiſcente. *Tode fung. mekl. fcl.* 1. *p.* 33.

metallorum. 3. P. compreſſum aſcendens imbricatum hirſutum, nucleo duriori. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 34. *t.* 6. *f.* 49.

terreſtre. 4. P. aggregatum, pulpa gelatinoſa, nucleo cereo ſubrecedente. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 35. *t.* 6. *f.* 50.

TUBER. *Fungus* ſubgloboſus carnoſus, carne intus venis diſtincta.

guloſorum. 1. T. globoſum ſolidum muricatum radice deſtitutum. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 726. Lycoperdon Tuber. *Mich. nov. pl. gen. t.* 102. *β*) *Mich. nov. pl. gen. t.* 164. *γ*) *Bull. herb. Franc. t.* 356.

oleraceum. 2. T. ſubrotundum nigrum congeſtum ſeſſile rugoſum. *Weber ſuppl. flor. holſ. p.* 14.

paraſiticum. 3. T. rubrum elongatum ſquamoſum. *Bull. herb. Franc. t.* 456.

album. 4. T. difforme ſubrotundum convexo-gibboſum rugoſum ſolidum albidum. *Bull. herb. Franc. t.* 404.

SCLEROTIUM. *Fungus* ſimpliciſſimus globoſo-oblongus tenax duriuſculus centro demum ſubhians, cortice inſeparabili nunquam ſupra dehiſcente.

* *ovalia.*

purpureum. 1. Scl. perpendiculare glaberrimum minimum ſparſum. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 2. *Bolt. fung.* 3. *p.* 119. *t.* 119. *f.* 1.

immerſum. 2. Scl. decumbens glabrum æquale. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 3. 4.

Mucor. 3. Scl. decumbens aggregatum. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 7.

** *globoſa.*

Semen. 4. Scl. nigreſcens corrugandum ſparſum. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 4. *t.* 1. *f.* 6.

radicatum. 5. Scl. ſparſum radicatum, baſi producta. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 8.

villoſum. 6. Scl. villoſum aggregatum. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 10. 11.

ſubterraneum. 7. Scl. globoſo-difforme aggregatum ſubterraneum. *Tode fung mekl. ſel.* 1. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 5.

*** *pyriforme.*

complanatum. 8. Scl. complanatum, ſtipite breviſſimo. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 5. *t.* 1. *f.* 9.

TUBERCULARIA. *Fungus* gelatinoſus pileatus, pileo tuberculato-papilloſo, ſtipiti craſſiſſimo farcto arcte appreſſo, in ſuperficie ſuperiori ſemina portante.

* *ſparſæ.*

vulgaris. 1. T. ſtipite ventricoſo globoſo, pileo convexo rugoſo, margine ſubrepando. *Bulliard herb. Franc. t.* 284. *Bolt. fung.* III. *t.* 127. *f.* 1.

volvata. 2. T. ſtipite conico volvato, volva cyathiformi, pileo rugoſo convexo, margine appreſſo repando. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 20. *t.* 3. *f.* 33.

ſulcata. 3. T. ſulcata integra, ſtipite crucibuliformi cum pileo depreſſo ſubtus connato. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 21. *t.* 4. *f.* 34.

nigricans. 4. T. primum coccinea, demum nigra. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 217. *t.* 455. *f.* 1.

** *faſciculata.*

faſciculata. 5. T. ſtipite tereti pileo complanato grenulato. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 20. *t.* 4. *f.* 32.

SPERMODERMIA. *Fungus* ſimpliciſſimus globoſus ſeſſilis ſpongioſus, ſeminibus confertis urticis vicem ſubeuntibus.

clandeſtina. 1. SPERMODERMIA. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 2. *t.* 1 *f.* 1.

ACROSPERMUM. *Fungus* ſimpliciſſimus ſuberectus in apice exterius ſemina emittens.

unguinoſum. 1. A. ceſpitoſum perpendiculare unctuoſum, (adultum) purpureum, apice tumidum. *Tode Schr. berl. Naturf.* 4. *p.* 263. *t.* 12.

compreſſum. 2. A. perpendiculare ovato elongatum compreſſum rigidiſſimum. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 8. *t.* 2. *f.* 13.

pyramidale. 3. A. perpendiculare ovato-acuminatum duriſſimum ſolitarium. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 9. *t.* 2. *f.* 14.

arachnoides. 4. A. gelatinoſum fibroſum ſubtus tela araneoſa veſtitum, capitulo aurantio demum atro. *Jacq. miſc. auſtr.* 1. *p.* 144. *t.* 15. *An hujus generis?*

ſiccum. 6. A. lacteum coriaceum intus cavum. *Schranck flor. bav.* 7 *p.* 676. *n.* 1634.

STILBUM. *Fungus* gelatinoſus ſtipitatus aggregatus, capitulo diaphano nitente ſolido perſiſtente extrinſecus ſemina portante.

* *capitulo ſphærico.*

vulgare. 1. St. ſtipite cylindrico craſſiuſculo. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 16.

bulboſum. 2. St. ſtipite attenuato bulboſo. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 10. *t.* 2. *f.* 7.

** *capitulo ovato.*

rubicundum. 3. St. capitulo compreſſo, ſtipite attenuato. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 18.

minimum. 4. St. capitulo compreſſo, ſtipite capillari. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 11. *t.* 2. *f.* 19.

pubens. 5. St. ſtipite ſubtus incraſſato pubente. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 12. *t.* 3. *f.* 21.

*** *capitulo turbinato.*

turbinatum. 6. St. ſtipite cylindrico ad capitulum contracto. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 12. *t.* 2. *f.* 20.

ASCOPHORA. *Fungus* erectus ſtipitatus, ſtipite ſetaceo, capitulo globoſo oblongo inflato opaco elaſtico extrinſecus ſemina portante.

* *ſparſæ.*

Mucedo. 1. A. aggregata, capitulo ſphærico ad ſtipitem longum rumpendo. *Wilden bot. Mag.* 4. *p.* 18. *f.* 17. Mucor roridus.

fragilis. 2. A. conferta, capitulo ſphærico in medio diſſiliente, ſtipite breviuſculo. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 14. *t.* 3. *f.* 23.

Stilbum. 3. A. capitulo ovato nitido, ſtipite breviſſimo. *Tode fung. mekl. ſel* 1. *p.* 14. *t.* 3. *f.* 24.

ovalis. 4. A. capitulo ovali demum corrugando & multifariam dehiſcente, ſtipite longiuſculo. *Tode Schr. berl. Naturf.* 3. *p.* 247. *t.* 4. *f.* 4-6. Aſcidium ovatum.

cylindrica. 5. A. gregaria, capitulo cylindrico corrugando, ſtipite breviuſculo. *Tode Schr. berl. Naturf.* 3. *p.* 248. *t.* 4. *f.* 7-9.

** *in receptaculo communi convexo aggregatæ.*

limbiflora. 6. A. receptaculo communi demum depreſſo, capitulis globoſis nutantibus deciduis, ſtipitibus capillaribus laxis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 15. *t.* 3. *f.* 25.

diſciflora. 7. A. capitulis ovato-elongatis deciduis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 16. *t.* 3. *f.* 26. 27.

articulata. 8. A. nigro-fuſceſcens, capitulis elongatis articulatis apice acuminatis. *Bull. herb. Fr.* 1. *p.* 110. *t.* 504. *f.* 14.

CHORDOSTYLUM. *Fungus* tenaciſſimus ſtipitatus, ſtipite longiſſimo tenaciſſimo ſubramoſo, capitulo globoſo ſubdeciduo ſemina includente.

* *erecta.*

Clavaria. 1. Ch. ſimplex, ſtipite capillari glabro flexuoſo, capitulo pyriformi coriaceo. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 40. *t.* 7. *f.* 55.

capillare. 2. Ch. ſparſum, ſtipite capillari glabro indiviſo, capitulo ſphærico fatiſcente. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 37. *t.* 6. *f.* 52.

byſſoides. 3. Ch. aggregatum, ſtipite capillari debili ramoſo. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 38. *t.* 7. *f.* 53.

** *repens.*

hiſpidulum. 4. Ch. hiſpidulum, ſurculo capillari decumbente ramoſo ſubradicante, capitulis obovatis immerſis. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 39. *t.* 7. *f.* 54.

filiforme. 5. Ch. luteum pubeſcens, ſtipite gracillimo, apicibus albis piloſis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 205. *t.* 448. *f.* 1.

penicillatum. 6. Ch. croceum glabrum, ſtipite tenui, apicibus multifidis. *Bull. herb. Franc.* 1. *p.* 207. *t.* 448. *f.* 3. *An hujus generis?*

RHIZOMORPHA. *Fungus* ramoſiſſimus repens corneus, ſeminibus latentibus.

fragilis. 1. Rh. nigra glabra compreſſa reticulata intus ſolida alba. *Flor. dan. t.* 713.

cinchonae. 2. Rh. fuſca pubeſcens reticulata compreſſa intus cava nitidiſſima. *Willden. bot. Ann.* 1. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 2.

capillaris. 3. Rh. crocea ſubcompreſſa capillaris pubeſcens. *Willd. bot. Ann.* 1. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 3.

MESENTERICA. *Fungus* expanſus gelatinoſus venoſus in margine gemmas ferens.

tremelloides. 1. MESENTERICA. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 7. *t.* 2. *f.* 12.

MUCOR. *Fungus* fugax, capitula rorida primo diaphana demum opaca ſtipitibus ſimplicibus ramoſisve affixa.

ovalis. 1. M. ceſpitoſus niveus, capitulo ovali. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2149.

minimus. 2. M. minimus albus, capitulo nutante. *Mich. n. pl. gen. t.* 95. *f.* 1.

paniceus. 3. M. capitulis globoſis albis ſiccis. *Mich. n. pl. gen. t.* 96. *f.* 6.

albus. 4. M. albus, capitulo globoſo. *Bull. herb. Fr. t.* 407. *f.* 3.

flavus. 5. M. luteus capitulo globoſo. *Hall.hiſt.ſtirp.Helv.n.*2151.

tremelloides. 6. M. aggregatus gelatinoſus lentiformis confluens. *Schr. fl. bav.* 2. *p.* 637. *n.* 1793.

plumoſus. 7. M. albus ramoſus lanam referens. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 638. *n.* 1795.

araneoſus. 8. M. canus telam aranearum referens. *Schranch fl. bav.* 2. *p.* 638. *n.* 1796.

purpureus. 9. M. purpureus guttam æmulans. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 639. *n.* 1799.

globoſus. 10. M. gregarius ochroleucus. *Schranck fl. bav.* 2. *p.* 638. *n.* 1798.

infuſorius. 11. M. gelatinoſus, filamentis ad latera globuliferis. *Spallanzani phyſ. Abh. t.* 1. *f.* 11. *An hujus generis?*

Mucedo. 12. M. ſtipitatus, capſula globoſa. *Mich. nov. pl. gen. t.* 95. *f.* 2. 4.

Eryſiphe. 13. M. albus, capitulis fuſcis ſeſſilibus.

virens. 14. M. thalaſſinus, capitulo globoſo. *Batſch el. fung. p.* 157. *n.* 2. *An hujus generis?*

HYDROPHORA. *Fungus* globoſus aqueus, ſtipite capillari ſubrecto.

minima. 1. H. capitulo excolore, ſtipite luteſcente. *Tode fung. mekl. ſel.* 2. *p.* 5. *t.* 8. *f.* 68.

tenella. 2. H. capitulo excolore, ſtipite griſeo. *Tode fung. mekl. ſel.* 2. *p.* 6. *n.* 2.

ſtercorea. 3. H. capitulo ſtipiteque ſordide luteſcentibus. *Tode fung. mekl.* 2. *p.* 6. *n.* 3.

PERICONIA. *Fungus* globoſus, ſeminibus ſeſſilibus deciduis capitulum & ſtipitem ubique obducentibus.

lichenoides. 1. PERICONIA. *Tode fung. mekl. ſel.* 2. *p.* 2. *t.* 8. *f.* 61.

GRANULARIA. *Fungus* ſubrotundus granis mucilagini immerſis farctus.

piſiformis. 1. GRANULARIA. *Willden. bot. Ann.* 1. *p.* 6. *t.* 1. *f.* 1.

MEDUSULA. *Fungus* ſolitarius globoſus ſtipitatus, confertus, ſeminibus externis filiformibus flexilibus colliqueſcentibus.

labyrinthica. 1. MEDUSULA. *Tode fung. mekl. ſel.* 1. *p.* 17. *t.* 3. *f.* 28.

MONILIA. Fila moniliformia in capitulum congregata.

* *ſtipitatæ.*

cruſtacea. 1. M. ſpicis digitatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 727. Mucor cruſtaceus. *Flor. dan. t.* 897. *f.* 1.

ceſpitoſa. 2. M. ſtipite ramoſo, ſpicis ternatis. *Syſt. nat.* XII. 3. *p.* 727. Mucor ceſpitoſus. *Mich. nov. pl. gen. t.* 91. *f.* 3. *β*) *Mich. nov. pl. gen. t.* 91. *f.* 4.

Aſpergillus. 3. M. ſtipite ſetaceo dichotomo procero, capitulis aqueis. *Scop. flor. carn. n.* 1642.

aurea. 4. M. ceſpitoſa flava, capitulo ſubrotundo. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2154.

alba. 5. M. alba, ſtipite articulato. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2155.

purpurea. 6. M. cruſta villoſa alba, ſtipitibus brevibus capitulisque rubris. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2153.

glauca. 7. M. cana villoſa, ſtipite ſetaceo brevi, capitulo globoſo. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 727. Mucor glaucus. *Bull. herb. Fr. t.* 504. *f.* 10.

** *ſeſſiles.*

ochroleuca. 8. M. globoſa ochroleuca villis radiantibus farcta. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2152.

leproſa. 9. M. ſetacea capitulis radicalibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 727. Mucor leproſus.

MUCILAGO. *Fungus*, fila ſimpliciſſima fugacia.

plumoſa. 1. M. nivea plumoſa. *Hall. ſtirp. Helv. n.* 2130.

ceſpitoſa. 2. M. plumoſa lutea. *Wigg. prim. flor. holſ. p.* 112.

cinerea. 3. M. cinerea, filis ceſpitoſis ramoſis ſimplicibusque. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2131.

miniata. 4. M. villoſa ruberrima. *Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n.* 2132.

INDEX
TOMI II^di
DUPLEX.

Digitized by Google

INDEX I.

CONTINENS NOMINA GENERUM, CUM SPECIEBUS SUBJECTIS OMNIBUS.

Abroma 1149, 1151
auguſtum 1151
Wheleri ib.
Abronia 996, 1008
californica 1008
Abrus 1075, 1076, 1086
precatorius 1086
Acæna 218, 278
elongata 278
Acalypha 998, 1032-1034.
alopecuroides 1033
anguſtifolia ib.
auſtralis 1032
betulifolia 1034
caroliniana 1033
ciliata 1032
corenſis 1033
decidua 1032
elliptica 1033
fruticoſa 1032
hernandifolia 1033
indica 1032
lævigata 1033
reptans ib.
ſcabroſa ib.
ſpicata 1032
Acalypha
ſupera 1033
tomentoſa ib.
villoſa 1032
virgata 1033
virginica 1032
Acanthus 887, 964, 965
arboreus 964
capenſis 965
carduifolius 964
Dioſcoridis 965
edulis 964
furcatus 965
ilicifolius ib.
integrifolius ib.
mollis 964
procumbens 965
ſpinoſus 964
Acaroa 1076, 1085
violacea 1085
Acer 598, 615-617
campeſtre 616
carolinianum 617
creticum 616
diſſectum ib.
japonicum ib.
laciniatum ib.
monſpeſſulanum ib.
Acer
montanum 618
Negundo ib.
palmatum ib.
penſilvanicum ib.
pictum ib.
Platanoides ib.
Pſeudoplatanus ib.
rubrum ib.
ſaccharinum ib.
ſempervirens 615
ſeptemlobum 616
tataricum ib.
trifidum ib.
Achillea 1165, 1252-1254
abrotanifolia 1254
ægyptiaca 1253
Ageratum 1252
alpina ib.
atrata 1254
capitata 1253
Cerbarato 1252
Clavennæ 1253
coronopifolia ib.
cretica ib.
criſtata 1253
falcata ib.
Halleri 1253
impatiens ib.

Adanſonia 1000, 1038
digitata 1038
Adelia 999, 1036
Acidoton 1036
Bernardia ib.
Ricinella ib.
Adenanthera 656, 678
falcata 678
pavonina ib.
ſcandens ib.
Adenia 523, 565
venenata 565
Adiantum 1283, 1314, 1317
aculeatum 1317
Æthiopicum ib.
borbonium ib.
caffrorum 1316
Capillus Veneris 1316
caudatum 1315
chryanum 1316
clavatum 1317
criſtatum 1316
cuneatum 1315
decurrens ib.
deltoideum ib.
denticulatum 1316
flabellulatum ib.
fragile 1317
fragrans 1316
furcatum ib.
fuſcum 1315
gujanenſe 1316
haſtatum 1315
hexagonum 1317
Lancea 1315
macrophyllum ib.
microphyllum 1317
pedatum 1315
philippenſe ib.
Adiantum
pteroides 1317
pulverulentum 1316
pumilum 1315
radiatum ib.
reniforme 1314
repens 1315
ſagittatum ib.
ſerratum 1316
ſerrulatum 1315
ſtriatum 1317
ſtrictum 1316
tenellum 1317
tenerum ib.
trapeziforme ib.
trifoliatum 1316
trilobum 1315
truncatum 1316
villoſum ib.
Adonis 783, 876
æſtivalis 876
apennina ib.
autumnalis ib.
capenſis ib.
flammea ib.
miniata ib.
veſicatoria ib.
vernalis ib.
Adoxa 603, 643
moſchatellina 643
Æcidium 1472 *ſq.*
anemones 1473
berberidis ib.
cancellatum 1472
candidum 1473
cornutum 1472
euonymi 1473
euphorbiæ ib.
flavum ib.
fuſcum ib.
lineare ib.
nigrum ib.
penicillatum 1472
Æcidium
pini 1473
pyrolæ ib.
rhamni 1472
rubellum 1473
ſcutellatum ib.
tuſſilaginis ib.
Ægilops 87, 178
aromatica 178
caudata ib.
ovata ib.
ſaccharina ib.
ſquarroſa ib.
triuncialis ib.
ÆGIPHILA 211, 259
arboreſcens 259
elata ib.
fœtida ib.
lævis ib.
martinicenſis ib.
trifida ib.
villoſa ib.
Ægopodium 310, 493
Podagraria 493
Ægopricon 4, 18
betulinum 18
Ærva 998, 1026
ægyptiaca 1026
Æſchynomene 1077, 1120, 1121.
americana 1120
arborea ib.
aſpera ib.
Burmanni 1121
cannabina 1120
coccinea ib.
grandiflora ib.
herbacea 112
indica ib.
pumila ib.

Æſchynomene
ſenſitiva 1120
Sesban 1121

Æſculus 593, 595
Hippaucaſtanum 595
lutea ib.
parva ib.
pavia ib.

Æthuſa 309, 486
Bunius 486
Cynapium ib.
fatua ib.
Meum ib.

Afzelia 889, 927
caſſioides 927

Agaricus 1285, 1397-1429
abietis 1420
abbreviatus 1417
acerrimus 1412
acicularis 1425
acris 1413
acuminatus 1426
adhærens 1403
aduſtus 1422
aggregatus 1411
alabaſtrinus 1410
alliaceus 1420
alliatus ib.
alterabilis 1422
alutaceus 1410
amaricans 1416
amarus 1413
androſaceus 1423
angulatus 1421
applicatus 1429
aqueus 1427
araneoſus 1402
arcuatus 1400
ardeſiacus 1415
armeniacus 1402
atromentarius 1428
atro-cyaneus 1422
atro-rufus 1421
atro-ſquamoſus 1419
atro-tomentoſus 1410
auratus 1416
auricomus 1414
aurivenius 1418
badius 1398
Balanus 1427
Beryllus 1416
bicolor 1423
buccinalis 1411
bulboſus 1399
Bulliardi 1413
bullularis 1418
cæruleſcens 1404
cæſareus 1397
caliciformis 1410
Campanella 1421
campanulatus 1428
campeſtris 1399
candicans 1414
candido-bulboſus 1418
candidus 1423
cano-brunneus 1418
carbonarius 1426
caryophylleus 1413
caſtaneus 1414
ceraceus 1403
Cereolus 1413
cereus 1417
cervinus 1410
ceſpitoſus 1429
Chryſodon 1422
ciliaris 1426
cimicarius 1413
cineraſcens 1418
cinereus 1427
cinnamomeus 1404
circumſeptus 1417
Clavis 1421
clavularis 1425

Agaricus
Clavus 1420
clypeatus 1402
clypeiformis 1426
cochleariformis 1409
collinus 1414
conchatus 1411
confertus 1424
congregatus 1426
conicus 1424
contiguus 1405
contortilis 1419
contortus 1416
contractus 1421
corallinus 1406
coriaceus 1418
craſſipes 1405
craſſus 1410
crenulatus 1420
criſtatus 1414
croceus 1402, 1415
cruentatus 1408
cuſpidatus 1424
cyaneus 1416
cyanoxanthus 1401
cyathiformis 1409
decurrens 1414
defoſſus 1407
degener 1410
delicioſus 1412
denticulatus
denudatus 1398
depluens 1428
dichrous 1429
diſcors 1408
diffuſus 1419
Digitalis 1428
dimidiatus 1411
domeſticus 1427
diſcors 1408
dulcis 1412
durus 1400
elaſticus 1415

Agaricus

elatior. 1408
elephantinus 1404
emeticus 1401
equinus 1424
eſculentus 1420
excoriatus 1399
fagineus 1429
fallax 1411
farinaceus 1419
farinoſus 1414
faſciatus 1406
faſcicularis 1407
faſciculatus 1425
faſtigiatus 1404
ferruginaſcens 1400
ferruginatus 1421
ferrugineus 1403
fibrilloſus 1420
Fibula 1421
fimiputris 1428
fiſſus 1415
flabellatus 1410
flabelliformis 1411
flamineus 1409
flavidus 1406
flavo-flocceſus 1417
flocceſus 1399
Flurſtedienſis 1411
fragillimus ib.
fragilis 1402
fuliginarius 1421
fuliginatus 1419
fulveſcens 1429
fulvidus 1402
fulvus 1398
furcatus 1410
Fumus 1421
fuſceſcens 1414
fuſipes 1406
Fuſus 1408
gelatinoſus 1429
Georgii 1402

Agaricus

giganteus 1397
gilvus 1402
glandifer 1422
glanduloſus 1428
glaucus 1411
glutinoſus 1401
goſſypinus 1428
gracilis 1422
granuloſus 1419
griſeo-albus 1398
griſeus 1425
helvolus 1398
hepaticus 1406
hirtus 1423
hiſpidus 1419
holoſericeus 1409
horizontalis 1408
Hyacinthus 1416
hypni 1421
janthinus 1419
ichoratus 1413
imbricatus 1400
impreſſus 1409
impuber 1407
incertus ib.
infundibulifor-
mis 1409
integer 1401
involutus 1405
irregularis 1414
laccatus 1420
laceratus 1399
lacrimabundus 1426
lacrimalis 1414
lactifluus 1412
laricinus 1406
laterinus 1408
latus 1404
leoninus 1406
libertatis 1405
Lingua 1429
livens 1412

Agaricus

læveſcens 1410
longipes 1406
lucens 1398
luridus 1422
luteo-albus 1424
luteus 1403
lycoperdioides 1405
maculatus 1397
madreporeus 1408
majalis 1420
mammillaris 1424
mammoſus 1420
Mappa 1397
margaritaceus 1427
margaritifer 1397
marginatus 1422
melleus 1413
membranaceus 1423
micaceus 1428
minor 1398
minutulus 1423
minutus 1421
mitratus 1403
mollis ib.
molliſſimus 1404
momentaneus 1425
moſchatus 1416
Mucor 1425
murinus 1419
muſcarius 1397
muſcorum 1418
mutabilis 1400
nævius 1398
narcoticus 1426
nebularis 1408
necator 1412
neptuneus 1410
nigro-villoſus 1415
nimbatus 1405
nitens 1399
niveus 1429
nivoſus 1405

Agaricus
norwegicus 1424
nothus 1423
nuceus 1425
obconicus 1409
obeſus 1411
obſcurus 1399
obſoleſcens 1418
ochraceus 1404
œdematoſus 1406
Offa 1404
olivaceus 1417
olivaſcens 1400
opacus 1413
orichalceus 1400
oſtreatus 1411
ovatus 1427
pallidus 1407
palmatus 1411
papilionaceus 1427
papillatus 1424
papilligér 1426
papyraceus 1425
perennis 1428
perforans 1423
peronatus 1424
petalodes 1411
picaceus 1428
pileatus 1405
piloſulus 1422
piluliformis 1416
pineti 1420
piperatus 1413
piſtillaris 1399
Placenta 1419
planus 1429
plicatus 1420
plumatus 1429
plumbeus 1398
plumoſus 1415
politus 1404
pompoſus ib.
porcellaneus 1427

Agaricus
præaltus 1398
pratenſis 1399
procerus ib.
pullatus 1428
punctatus 1402
purpureus 1419
puſillus 1405
radians 1429
radiatus 1423
radicoſus 1399
ramealis 1415
ramoſus 1416
repens 1415
rigidus 1406
rimoſus 1422
riſigallinus 1407
roſellus 1417
roſtratus 1428
Rotula 1424
rubens 1415
Rudolphi 1403
rufeſcens 1406
rufus 1412
Ruſſula 1401
rutilus 1402
ſaccharinus 1425
ſanguineus 1417
ſanguinolentus 1409
ſciſſus 1416
ſcrobiculatus 1412
ſemiglobatus 1418
ſemipetiolatus 1410
ſeneſcens 1408
ſericeus 1402
ſetaceus 1421
ſoboliferus 1428
ſolitarius 1397
ſordiolulus 1426
ſordiolus 1417
ſpadiceo-griſeus 1425
ſpadiceus 1403
ſqualidus 1427

Agaricus
ſquamoſus 1399
ſquamuloſus 1407
ſtellatus 1424
ſtercorarius 1428
ſtriatellus 1421
ſtriatulus 1429
ſtriatus 1403
ſuaveolens 1409
ſubalutaceus ib.
ſubannulatus 1407
ſubantiquatus 1400
ſubatratus 1426
ſubcarneus 1417
ſubcoriaceus 1420
ſubcorneus 1417
ſubferrugineus 1408
ſubgracilis 1397
ſubgranulatus 1403
ſubpurpuraſcens 1407
ſubteſtaceus 1408
ſuccineus 1427
ſulcatus 1425
ſulphuratus 1422
ſulphureus 1417
ſuperſtitioſus 1416
tenuis 1424
terreus 1403
teſtaceus 1409
tigrinus 1414
Tintinnabulum 1423
tomentoſus 1418
torminoſus 1412
tortus 1427
tremebundus 1418
tremulus 1410
trichopus 1423
tricolor 1426
trilobus 1398
truncatus 1402
tubæformis 1409
tuberculoſus 1406
tuberoſus 1405

Agaricus
turbinatus 1404
turfaceus 1424
umbellatus 1423
umbelliferus *ib.*
umbilicaris 1425
umbilicatus 1414
Umbraculum 1419
umbrinus 1407
undulatus 1403
vaccinus *ib.*
vaginatus 1398
Vaillantii 1427
variegatus 1424
varius 1402
velutipes 1415
ventricoſus 1402
verſicolor 1429
vernus 1397
villoſus 1400
viroſus 1416
violaceo-fulvens 1429
violaceo-fulvus 1409
violaceus 1401
vireſcens *ib.*
virgineus *ib.*
viſceralis 1422
viſcoſus 1407
vitellinus 1400
xerampelinus 1401
zonarius 1412

Agave 524, 563
americana 563
cubenſis *ib.*
fœtida *ib.*
lurida *ib.*
tuberoſa *ib.*
virginica *ib.*
vivipara *ib.*

Ageratum 1162, 1200, 1201
ciliare 1201

Ageratum
conyzoides 1200
gujanenſe 1201

Agrimonia 742, 757
Agrimonoides 757
decumbens *ib.*
Eupatoria *ib.*
parviflora *ib.*
repens *ib.*

Agroſtemma 662, 735
Cæli roſa 735
Coronaria *ib.*
Flos jovis *ib.*
Githago *ib.*

Agroſtis 86, 168-171
alba 170
alpina 169
aſpera 171
auſtralis 169
avenacea 171
bromoides 169
capillaris 170
ciliata 171
Cinna 170
Cornu copiæ *ib.*
coromandeliana *ib.*
diandra *ib.*
dubia 169
feſtucoides *ib.*
filiformis *ib.*
gigantea *ib.*
glomerata 171
hirſuta 169
indica 171
interrupta 169
lateralis 171
Leerſii 169
lenta 171
linearis 170
Matrella 169
mexicana 171
miliacea 169

Agroſtis
minima 170
ovata *ib.*
procera *ib.*
pumila *ib.*
pungens 171
purpuraſcens 170
rubra 169
ſerotina *ib.*
ſilvatica 170
Spica venti 168
ſpicata *ib.*
ſpiciformis 169
ſtolonifera 170
ſtricta *ib.*
tenaciſſima *ib.*
verticillata *ib.*
vinealis 169
virginica 171

AGYNEJA 84, 106
impuber 106
puber *ib.*

Ailanthus 662, 726
Pongelion 726

Ajovea 522, 574
gujanenſis 574

Aira 87, 174, 175
ægilopſoides 174
alpina 175
antarctica *ib.*
aquatica 174
arundinacea *ib.*
bengalenſis *ib.*
caneſcens 175
capenſis 174
caryophyllea 175
ceſpitoſa 174
feſtucoides 175
flexuoſa *ib.*
juncea *ib.*
Koenigii 174
media 175
miliacea 174

Aira
minuta 174
montana 175
paludoſa 174
præcox 175
purpurea ib.
ſetacea ib.
ſinenſis ib.
ſubſpicata ib.
villoſa ib.
Aitonia 997, 1013
capenſis 1013
Ajuga 885, 892
alpina 892
decumbens ib.
genevenſis ib.
orientalis ib.
pyramidalis ib.
reptans ib.
Aizoon 779, 848, 849
canarienſe 848
fruticoſum ib.
glinoides ib.
hiſpanicum ib.
lanceolatum ib.
paniculatum ib.
perfoliatum ib.
rigidum ib.
ſecundum ib.
tomentoſum 849
Alangium 656, 667
pungens 667
Albuca 525, 547, 548
abyſſinica 547
altiſſima ib.
coarctata ib.
faſtigiata 548
major 547
minor ib.
ſpiralis 548
viſcoſa ib.

Alcea 1002, 1052
acaulis 1052
coromandeliana ib.
ficifolia ib.
roſea ib.
ſinenſis ib.
Alchemilla 317, 281
alpina 281
aphanoides ib.
pentaphylla ib.
vulgaris ib.
Alchornea 997, 1013
latifolia 1013
Aldrovanda 313, 514
veſiculoſa 514
Aletris 524, 561, 562
aurea 562
capenſis 561
farinoſa ib.
fragrans ib.
guineenſis ib.
hyacinthoides ib.
japonica 562
pumila 561
Uvaria ib.
Aleurites 998, 1035
triloba 1035
Aliſma 528, 591, 592
cordifolium 592
Damaſonium. ib.
flavum 591
natans 592
parnaſſifolium ib.
Plantago 591
ranunculoides 592
repens ib.
ſubulatum ib.
ALLAMANDA 293, 435
cathartica 435

Allionia 210, 231
albida 231
incarnata ib.
violacea ib.
Allium 524, 541-544
altaicum 544
Ampelopraſum 541
Anguloſum 543
arenarium 542
aſcalonicum 543
cæruleum 541
canadenſe 543
carinatum 542
Cepa 543
Chamæmoly 544
deſertorum 542
deſcendens ib.
fiſtuloſum 543
flavum 542
gracile 544
illyricum ib.
inodorum ib.
lineare 541
magicum ib.
Moly 544
monſpeſſulanum 543
moſchatum 542
multibulboſum 543
narciſſiflorum ib.
neapolitanum ib.
nigrum ib.
nutans ib.
obliquum 541
odorum 543
oleraceum 542
ornitogaloides 544
Pallaſii 542
pallens ib.
paniculatum ib.
parviflorum 542
Porum 541
ramoſum ib.
roſeum ib.

Allium
roṫundum 541
ſativum 542
Schœnopraſum 543
Scorodopraſum 542
ſeneſcens 543
ſibiricum ib.
ſphærocephalon 542
ſuaveolens 541
ſubhirſurum ib.
tataricum ib.
tenuiſſimum 543
tricoccum 544
triquetrum ib.
urſinum ib.
Victorialis 541
vineale 542

Allophylus 599, 611, 612
racemoſus 612
rigidus ib.
zeylanicus 611

Aloë 524, 562, 563
arachnoidea 563
dichotoma ib.
diſticha 562
humilis ib.
linguæformis ib.
maculata ib.
pendens ib.
perfoliata ib.
picta ib.
pumila 563
retuſa ib.
ſinuata ib.
ſpicata ib.
ſpiralis ib.
variegata 562
viſcoſa 563

Alopecurus 86, 167
agreſtis 167
bulboſus ib.

Alopecurus
carolinianus 167
caudatus ib.
ciliatus ib.
geniculatus ib.
hordeiformis ib.
indicus ib.
monſpelienſis ib.
panicus ib.
pratenſis ib.
typhoides ib.

Alpinia 1, 7, 8
jamaicenſis 8
Langua 7
occidentalis ib.
racemoſa ib.
ſpicata ib.

Alſine 311, 506, 507
media 506
mucronata 507
proſtrata ib.
ſegetalis 506

ALSTONIA 771, 798
theæformis 798

Alſtrœmeria 524, 564
Ligta 564
multiflora ib.
peregrina ib.
pulchella ib.
Salſilla ib.

Alternanthera 84, 106
repens 106

Althæa 1002, 1051, 1052
cannabina 1052
corymboſa 1051
grandiflora ib.
hirſuta ib.
Ludwigii ib.

Althæa
narbonenſis 1051
officinalis. ib.

Alyſſum 967, 976, 977
alpeſtre 976
calicinum ib.
clypeatum ib.
creticum 977
deltoideum ib.
gemonenſe ib.
halimifolium 976
hyperboreum ib.
minimum ib.
montanum ib.
ſaxatile ib.
ſinuatum 977
ſpinoſum 976
utriculatum 977
Veſicaria ib.

Amanoa 304, 427
gujanenſis 427

Amarantus 89, 204-206
albus 205
Blitum ib.
caudatus ib.
cruentus ib.
deflexus ib.
flavus ib.
gangeticus ib.
græcizans 204
hybridus 205
hypochondriacus ib.
lividus ib.
mangoſtanus ib.
melancholicus 204
oleraceus 205
paniculatus ib.
polygamus 204
polygonoides 205
retroflexus 206

Amarantus
ſanguineus 206
ſcandens 205
ſpinoſus 206
tricolor 204
triſtis 205
viridis *ib.*
Amaryllis 524, 538-540
alba 540
Atamaſco 539
aurea *ib.*
Belladonna *ib.*
capenſis 538
chilenſis 539
ciliaris 540
cinnamomea *ib.*
clavata 539
diſticha 540
formoſiſſima 539
longifolia *ib.*
lutea 538
maculata 539
orientalis *ib.*
pumilio *ib.*
radiata 540
reginæ 539
reticulata *ib.*
revoluta *ib.*
ſamienſis 540
tartarica *ib.*
tubiflora 539
tubiſpatha 538
undulata 540
vittata 539
AMASONIA 894, 965
erecta 965
Ambroſia 291, 374, 375
artemiſifolia 374
elatior *ib.*
maritima *ib.*
Ambroſia
ſimplicifolia 375
trifida 374
Ambroſinia 782, 866
Baſſii 866
Ambulia 887, 945
monoſperma 945
Amellus 1165, 1254 *ſq.*
carolinianus 1255
lychnitis 1254
umbellatus 1255
Amerimnum 1076, 1087
Brownei 1087
Ebenus *ib.*
Amethyſtea 20, 43
cærulea 43
Ammannia 215, 264, 265
baccifera 264
debilis *ib.*
latifolia *ib.*
octandra *ib.*
pinnatifida 265
ramoſior 264
ſanguinolenta *ib.*
Ammi 308, 474, 475
copticum 475
daucifolium *ib.*
glaucifolium *ib.*
majus 474
Amomum 1, 5-7
anguſtifolium 6
Cardamomum 5
Curcuma *ib.*
Globba 6
Grana Paradiſi 5
Kœnigii 6
Leonurus *ib.*
littorale *ib.*
Amomum
medium 7
minus *ib.*
Mioga 6
montanum *ib.*
repens *ib.*
ſcyphiferum *ib.*
ſilveſtre *ib.*
ſpurium *ib.*
uliginoſum *ib.*
Zerumbet 5
Zingiber *ib.*
Amorpha 1075, 1076, 1093
fruticoſa 1093
Amſonia 294, 439
ciliata 439
Tabernæmontana *ib.*
Amygdalus 770, 793, 794
communis 793
dulcis 794
incana *ib.*
nana *ib.*
orientalis *ib.*
perſica 793
pumila 794
Amyris 600, 614, 615
ambroſiaca 614
Balſamea *ib.*
balſamifera 615
Elemifera 614
gujanenſe 615
maritima 614
Opobalſamum *ib.*
protium *ib.*
ſilvatica *ib.*
toxifera *ib.*
zeylanica 615
Anabaſis 307, 454
aphylla 454
folioſa *ib.*

Anabaſis
ſpinoſiſſima 454
tamariſcifolia *ib.*
Anacardium 647, 652
occidentale 652
Anacyclus 1163, 1250 *ſq.*
aureus 1251
creticus *ib.*
orientalis 1250
valentinus 1251
Anagallis 292, 332
arvenſis 332
cærulea *ib.*
latifolia *ib.*
linifolia *ib.*
Monelli *ib.*
pumila *ib.*
tenella *ib.*
verticillata *ib.*
Anagyris 655, 665
fœtida 665
Anaſſer 293, 333
Borboniæ 333
Anaſtatica 967, 970
hierichuntica 970
ſyriaca *ib.*
Anavinga 660, 702
exotica 702
Anchuſa 292, 317, 318
amœna 318
anguſtifolia 317
Barrelieri *ib.*
echinocarpos 318
flava *ib.*
hiſpida *ib.*
italica 317
lanata 318
officinalis 317

Anchuſa
paniculata 317
ſaxatilis 318
ſempervirens *ib.*
tinctoria 317
tuberculata 318
undulata 317
virginica *ib.*
ANCISTRUM 21, 50
latebroſum 50
Sanguiſorbæ *ib.*
Andira 1076, 1086
Piſonis 1086
Andrachne 312, 504
fruticoſa 504
telephioides *ib.*
Andromeda 659, 695, 696
anaſtomoſaus 696
arborea *ib.*
cærulea 695
caliculata 696
Catesbæi 695
cerea *ib.*
faſciculata *ib.*
ferruginea *ib.*
ferruginoſa *ib.*
hypnoides *ib.*
jamaicenſis *ib.*
japonica 696
lucida *ib.*
mariana 695
nitida *ib.*
octandra *ib.*
paniculata 696
polifolia 695
racemoſa 696
reticulata *ib.*
rupeſtris *ib.*
tetragona 695

Andropogon 87, 163-166
aciculatus 165
afer 166
alopecuroides 165
annulatus 164
barbatus *ib.*
bicornis *ib.*
binatus *ib.*
Bladhii *ib.*
brevifolius *ib.*
caricoſus 163
ciliatus 165
contortus 163
cotuliferus 165
crinitus 163
cymbarius 165
diſtachyos 164
divaricatus *ib.*
faſtigiatus 165
glaucus *ib.*
Gryllus *ib.*
hirtus *ib.*
incurvatus 164
inſularis 166
Iſchæmum *ib.*
muricatus 165
muticus 164
Nardus 166
nutans 165
proſtratus 166
provincialis 164
ramoſus *ib.*
ſaccharoides 165
Schœnanthus 164
ſerratus *ib.*
ſerrulatus 165
ſquarroſus *ib.*
undatus 166
virginicus 164
Androſace 292, 325, 326
carnea 326

Androſace
brevifolia 326
elongata 325
filiformis 326
lactea *ib.*
maxima 325
obtuſifolia *ib.*
odoratiſſima *ib.*
pauciflora *ib.*
ſeptentrionalis *ib.*
villoſa *ib.*

Andryala 1161, 1181
cheiranthifolia 1181
crithmifolia *ib.*
integrifolia *ib.*
lanata *ib.*
nigricans *ib.*
pinnatifida *ib.*
raguſina *ib.*
uniflora *ib.*

Anemone 782, 870-872
alpina 870
apennina 871
apiifolia 870
baldenſis *ib.*
cernua *ib.*
coronaria *ib.*
decapetala 871
dichotoma *ib.*
faſciculata 872
fragifera 871
Halleri 870
Hepatica *ib.*
hortenſis *ib.*
narciſſiflora 871
nemoroſa *ib.*
palmata *ib.*
patens 870
penſilvanica 871
pratenſis 870
Pulſatilla *ib.*
quinquefolia 871

Anemone
ranunculoides 871
ſibirica *ib.*
ſilveſtris *ib.*
ſulphurea 870
thalictroides 871
trifolia *ib.*
vernalis 870
virginiana *ib.*

Anethum 310, 491
Fœniculum 491
graveolens *ib.*
ſegetum *ib.*

Angelica 309, 482
Archangelica 482
atro purpurea *ib.*
integrifolia *ib.*
lobata *ib.*
lucida *ib.*
Razulii *ib.*
ſilveſtris *ib.*
verticillaris *ib.*

Anguillaria 295, 430
bahamenſis 430
zeylanica *ib.*

Anguria 21, 70
pedata 70
trifoliata *ib.*
trilobata *ib.*

Annona 782, 868, 869
ægyptiaca 868
africana 869
amara *ib.*
Amboini *ib.*
Aperamoa *ib.*
aſiatica *ib.*
glabra *ib.*
longifolia *ib.*
muricata 868
paludoſa 869
paluſtris *ib.*

Annona
punctata 869
reticulata 868
rufeſcens 869
ſinenſis 868
ſquamoſa 869
triloba *ib.*

Anoda 1001, 1040
Dilleniana 1040
haſtata *ib.*
triloba *ib.*

Anredera 306, 454
ſpicata 454

Anthemis 1165, 1251 *ſq.*
alpina 1251
altiſſima *ib.*
americana 1252
arabica *ib.*
arvenſis 1251
auſtriaca 1252
chia 1251
corymboſa *ib.*
Cota 1251
Cotula *ib.*
maritima *ib.*
mixta 1251
nobilis *ib.*
odorata 1252
Pyrethrum 1251
repanda 1252
repens *ib.*
tinctoria *ib.*
tomentoſa 1251
trinervia 1252
valentina *ib.*

Anthericum 525, 554 556
Adenanthera 554
alooides *ib.*
annuum 555
aphyllum 556

Anthericum
aſphodeloides 554
caliculatum ib.
Cauda felis ib.
ciliatum ib.
cirratum 555
contortum 554
falcatum ib.
filiforme ib.
flexifolium 555
floribundum ib.
fruteſcens 554
græcum 555
hiſpidum ib.
japonicum 554
latifolium ib.
Liliago 555
Liliaſtrum ib.
muricatum ib.
oſſifragum 554
planifolium 555
ramoſum ib.
revolutum ib.
ſcabrum ib.
ſerotinum ib.
ſpirale 556
ſquameum 555
ſubtrigonum 554
triquetrum 555
ANTHISTIRIA 88, 194
ciliata 194
imberbis ib.
Anthoceros 1285, 1355
criſpus 1355
lævis ib.
multifidus ib.
punctatus ib.
Antholyza 82, 112, 113
æthiopica 113

Antholyza
Cunonia 112
Lucidor 113
Meriana ib.
Merianella ib.
plicata 112
ringens ib.
Anthoſpermum 219, 285
æthiopicum 285
ciliare ib.
herbaceum ib.
Anthoxanthum 22, 75, 76
aculeatum 75
avenaceum 76
crinitum ib.
indicum ib.
odoratum 75
paniculatum 76
Anthyllis 1076, 1099, 1100
Barba jovis 1099
cornicina ib.
cytiſoides 1100
Erinacea ib.
Gerardi 1099
Hermanniæ 1100
involucrata 1099
linifolia 1100
lotoides 1099
montana ib.
quinqueflora ib.
tetraphylla ib.
viſciflora ib.
Vulneraria ib.
Antichorus 599, 609
depreſſus 609
Antideſma 304, 432
alexiterium 432

Antirhea 212, 244
borbonica 244
Antirrhinum 889, 930-934
ægyptiacum 931
æruginеum 933
alpinum ib.
aphyllum ib.
arvenſe 932
Aſarina 934
bellidifolium 933
bicorne 932
bipunctatum ib.
canadenſe 933
chalepenſe 931
cirrhoſum ib.
Cymbalaria 933
dalmaticum ib.
Elatine 931
flavum 933
geniſtifolium 931
glaucum 933
Hælava 932
hexandrum ib.
hirtum 931
junceum ib.
lagopodioides 933
Linaria 931
linifolium ib.
macrocarpon 932
majus 934
minus 931
molle 934
monſpeſſulanum 933
multicaule ib.
origanifolium 932
Orontium 934
papilionaceum ib.
pedunculatum 931
peliſſerianum ib.
piloſum 930
pinifolium 933
pinnatum 932

Digitized by Google

Antirrhinum
purpureum 933
reflexum ib.
repens ib.
ſaxatile 932
ſpurium 933
ſupinum ib.
triornithophorum ib.
triphyllum 932
triſte ib.
unilabiatum 934
verſicolor 932
villoſum 933
virgatum ib.
viſcidum 932
viſcoſum ib.
Antura 295, 405
hadienſis 405
APACTIS 740, 747
japonica 747
Apama 1149, 1153
dubia 1153
Aphanes 3, 15
arvenſis 15
Swartſii ib.
Aphyllanthes 524, 540
monſpelienſis 540
APHYTEJA 995, 1005
Hydnora 1005
Apium 316, 493
bipinnatum 493
graveolens ib.
Petroſelinum ib.
Apluda 85, 148
ariſtata 148
digitata ib.
mutica ib.
ſcirpoides ib.
Zeagites ib.
Apocynum 306, 442, 443
Acuſi 443
androſæmifolium 442
cannabinum 443
filiforme ib.
fruteſcens ib.
lineare ib.
minutum ib.
reticulatum ib.
ſibiricum 442
triflorum 443
umbellatum ib.
venetum ib.
APONOGETON 594, 597
anguſtifolium 597
diſtachyon ib.
monoſtachyon ib.
Aquartia 211, 247
aculeata 247
Aquilaria 660, 685
ovata 685
Aquilegia 779, 850, 851
alpina 851
canadenſis ib.
viridiflora ib.
viſcoſa 850
vulgaris ib.
AQUILICIA 301, 421
ſambucina 421
Arabis 968, 987
alpina 987
bellidifolia ib.
cærulea ib.
canadenſis ib.
grandiflora ib.
Halleri ib.
hiſpida ib.
lucida ib.
lyrata ib.
Arabis
ovirenſis 987
pendula ib.
thaliana ib.
turrita ib.
Arachis 1075, 1076, 1100
aprica 1100
hypogæa ib.
Aralia 312, 509, 510
arborea 509
capitata ib.
cordata 510
japonica ib.
nudicaulis ib.
pentaphylla 509
racemoſa 510
Sciodaphyllum 509
ſinenſis 510
ſpinoſa 509
Arbutus 659, 697
acadienſis 697
alpina ib.
Andrachne ib.
ferruginea ib.
laurifolia ib.
mucronta ib.
pumila ib.
Unedo ib.
Uva urſi ib.
Arctium 1162, 1184
Carduelis 1184
Lappa ib.
Perſonata ib.
Arctopus 308, 465
echinatus 465
Arctotis 1166, 1273 *ſq.*
acaulis 1274
anguſtifolia 1273
anthemoides 1274
argentea 1273

Arctotis
aſpera 1273
calendulacea ib.
caroliniana 1274
dentata ib.
grandiflora 1273
microphylla ib.
paleacea 1274
paradoxa ib.
plantaginea 1273
ſcarioſa 1274
ſerrata 1273
tenuifolia ib.
Ardiſia 295, 394, 395
coriacea 395
excelſa ib.
lateriflora ib.
paraſitica ib.
ſerrulata ib.
tinifolia 394
ARDUINA 295, 403
biſpinoſa 403
Areca 647, 649
Catechu 649
oleracea ib.
Arenaria 661, 719-721
auſtriaca 721
balearica 719
bavarica 721
biflora 719
calicina 720
capillacea 721
caroliniana ib.
ceraſtioides 719
ciliata ib.
cucubaloides 720
dianthoides ib.
dichotoma 719
faſciculata 721
filifolia ib.
Arenaria
geniculata 720
grandiflora 721
gypſophiloides 720
Halleri 719
hiſpida 721
juniperina ib.
lanceolata 719
laricifolia 721
lateriflora 719
liniflora 721
marina 720
media ib.
montana ib.
multicaulis 719
norwegica ib.
obtuſa 720
peploides 719
polygonoides 720
recurva 721
rubra ib.
ſaxatilis 720
ſerpyllifolia 719
ſtriata 720
tenuifolia 721
tetraquetra 719
triflora 720
trinervia 719
verna 720
Arethuſa 21, 61
bipinnata 61
bulboſa ib.
capenſis ib.
ciliaris ib.
divaricata ib.
folioſa ib.
ophiogloſſoides ib.
racemoſa ib.
ſpicata ib.
villoſa ib.
Aretia 292, 325
alpina 325
Aretia
helvetica 325
Vitaliana ib.
Argemone 776, 810
armeniaca 810
mexicana ib.
pyrenaica ib.
Argolaſia 524, 560
capenſis 560
ARGOPHYLLUM 303, 418
nitidum 418
Argythamnia 219, 286
candicans 286
Ariſtea 119
cyanea 119
Ariſtida 86, 195, 196
aſcenſionis 195
americana ib.
arundinacea ib.
depreſſa 196
geniculata 195
gigantea ib.
Hyſtrix ib.
lanata 196
paniculata ib.
plumoſa 195
ſetacea ib.
Ariſtolochia 528, 590, 591
anguicida 590
arboreſcens ib.
bætica ib.
barbata 591
bilabiata 590
biloba ib.
bracteata 591
caudata 590
Clematitis 591
erecta 590

Ariſtolochia
grandiflora 591
hirſuta ib.
indica ib.
longa ib.
maurorum 590
maxima ib.
obtuſata 591
odoratiſſima ib.
peltata 590
pentandra ib.
Piſtolochia 591
rotunda ib.
ſempervirens 590
ſerpentaria ib.
Sipho 591
trilobata 590

Ariſtotela 741, 751
Macqui 751

Arnebia 292, 320
tinctoria 320

Arnica 1164, 1242 *ſq.*
ciliata 1242
coronopifolia 1243
crocea 1242
Doronicum ib.
Gerbera 1243
glacialis 1242
hirſuta ib.
japonica ib.
maritima 1242
montana ib.
oporina ib.
palmata 1243
piloſelloides 1242
ſcorpioides ib.

Artedia 308, 473
ſquamata 473

Artemiſia 1163, 1209-1212
Abrotanum 1209

Artemiſia
Abſinthium 1211
æthiopica 1210
anethifolia ib.
annua 1212
arboreſcens 1209
argentea 1210
auſtriaca 1211
borealis 1212
cæruleſcens ib.
campeſtris 1210
capillaris 1209
Contra 1210
crithmifolia ib.
Dracunculus 1212
filaginoidea 1211
glacialis ib.
Gmelini 1209
hiſpanica 1210
humilis ib.
Jacquini 1212
japonica ib.
inodora 1211
integrifolia 1212
italica 1210
judaica ib.
laricifolia 1209
Lerchii ib.
littoralis 1212
maderaſpatana ib.
maritima 1211
Meſſerſmidii 1210
minima 1212
nitroſa 1209
paluſtris 1211
pauciflora 1210
pectinata 1212
pontica 1211
rupeſtris ib.
Santonica ib.
Semſck ib.
ſericea ib.
ſinenſis 1212
ſpicata 1211

Artemiſia
tanacetifolia 1212
tartarica 1210
tenella 1211
vermiculata 1209
vulgaris 1211

ARTOCARPUS 2, 14
inciſa 14
integrifolia ib.

Aruba 311, 504
gujanenſis 504

Arum 781, 764-866
arboreſcens 865
Ariſarum ib.
atro-rubens 864
auritum 866
bicolor 864
cannæfolium 865
Colocaſia 864
divaricatum 865
Dracontium 864
Dracunculus ib.
eſculentum ib.
flavum ib.
hederaceum 865
helleborifolium 864
lingulatum 866
macrorhizon 864
maculatum 865
muſcivorum ib.
ovatum ib.
pentaphyllum 864
peregrinum 865
pictum ib.
proboſcideum ib.
ſagittæfolium ib.
ſeguinum ib.
ſpirale ib.
tenuifolium ib.
ternatum 864
trilobatum 865
triphyllum 864

veno-

Arum
venoſum 864
virginicum 865

Aruna 21, 50
gujanenſis 50

Arundo 88, 194, 195
bifaria 195
Donax 194
gigantea ib.
mauritanica 195
phragmites ib.
Quila ib.
Rugi ib.
tecta ib.
Valdivia ib.

Aſarum 740, 745
canadenſe 745
carolinianum ib.
europæum ib.
virginicum ib.

Aſcarina 2, 12
polyſtachya 12

Aſcium 775, 817
gujanenſe 817

Aſclepias 306, 444-447.
acanthocarpos 446
alexicaca 445
amœna ib.
aphylla 447
arboreſcens 445
aſthmatica 444
carnoſa 446
cinerea ib.
citrifolia 445
cordata 444
criſpa 445
curaſſavica 444
Dæmia ib.
decumbens ib.
filiformis 446
fruticoſa 445

Aſclepias
gigantea 445
glabra 444
gonocarpos 446
grandiflora ib.
humiſtrata ib.
incarnata 444
lactifera 445
lanceolata 446
laniflora 445
nigra 444
nivalis ib.
nivea ib.
parviflora ib.
pedicellata 447
perennis 446
polyſtachyos ib.
pubeſcens 445
purpuraſcens ib.
radians ib.
repanda ib.
rubra 446
ſetoſa ib.
ſibirica ib.
ſpiralis 445
ſtipitacea 447
ſyriaca 445
tuberoſa 446
undulata 445
variegata 444
verticillata 446
viminalis 444
Vincetoxicum 445
viridis 447
volubilis 444

Aſcobolus 1461
pezizoides ib.

Aſcophora 1287, 1484
articulata 1484
cylindrica ib.
diſciflora ib.
fragilis ib.

Aſcophora
limbiflora 1484
Mucedo ib.
ovalis ib.
Stilbum ib.

Aſcyrum 1150, 1160
Crux Andreæ 1160
Hypericoides ib.
villoſum ib.

Aſpalathus 1076, 1091-1093
albeſcens 1092
anthylloides 1093
araneoſa 1092
argentea 1093
aſparagoides ib.
aſtroites 1092
calloſa 1093
candicans ib.
caneſcens 1092
capitata 1091
carnoſa 1092
chenopoda ib.
ciliaris ib.
cretica 1093
ericifolia 1091
galioides ib.
geniſtoides 1092
glomerata 1091
heterophylla 1092
Hyſtrix ib.
indica 1093
laxata ib.
mucronata ib.
nigra 1091
orientalis 1093
pedunculata 1092
piloſa 1093
pinnata 1092
quinqueſolia ib.
retroflexa ib.
ſericea ib.

Aſpalathus
ſpinoſa 1091
thymifolia 1092
tridentata 1093
uniflora 1091
verrucoſa 1092
Aſparagus 525, 557
acutifolius 557
æthiopicus ib.
albus ib.
aphyllus ib.
aſiaticus ib.
capenſis ib.
declinatus ib.
falcatus ib.
horridus ib.
officinalis ib.
retrofractus ib.
ſarmentoſus ib.
fiſtularis ib.
verticillaris ib.
Aſperugo 292, 321
ægyptiaca 321
procumbens ib.
Aſperula 214, 235
ariſtata 235
arvenſis ib.
calabrica ib.
cynanchica ib.
hexaphylla ib.
lævigata ib.
odorata ib.
pyrenaica ib.
taurina ib
tinctoria ib.
Aſphodelus 525, 553
altaicus 553
fiſtuloſus ib.
liburnicus ib.
luteus ib.
ramoſus ib.
Aſplenium 1283, 1301-1304
Adiantum nigrum 1304
alternifolium 1302
anguſtifolium 1301
anteriſcifolium 1303
bifolium 1302
bulbiferum 1304
caudatum 1303
Ceterach 1301
cicutarium 1304
cultrifolium 1302
dentatum ib.
dimidiatum 1303
diſſectum 1302
ebeneum ib.
eroſum ib.
flaccidum 1303
fragrans 1304
germanicum ib.
grandifolium 1302
Hemionitis 1301
japonicum 1303
lanceolatum ib.
lanceum 1301
leptophyllum 1304
lucidum 1303
marginatum 1302
marinum 1303
rhizanthemum 1302
Nidus 1301
nodoſum 1302
obliquum 1303
obtuſatum ib.
obtuſifolium 1302
plantagineum 1301
poliodon 1302
præmorſum ib.
proliferum 1301
pumilum 1302
pygmæum 1303
rhizophorum ib.
rhizophyllum 1301
Ruta muraria 1304
Aſplenium ſalicifolium 1302
Scolopendrium 1301
ſerratum ib.
ſorbifolium 1303
ſquamoſum ib.
ſtriatum ib.
tenerum ib.
Trichomanes ramoſum 1304
trichomanoides 1303
viride 1304
Aſſa 778, 839
exotica 839
Aſſonia 999, 1036
populnea 1036
Aſter 1164, 1230-1234
acris 1231
æſtivus 1232
alpinus ib.
Amellus 1232
annuus 1233
carolinianus 1230
ciliatus 1231
concolor 1232
cordifolius 1233
coriaceus 1232
corymboſus 1233
crinitus 1230
criſpus 1234
Cymbalariæ 1230
diffuſus 1234
divaricatus 1233
divergens 1234
dumoſus 1231
ericæfolius 1234
ericoides 1231
folioloſus ib.
fruticuloſus 1230
grandiflorus 1232

Aſter
hiſpidus 1234
holoſericeus ib.
hyſſopifolius 1231
indicus 1233
junceus ib.
lævis ib.
linariæfolius 1231
linifolius ib.
macrophyllus 1234
miſer 1233
multiflorus 1231
mutabilis 1234
nemoralis 1231
novæ Angliæ ib.
novi Belgii 1233
paludoſus 1232
paniculatus 1233
patens ib.
pendulus 1234
puniceus 1233
Radula 1234
reflexus 1230
rigidus 1231
ſalicifolius ib.
ſalicinus 1234
ſcaber 1233
ſibiricus 1232
ſinenſis 1234
ſpectabilis ib.
ſquarroſus 1232
tardiflorus 1234
tataricus ib.
taxifolius 1230
tenellus 1232
tenuifolius 1231
Tradeſcanti 1233
Tripolium 1232
umbellatus 1231
undulatus 1232
vernus ib.
Aſtragalus 1075, 1077, 1132-1137
alopecuroides 1132

Aſtragalus
alpinus 1134
alyſſoides 1136
Ammodytes 1135
ampullatus 1136
annularis 1133
arenarius ib.
aſper 1132
auſtriacus 1135
bæticus 1134
barbatus ib.
bicolor 1136
bohemicus 1132
campeſtris 1137
canadenſis 1133
capitatus ib.
caprinus 1136
carolinianus 1132
chriſtianus 1133
Cicer 1134
compactus 1135
contortuplicatus 1134
cornutus 1135
danicus 1134
daſyanthus 1137
deflexus 1133
denſifolius 1136
depreſſus 1137
Epiglottis 1134
emarginatus 1135
exſcapus 1136
falcatus 1133
galegiformis ib.
Glaux 1134
globoſus 1136
glycyphyllos 1135
hamoſus 1134
hians 1133
hirſutus 1136
hyſpidus 1134
Hypoglottis ib.
incanus 1137
lagopodioides 1135
laguroides 1137

Aſtragalus
lanatus 1137
latifolius ib.
Laxmanni 1134
leontinus 1135
leptophyllos 1137
lineatus 1135
lupulinus 1137
meliloioides 1132
microphyllus 1133
monſpeſſulanus 1137
montanus 1136
numularius ib.
Onobrychis 1133
pentaglottis 1134
peregrinus 1133
phyſodes 1137
piloſus 1132
Poterium 1135
pſoraloides 1136
Rauwolfii 1135
ſeſameus 1134
ſinenſis 1133
ſinicus 1135
ſpicatus 1137
Stella 1134
ſulcatus 1133
ſyriacus 1134
Tragacantha 1135
tragacanthoides ib.
trimeſtris ib.
uliginoſus 1133
uncatus 1136
uralenſis ib.
verticillaris ib.
veſicarius ib.
virescens 1132

Aſtrantia 308, 469
carniolica 469
Epipactis ib.
major ib.
minor ib.

Aſtronium 311, 499
graveolens 499
Athamanta 309, 476, 477
annua 477
Cervaria 476
condenſata ib.
cretenſis 477
daucoides ib.
Libanotis 476
Matthioli 477
Oreoſelinum 476
ſibirica ib.
ſicula ib.
ſinenſis 477
Athanaſia 1163, 1206 ſqq.
annua 1206
capitata ib.
cinerea 1207
crenata 1206
crithmifolia ib.
decuſſata 1208
dentata 1207
filiformis ib.
geniſtifolia ib.
graminifolia 1206
haſtata ib.
laxa 1207
linifolia ib.
maritima 1206
microphylla 1207
obovata 1206
paniculata ib.
parviflora 1207
paſſerinoides ib.
pectinata 1207
pinnata ib.
pubeſcens 1206
pumila 1207
pungens 1208
ſantolinoides ib.
Athanaſia
ſerrata 1207
ſeſſiliflora ib.
ſquarroſa 1207
trifurcata 1206
trinervia ib.
uniflora 1208
virgata ib.
viſcoſa 1207
Athenæa 601, 629
guianenſis 629
Atractobolus 1285, 1461
annularis 1461
Atractylis 1162, 1191, 1192
cancellata 1192
gummifera ib.
humilis ib.
Lancea ib.
mexicana ib.
oppoſitifolia ib.
ovata 1191
purpurea 1192
Atragene 782, 872
alpina 872
capenſis ib.
japonica ib.
polygama ib.
tenuifolia ib.
zeylanica ib.
Atraphaxis 526, 580
ſpinoſa 580
undulata ib.
Atriplex 306, 450, 451
alba 451
albicans 450
coriacea ib.
Atriplex
glauca 450
Halimus ib.
haſtata ib.
hortenſis 451
laciniata 450
littoralis 451
patula ib.
pedunculata ib.
portulacoides 450
roſea ib.
ſalicina 451
ſibirica 450
tatarica ib.
virgata 451
Atropa 296, 380, 381
arboreſcens 381
Belladonna ib.
fruteſcens ib.
Mandragora 380
phyſaloides 381
ſolanacea ib.
Aubletia 776, 812
aſpera 812
lævis ib.
Paturno ib.
Tiburua ib.
AUCUBA 216, 276
japonica 276
Avena 88, 192-194
aurata 193
brevis 192
bromoides 194
calicina 193
capenſis ib.
caroliniana 194
diſtichophylla 193
dubia 192
fatua 193
flaveſcens ib.
fragilis ib.

Avena
hiſpida 193
Loeflingiana 192
lupulina 193
lutea 192
montana ib.
nuda 193
penſilvanica 192
pratenſis 193
pubeſcens 192
purpurea ib.
rupeſtris 194
ſativa 192
Scheuchzeri 193
ſempervirens ib.
ſeſquitertia 192
ſetacea 193
ſibirica 192
ſpicata 194
ſterilis 193
ſtipiformis 192
ſtrigoſa ib.
verſicolor 194
Averrhoa 663, 729
Bilimbi 729
Carambola ib.
Avicennia 888, 963
nitida 963
reſinifera ib.
tomentoſa ib.
Axyris 86, 151
amarantoides 151
ceratoides ib.
hybrida ib.
proſtrata ib.
Ayenia 416
lævigata ib.
magna ib.
puſilla ib.
tomentoſa ib.
Azalea 294, 336
indica 336

Azalea
lapponica 336
nudiflora ib.
pontica ib.
procumbens ib.
roſmarinifolia ib.
viſcoſa ib.
Azima 215, 262
nova 262
Baccharis 1163, 1219 *ſq.*
arborea 1220
braſiliana ib.
Dioſcoridis ib.
fœtida 1219
halimifolia 1220
indica ib.
ivæfolia 1219
neriifolia 1220
viſcoſa ib.
Bacopa 293, 329
aquatica 329
Bæa 38
indica 38
Bæckea 598, 635
fruteſcens 635
Bæobotrys 298, 370
nemoralis 370
Baillieria 1166, 1271
aſpera 1271
Balanophora 2, 13
fungoſa 13
Ballota 885, 908
alba 908
diſticha ib.
lanata ib.
nigra ib.
ſuaveolens ib.

BALTIMORA 1166, 1259
recta 1269
Bambus 526, 579
Arundo 579
Banara 741, 747
gujanenſis 747
Baniſteria 662, 724, 725
angulata 724
benghalenſis ib.
brachiata ib.
dichotoma ib.
fulgens ib.
laurifolia ib.
longifolia 725
purpurea 724
Quapara ib.
ſinimarienſis ib.
BANKSIA 215, 262
dactyloides 262
dentata ib.
ericæfolia ib.
integrifolia ib.
muſculiformis ib.
pyriformis ib.
ſerrata ib.
Barbylus 600, 610
Brownii 610
Barnadeſia 1162, 1192
ſpinoſa 1192
Barreliera 959, 960
acanthoides 959
biſpinoſa 960
buxifolia 959
coccinea 960
criſtata ib.
hirſuta ib.
Hyſtrix 959
longiflora 960

Barreliera
longifolia 959
nitida 960
noctiflora ib.
Prionitis 959
pungens 960
ſolanifolia 959
triſpinoſa 960
BARRINGTONIA 1000, 1039
ſpecioſa 1039
Bartſia 887, 922
alpina 922
coccinea ib.
Gymnandra ib.
pallida ib.
viſcoſa ib.
Baſella 311, 507
alba 507
japonica ib.
lucida ib.
rubra ib.
BASSIA 740, 746
longifolia 746
obovata ib.
Baſſovia 296, 390
ſilvatica 390
Baſtera 1165, 1271
Houttuyni 1271
BATIS 217, 272
maritima 272
Batſchia 292, 315
carolinienſis 315
Bauhinia 655, 666, 667
aculeata 666
acuminata ib.
candida ib.
divaricata ib.
glabra ib.
inermis 667

Bauhinia
porrecta 666
purpurea ib.
ſcandens ib.
tomentoſa ib.
ungulata ib.
variegata ib.
BEFARIA 743, 748
æſtuans 748
reſinoſa ib.
Begonia 778, 835, 836
acutifolia 835
capenſis 836
dichotoma 835
Erminea 836
ferruginea 835
glabra ib.
grandifolia ib.
hirſuta 836
humilis 835
malabarica ib.
minor ib.
nana 836
obliqua 835
octopetala 836
urticæ 835
Bellis 1164, 1245
annua 1245
arabica ib.
perennis ib.
BELLIUM 1164, 1245
bellidioides 1245
minutum ib.
Bellonia 297, 360
aſpera 360
ſpinoſa ib.
Berberis 523, 575
cretica 575
ilicifolia ib.

Berberis
ſibirica 575
vulgaris ib.
BERGIA 662, 733
capenſis 733
glomerata ib.
Bertiera 298, 362
guianenſis 362
Beſleria 890, 935, 936
bivalvis 935
coccinea 936
criſtata 935
incarnata 936
lutea 935
melittifolia ib.
violacea ib.
Beta 306, 451, 452
Cicla 452
maritima ib.
patula 451
vulgaris ib.
Betonica 885, 906
alopecuros 906
heraclea ib.
hirſuta ib.
incana ib.
officinalis ib.
orientalis ib.
ſtricta ib.
Betula 218, 282, 283
alba 282
Alnus ib.
criſpa ib.
daurica 283
excelſa ib.
fruticoſa ib.
incana 282
lenta 283
nana ib.
nigra ib.
oblongata 282

Betula
papyracea 283
pendula 282
populifolia ib.
pumila ib.
ſerrulata ib.

Bidens 1163, 1194, 1195
bipinnata 1195
bulbata 1194
cernua ib.
frondoſa ib.
hirſuta ib.
minima ib.
nivea ib.
nodiflora ib.
piloſa ib.
ſcandens ib.
tenella ib.
tripartita ib.
verticillata ib.

Bignonia 889, 940–942
æquinoctialis 941
alba ib.
alliacea ib.
cærulea 942
capreolata 941
Catalpa 940
chelonoides 942
citrifolia 940
Copaja 942
crucigera 941
dichotoma ib.
echinata ib.
fluviatilis ib.
grandiflora 942
incarnata 941
indica 942
Keſera 941
Leucoxylon 942
longiſſima 941
paniculata ib.

Bignonia
pentaphylla 942
peruviana ib.
pubeſcens 941
radiata 942
radicans ib.
ſempervirens 940
ſpathacea 942
ſtans ib.
tomentoſa 940
triphylla 941
Unguis ib.

Binectaria 599, 615
peregrina 615

Biſcutella 967, 978
apetala 978
apula ib.
auriculata ib.
coronopifolia ib.
lævigata ib.
lyrata ib.
ſempervirens ib.

Biſerrula 1075, 1077, 1137
Pelecinus 1137

Bixa 774, 812
Orellana 812

Blackburnia 215, 258
pinnata 258

Blackea 741, 748
trinervia 748
triplinervia ib.

Blackwellia 743, 768
Juſſiei 768

BLADHIA 295, 404
criſpa 404
japonica ib.
villoſa ib.

Blæria 217, 249, 250
articulata 249

Blæria
ciliaris 249
ericoides ib.
muſcoſa 250
purpurea 249
puſilla ib.

Blaſia 1285, 1354
puſilla 1354

Blechnum 1283, 1300
auſtrale 1300
japonicum ib.
occidentale ib.
orientale ib.
radicans ib.
virginicum ib.

Blitum 3, 17
capitatum 17
chenopodioides ib.
virgatum ib.

Bobartia 85, 151
indica 151

Bocconia 740, 745
frutеſcens 745

Boehmeria 217, 267
caudata 267
cylindrica ib.
hirta ib.
littoralis ib.
ramiflora ib.

Boerhaavia 2, 14, 15
anguſtifolia 15
diffuſa ib.
erecta 14
hirſuta 15
repens ib.
ſcandens ib.
tetrandra ib.

Boletus 1285, 1432–1433
abietinus 1437

Boletus
aduſtus 1437
agaricoides 1435
aurantiacus 1433
Batſchii 1435
betulinus 1436
biennis 1433
bovinus 1432
Bulliardi 1434
Calceolus 1436
carolinianus 1434
cereus 1433
cinnabarinus 1436
cinnamomeus 1433
citrinus 1435
cornutus 1437
criſtatus 1435
decipiens 1437
dimidiatus 1432
elegans 1435
exaſperatus 1433
fagineus 1435
faſciatus ib.
faſciculatus 1433
Favus 1436
ferruginatus 1432
ferruginoſus 1437
fomentarius 1436
fragilis 1434
fraxineus 1436
frondoſus 1433
fulvus 1437
fuſcidulus 1433
fuſcus 1437
globatus ib.
granulatus 1432
hepaticus 1438
hirſutulus 1437
hirſutus 1434
hiſpidus 1437
hydnoides 1435
hypocrateriformis 1434
igniarius 1436

Boletus
imbricatus 1437
infundibuliformis 1434
lacrymans 1435
lacteus 1433
lapidum 1434
leptocephalus 1432
lipſienſis 1436
lobatus 1435
lucidus 1434
luteus 1432
Medulla panis 1438
membranaceus 1436
microporus 1435
mutabilis 1432
nigreſcens 1434
nitens 1436
numularius 1432
obliquatus 1435
obliquus 1438
odoratus 1437
palleſcens 1433
papyraceus 1433
perennis 1432
procerus 1434
purgans 1436
puſillus 1433
ramoſiſſimus ib.
ramoſus 1436
ramulorum 1435
reſupinatus 1437
rufus 1435
ſalicinus 1437
ſalignus 1436
ſanguineus ib.
ſcaber 1435
ſcalaris 1437
ſebaceus 1438
ſquamoſus 1434
ſtrobiliformis 1433
ſuaveolens 1437
ſuberoſus 1436
ſubtomentoſus 1434

Boletus
ſubveſcus 1434
ſulphureus 1436
ſupinus 1433
tuberculoſus 1435
tuberoſus 1433
umbilicatus 1434
verſicolor 1437
villoſus 1436
viſcidus 1432

Boltonia 1164, 1244
aſteroides 1244
glaſtifolia ib.

Bombax 1000, 1039, 1040
Ceiba 1040
Erianthos 1039
globiferum 1040
globoſum ib.
Goſſypium ib.
grandiflorum ib.
heptaphyllum ib.
pentandrum 1039
pyramidale 1040

Bonnetia 775, 814
paluſtris 814

Bontia 890, 963
daphnoides 963

Borago 291, 321
africana 321
indica ib.
longifolia ib.
officinalis ib.
orientalis ib.
verrucoſa ib.
zeylanica ib.

Boraſſus 527, 583
flabelliformis 583

Borbonia 1076, 1088
cordata 1088
crenata *ib.*
ericifolia *ib.*
lævigata *ib.*
lanceolata *ib.*
trinervia *ib.*
Boſea 305, 455
Yervemora 455
Brabejum 212, 248
ſtellulifolium 248
Braſenia 780, 853
Schreberi 853
Braſilium 301, 417
glabrum 417
hirſutum *ib.*
Braſſica 968, 988, 989
alpina 988
arvenſis *ib.*
auſtriaca *ib.*
campeſtris *ib.*
craſſifolia *ib.*
Eruca 989
Erucaſtrum *ib.*
muralis 983
Napus *ib.*
oleracea *ib.*
orientalis *ib.*
polymorpha *ib.*
Rapa *ib.*
ſinenſis *ib.*
veſicaria 989
violacea 988
BRATHYS 780, 852
juniperina 852
Breynia 304, 430
diſticha 430
Briza 88, 183
caroliniana 183
cynoſuroides *ib.*
Eragroſtis *ib.*
Briza
maxima 183
media *ib.*
minor *ib.*
virens *ib.*
Bromelia 522, 529
Acanga 529
Ananas *ib.*
bracteolata *ib.*
humilis *ib.*
Karates *ib.*
lingulata *ib.*
nudicaulis *ib.*
paniculata *ib.*
Pinguin *ib.*
Bromus 88, 188-191
alopecuros 189
ambiguus *ib.*
anguſtifolius *ib.*
aquaticus *ib.*
arvenſis *ib.*
aſper *ib.*
bifidus 188
ciliatus 189
criſtatus 191
dilatatus 189
diſtachyos 191
erectus 189
geniculatus *ib.*
giganteus 190
gracilis *ib.*
grandiflorus 189
hirſutus 190
japonicus 188
incraſſatus 189
jubatus 190
madritenſis 188
maſſilienſis 191
mollis 189
montanus 190
multiflorus 183
pauper 191
phleoides 190
Bromus
Phœnix 190
pinnatus *ib.*
Pluckenetii 191
poiformis 190
polyſtachyos 188
purgans 189
racemoſus 190
ramoſus *ib.*
rigens *ib.*
rubens *ib.*
ſcoparius *ib.*
ſecalinus 188
ſilvaticus 190
ſquarroſus 189
ſterilis 188
ſtipoides 189
ſtrictus 188
tectorum 190
triflorus 188
triticeus 191
villoſus 190
Broſimum 2, 12
Alicaſtrum 12
ſpurium *ib.*
Broſſæa 294, 377
coccinea 377
Browallia 888, 952
alienata 952
demiſſa *ib.*
elata *ib.*
humifuſa *ib.*
Brownea 998, 1028
coccinea 1028
grandiceps *ib.*
Brucea 220, 286
antidyſenterica 286
Brünnichia 661, 722
cirrhoſa 722
Brunnia 302, 410
abrotanoides 410
ciliata *ib.*

Biſſus 1285, 1395-1397
alutoſa 1396
aquatica ib.
atra ib.
aurea ib.
barbata ib.
bombycina ib.
cancellata ib.
candida ib.
conoidea ib.
coriacea ib.
cryptarum ib.
Flos aquæ ib.
Flos cobalti 1397
fulva 1396
globoſa ib.
nigra ib.
petræa ib.
phoſphorea ib.
rudiciformis ib.
ſanguinea ib.
ſeptica 1395
tremelloides 1397
velutina 1396

Cacalia 1162, 1195-1197
acaulis 1197
albifrons ib.
alpina ib.
Anteuphorbium 1195
appendiculata 1196
aſclepiadea ib.
atriplicifolia ib.
bipinnata 1197
carnoſa 1195
cordifolia 1196
cuneifolia 1195
echinata 1196
Ficoides 1195
haſtata 1196
incana ib.

Cacalia
Kleinia 1195
laciniata ib.
laurifolia ib.
odora ib.
ovata 1197
papillaris 1195
pendula ib.
Porophyllum 1196
radicans ib.
repens 1195
ſaracenica 1196
ſcandens ib.
ſemperviva 1195
ſonchifolia 1196
ſuaveolens ib.
ſuffruticoſa ib.
tomentoſa ib.
villoſa ib.

Cachrys 309, 478
Libanotis 478
odontalgica ib.
panacifolia ib.
ſicula ib.

Cactus 770, 784, 785
alatus 785
cochenillifer ib.
coquimbanus 784
curaſſavicus 785
Ficus indica ib.
flagelliformis ib.
grandiflorus ib.
heptaginus 784
hexagonus ib.
lanuginoſus ib.
mammillaris ib.
Melocactus ib.
moniliformis 785
nobilis 784
Opuntia 785
paraſiticus ib.
pendulus ib.

Cactus
pentagonus 784
Pereskia 785
peruvianus 784
Phyllanthus 785
Pitajaya 784
portulacifolius 785
repandus 784
Royeni ib.
ſpinoſiſſimus 785
tetragonus 784
triangularis 785
Tuna ib.

Cacucia 656, 693
coccinea 693

Cadaba 300, 405
farinoſa 405
glanduloſa ib.
rotundifolia ib.

Cadamba 647, 649
jasminiflora 649

Cadia 656, 667
arabica 667

Cænopteris 1283, 1321 ſq.
furcata 1321
rhizophylla ib.
rutæfolia ib.
vivipara 1322

Cæſalpinia 655, 672
Criſta 672
Sappan ib.
veſicaria ib.

Calamagroſtis 86, 171, 172
arenaria 172
arundinacea ib.
Arundo 171
bicolor 172
caneſcens ib.
conſpicua ib.

Calamagroſtis
epigeios 172
furcta ib.
Karka ib.
lanceolata ib.
Plinii ib.
villoſa 171
Calamus 526, 570
Rotang 570
Calceolaria 20, 39
Fothergillii 39
integrifolia ib.
nana ib.
perfoliata ib.
pinnata ib.
plantaginea ib.
Calea 1163, 1205
Amellus 1205
aſpera ib.
caroliniana ib.
jamaicenſis ib.
leptophylla ib.
oppoſitifolia ib.
pinifolia ib.
ſcoparia ib.
Calendula 1166, 1271 *ſq.*
arboreſcens 1272
arvenſis ib.
fruticoſa ib.
graminifolia ib.
hybrida ib.
nudicaulis ib.
officinalis ib.
oppoſitifolia ib.
pluvialis ib.
pumila ib.
rigida ib.
ſancta 1271
tomentoſa 1272
Tragus ib.
Calla 781, 863
æthiopica 863
paluſtris ib.
Callicarpa 211, 246
americana 246
ferruginea ib.
japonica ib.
integrifolia ib.
reticulata ib.
tomentoſa ib.
Callicocca 298, 370, 371
alba 370
glabra 371
gujanenſis ib
purpurea 370
tomentoſa ib.
Calligonum 777, 839
polygonoides 839
Calliſia 83, 121
repens 121
Callitriche 3, 17
autumnalis 17
brutia ib.
dubia ib.
verna ib.
Callixene 525, 556
magellanica 525, 556
Calodendrum 301, 417
capenſe 417
Calophyllum 774, 814
Akura 814
Calaba ib.
Inophyllum ib.
Soulatti ib.
Caltha 782, 883
paluſtris 883
Calycanthus 781, 862
fertilis 862
floridus ib.
præcox ib.
ſterilis ib.
Camex 296, 403
gujanenſis 403
Cambogia 774, 810
Gutta 810
Camellia 1000, 1069
japonica 1069
Saſanqua ib.
Cameraria 294, 438
anguſtifolia 438
gujanenſis ib.
latifolia ib.
Tamaquarina ib.
Campanula 297, 348-353
adpreſſa 353
alpeſtris 351
alpina ib.
altiflora 352
americana 349
aurea ib.
barbata 351
Bellardi 348
Bocconi ib.
bononienſis 350
capenſis 351
capillacea 349
carpatica ib.
cenifia 348
Cervicaria 350
ceſpitoſa 348
cinerea 350
criſpa 352
dichotoma 350

Aſpalathus
ſpinoſa 1091
thymifolia 1092
tridentata 1093
uniflora 1091
verrucoſa 1092

Aſparagus 525, 557
acutifolius 557
æthiopicus ib.
albus ib.
aphyllus ib.
aſiaticus ib.
capenſis ib.
declinatus ib.
falcatus ib.
horridus ib.
officinalis ib.
retrofractus ib.
ſarmentoſus ib.
ſtipularis ib.
verticillaris ib.

Aſperugo 292, 321
ægyptiaca 321
procumbens ib.

Aſperula 214, 235
ariſtata 235
arvenſis ib.
calabrica ib.
cynanchica ib.
hexaphylla ib.
lævigata ib.
odorata ib.
pyrenaica ib.
taurina ib.
tinctoria ib.

Aſphodelus 525, 553
altaicus 553
fiſtuloſus ib.
liburnicus ib.
luteus ib.
ramoſus ib.

Aſplenium 1283, 1301-1304
Adiantum nigrum 1304
alternifolium 1302
anguſtifolium 1301
anteriſcifolium 1303
bifolium 1302
bulbiferum 1304
caudatum 1303
Ceterach 1301
cicutarium 1304
cultrifolium 1302
dentatum ib.
dimidiatum 1303
diſſectum 1302
ebeneum ib.
eroſum ib.
flaccidum 1303
fragrans 1304
germanicum ib.
grandifolium 1302
Hemionitis 1301
japonicum 1303
lanceolatum ib.
lanceum 1301
leptophyllum 1304
lucidum 1303
marginatum 1302
marinum 1303
monanthemum 1302
Nidus 1301
nodoſum 1302
obliquum 1303
obtuſatum ib.
obtuſifolium 1302
plantagineum 1301
polidon 1302
præmorſum ib.
proliferum 1301
pumilum 1302
pygmæum 1303
rhizophorum ib.
rhizophyllum 1301
Ruta muraria 1304

Aſplenium
ſalicifolium 1302
Scolopendrium 1301
ſerratum ib.
ſorbifolium 1303
ſquamoſum ib.
ſtriatum ib.
tenerum ib.
Trichomanes ramoſum 1304
trichomanoides 1303
viride 1302

Aſſa 778, 839
exotica 839

Aſſonia 999, 1036
populnea 1036

Aſter 1164, 1230-1234
acris 1231
æſtivus 1232
alpinus ib.
Amellus 1232
annuus 1233
carolinianus 1230
ciliatus 1231
concolor 1232
cordifolius 1233
coriaceus 1232
corymboſus 1233
crinitus 1230
criſpus 1234
Cymbalariæ 1230
diffuſus 1234
divaricatus 1233
divergens 1234
dumoſus 1231
ericæfolius 1234
ericoides 1231
folioloſus ib.
fruticuloſus 1230
grandiflorus 1232

Aſter
hiſpidus 1234
holoſericeus ib.
hyſſopifolius 1231
indicus 1233
junceus ib.
lævis ib.
linariæfolius 1231
linifolius ib.
macrophyllus 1234
miſer 1233
multiflorus 1231
mutabilis 1234
nemoralis 1231
novæ Angliæ ib.
novi Belgii 1233
paludoſus 1232
paniculatus 1233
patens ib.
pendulus 1234
puniceus 1233
Radula 1234
reflexus 1230
rigidus 1231
ſalicifolius ib.
ſalicinus 1234
ſcaber 1233
ſibiricus 1232
ſinenſis 1234
ſpectabilis ib.
ſquarroſus 1232
tardiflorus 1234
tataricus ib.
taxifolius 1230
tenellus 1232
tenuifolius 1231
Tradeſcanti 1233
Tripolium 1232
umbellatus 1231
undulatus 1232
vernus ib.
Aſtragalus 1075, 1077, 1132-1137
alopecuroides 1132

Aſtragalus
alpinus 1134
alyſſoides 1136
Ammodytes 1135
ampullatus 1136
annularis 1133
arenarius ib.
aſper 1132
auſtriacus 1135
bæticus 1134
barbatus ib.
bicolor 1136
bohemicus 1132
campeſtris 1137
canadenſis 1133
capitatus ib.
caprinus 1136
carolinianus 1132
chriſtianus 1133
Cicer 1134
compactus 1135
contortuplicatus 1134
cornutus 1135
danicus 1134
daſyanthus 1137
deflexus 1133
denſifolius 1136
depreſſus 1137
Epiglottis 1134
emarginatus 1135
exſcapus 1136
falcatus 1133
galegiformis ib.
Glaux 1134
globoſus 1136
glycyphyllos 1135
hamoſus 1134
hians 1133
hirſutus 1136
hyſpidus 1134
Hypoglottis ib.
incanus 1137
lagopodioides 1135
laguroides 1137

Aſtragalus
lanatus 1137
latifolius ib.
Laxmanni 1134
leontinus 1135
leptophyllos 1137
lineatus 1135
lupulinus 1137
melilotoides 1132
microphyllus 1133
monſpeſſulanus 1137
montanus 1136
numularius ib.
Onobrychis 1133
pentaglottis 1134
peregrinus 1133
phyſodes 1137
piloſus 1132
Poterium 1135
pſoraloides 1136
Rauwolfii 1135
ſeſameus 1134
ſinenſis 1133
ſinicus 1135
ſpicatus 1137
Stella 1134
ſulcatus 1133
ſyriacus 1134
Tragacantha 1135
tragacanthoides ib.
trimeſtris ib.
uliginoſus 1133
uncatus 1136
uralenſis ib.
verticillaris ib.
veſicarius ib.
virescens 1132
Aſtrantia 308, 469
carniolica 469
Epipactis ib.
major ib.
minor ib.

Aſtronium 311, 499
graveolens 499

Athamanta 309, 475, 477
annua 477
Cervaria 476
condenſata ib.
cretenſis 477
daucoides ib.
Libanotis 476
Matthioli 477
Oreoſelinum 476
ſibirica ib.
ſicula ib.
ſinenſis 477

Athanaſia 1163, 1206 *ſqq.*
annua 1206
capitata ib.
cinerea 1207
crenata 1206
crithmifolia ib.
decuſſata 1208
dentata 1207
filiformis ib.
geniſtifolia ib.
graminifolia 1205
haſtata ib.
laxa 1207
linifolia ib.
maritima 1206
microphylla 1207
obovata 1206
paniculata ib.
parviflora 1207
paſſerinoides ib.
pectinata 1207
pinnata ib.
pubeſcens 1206
pumila 1207
pungens 1208
ſantolinoides ib.

Athanaſia
ſerrata 1207
ſeſſiliflora ib
ſquarroſa 1207
trifurcata 1206
trinervia ib
uniflora 1208
virgata ib.
viſcoſa 1207

Athenæa 601, 629
guianenſis 629

Atractobolus 1285, 1461
annularis 1461

Atractylis 1162, 1191, 1192
cancellata 1192
gummifera ib.
humilis ib.
Lancea ib.
mexicana ib.
oppoſitifolia ib.
ovata 1191
purpurea 1192

Atragene 782, 872
alpina 872
capenſis ib.
japonica ib.
polygama ib.
tenuifolia ib.
zeylanica ib.

Atraphaxis 526, 580
ſpinoſa 580
undulata ib.

Atriplex 306, 450, 451
alba 451
albicans 450
coriacea ib.

Atriplex
glauca 450
Halimus ib.
haſtata ib.
hortenſis 451
laciniata 450
littoralis 451
patula ib.
pedunculata ib.
portulacoides 450
roſea ib.
ſalicina 451
ſibirica 450
tatarica ib.
virgata 451

Atropa 296, 380, 381
arboreſcens 381
Belladonna ib.
fruteſcens ib.
Mandragora 380
phyſaloides 381
ſolanacea ib.

Aubletia 776, 812
aſpera 812
lævis ib.
Paturno ib.
Tiburua ib.

AUCUEA 216, 276
japonica 276

Avena 88, 192-194
aurata 193
brevis 192
bromoides 194
calicina 193
capenſis ib.
caroliniana 194
diſtichophylla 193
dubia 192
fatua 193
flaveſcens ib.
fragilis ib.

Avena
hiſpida 193
Loeflingiana 192
lupulina 193
lutea 192
montana ib.
nuda 193
penſilvanica 192
pratenſis 193
pubeſcens 192
purpurea ib.
rupeſtris 194
ſativa 192
Scheuchzeri 193
ſempervirens ib.
ſeſquitertia 192
ſetacea 193
ſibirica 192
ſpicata 194
ſterilis 193
ſtipiformis 192
ſtrigoſa ib.
verſicolor 194

Averrhoa 663, 729
Bilimbi 729
Carambola ib.

Avicennia 888, 963
nitida 963
reſinifera ib.
tomentoſa ib.

Axyris 86, 151
amarantoides 151
ceratoides ib.
hybrida ib.
proſtrata ib.

Ayenia 416
lævigata ib.
magna ib.
puſilla ib.
tomentoſa ib.

Azalea 294, 336
indica 336

Azalea
lapponica 336
nudiflora ib.
pontica ib.
procumbens ib.
roſmarinifolia ib.
viſcoſa ib.

Azima 215, 262
nova 262

Baccharis 1163, 1219 *ſq.*
arborea 1220
braſiliana ib.
Dioſcoridis ib.
fœtida 1219
halimifolia 1220
indica ib.
ivæfolia 1219
neriifolia 1220
viſcoſa ib.

Bacopa 293, 329
aquatica 329

Bæa 38
indica 38

Bæckea 598, 635
fruteſcens 635

Bæobotrys 298, 370
nemoralis 370

Baillieria 1166, 1271
aſpera 1271

Balanophora 2, 13
fungoſa 13

Ballota 885, 908
alba 908
diſticha ib.
lanata ib.
nigra ib.
ſuaveolens ib.

Baltimora 1166, 1259
recta 1269

Bambus 526, 579
Arundo 579

Banara 741, 747
gujanenſis 747

Baniſteria 662, 724, 725
angulata 724
benghalenſis ib.
brachiata ib.
dichotoma ib.
fulgens ib.
laurifolia ib.
longifolia 725
purpurea 724
Quapara ib.
ſinimarienſis ib.

Banksia 215, 262
dactyloides 262
dentata ib.
ericæfolia ib.
integrifolia ib.
muſculiformis ib.
pyriformis ib.
ſerrata ib.

Barbylus 600, 610
Brownii 610

Barnadeſia 1162, 1192
ſpinoſa 1192

Barreliera 959, 960
acanthoides 959
biſpinoſa 960
buxifolia 959
coccinea 960
criſtata ib.
hirſuta ib.
Hyſtrix 959
longiflora 960

Barreliera
longifolia 959
nitida 960
noctiflora ib.
Prionitis 959
pungens 960
ſolanifolia 959
triſpinoſa 960

BARRINGTONIA 1000, 1039
ſpecioſa 1039

Bartſia 887, 922
alpina 922
coccinea ib.
Gymnandra ib.
pallida ib.
viſcoſa ib.

Baſella 311, 507
alba 507
japonica ib.
lucida ib.
rubra ib.

BASSIA 740, 746
longifolia 746
obovata ib.

Baſſovia 296, 390
ſilvatica 390

Boſtera 1165, 1271
Houttuyni 1271

BATIS 217, 272
maritima 272

Batſchia 292, 315
caroliniensis 315

Bauhinia 655, 666, 667
aculeata 666
acuminata ib.
candida ib.
divaricata ib.
glabra ib.
inermis 667

Bauhinia
porrecta 666
purpurea ib.
ſcandens ib.
tomentoſa ib.
ungulata ib.
variegata ib.

BEFARIA 743, 748
æſtuans 748
reſinoſa ib.

Begonia 778, 835, 836
acutifolia 835
capenſis 836
dichotoma 835
Erminea 836
ferruginea 835
glabra ib.
grandifolia ib.
hirſuta 836
humilis 835
malabarica ib.
minor ib.
nana 836
obliqua 835
octopetala 836
urticæ 835

Bellis 1164, 1245
annua 1245
arabica ib.
perennis ib.

BELLIUM 1164, 1245
bellidioides 1245
minutum ib.

Bellonia 297, 360
aſpera 360
ſpinoſa ib.

Berberis 523, 575
cretica 575
ilicifolia ib.

Berberis
ſibirica 575
vulgaris ib.

BERGIA 662, 733
capenſis 733
glomerata ib.

Bertiera 298, 362
guianenſis 362

Beſleria 890, 935, 936
bivalvis 935
coccinea 936
criſtata 935
incarnata 936
lutea 935
melittifolia ib.
violacea ib.

Beta 306, 451, 452
Cicla 452
maritima ib.
patula 451
vulgaris ib.

Betonica 885, 905
alopecuros 906
heraclea ib.
hirſuta ib.
incana ib.
officinalis ib.
orientalis ib.
ſtricta ib.

Betula 218, 282, 283
alba 282
Alnus ib.
criſpa ib.
daurica 283
excelſa ib.
fruticoſa ib.
incana 282
lenta 283
nana ib.
nigra ib.
oblongata 282

Betula
papyracea 283
pendula 282
populifolia ib.
pumila ib.
ſerrulata ib.
Bidens 1163, 1194, 1195
bipinnata 1195
bulbata 1194
cernua ib.
frondoſa ib.
hirſuta ib.
minima ib.
nivea ib.
nodiflora ib.
piloſa ib.
ſcandens ib.
tenella ib.
tripartita ib.
verticillata ib.
Bignonia 889, 940-942
æquinoctialis 941
alba ib.
alliacea ib.
cærulea 942
capreolata 941
Catalpa 940
chelonoides 942
citrifolia 940
Copaja 942
crucigera 941
dichotoma ib.
echinata ib.
fluviatilis ib.
grandiflora 942
incarnata 941
indica 942
Keſera 941
Leucoxylon 942
longiſſima 941
paniculata ib.

Bignonia
pentaphylla 942
peruviana ib.
pubeſcens 941
radiata 942
radicans ib.
ſempervirens 940
ſpathacea 942
ſtans ib.
tomentoſa 940
triphylla 941
Unguis ib.
Binectaria 599, 615
peregrina 615
Biſcutella 967, 978
apetala 978
apula ib.
auriculata ib.
coronopifolia ib.
lævigata ib.
lyrata ib.
ſempervirens ib.
Biſerrula 1075, 1077, 1137
Pelecinus 1137
Bixa 774, 812
Orellana 812
Blackburnia 215, 258
pinnata 258
Blackea 741, 748
trinervia 748
triplinervia ib.
Blackwellia 743, 768
Juſſiei 768
BLADHIA 295, 404
criſpa 404
japonica ib.
villoſa ib.
Blæria 212, 249, 250
articulata 249

Blæria
ciliaris 249
ericoides ib.
muſcoſa 250
purpurea 249
puſilla ib.
Blaſia 1285, 1354
puſilla 1354
Blechnum 1283, 1300
auſtrale 1300
japonicum ib.
occidentale ib.
orientale ib.
radicans ib.
virginicum ib.
Blitum 3, 17
capitatum 17
chenopodioides ib.
virgatum ib.
Bobartia 86, 151
indica 151
Bocconia 740, 745
fruteſcens 745
Boehmeria 217, 267
caudata 267
cylindrica ib.
hirta ib.
littoralis ib.
ramiflora ib.
Boerhaavia 2, 14, 15
anguſtifolia 15
diffuſa ib.
erecta 14
hirſuta 15
repens ib.
ſcandens ib.
tetrandra ib.
Boletus 1285, 1432-1438
abietinus 1437

Boletus
aduſtus 1437
agaricoides 1435
aurantiacus 1433
Batſchii 1435
betulinus 1436
biennis 1433
bovinus 1432
Bulliardi 1434
Calceolus 1436
carolinianus 1434
cereus 1433
cinnabarinus 1436
cinnamomeus 1433
citrinus 1435
cornutus 1437
criſtatus 1435
decipiens 1437
dimidiatus 1432
elegans 1435
exaſperatus 1433
fagineus 1435
faſciatus ib.
faſciculatus 1433
Favus 1436
ferruginatus 1432
ferruginoſus 1437
fomentarius 1436
fragilis 1434
fraxineus 1436
frondoſus 1433
fulvus 1437
fuſcidulus 1433
fuſcus 1437
globatus ib.
granulatus 1432
hepaticus 1438
hirſutulus 1437
hirſutus 1434
hiſpidus 1437
hydnoides 1435
hypocrateriformis 1434
igniarius 1436

Boletus
imbricatus 1437
infundibuliformis 1434
lacrymans 1435
lacteus 1433
lapidum 1434
leptocephalus 1432
lypſienſis 1436
lobatus 1435
lucidus 1434
luteus 1432
Medulla panis 1438
membranaceus 1436
microporus 1435
mutabilis 1432
nigreſcens 1434
niteus 1436
numularius 1432
obliquatus 1435
obliquus 1438
odoratus 1437
palleſcens 1433
papyraceus 1438
perennis 1432
procerus 1434
purgans 1436
puſillus 1433
ramoſiſſimus ib.
ramoſus 1436
ramulorum 1435
reſupinatus 1437
rufus 1435
ſalicinus 1437
ſalignus 1436
ſanguineus ib.
ſcaber 1435
ſcalaris 1437
ſebaceus 1438
ſquamoſus 1434
ſtrobiliformis 1433
ſuaveolens 1437
ſuberoſus 1436
ſubtomentoſus 1434

Boletus
ſubveſcus 1434
ſulphureus 1436
ſupinus 1433
tuberculoſus 1435
tuberoſus 1433
umbilicatus 1434
verſicolor 1437
villoſus 1436
viſcidus 1432

Boltonia 1164, 1244
aſteroides 1244
glaſtifolia ib.

Bombax 1000, 1039, 1040
Ceiba 1040
Erianthos 1039
globiferum 1040
globoſum ib.
Goſſypium ib.
grandiflorum ib.
heptaphyllum ib.
pentandrum 1039
pyramidale 1040

Bonnetia 775, 814
paluſtris 814

Bontia 890, 963
daphnoides 963

Borago 291, 321
africana 321
indica ib.
longifolia ib.
officinalis ib.
orientalis ib.
verrucoſa ib.
zeylanica ib.

Boraſſus 527, 583
flabelliformis 583

Borbonia 1076, 1088
cordata 1088
crenata ib.
ericifolia ib.
lævigata ib.
lanceolata ib.
trinervia ib.
Boſea 305, 455
Yervamora 455
Brabejum 212, 248
ſtellulifolium 248
Braſenia 780, 853
Schreberi 853
Braſilium 301, 417
glabrum 417
hirſutum ib.
Braſſica 968, 988, 989
alpina 988
arvenſis ib.
auſtriaca ib.
campeſtris ib.
craſſifolia ib.
Eruca 989
Erucaſtrum ib.
muralis 988
Napus ib.
oleracea ib.
orientalis ib.
polymorpha ib.
Rapa ib.
ſinenſis ib.
veſicaria 989
violacea 988
BRATHYS 780, 852
juniperina 852
Breynia 304, 430
diſticha 430
Briza 88, 183
caroliniana 183
cynoſuroides ib.
Eragroſtis ib.
Briza
maxima 183
media ib.
minor ib.
virens ib.
Bromelia 522, 529
Acanga 529
Ananas ib.
bracteolata ib.
humilis ib.
Karatas ib.
lingulata ib.
nudicaulis ib.
paniculata ib.
Pinguin ib.
Bromus 88, 188-191
alopecuros 189
ambiguus ib.
anguſtifolius ib.
aquaticus ib.
arvenſis ib.
aſper ib.
bifidus 188
ciliatus 189
criſtatus 191
dilatatus 189
diſtachyos 191
erectus 189
geniculatus ib.
giganteus 190
gracilis ib.
grandiflorus 189
hirſutus 190
japonicus 188
incraſſatus 189
jubatus 190
madritenſis 188
maſſilienſis 191
mollis 189
montanus 190
multiflorus 188
pauper 191
phleoides 190
Bromus
Phœnix 190
pinnatus ib.
Pluckenetii 191
poiformis 190
polyſtachyos 188
purgans 189
racemoſus 190
ramoſus ib.
rigens ib.
rubens ib.
ſcoparius ib.
ſecalinus 188
ſilvaticus 190
ſquarroſus 189
ſterilis 188
ſtipoides 189
ſtrictus 188
tectorum 190
triflorus 188
triticeus 191
villoſus 190
Broſimum 2, 12
Alicaſtrum 12
ſpurium ib.
Broſſæa 294, 377
coccinea 377
Browallia 888, 952
alienata 952
demiſſa ib.
elata ib.
humiſuſa ib.
Brownea 998, 1028
coccinea 1028
grandiceps ib.
Brucea 220, 286
antidyſenterica 286
Brünnichia 661, 722
cirrhoſa 722
Brunnia 302, 410
abrotanoides 410
ciliata ib.

Brunnia
glutinoſa 410
lanuginoſa ib.
nodiflora ib.
paleacea ib.
radiata ib.
verticillata ib.

Brunsfelſia 887, 929
americana 929
undulata ib.

Bryonia 81, 103, 104
africana 104
alba ib.
cordifolia ib.
cretica ib.
dioica ib.
grandis ib.
japonica ib.
lacinioſa ib.
latebroſa ib.
palmata ib.
racemoſa ib.
ſcabra ib.
ſcabrella ib.
verrucoſa ib.

Bryum 1284, 1330-1338
acuminatum 1333
æſtivum 1336
affine 1335
agrarium 1333
albidum 1336
alpinum 1337
androgynum 1336
anguſtatum 1332
apocarpum 1334
aquaticum 1331
argenteum 1337
barbatum 1336
Bartramia 1335
baſiflorum 1332
bipartitum 1337
brevifolium 1338
calcarium 1337
calicinum 1336
capillaceum 1331
carneum 1337
Celſii ib.
ciliare 1332
ciliatum 1331
cirrhatum ib.
convolutum 1336
cricetorum 1338
criſpum 1335
cubitale 1338
curviroſtrum 1334
cuſpidatum 1332
dealbatum 1338
dendroides 1337
diaphanum 1335
Dickſoni 1334
Didymodon 1333
elongatum 1335
ericoides 1332
exſtinctorium ib.
faſciculare ib.
flaveſcens 1338
flexuoſum 1336
fontinalioides 1333
Heimii ib.
hercynicum 1336
hypnoides 1332
imberbe 1336
inclinatum 1331
indicum 1332
lanceolatum ib.
lycopodioides 1336
marginatum 1338
microcarpon 1332
minutum 1335
mnioides 1330
murale 1333
nutans 1331
obtuſum 1334
Octoblepharis 1331
ovatum 1334
pallidum 1332
paludoſum 1337
paraſiticum 1335
patens 1333
pennatum 1334
piloſum 1336
pomiforme 1330
pulvinatum 1331
puſillum 1333
pyriforme ib.
recurviroſtrum 1334
repens 1333
reticulatum 1337
rigidum 1336
rubrum 1331
rurale 1335
ſecundum 1333
ſeſſile 1334
ſetaceum ib.
ſilvaticum ib.
ſplachnoides 1337
ſquarroſum ib.
ſtelligerum 1334
ſtriatum 1335
ſubulatum 1333
tectorum 1335
tetragonum 1338
tortum 1332
tortuoſum 1333
triſarium 1331
truncatulum 1334
unguiculatum 1336
unilaterale 1335
ventricoſum 1337
verticillatum ib.
viridulum 1334
Zierii 1337

Bubon 309, 484
Galbanum 484
gummiferum ib.
lævigatum 484
macedonicum ib.

Bubon
rigidius 484
Buchnera 889, 951 952
æthiopica 952
americana 951
aſiatica 952
capenſis ib.
cernua 951
coccinea 952
cordifolia ib.
cuneifolia 951
elongata 952
grandiflora ib.
pinnatifida ib.
BUCIDA 660, 702
Buceras 702
Buddleja 212, 250
americana 250
capitata ib.
globoſa ib.
incompta ib.
occidentalis ib.
virgata ib.
Buffonia 218, 281
tenuifolia 281
Buginvillea 602, 632
braſilienſis 632
Büttneria 301, 404
carthagenenſis 404
cordata ib.
microphylla ib.
ovata ib.
ſcabra ib.
Bulbocodium 524
vernum ib.
BUMALDA 306, 463
trifolia 463
Bumelia 295, 397, 398
montana 397
nigra ib.
pallida ib.
pentagona 398
retuſa 397
rotundifolia 398
ſalicifolia ib.
Bunara
gujanenſis
Bunias 968, 991
ægypriaca 991
aſpera ib.
balearica ib.
Cakile ib.
cochlearioides ib.
cornuta ib.
Erucago ib.
myagroides ib.
orientalis ib.
ſpinoſa ib.
Bunium 309, 475
aromaticum 475
Bulbocaſtanum ib.
Buphthalmum 1165, 1257 *ſq.*
aquaticum 1257
arboreſcens ib.
durum ib.
fruteſcens ib.
grandiflorum 1258
graveolens 1257
helianthoides 1258
maritimum 1257
melitenſe ib.
pratenſe ib.
ramoſum ib.
ſalicifolium 1258
ſericeum 1257
ſpecioſiſſimum 1258
ſpinoſum 1257
Bupleurum 309, 469-471
anguloſum 469
arboreſcens 471
baldenſe 470
difforme 471
falcatum 470
flavum ib.
fruticeſcens ib.
fruticoſum ib.
Gerardi ib.
junceum ib.
longifolium ib.
nudum ib.
odontites 469
petræum 470
pyrenæum ib.
ranunculoides 469
rigidum 470
rotundifolium 469
ſemicompoſitum 470
ſpinoſum ib.
ſtellatum 469
tenuiſſimum 470
Burcarda 313, 514
villoſa 514
Burmannia 522, 531
biflora 531
diſticha ib.
Burſera 522, 575
gummifera 575
Butomus 645, 654
umbellatus 654
Buxbaumia 1284, 1325
aphylla 1325
folioſa ib.
Buxus 219, 286
dioica 286
ſempervirens ib.

Biſſus 1285, 1395-1397
aluſoſa 1396
aquatica ib.
atra ib.
aurea ib.
barbata ib.
bombycina ib.
cancellata ib.
candida ib.
conoidea ib.
coriacea ib.
cryptarum ib.
Flos aquæ ib.
Flos cobalti 1397
fulva 1396
globoſa ib.
nigra ib.
petræa ib.
phoſphorea ib.
rudiciformis ib.
ſanguinea ib.
ſeptica 1395
tremelloides 1397
velutina 1396

Cacalia 1162, 1195-1197
acaulis 1197
albifrons ib.
alpina ib.
Anteuphorbium 1195
appendiculata 1196
aſclepiadea ib.
atriplicifolia ib.
bipinnata 1197
carnoſa 1195
cordifolia 1196
cuneifolia 1195
echinata 1196
Ficoides 1195
haſtata 1196
incana ib.

Cacalia
Kleinia 1195
laciniata ib.
laurifolia ib.
odora ib.
ovata 1197
papillaris 1195
pendula ib.
Porophyllum 1196
radicans ib.
repens 1195
ſaracenica 1196
ſcandens ib.
ſemperviva 1195
ſonchifolia 1196
ſuaveolens ib.
ſuffruticoſa ib.
tomentoſa ib.
villoſa ib.

Cachrys 309, 478
Libanotis 478
odontalgica ib.
panacifolia ib.
ſicula ib.

Cactus 770, 784, 785
alatus 785
cochenillifer ib.
coquimbanus 784
curaſſavicus 785
Ficus indica ib
flagelliformis ib.
grandiflorus ib.
heptagonus 784
hexagonus ib.
lanuginoſus ib.
mammillaris ib.
Melocactus ib.
moniliformis 785
nobilis 784
Opuntia 785
paraſiticus ib.
pendulus ib.

Cactus
pentagonus 784
Pereskia 785
peruvianus 784
Phyllanthus 785
Pitajaya 784
portulacifolius 785
repandus 784
Royeni ib.
ſpinoſiſſimus 785
tetragonus 784
triangularis 785
Tuna ib.

Cacucia 656, 693
coccinea 693

Cadaba 300, 405
farinoſa 405
glanduloſa ib.
rotundifolia ib.

Cadamba 647, 649
jaſminiflora 649

Cadia 656, 667
arabica 667

Cænopteris 1283, 1321 ſq.
furcata 1321
rhizophylla ib.
rutæfolia ib.
vivipara 1322

Cæſalpinia 655, 672
Criſta 672
Sappan ib.
veſicaria ib.

Calamagroſtis 86, 171, 172
arenaria 172
arundinacea ib.
Arundo 171
bicolor 172
caneſcens ib.
conſpicua ib.

Calamagroſtis
epigeios 172
furcata ib.
Karka ib.
lanceolata ib.
Plinii ib.
villoſa 171

Calamus 526, 570
Rotang 570

Calceolaria 20, 39
Fothergillii 39
integrifolia ib.
nana ib.
perfoliata ib.
pinnata ib.
plantaginea ib.

Calea 1163, 1205
Amellus 1205
aſpera ib.
caroliniana ib.
jamaicenſis ib.
leptophylla ib.
oppoſitifolia ib.
pinifolia ib.
ſcoparia ib.

Calendula 1166, 1271 *ſq.*
arboreſcens 1272
arvenſis ib.
fruticoſa ib.
graminifolia ib.
hybrida ib
nudicaulis ib.
officinalis ib.
oppoſitifolia ib.
pluvialis ib.
pumila ib.
rigida ib.
ſancta 1271
tomentoſa 1272
Tragus ib.

Calla 781, 863
æthiopica 863
paluſtris ib.

Callicarpa 211, 246
americana 246
ferruginea ib.
japonica ib.
integrifolia ib.
reticulata ib.
tomentoſa ib.

Callicocca 298, 370, 371
alba 370
glabra 371
guianenſis ib
purpurea 370
tomentoſa ib.

Calligonum 777, 839
polygonoides 839

Calliſia 83, 121
repens 121

Callitriche 3, 17
auctumnalis 17
bruttia ib.
dubia ib.
verna ib.

Callixene 525, 556
magellanica 525, 556

Calodendrum 301, 417
capenſe 417

Calophyllum 774, 814
Akara 814
Calaba ib.
Inophyllum ib.
Soulattri ib.

Caltha 782, 883
paluſtris 883

Calycanthus 781, 862
fertilis 862
floridus ib.
præcox ib.
ſterilis ib.

Camex 296, 403
gujanenſis 403

Cambogia 774, 810
Gutta 810

Camellia 1000, 1069
japonica 1069
Saſangua ib.

Cameraria 294, 438
anguſtifolia 438
gujanenſis ib.
latifolia ib.
Tamaquarina ib.

Campanula 297, 348-353
adpreſſa 353
alpeſtris 351
alpina ib.
altiflora 352
americana 349
aurea ib.
barbata 351
Bellardi 348
Bocconi ib.
bononienſis 350
capenſis 351
capillacea 349
carpatica ib.
cenisia 348
Cervicaria 350
ceſpitoſa 348
cinerea 350
criſpa 352
dichotoma 350

Campanula
edulis 350
Elatines 351
erinoides 352
Erinus ib.
faſciculata 353
fragilis ib.
fruticoſa 352
glauca 353
glomerata 350
gracilis 352
graminifolia 350
grandiflora 349
hederacea 351
heterophylla 352
hiſpidula 350
hybrida 352
interrupta ib.
laciniata 351
latifolia 350
lilifolia 349
limonifolia 351
linearis 349
lobelioides ib.
marginata 353
Medium 350
mollis 351
nitida 352
patula 348
pedunculata 352
pentagonia ib.
peregrina 351
perfoliata ib.
perſicifolia 348
petræa 350
poroſa 349
procumbens 352
pulla 348
puſilla ib.
pyramidalis 349
rapunculoides 350
Rapunculus 348
rhomboidea 349
rotundifolia 348

Campanula
ſaxatilis 351
Scheuchzeri 348
ſeſſiliflora 352
ſibirica 351
ſpeculum 352
ſpicata 351
ſtricta ib.
tenella 349
tetraphylla 353
thyrſoidea 350
Trachelium ib.
tridentata 351
triphylla 353
undulata 349
unidentata ib.
uniflora 348
urticæfolia 350
valdenſis 351
verticillata 353
veſula 348
zoyſii 349
Camphoroſma 217, 280, 281
acutum 281
glabrum ib.
monſpelienſe 280
paleaceum 281
Pteranthus ib.
Cananga 782, 868
Uregu[illegible] 868
CANARINA 522, 577
Campanula 577
CANARIUM 300, 405
commune 405
CANELLA 741, 749
alba 749
Canephora 302, 372
madagaſcarienſis 372

Canna 1, 5
anguſtifolia 5
glauca ib.
indica ib.
juncea ib.
Cannabis 305, 457
ſativa 457
Canſcora 216, 262
renurticoſa 262
Canſiera 216, 280
Rheedii 280
Cantua 294, 347
peruviana 347
Cantuſſa 656, 677
exotica 677
Capparis 774, 806, 807
Baducca 806
Breynia 807
Carandas 806
como,a 807
cynophallophora 806
Dahi 807
erythrocarpos 806
Euſtachiana 807
exſtipulata ib.
ferruginea 806
flexuoſa ib.
frondoſa ib.
grandis 807
haſtata ib.
horrida 806
jamaicenſis 807
linearis ib.
longifolia 806
mithridatica 807
nemoroſa ib.
oblongifolia ib.
pulcherrima ib.
ſepiaria 806
ſiliquoſa ib.
ſpinoſa ib.

Capparis
tenuifolia 807
toruloſa 806
verrucoſa 807
zeylanica 806
Capraria 889, 947
biflora 947
cruſtacea ib.
durantifolia ib.
humilis ib.
lanceolata ib.
lucida ib.
undulata ib.
uniflora ib.
Capſicum 296, 387
annuum 387
baccatum ib.
fruteſcens ib.
groſſum ib.
ſinenſe ib.
CAPURA 575
purpurata 575
Caquepiria 647, 651
Bergkia 651
Caraipa 773, 821
anguſtifolia 821
latifolia ib.
longifolia ib.
parvifolia ib.
Cardamine 968, 979, 980
africana 980
amara ib.
aſarifolia 979
bellidifolia ib.
chelidonia 980
græca ib.
hirſuta ib.
impatiens ib.
nivalis 979
nudicaulis ib.
perviflora 980
petræa 979
pratenſis 980
reſed folia ib.
trifolia ib.
virginica ib.
Cardioſpermum 603, 642
Corindum 642
grandiflorum ib.
Halicacabum ib.
Carduus 1162, 1185-1189
acanthoides 1186
acaulis 1189
altiſſimus 1188
arabicus 1186
argentatus 1187
auſtralis ib.
Banjarti 1188
canus 1187
carlinæfolius ib.
carlinoides ib.
carolinianus 1186
Caſabonæ 1188
chius 1187
ciliatus 1188
criſpus 1186
cyanoides ib.
defloratus 1187
diſſectus ib.
eriophorus 1188
flaveſceus ib.
gnaphalioides 1189
helenioides ib.
heterophyllus ib.
lanceolatus 1186
leucographus ib.
linearis 1188
marianus 1189
mollis 1188
monſpeſſulanus 1187
nutans ib.
Carduus
paluſtris 1186
paniculatus 1187
pannonicus ib.
parviflorus ib.
pectinatus ib.
peregrinus 1186
polyanthemus ib.
paniceus 1188
pycnocephalus 1186
rigens 1188
rivularis ib.
ſcaber 1189
ſerratuloides 1188
ſpinoſiſſimus 1186
ſtellatus 1188
ſyriacus 1189
tataricus ib.
tuberoſus 1187
virginianus 1188
Carex 84, 137-147
acuta 144
Agaſtachys 145
alpina 143
arenaria 139
argentea 143
aſpera 141
atrata 146
baldenſis 139
bifurca 145
brachyſtachys 146
brizoides 139
brunnea 140
caneſcens 141
capillaris 142
capitata 138
caryophyllea 142
cernua 146
ceſpitoſa 142
chordorhiza 139
curvula 140
cyperoides 139
diandra 145

Carex
digitata 141
dioica 138
diſſimilis 144
diſtans 143
diſticha 140
echinata ib.
elegans 143
elongata 140
erecta 145
ericetorum 142
ferax 146
ferruginea 143
filiformis 141
flacca 145
Flagellum 138
flava 141
fœtida 140
folliculata 142
frigida 146
fuſca ib.
glauca 145
globularis 142
glomerata 141
gracilis 144
gynobaſis ib.
Haleonaſter 139
Halleri 138
hermaphrodita 139
hirta 144
hirtella 138
hordeoſtichos 145
humilis 143
japonica ib.
inæqualis 146
indica 140
juncifolia 142
lævis 138
laſiocarpa 145
latifolia 138
leporina 139
leptoſtachys 143
Lecoglochin 139
limoſa 142

Carex
lithoſperma 137
lobata 140
loliacea ib.
marcida 146
microſtachya 140
miliacea 144
mitis 138
mixta 146
montana 141
muricata 140
mutabilis 143
myoſuroides 147
nemoroſa 143
nutans 146
oblonga ib.
pallefcens 142
paluſtris 145
panicea 142
paniculata 141
paradoxa 145
patula 144
pedata 141
pendula 143
pilulifera 141
poæformis 138
Poireti 140
polygama 145
præcox 140
proſtrata 142
Pſeudo-cyperus 146
pulicaris 138
pumila 144
quinata 146
remota 140
rhizantha 144
ſaxatilis 141
Scheuchzeri 144
ſempervirens ib.
ſilvatica 143
ſinenſis 144
ſpadicea ib.
ſpicata 139
ſplendida 142

Carex
ſquarroſa 138
ſubulata ib.
tenuifolia 142
ternaria 145
tomentoſa 141
torſacea 145
triceps 142
triſtachya 141
uliginoſa 139
uncinata 138
verna 143
veſicaria 144
vulpina 139

Carica 659, 701
Papaya 701
Poloposa ib.
ſpinoſa ib.

Cariſſa 295, 433
Carandes 433
edulis ib.
ſpinarum ib.

Carlina 1162, 1191
acaulis 1191
atractyloides ib.
corymboſa ib.
involucrata ib.
lanata ib.
pyrenaica ib.
racemoſa ib.
vulgaris ib.
xeranthemoides ib.

CAROLINEA 1000, 1039
inſignis 1039
princeps ib.

CAROXYLON 302, 422
Salſola 422

Carpeſium 1163, 1219
abrotanoides 1219
cernuum ib.
Carphalæa 213, 264
madagaſcarienſis 264
Carpinus 742, 754, 755
Betulus 754
caroliniana ib.
orientalis 755
Oſtrya 754
virginiana 755
Carpodetus 300, 402
ſerratus 402
Carthamus 1162, 1192, 1193
arboreſcens 1192
cæruleus ib.
Carduncellus ib.
carolinianus ib.
corymboſus 1193
creticus ib.
dentatus 1192
lanatus 1193
mitiſſimus 1192
ſalicifolius ib.
tinctorius ib.
tingitanus 1193
tomentoſus 1192
Carum 310, 491
Carvi 491
CARYOCAR 779, 839
nuciferum 839
Caryophyllus 770, 822
aromaticus 822
Caryota 773, 805
urens 805
Caſearia 660, 700
aculeata 700

Caſearia
nitida 700
parviflora ib.
Caſſia 655, 667-671
Abſus 668
alata 670
anguſtifolia ib.
Apucuita 668
Aſhrek ib.
atomaria 669
auriculata 670
bacillaris 668
bicapſularis ib.
biflora 669
bracteata 670
caroliniana 668
Chamæcriſta 671
Cryſta ib.
diphylla 667
emarginata 668
falcata ib.
Fiſtula 669
flexuoſa 671
frondoſa 670
glanduloſa 671
grandis 670
hirſuta 669
javanica 670
lanceolata 669
liguſtrina 670
lineata 669
longiſiliqua 668
marilandica 670
mimoſoides 671
multiglanduloſa 669
multiſiliqua 670
nictitans 671
nigricans 670
obtuſifolia 668
occidentalis 669
patula ib.
piloſa ib.
planiſiliqua ib.

Caſſia
procumbens 671
ruſcifolia 669
Senna ib.
ſennoides 668
ſenſitiva 669
ſericea 668
ſerpens 669
ſinenſis ib.
Sophera 670
ſtipularia ib.
Sunſub 668
ſurattenſis 670
Tagera 668
tenuiſſima 670
tomentoſa ib.
Tora 668
viminea ib.
virgata 670
Caſſine 311, 497
capenſis 497
Maurocenia ib.
Peragua ib.
Caſſipurea 771, 796
gujanenſis 796
Caſſytha 647, 653
corniculata 653
filiformis ib.
zeylanica ib.
CASTILLEJA 886, 921
fiſſifolia 921
integrifolia ib.
CASUARINA 2, 13
equiſetifolia 13
nodiflora ib.
ſtricta ib.
toruloſa ib.
Catananche 1161, 1183, 1184
cærulea 1183

Catananche
græca 1184
lutea 1183

Catesbæa 213, 243
longiflora 243
parviflora ib.

Catha 301, 411
inermis 411
ſpinoſa ib.

Catinga 770, 788
aromatica 788
moſchata ib.

Caturus 89, 202
ſpiciflorus 202

Caucalis 308, 472, 473
anguſtifolia 473
Anturiſcus ib.
daucoides 472
glabra 473
grandiflora 472
helvetica 473
latifolia 472
leptophylla 473
maritima ib.
mauritanica ib.
nodoſa ib.
orientalis ib.
pumila ib.
ſcandicina ib.
virgata ib.

Caucanthus 661, 726
Forskăhlei 726

Cautſchua 996, 1007
elaſtica 1007

Cavanilla 999, 1037, 1038
acutangula 1037
angulata ib.
decanthera ib.
ferruginea 1038

Cavanilla
ovata 1038
palmata 1037
phœnicea 1038
punctata 1037
tiliæfolia ib.
tomentoſa ib.
umbellata ib.

Ceanothus 300, 402, 403
africanus 402
americanus ib.
aſiaticus ib.
capſularis 403
reclinatus 402

Cecropia 22, 71
peltata 71

CEDRELA 301, 416
odorata 416

Cedrota 601, 629
gujanenſis 629

Celaſtrus 300, 405, 406
acuminatus 406
alatus ib.
bullatus ib.
buxifolius ib.
caſſinoides ib.
crenatus ib.
edulis ib.
filiformis ib.
integrifolius ib.
linearis ib.
lucidus ib.
microphyllus ib.
myrtifolius ib.
octogonus ib.
orbiculatus ib.
parviflorus ib.
procumbens ib.
punctatus ib.
pyracanthus ib.

Celaſtrus
ſcandens 405
ſtriatus 406
undulatus ib.

Celoſia 304, 425, 426
argentea 425
baccata ib.
caſtrenſis ib.
caudata ib.
coccinea ib.
corymboſa ib.
criſtata ib.
gnaphaloides ib.
lanata ib.
margaritacea ib.
nodiflora ib.
paniculata ib.
procumbens ib.
pyramidalis 426
trigyna 425
virgata ib.

Celſia 889, 938
Arcturus 938
cretica ib.
linearis ib.
orientalis ib.

Celtis 305, 456
auſtralis 456
Lima ib.
occidentalis ib.
orientalis ib.

Cenchrus 85, 150
capitatus 150
carolinianus ib.
ciliaris ib.
echinatus ib.
fruteſcens ib.
granularis ib.
lappaceus ib.
muricatus ib.
racemoſus ib.
ſetoſus ib.
tribuloides ib.

Digitized by Google

Centaurea 1165, 1263-1268
acaulis 1265
ægyptiaca 1268
alba 1266
alpina 1263
amara 1266
anguſtifolia ib.
argentea 1264
aſpera 1268
aurea ib.
babylonica 1266
Behen ib.
benedicta 1268
bracteata 1264
Calcitrapa 1263
Calcitrapoides ib.
capillata 1265
Carduncellus 1266
caroliniana 1265
Centaureum 1263
Centauroides 1268
ceſpitoſa ib.
cichoracea 1267
Cineraria 1264
collina 1268
conifera 1266
Crocodilium 1267
Crupina 1264
Cyanus ib.
diluta 1265
eriophora 1268
erucifolia 1264
galactites 1267
glaſtifolia 1266
humilis ib.
hiſſopifolia 1265
Jacea ib.
Isnardi 1267
linifolia 1265
Lippii 1264
maxima ib.
melitenſis 1268

Centaurea
montana 1264
moſchata 1263
Moſchus ib.
mucronata 1264
muricata 1267
napifolia ib.
nigra 1264
nudicaulis 1266
orientalis 1265
paniculata 1264
pectinata 1265
peregrina 1267
phrygia 1265
procumbens 1266
pullata 1264
pumila 1267
radiata ib.
raguſina 1265
repens 1266
Rhapontica ib.
romana 1267
rupeſtris 1268
ſalmantica 1267
Scabioſa 1265
ſempervirens 1264
ſeridis 1267
ſeſſilis ib.
ſibirica 1265
ſicula 1268
ſolſtitialis ib.
ſonchifolia 1267
ſphærocephala ib.
ſpinoſa 1264
ſplendens 1266
Stoebe 1264
ſtrobilacea 1265
tatarica ib.
tingitana 1267
uniflora 1265
Venetum 1267
Centunculus 211, 255
minimus 255

Cephaëlis 298, 372
axillaris 372
elata ib.
muſcoſa ib.
violacea ib.
Cephalanthus 210, 227
occidentalis 227
Ceranthus 19, 26
Schreberi 26
Ceraſtium 663, 736-738
alpinum 737
aquaticum ib.
arvenſe ib.
dichotomum ib.
dioicum ib.
illyricum 738
latifolium 737
lineare ib.
manticum ib.
maximum ib.
pentandrum ib.
perfoliatum 736
procumbens 737
refractum 738
repens 737
rigidum 738
ſemidecandrum 737
ſtrictum ib.
ſuffruticoſum ib.
tomentoſum ib.
viſcoſum 736
vulgatum 737
Ceratocarpus 3, 17
arenarius 17
Ceratonia 303, 431
chilenſis 431
Siliqua ib.

Ceratophyllum 740, 746
demerſum 746
ſubmerſum ib.
Ceratoſanther 81, 102
tuberoſa 102
Ceratoſtema 659, 676
peruvianum 676
Cerbera 295, 433
Ahovai 433
Manghas ib.
parviflora ib.
Thevetia ib.
Cercis 655, 666
canadenſis 666
Siliquaſtrum ib.
Cerinthe 291, 320
major 320
minor ib.
Ceropegia 294, 439
biflora 439
Candelabrum ib.
ſagittata ib.
tenuifolia ib.
Ceſtrum 296, 388, 389
auriculatum 388
diurnum ib.
fœtidum 389
hirtum ib.
laurifolium 388
nocturnum ib.
Parqui ib.
tomentoſum ib.
toxicarium ib.
veſpertinum ib.
Chadara 775, 815
arborea 815
velutina ib.
Chærophyllum 487, 488
alpinum 487
arboreſcens 488
ariſtatum ib.
aromaticum ib.
aureum ib.
bulboſum 487
Cicutaria 488
coloratum ib.
hirſutum ib.
ſcabrum ib.
ſilveſtre 487
tremulum 488
Chætocarpus 211, 248
Ponteria 248
Chalcas 658, 678
paniculata 678
Chamærops 527, 584
humilis 584
Chamira 967, 984
cornuta 984
Chamitis 310, 491
integrifolia 491
trifurcata ib.
Chara 2, 14
flexilis 14
hiſpida ib.
tomentoſa ib.
vulgaris ib.
Cheiranthus 967, 984, 985
alpinus 985
annuus 984
calloſus ib.
canus 985
Cheiri ib.
chius ib.
eryſimoides 984
Cheiranthus Farſetia 985
feneſtralis 984
fruticuloſus ib.
helveticus ib.
incanus ib.
littoreus ib.
maritimus 985
montanus ib.
mutabilis ib.
ſalinus 984
ſcapiger ib.
ſinuatus ib.
ſtrictus 985
tenuifolius ib.
tricuſpidatus ib.
trilobus 984
triſtis 985
villoſus ib.
Chelidonium 774, 809
corniculatum 809
dodecandrum ib.
Glaucium ib.
hybridum ib.
japonicum ib.
majus ib.
Chelidurus 82, 105
ignotus 105
Chelone 890, 928
glabra 928
hirſuta ib.
obliqua ib.
Pentſtemon ib.
ruellioides ib.
Chendea 304, 426
diffuſa 426
Chenopodium 306, 448-450
album 449
ambroſioides ib.
anthelminticum ib.

Chenopodium
ariſtatum 449
atriplicis 448
Bonus Henricus ib.
Botrys 449
caudatum ib.
glaucum ib.
guineenſe ib.
hybridum ib.
laterale 450
maritimum ib.
multifidum 449
murale ib.
oppoſitifolium 450
polyſpermum 449
punctulatum 448
rubrum ib.
Scoparia 449
ſepium ib.
ſericeum 450
ſerotinum 449
triangulare 448
urbicum ib.
viride 449
Vulvaria ib.

Cherleria 661, 721
ſedoides 721

Chimarrhis 297, 370
cymoſa 370

Chiococca 298, 366
barbata 366
paniculata ib.
racemoſa ib.

Chionanthus 19, 26
caribæa 26
compacta ib.
Ghaeri ib.
incraſſata ib.
virginiana ib.
zeylanica ib.

Chironia 294, 391 392
angularis 391
baccifera 392
campanulata 391
decandra 392
dichotoma 391
dodecandra 392
fruteſcens ib.
jaſminoides 391
lanceolata ib.
linoides ib.
lychnoides ib.
nudicaulis ib.
tetragona 392
trinervia 391

CHLORA 600, 618
dodecandra 618
imperfoliata ib.
perfoliata ib.
quadrifolia ib.

Chloranthus 216, 280
inconſpicuus 280

Chloris 86, 163
ciliata 163
cruciata ib.
petræa ib.
polydactyla ib.
radiata ib.

Chomelia 212, 245
ſpinoſa 245

Chondrilla 1161, 1173
crepoides 1173
juncea ib.
nudicaulis ib.

Chordoſtylum 1286, 1484 *ſq.*
byſſoides 1485
capillare 1485
Clavaria ib.
filiforme 1485

Chordoſtylum
hiſpidulum 1485
penicillatum ib.

Chryſanthemum 1164, 1247 *ſq.*
Achilleæ 1247
alpinum ib.
arcticum 1248
atratum 1247
Balſamita ib.
bipinnatum 1248
carolinianum 1247
coronarium 1248
corymboſum 1247
floſculoſum 1248
fruteſcens 1247
graminifolium ib.
japonicum 1248
indicum ib.
inodorum 1247
italicum 1248
Leucanthemum 1247
millefoliatum 1248
monſpelienſe 1247
montanum ib.
Myconis 1248
paludoſum ib.
pectinatum 1248
pinnatifidum ib.
ſegetum ib.
ſerotinum 1247

CHRYSITRIX 777, 828
capenſis 828

Chryſobalanus 771, 796
Icaco 796

Chryſocoma 1162, 1203 *ſq.*
acaulis 1204
biflora ib.
cernua 1203

Chryſocoma
ciliata 1203
Coma aurea ib.
dichotoma ib.
fruticoſa ib.
gigantea 1204
graminifolia ib.
Linoſyris 1203
montana ib.
odoratiſſima 1204
oppoſitifolia 1203
paniculata 1204
patula 1203
piloſa ib.
purpurea 1204
ramoſa ib.
ſcabra 1203
ſericea ib.
tomentoſa ib.
uniflora 1204
villoſa ib.
Chryſogonum 1166, 1270
virginianum 1270
Chryſophyllum 296, 395, 396
argenteum 396
Cainito 395
glabrum 396
Macucu ib.
microcarpum ib.
monopyrenum 395
Chryſoſplenium 661, 704
alternifolium 704
oppoſitifolium ib.
Chuncoa 660, 702
amazonia 702
Chuquiraga 1163, 1205
Juſſiei 1205
Cicca 220, 287
diſticha 287
Cicer 1078, 1113
arietinum 1113
Cichorium 1161, 1184
Endivia 1184
Intybus ib.
ſpinoſum ib.
Cicuta 310, 485
bulbifera 485
maculata ib.
perennans ib.
viroſa ib.
Cienfuegoſia 1000, 1060
digitata 1060
Cimicifuga 778, 839
fœtida 839
Cinchona 297, 361
anguſtifolia 361
brachycarpa ib.
caribæa ib.
corymbifera ib.
floribunda ib.
montana ib.
officinalis ib.
ſpinoſa ib.
Cineraria 1164, 1237 - 1240
alata 1239
Amelloides ib.
americana ib.
aurea ib.
aurita 1238
cacalioides ib.
canadenſis 1239
capillacea ib.
carolinienſis 1240
cordifolia 1238
Cineraria
criſpa 1238
cruenta ib.
cymbalarifolia 1237
denticulata 1239
diſcolor ib.
elongata 1238
geifolia 1237
glabra 1238
glauca ib.
haſtifolia 1239
humifuſa 1237
japonica 1238
integrifolia ib.
lanata 1238
lineata 1239
linifolia 1238
lobata 1239
longifolia 1238
malvæfolia ib.
maritima 1239
multiflora 1240
paluſtris 1239
perfoliata 1240
purpurata 1239
repanda 1240
rotundifolia ib.
ſcapiflora ib.
ſenecionis 1239
ſibirica 1238
ſonchifolia 1239
tuſſilaginis 1238
viſcoſa 1239
Ciponima 773, 798
guianenſis 798
Circæa 21, 27
alpina 27
lutetiana ib.
Ciſſampelos 995, 1006
Caapeba 1006
capenſis ib.
fruticoſa ib.

Ciſſampelos
Pareira 1006
ſmilacina ib.

Ciſſus 216, 255, 256
acida 256
cordifolia 255
digitata 256
glanduloſa ib.
heptaphylla ib.
quadrangularis ib.
ſicyoides 255
terndta 256
trifoliata ib.
vitiginea 255

Ciſtus 775, 822-825
ægyptiacus 824
albidus 823
alternifolius
anglicus 824
anguſtifolius 825
apenninus ib.
arabicus ib.
calicinus 824
canadenſis ib.
canarienſis 825
canus 823
capenſis ib.
carolinianus 824
creticus 823
criſpus ib.
elongatus
fœtidus 825
Fumana 823
glutinoſus 825
guttatus 824
halimifolius 823
Helianthemum 825
hirtus ib.
hybridus
incanus 823
italicus 824
ladaniferus 822
lævipes 823
laurifolius ib.
lavandulifolius
laxus 823
ledifolius 824
Libanotis 822
Lippii 824
marifolius 823
medius 822
monſpelienſis ib.
mutabilis 825
nizoticus 824
numularius 825
œlandicus 824
piloſus 825
polifolius ib.
populifolius 823
racemoſus 825
roſeus 823
ſalicifolius 824
ſalvifolius 823
ſcabroſus 824
ſericeus 825
ſerpyllifolius ib.
ſquamatus ib.
ſtipulatus ib.
ſurrejanus ib.
ſyriacus 824
thymifolius 825
Tuberaria 824
umbellatus 823
vaginatus ib.
villoſus ib.

Citharexylum 890, 942, 943
caudatum 943
cinereum 942
erectum 943
Melanocardium ib.
paniculatum ib.
quadrangulare ib.
ſubſerratum ib.
villoſum 943

Citrus 1149, 1152, 1153
Aurantium 1153
chilenſis 1152
decumana 1153
japonica ib.
Medica 1152
ſpinoſa ib.

Clathrus 1286, 1449
cancellatus 1449

Claucena 600, 610
javenſis 610

Clavaria 1286, 1442-1445
aſcendens 1445
anthocephala 1444
atra 1443
atro-purpurea ib.
bifida 1444
brachiata ib.
capillaris 1445
ceſpitoſa 1443
coralloides 1444
cornea 1443
Cornu Alces 1444
Cornu Cervi ib.
cornuta ib.
corticalis ib.
criſpa ib.
cylindrica 1445
damæcornis 1444
delicatula 1445
elveloides 1443
farinoſa 1445
faſtigiata 1444
fiſtuloſa 1445
fuſca 1443
glabra 1442
gracilis 1444

Clavaria
granulata 1445
inæqualis 1443
lumbricalis 1445
media ib.
muſcoides 1444
ophioglofſoides 1443
paraſitica 1445
pedunculata ib.
phalloides ib.
piſtillaris 1442
placorhiza 1445
plebeja 1444
polymorpha 1445
purpurea 1443
reſinoſorum ib.
ſerpentina ib.
ſimpliciſſima ib.
ſubdiviſa ib
tubuloſa ib.
vermicularis 1444
viridis 1443

Claytonia 423
Portulacaria 423
ſibirica ib.
virginica ib.

Clematis 782, 872-874
cirrhoſa 872
criſpa ib.
dioica 873
erecta 874
Flammula 873
florida ib.
Forſteri ib.
hexapetala ib.
japonica 872
integrifolia 874
maritima ib.
ochroleuca ib.
orientalis 873
Pallaſii ib.
paniculata ib.

Clematis
reticulata 873
ſinenſis ib.
Viorna ib.
virginiana 872
Vitalba 873
Viticella ib.

Cleome 968, 993, 994
aculeata 993
anguſtifolia ib.
arabica ib.
capenſis ib.
Chelidonii 994
digitata 993
dodecandra 994
felina ib.
fruticoſa ib.
gigantea 993
gujanenſis 994
heptaphylla ib.
icoſandra ib.
juncea ib.
monophylla 993
ornithopodioides ib.
pentaphylla 994
polygama ib.
procumbens 993
ſerrata ib.
ſpinoſa ib.
tenella 994
triphylla ib.
violacea 993
viſcoſa 994

Cleonia 886, 921
luſitanica 921

Clerodendrum 890, 962
calamitoſum 962
fortunatum ib.
infortunatum ib.
paniculatum ib.

Clerodendrum
Phlomidis 962
trichotomum ib.

Clethra 658, 698
alnifolia 698
arborea ib.
paniculata ib.

Cleyera 775, 816
japonica 816

Clibadium 298, 375
ſurinamenſe 375

Cliffortia 777, 831, 832
crenata 831
cuneata ib.
ericifolia ib.
falcata 832
ferruginea 831
filifolia ib.
graminea ib.
ilicifolia ib.
juniperina 832
obcordata ib.
odorata 831
polygonifolia ib.
pulchella ib.
ruſcifolia ib.
ſarmentoſa ib.
ſtrobilifera ib.
teretifolia ib.
ternata 832
trifoliata 831

Clinopodium 886, 912
incanum 912
martinicenſe ib.
rugoſum ib.
vulgare ib.

Clitoria 1078, 1107
aquilupienſis 1107
braſiliana ib.
Gelaſtia ib.
mariana ib.
micrantha ib.
multiflora ib.
ternatea ib.
virginiana ib.
Cluſia 776, 818
alba 818
flava ib.
roſea ib.
venoſa ib.
Clutia 312, 504, 505
acuminata ib. 505
alaternoides ib. 504
Elateria 505
hirta ib.
lanceolata ib.
polygonoides ib.
pulchella ib.
retuſa ib.
ſtipularis ib.
tomentoſa ib.
Clypeola 957, 977
caroliniana 977
Jonthlaſpi ib.
maritima ib.
tomentoſa ib.
Cneorum 83, 99
tricoccon 99
Cneſtis 662, 729
ſcandens 729
Cnicus 1162, 1189, 1190
Acarna 1190
centauroides 1189
cernuus 1190
dubius 1189
Eryſithales ib.
Cnicus
ferox 1190
oleraceus 1189
pygmæus 1190
ſpinoſiſſimus 1189
uniflorus ib.
Coccoloba 603, 640, 641
auſtralis 640
barbadenſis ib.
diverſifolia ib.
emarginata ib.
excoriata ib.
flaveſcens ib.
leoganenſis ib.
nivea 641
obtuſifolia 640
pubeſcens ib.
punctata ib.
tenuifolia ib.
Uvifera ib.
Coccoſipſilum 213, 245
repens 245
Cochlearia 967, 974, 975
anglica 975
Armoracia ib.
Coronopus ib.
danica 974
fœtida 975
glaſtifolia ib.
groenlandica ib.
officinalis 974
Cocos 521, 569
aculeata 569
butyracea ib.
chilenſis ib.
guineenſis ib.
lapidea ib.
maldivica ib.
nucifera ib.
Codia 602, 636
montana 636
Codon 658, 675
Royeni 675
Coffea 298, 365
arabica 365
guianenſis ib.
occidentalis ib.
odorata ib.
opulina ib.
paniculata ib.
ſambucina ib.
triflora ib.
Coix 85, 143
Lacryma 143
Colchicum 527, 588
autumnale 588
montanum ib.
variegatum ib.
Coldenia 220, 288
procumbens 288
Colletia 304, 408
ſpinoſiſſima 408
Colliguaja 603, 640
odorifera 640
Collinſonia 20, 48, 49
præcox 48
ſcabriuſcula 49
ſerotina ib.
Columnea 889, 964
hirſuta 964
hiſpida ib.
longifolia ib.
rutilans ib.
ſcandens ib.
Colutea 1075, 1077, 1116, 1117
æſchynomenoides 1117
arboreſcens 1116
fiſtuloſa 1117

Colutea
ſruteſcens 1117
herbacea *ib.*
humilis *ib.*
orientalis 1116
perennans 1117

Comarum 781, 861
fragarioides 861
paluſtre *ib.*

Combretum 600, 609
decanarum 609
laxum *ib.*
ſecundum *ib.*

Cometes 217, 266
alterniflora 266

Commelina 82, 120, 121
africana 120
benghalenſis *ib.*
caroliniana 121
Commelinoides 120
communis *ib.*
diffuſa 121
erecta 120
hexandra 121
longicaulis 120
mollis *ib.*
nudicaulis 121
nudiflora *ib.*
papilionacea *ib.*
ſpirata *ib.*
tuberoſa *ib.*
vaginata *ib.*
virginica *ib.*
Zanonia *ib.*

Commersonia 310, 510
echinata 510

Comocladia 83, 99
dentata 99
ilicifolia 99
integrifolia *ib.*

Conami 778, 834
braſilienſe 834

Conceveiba 772, 826
gujanenſis 826

Conferva 1285, 1392-1395
Ægogropila 1395
æruginoſa 1393
amphibia *ib.*
armillaris *ib.*
bulloſa *ib.*
burſata 1394
canalicularis 1393
cancellata 1394
capillaris 1393
catenata 1394
catenulata 1395
Chætophora 1392
corallina 1394
corallinoides 1395
decimina 1393
dichotoma 1394
elongata 1395
filiformis 1393
flexuoſa 1395
fluviatilis 1392
fœniculacea 1394
fontinalis 1392
fucoides 1395
fulva *ib.*
furcata 1393
fuſca 1395
gelatinoſa 1394
glomerata 1395
Helminthochorton 1394
infuſionum 1394
jugalis 1393
lanceolata 1392
littoralis 1393
lobata 1392
moniliformis *ib.*
nigra 1394
paraſitica 1395
pectinalis 1392
pellucida 1394
pennata 1395
piſcium 1392
plana 1393
plicata 1395
polymorpha *ib.*
porticalis 1392
punctalis *ib.*
quinina 1393
reticulata 1394
rigida *ib.*
rivularis 1392
rupeſtris 1395
ſaccata 1394
ſcoparia *ib.*
ſericea 1395
ſerpentina 1393
ſeticuloſa *ib.*
ſpongioſa 1394
ſtellina 1393
thermalis 1394
tomentoſa *ib.*
tranſverſina 1393
trichoides 1395
tubuloſa *ib.*
vagabunda *ib.*
veſicata 1394

Conium 309, 475
africanum 475
maculatum *ib.*
rigens *ib.*
Royeni *ib.*
ſuffruticoſum *ib.*

Connarus 997, 1014
africanus 1014
monocarpos *ib.*

Connarus
pentagynus 1014
pinnatus ib.

Conobea 886, 936
aquatica 936

Conocarpus 303, 372, 373
erecta 372
procumbens ib.
racemoſa 373

Conohoria 302, 396
flaveſcens 396

Convallaria 525, 559
biflora 559
japonica ib.
latifolia ib.
majalis ib.
multiflora ib.
Polygonatum ib.
racemoſa ib.
ſpicata ib.
ſtellata ib.
trifolia ib.
verticillata ib.

Convolvulus 293, 339-344
althæoides 341
anceps ib.
angularis 340
aquaticus 344
arenarius
arvenſis 339
Batatus 341
biflorus 340
braſilienſis 344
cæleſtis 340
cairicus 342
canarienſis 341
Cantabrica 344
carolinus 340
Cneorum 344

Convolvulus
copticus 342
corymboſus 343
crenatus 341
dianthus 343
diſſectus 342
Dorycnium 343
edulis ib.
farinoſus 340
floridus 343
formoſus ib.
gemellus 340
glaber 342
grandiflorus 341
gujanenſis 342
haſtatus 341
havanenſis ib.
hederaceus 340
Hermanniæ 339
hirtus 343
humiſtratus 344
Hyſtrix
Jalapa 342
japonicus 341
Jetiaucu 339
Imperati
lanatus
lineatus 344
littoralis ib.
macrocarpus 342
macrorhizos ib.
malabaricus 341
martinicenſis 342
maximus 341
Medium ib.
minimus ib.
mucronatus 342
muricatus 341
nervoſus 340
Nil ib.
obſcurus ib.
œnotheroides 343
panduratus 340
paniculatus 342

Convolvulus
pelatus 342
pentapetaloides 344
perſicus 343
Pes capræ 344
proſtratus ib.
purpureus 340
quinquefolius 342
repens 343
reptans ib.
Scammonea 340
ſcoparius 343
ſepium 339
ſericeus 342
ſibiricus 340
ſiculus 343
Soldanella ib.
ſpecioſus 341
ſpinoſus 343
ſpithamæus ib.
ſublobatus 344
tomentoſus 342
tricolor 344
trinervius 341
tuguriorum 340
Turpethum 341
umbellatus 340
uniflorus 341
verticillatus 340
vitifolius 342

Conyza 1163, 1220-1222
anthelmintica 1221
arboreſcens ib.
aſteroides 1220
aurita 1222
balſamifera 1220
bifoliata 1222
bifrons 1221
candida ib.
caneſcens 1220
carolinenſis 1221
cinerea ib.

Conyza
cryſpata 1221
decurrens 1220
fruticoſa 1221
hirſuta 1222
inciſa 1221
linifolia 1220
lobata 1221
odorata ib.
patula 1222
pubigera 1221
purpuraſcens ib.
rigida 1222
rugoſa ib.
rupeſtris ib.
ſaxatilis 1220
ſcabra 1221
ſinenſis ib.
ſordida 1220
ſquarroſa ib.
tortuoſa 1221
virgata 1220
Cookia 19, 24
Gnidia 24
piloſa ib.
proſtrata ib.
Copaifera 660, 700
officinalis 700
COPROSMA 307, 471
fœtidiſſimum 471
lucidum ib.
Corchorus 775, 827
æſtuans 827
capſularis ib.
hirſutus ib.
hirtus ib.
japonicus ib.
javanicus ib.
olitorius ib.
ſiliquoſus ib.
tridens ib.
trilocularis ib.
Cordia 295, 392, 393
aſpera 392
Callococca 393
dichotoma 392
elliptica 393
flaveſcens 392
Geraſcanthes ib.
juglandifolia ib.
macrophylla 393
micrantha ib.
Myxa 392
Sebeſtena ib.
ſpineſcens ib.
tetrandra 393
tetraphylla 392
Toqueve 393
Coreopſis 1165, 1260 *ſq.*
alba 1260
alternifolia 1261
anguſtifolia ib.
aurea 1260
auriculata 1261
baccata 1260
Bidens ib.
chryſantha ib.
coronata ib.
craſſifolia 1261
gladiata ib.
lanceolata ib.
leucantha 1260
limenſis 1261
major ib.
perfoliata ib.
procera 1260
quadricornis ib.
reptans 1260
tripteris ib.
verticillata ib.
Coriandrum 309, 486
ſativum 486
teſticulatum ib.
Coriaria 663, 728
myrtifolia 728
ruſcifolia ib.
ſarmentoſa ib.
Coris 292, 377
monſpelienſis 377
Coriſpermum 3, 16, 17
hyſſopifolium 16
ſquarroſum 17
Cornucopiæ 86, 151
alopecuroides 151
altiſſimum ib.
cucullatum ib.
hyemale ib.
perennans ib.
Cornus 216, 256, 257
alba 257
alternifolia ib.
chilenſis ib.
circinata ib.
cyanocarpos ib.
florida 256
japonica 257
maſcula ib.
paniculata ib.
ſanguinea ib.
ſericea ib.
Cornutia 890, 946
pyramidata 946
Coronilla 1075, 1077, 1118
argentea 1118
coronata ib.
cretica ib.
Emerus ib.
glauca ib.
juncea ib.
minima ib.
ſcandens ib.
Securidaca ib.

Coronilla
valentina 1118
varia ib.
Corrigiola 311, 505
albella 505
littoralis ib.
repens ib.
Cortuſa 292, 328
Gmelini 328
Matthioli ib.
Corylus 602, 637
americana 637
Avellana ib.
Colurna ib.
roſtrata ib.
Corymbium 299, 373, 374
filiforme 374
glabrum ib.
ſcabrum 373
villoſum 374
CORYNOCARPUS 301, 418
lævigata 418
Corypha 521, 569
minor 569
Palmetto ib.
Scribus ib.
umbraculifera ib.
Coſaria 22, 71
Forskahlii 71
Coſſignia 522, 577
Commerſoni 577
Coſtus 1, 7
arabicus 7
glabratus ib.
Cotula 1163, 1249 *ſq.*
anthemoides 1250
aurea ib.
capenſis ib.

Cotula
coronopifolia 1250
minuta ib.
pilulifera ib.
pyrethraria ib.
quinqueloba ib.
ſericea ib.
ſtricta ib.
tanacetifolia ib.
turbinata 1249
umbellata 1250
Verbeſina ib.
viſcoſa ib.
Cotyledon 662, 729, 730
cacalioides 730
deficiens 729
faſcicularis 730
hemiſphærica 729
hiſpanica 730
laciniata ib.
lanceolata ib.
malacophylla ib.
mammillaris ib.
nudicaulis 729
orbiculata ib.
paniculata 730
papillaris ib.
reticulata ib.
ſerrata ib.
ſpinoſa ib.
ſpuria ib.
triflora ib.
Umbilicus ib.
Crambe 968, 992
caſpica 992
fruticoſa ib.
hiſpanica ib.
maritima ib.
orientalis ib.
Tataria ib.
Crameria 216, 278
Ixina 278

Cranichis 61
aphylla 61
diphylla 62
muſcoſa ib.
oligantha ib.
ſtachyoides ib.
Craniolaria 890, 934, 935
annua 935
fruticoſa 934
Cranzia 219, 286
lævigata 286
Craſpedia 1167, 1281
uniflora 1281
Craſſula 312, 515–519
alba 516
aloides 518
alpeſtris ib.
alternifolia 517
argentea 518
barbata ib.
cærulata ib.
capitella ib.
centauroides 516
cephalophora 518
ciliata 517
coccinea 515
columnaris 517
corallina 519
cordata ib.
Cotyledon 515
cotyledonoides 518
crenulata 519
cultrata 516
cymoſa ib.
deltoidea 519
dichotoma 517
diffuſa 519
expanſa 518
flava 516

Craſſula
fruticuloſa 516
glomerata 517
imbricata ib.
lactea 516
lineolata 517
marginalis 516
mollis 519
montana 518
muſcoſa 517
nudicaulis ib.
obliqua 516
obvallata 518
orbicularis 517
pellucida ib.
perfoliata 516
perforata 519
pinnata 516
pruinoſa ib.
pubeſcens 518
pulchella 517
punctata ib.
pyramidalis 518
ramoſa 516
retroflexa 518
rubens 517
rupeſtris 518
ſcabra 516
ſparſa 519
ſpicata 518
ſtrigoſa 517
ſubulata ib.
tecta 518
tetragona 516
thyrſiflora 519
tomentoſa ib.
turrita 518
verticillaris 517
veſtita 519

Cratægus 777, 829, 830
alpina 829
Aria ib.

Cratægus
Azarolus 830
coccinea ib.
Crus galli 829
edulis ib.
elliptica ib.
glabra ib.
glanduloſa ib.
indica 830
lævis 829
leucophleos ib.
lucida 830
maura ib.
monogyna ib.
Oxyacantha ib.
populifolia ib.
punctata 829
rotundifolia ib.
tomentoſa ib.
torminalis 830
triloba ib.
uniflora 829
viridis ib.

Cratæva 741, 749
gynandra 749
Marmelos ib.
religioſa ib.
Tapia ib.
Crenea 740, 747
maritima 747
Crepis 1161, 1179-1181
albida 1180
alpina 1179
arenoſa 1180
aſpera ib.
barbata 1179
biennis 1180
burſifolia ib.
Dioſcoridis ib.
filiformis ib.
fœtida ib.
hieracioides ib.

Crepis
neglecta 1180
patula 1181
pulchra 1179
pygmæa ib.
radicata 1180
rhagadioloides 1179
rigens 1180
rubra ib.
ſibirica 1179
ſucculenta 1180
tectorum ib.
veſicaria 1179
virens 1180
Creſcentia 887, 943, 944
cucurbitina 944
Cujete 943
pinnata 944
Creſſa 307, 454
arabica 454
cretica ib.
Cribraria 1471
pallida ib.
Crinita 210, 231
capenſis 231
Crinodendron 997, 1026
Patagua 1026
Crinum 524, 537, 538
africanum 537
americanum 538
aſiaticum 537
caſpicum 538
falcatum ib.
latifolium 537
lineare 538
nervoſum ib.
obliquum 537
ſpecioſum 538

Crinum
tenellum 538
zeylanicum *ib.*

Criſtaria 656, 675
coccinea 675

Crithmum 309, 478
latifolium 478
maritimum *ib.*
pyrenaicum *ib.*

Crocus 81, 107
ſativus 107

Croſſoſtylis 999, 1036
biflora 1036

Crotalaria 1077, 1094-1096
amplexicaulis 1094
axillaris 1095
biſaria *ib.*
biflora 1094
cærulea 1095
capenſis *ib.*
cordifolia 1096
floribunda 1095
gujanenſis 1096
heterophylla 1095
imbricata *ib.*
incana 1096
juncea 1094
laburnifolia 1096
latifolia 1095
linifolia *ib.*
lunaris 1096
microphylla 1095
oppoſita 1094
pallida 1095
perfoliata 1094
perforata *ib.*
quinquefolia 1096
retuſa 1094
rotundifolia 1095

Crotalaria
ſagittalis 1004
ſericea *ib.*
ſeſſiliflora *ib.*
ſinenſis 1005
triflora *ib.*
verrucoſa *ib.*

Croton 998, 1029-1032
acutum 1030
argenteum 1031
aromaticum *ib.*
aſtroites *ib.*
balſamiferum 1029
capenſe 1031
cardioſpermum 1029
Caſcarilla *ib.*
caſtaneifolium *ib.*
cyanoſpermum *ib.*
divaricatum 1031
flavens *ib.*
glabellum 1030
glanduloſum 1031
globoſum 1030
gujanenſe *ib.*
hirtum *ib.*
humile 1031
japonicum 1032
Inophyllum 1030
lacciferum *ib.*
laurinum 1031
lobatum 1032
lucidum 1030
macrophyllum 1031
maritimum 1030
maturenſe *ib.*
moluccanum 1031
nitens *ib.*
nutans *ib.*
obliquum 1029
pallens 1030
paluſtre 1029
plicatum *ib.*

Croton
populifolium 1030
punctatum *ib.*
Ricinocarpos 1031
ſebiferum 1030
ſeſſiliflorum 1029
ſpinoſum 1032
Tiglium 1030
variegatum 1029

Crucianella 214, 241
ægyptiaca 241
anguſtifolia *ib.*
herbacea *ib.*
latifolia *ib.*
maritima *ib.*
monſpeliaca *ib.*
patula *ib.*

Crudia 660, 674
Schreberi 674

Cruzita 219, 281
hiſpanica 281

Cryptoſtomum 2969 390
gujanenſe 390

Cubaea 655, 671
paniculata 671
trigona *ib.*

Cublandia 773, 797
fruteſcens 797

Cucubalus 661, 712, 713
ægyptiacus 713
bacciferus 712
Behen *ib.*
catholicus 713
fabarius *ib.*
fruticuloſus *ib.*
glutinoſus 712
italicus *ib.*
molliſſimus *ib.*
Otites 713

Cynanchum
altiſſimum 442
arboreum 441
capenſe ib.
carolinenſe ib.
clauſum 442
cordifolium 441
criſpiflorum ib.
erectum 442
extenſum ib.
filiforme ib.
hirtum 441
lanceolatum 442
longiflorum ib.
maritimum 441
monſpeliacum 442
obliquum 441
obtuſifolium 442
parviflorum 441
planifolium 442
pyrotechnicum ib.
racemoſum 441
reticulatum ib.
ſuberoſum ib.
tenellum 442
undulatum 441
viminale 442

Cynara 1162,1190, 1191
acaulis 1191
Carduncul us 1190
horrida ib.
humilis ib.
integrifolia 1191
Scolymus 1190

Cynoctonum 307,443
petiolatum 443
ſeſſilifolium ib.

Cynogloſſum 292, 318,319
apenninum 319
cheirifolium ib.

Cynogloſſum
creticum 318
Dioſcoridis ib.
japonicum 319
lævigatum ib.
lanceolatum 318
linifolium 319
luſitanicum ib.
officinale 318
omphalodes 319
pictum ib.
ſcorpioides ib.
ſylvaticum 318
virginicum 319

Cynometra 656,674
cauliflora 674
ramiflora ib.

Cynomorium 2,13
cayennenſe 13
coccineum ib.
jamaicenſe ib.

Cynoſurus 88,184, 185
ægyptius 185
aureus ib.
cæruleus 184
coracanus 185
criſtatus 184
domingenſis 185
echinatus 184
floccifolius 185
indicus ib.
lagopodoides ib.
Lima 184
multibracteatus ib.
ſiculus 185
ſphærocephalus 184
ternatus 185
uniflorus ib.
Uniolæ ib.
virgatus ib.

Cyperus 84,129-135
ægyptius 129
alopecurus 131
alternifolius ib.
arenarius 130
articulatus 129
capitatus 130
cinnamomeus ib.
compactus ib.
complanatus 131
compreſſus 133
confertus 134
conglomeratus ib.
corymboſus 135
cruentus 132
denudatus ib.
difformis 133
diphyllus 130
diſtans 133
dubius 134
effuſus 130
elatus 133
elegans ib.
eſculentus 132
exaltatus ib.
faſtigiatus 131
faſtigioſus 134
ferrugineus 131
filiformis 134
flabelliformis 135
flaveſcens 133
flavidus 132
fuſcus 133
glaber ib.
globoſus 131
globuloſus 135
glomeratus 133
gradatus 130
Haſpan ib.
hirſutis ib.
Jaminicus 132
imbricatus 134
Iria 132

Cyperus
lævigatus 132
lateralis 129
leucocephalus 134
ligularis 132
longus 130
minimus 129
minutus 130
monoſtachyos 132
Monti 130
mucronatus 129
niloticus ib.
nitens 131
niveus 134
odoratus 133
Pangorei 131
paniculatus ib.
pannonicus 132
Papyrus 133
polyſtachyos 131
pumilus 133
pygmæus 130
rotundus 132
Santonici 131
ſetaceus 129
ſpathaceus 132
ſphacelatus 134
ſquarroſus 132
ſtoloniferus 134
ſtrigoſus 133
ſurinamenſis 134
tenellus 129
tenuiflorus 131
tenuis 134
triflorus 133
tuberoſus 131
umbellatus 135
viſcoſus 134
Cyphium 303, 370
capenſe 370
Cypripedium 21, 62
acaule 62
album ib.

Cypripedium
bulboſum 62
Calceolus ib.
japonicum ib.
Cyrilla 303, 411
racemiflora 411
CYTINUS 740, 745
Hypociſtis 745
Cytiſus 1075, 1078, 1114, 1115
argenteus 1114
auſtriacus ib.
Cajan ib.
capitatus ib.
folioloſus ib.
glaber ib.
græcus 1115
hirſutus 1114
Laburnum 1115
nigricans 1114
prolifer ib.
purpureus ib.
ſeſſilifolius ib.
ſupinus ib.
tener 1115
violaceus ib.
Wolgaricus 1114

Dactylis 87, 184
capitata 184
ciliaris ib.
cynoſuroides ib.
geniculata ib.
glomerata ib.
lagopoides ib.
patens ib.
Dais 659, 686, 687
cotinifolia 686
diſperma 687
laurifolia ib.
octandra ib.

DALBERGIA 1075, 1084
Lanceolaria 1084
Monetaria ib.
Dalechampia 1000, 1070
colorata 1070
ſcandens ib.
Daphne 602, 631, 632
alpina 631
altaica 632
buxifolia ib.
calcina 631
caucaſica 632
Cneorum ib.
dioica 631
fœtida 632
Gnidium ib.
indica ib.
Lagetto ib.
Laureola 631
Mezereum ib.
occidentalis ib.
odora 632
oleoides ib.
pontica 631
pubeſcens ib.
rotundifolia 632
ſericea ib.
ſquarroſa ib.
Tartonraira 631
Thymelæa ib.
trifolia 632
vermiculata ib.
villoſa 631
Datiſca 743, 757
cannabina 757
hirta ib.
Datura 293, 378, 379
arborea 379

Datura
faſtuoſa 379
ferox 378
lævis 379
Metel ib.
Stramonium ib.
Tatula ib.

Daucus 308, 474
alatus 474
Carota ib.
divaricatus ib.
Gingidium ib.
gummifer ib.
lucidus ib.
mauritanicus ib.
muricatus ib.
polygamus ib.
Viſnaga ib.

Decodon 656, 677
aquaticus 677

Decumaria 742, 749
barbara 747

Deguelia 1076, 1085
ſcandens 1085

Delima 772, 819
ſarmentoſa 819

Delphinium 778, 837
aconiti 837
Ajacis ib.
ambiguum ib.
carolinianum ib.
Conſolida ib.
elatum ib.
exaltatum ib.
grandiflorum ib.
hybridum ib.
intermedium ib.
peregrinum ib.
puniceum ib.

Delphinium
urceolatum 837

Demidoſia 307, 458
repens 458

Dentaria 968, 979
bulbifera 979
enneaphylla ib.
pentaphylla ib.

Dentella 297, 370
repens 370

Detarium 660, 700
ſenegalenſe 700

Deutzia 661, 722
ſcabra 722

Dialium 21, 27
indum 27

Dianthera 20, 35-37
americana 36
cærulea ib.
clavata ib
comata ib.
debilis ib.
enſiformis 37
euſtachiana 36
flava ib.
hirſuta 35
humifuſa 36
hyſſopifolia 37
japonica 36
malabarica ib.
martinicenſis ib.
nitida 35
odora 36
ovata 37
paniculata 36
pectoralis ib.
punctata ib.
reptans ib.
ſeſſilis 35
ſulcata 36

Dianthera
triſulca 36
verticillata ib.
violacea ib.

Dianthus 661, 710-712
albens 711
alpinus 712
arboreus ib.
arenarius 711
Armeria 710
atro-rubens ib.
barbatus ib.
carolinianus ib.
Carthuſianorum ib.
Caryophyllus 711
deltoideus ib.
diminutus ib.
ferrugineus 710
fruticoſus 712
glacialis 711
glaucus ib.
japonicus 710
monſpeliacus 711
moſchatus ib.
plumarius ib.
pomeridianus ib.
prolifer 710
pumilus 711
pungens 712
rupeſtris 711
ſilveſtris ib.
ſinenſis ib.
ſuperbus ib.
virgineus 712

Diapenſia 294, 325
japonica 325

Dichondra 307, 457, 458
repens 457
ſericea 458
Staphilagria 837

Dickſonia 1283, 1314
arboreſcens 1314
Culcita ib.
Dictamnus 655, 676
albus 676
capenſis ib.
Didelta 1165, 1263
tetragoniæfolia 1263
Digera 300, 408
arvenſis 408
Digitalis 889, 939, 940
ambigua 940
canarienſis ib.
ferruginea 939
lutea ib.
minor ib.
obſcura ib.
purpurea ib.
Sceptrum 940
Thapſi 939
Dilatris 82, 119
paniculata 119
umbellata ib.
viſcoſa ib.
Dillenia 783, 866
indica 866
Diodia 214, 235, 236
proſtrata 236
ſarmentoſa ib.
ſcandens ib.
ſimplex 235
teres 236
tetragona ib.
virginica 235
DIONÆA 658, 685
Muſcipula 685
Dioſcorea 527, 581, 582
aculeata 582
Dioſcorea
alata 582
bulbifera ib.
japonica 581
oppoſitifolia 582
pentaphylla 581
quaternata ib.
quinata ib.
quinqueloba ib.
ſativa ib.
ſeptemloba ib.
trifida ib.
triphylla ib.
villoſa ib.
Dioſma 301, 408, 410
barbigerum 410
bifidum 409
capenſe ib.
ciliatum ib.
corymboſum ib.
crenatum ib.
cupreſſinum ib.
ericoides ib.
hirſutum ib.
imbricatum ib.
lanceolatum ib.
latifolium ib.
marginatum 410
odoratiſſimum 409
oppoſitifolium ib.
pulchellum ib.
rubrum ib.
ſucculentum 408
tetragonum 410
unicapſulare 409
uniflorum ib.
villoſum 410
Dioſpyros 601, 617
Ebenum 617
glaberrima ib.
hirſuta ib.
Kaki ib.
Dioſpyros
Lotus 617
tetraſperma ib.
virginiana ib.
Diphyſa 1077, 1117
carthagenenſis 1117
Dipſacus 210, 227
fullonum 227
laciniatus ib.
piloſus ib.
ſilveſtris ib.
Dirca 602, 632
paluſtris 632
DISA 21, 62
grandiflora 62
longicornis ib.
maculata ib.
racemoſa ib.
DISANDRA 593, 595
proſtrata 595
Diſperma 885, 892
repens 892
Dodartia 889, 955
indica 955
orientalis ib.
DODECAS 741, 751
ſurinamenſis 751
Dodecatheon 292, 328
Meadia 328
DODONÆA 601, 618
anguſtifolia 618
viſcoſa ib.
Dolichos 1075, 1077, 1102-1105
acinaciformis 1103
altiſſimus 1104
ariſtatus 1103

Dolichos
benghalenſis 1102
biflorus 1105
bulboſus 1104
capenſis 1103
Catjang 1105
cultratus 1104
Didice *ib.*
enſiformis 1103
Faba indica 1104
Faba nigrita 1102
filiformis 1104
funarius *ib.*
gladiatus 1103
incurvus *ib.*
Lablab *ib.*
lignoſus *ib.*
lineatus 1104
Lubia 1105
luteolus 1103
luteus *ib.*
minimus 1104
polyſtachyos 1103
pruriens 1104
pugioniformis 1105
purpureus 1104
repens 1105
reticulatus 1104
roſeus *ib.*
ſcarabæoides *ib.*
ſeſquipedalis 1103
ſinenſis *ib.*
Soja 1105
tetragonolobus 1103
tranquebaricus *ib.*
trilobus 1104
unguiculatus 1103
urens 1104

Doliocarpus 774, 805
Calinea 805
major *ib.*
Rolandri *ib.*

Dombeya 887, 956
lapponica 956

DORÆNA 293, 329
japonica 329

Doronicum 1164, 1243
acaule 1243
altaicum *ib.*
Bellidiaſtrum *ib.*
lavifolium *ib.*
Pardalianches *ib.*
plantagineum *ib.*
ramoſum *ib.*

Dorſtenia 217, 265
cauleſcens 265
Contragenea *ib.*
cordifolia *ib.*
Drakena *ib.*
Houſtoni *ib.*
lucida *ib.*
pubeſcens *ib.*

Draba 967, 970, 971
alpina 971
caroliniana *ib.*
ciliaris *ib.*
ſladnizenſis *ib.*
hirta *ib.*
incana *ib.*
muralis *ib.*
pyrenaica *ib.*
verna 970

Dracæna 525, 558
auſtralis 558
borealis *ib.*
Draco *ib.*
enſifolia *ib.*
erecta *ib.*
ferrea *ib.*
graminifolia *ib.*
indiviſa *ib.*
marginata *ib.*
medeoloides *ib.*
ſtriata 558
terminalis *ib.*
undulata *ib.*
volubilis *ib.*

Dracocephalum 886, 915
auſtriacum 915
canarienſe *ib.*
caneſcens *ib.*
denticulatum *ib.*
grandiflorum *ib.*
Moldavica *ib.*
nutans *ib.*
peltatum *ib.*
peregrinum *ib.*
pinnatum *ib.*
Ruyſchiana *ib.*
ſibiricum *ib.*
thymiflorum *ib.*
virginianum *ib.*

Dracontium 593, 596, 597
camſchaticum 596
cordatum *ib.*
fœtidum *ib.*
pentaphyllum 597
pertuſum *ib.*
polyphyllum 596
Quebitea *ib.*
ſcandens 597
ſpinoſum 596

Droſera 313, 514, 515
acaulis 514
anglica 515
capenſis *ib.*
ciſtiflora *ib.*
cuneifolia 514
indica 515
longifolia 514

Droſera
luſitanica 515
rotundifolia 514
DRYANDRA 997, 1014
cordata 1014
Dryas 781, 861
anemonoides 861
geoides ib.
octopetala ib.
Drypis 311, 507
ſpinoſa 507
Dugortia 775, 816
mucamentoſa 816
Duranta 960
Ellifia ib.
Mutiſia ib.
Plumieri ib.
DURIO 1149, 1154
Zibethinus 1154
DUROIA 523, 574
Eriopila 574

Ebenus 1076, 1100
cretica 1100
Echinophora 308, 471
ſpinoſa 471
tenuifolia ib.
Echinops 1167, 1280
Ritro 1280
ſphærocephalus ib.
ſpinoſus ib.
ſtrigoſus ib.
Echites 294, 436-437
agglutinata 436
annularis 437

Echites
aſperuginis 437
biflora ib.
biſpinoſa ib.
caudata ib.
circinalis 436
corymboſa ib.
coſtata 437
difformis 436
domingenſis ib.
floribunda ib.
heterophylla 437
quinquangularis 438
repens ib.
ſcholaris 437
ſemidigyna 436
ſiphylitica 437
ſpicata ib.
ſuberecta 436
ſucculenta 437
toruloſa 436
trifida ib.
umbellata 437
Echium 291, 322, 323
argenteum 323
candicans 322
capitatum 323
creticum ib.
fruticoſum 322
giganteum ib.
glaucophyllum 323
italicum ib.
lævigatum ib.
luſitanicum ib.
orientale ib.
plantagineum ib.
rubrum ib.
ruſticum ib.
ſpicatum ib.
ſtrictum 322
violaceum 323
vulgare ib.

ECKEBERGIA 656, 680
capenſis 680
ECLIPTA 1165, 1255
erecta 1255
latifolia ib.
proſtrata ib.
punctata ib.
ſeſſilis ib.
Ehretia 295, 393, 394
Beurreria 394
dubia ib.
exſucca ib.
halimifolia 393
internodis 394
linifolia ib.
ſpinoſa 393
virgata ib.
EHRHARTA 524, 549
Bankſii 549
capenſis ib.
punicea ib.
Elæagnus 218, 275, 276
anguſtifolia 275
criſpa ib.
glabra ib.
latifolia ib.
macrophylla 276
multiflora 275
orientalis ib.
pungens 276
ſpinoſa ib.
umbellata ib.
ELÆIS 521, 568
guineenſis 568
Elæocarpus 775, 816, 817
copalliſera 817
Dicera 816

Elæocarpus
oblonga 817
ſerrata 816
Elæodendrum 301, 417
orientale 417
Elate 83, 94
ſilveſtris 94
Elaterium 2, 11
carthaginenſe 11
trifoliatum ib.
Elatine 603, 643
Alſinaſtrum 643
Hydropiper ib.
Elephantopus 1167, 1279
anguſtifolius 1279
ſcaber ib.
ſpicatus ib.
tomentoſus ib.
ELLISIA 296, 330
Nyctei̇æa 330
Elymus 88, 197, 198
arenarius 197
canadenſis ib.
caninus 198
Caput Meduſæ ib.
carolinianus ib.
europæus ib.
Hyſtrix ib.
philadelphicus 197
ſibiricus ib.
ſubulatus 198
tener ib.
virginicus ib.
Embelia 217, 280
indica 280
EMBOTHRIUM 216, 279
coccineum 279
umbellatum ib.
Empetrum 90, 209
album 209
nigrum ib.
pinnatum ib.
Empleurum 217, 268
Aitoni 268
Enargea 524, 547
marginata 547
Encelia 1166, 1261
alternifolia 1261
Endrachium 293, 339
madagaſcarienſe 339
Enurea 741, 748
capreolata 748
EPACRIS 294, 336, 337
faſciculata 337
juniperina ib.
longifolia 336
pumila 337
roſmarinifolia ib.
Eperua 659, 672
falcata 672
Ephedra 997, 1013
aphylla 1013
diſtachya ib.
monoſtachya ib.
Ephielis 598, 611
gujanenſis 611
Epichyſium 1460
argenteum ib.
Epidendrum 21, 63-69
altifolium 63
alpeſtre 69
altiſſimum 67
amabile 68
anceps 65
anguſtifolium 66
Epidendrum
auctumnale 64
bifidum 68
biflorum 64
capenſe 68
carinatum ib.
caudatum 63
ciliare 65
claviculatum 63
Clypeolus 66
cochlearifolium 69
cochleatum 68
coccineum 63
corniculatum 67
criſpatum 64
cucullatum 65
diffuſum ib.
echinocarpon 66
elongatum ib.
equitans 64
Faſciola 66
filiforme 69
flabelliforme 67
Flos aëris 63
fragrans 66
funale 69
furvum 63
glaucum 64
globoſum 65
graminifolium 69
graminoides 64
guttatum 68
juncifolium ib.
labiatum 67
Lanceola ib.
laxum 69
lineare 63
maculatum 68
micranthum 69
minimum 68
minutum ib.
moniliforme ib.
montanum 65
Myoſuros 64

Epidendrum
noctūrnum 65
nodoſum 65
nutans 64
ophioglоſſoides 69
ovale ib.
ovatum 63
palmifolium 66
polybulbon ib.
proliferum 64
pulchellum 69
punctatum 63
puſillum 68
racemiflorum 69
ramoſum 63
reſupinatum 64
retuſum 68
rigidum 65
ruſcifolium 69
ſanguineum 66
ſatyrioides 67
ſcriptum 68
ſecundum 63
ſerrulatum 65
ſertularioides ib.
ſeſſile 67
ſpatulatum 63
ſubulatum 67
tenuifolium 63
teretifolium 65
teres ib.
teſſæfolium 66
tetrapetalum 67
tribuloides ib.
trichocarpon 66
tridentatum 69
triquetrum 67
triſte 64
tuberoſum 68
umbellatum 66
umbelliferum 65
undulatum 67
utricularioides ib.
Vanilla 63

Epidendrum
variegatum 67
veſtitum 64
vomeriforme ib.
Epigæa 659, 696
cordifolia 696
repens ib.
Epilobium 599, 607, 608
alpinum 608
anguſtifolium 607
Dodonæi 608
glabellum ib.
hirſutum ib.
latifolium ib.
montanum ib.
obſcurum ib.
paluſtre ib.
rotundifolium ib.
roſeum ib.
tetragonum ib.
Epimedium 215, 256
alpinum 256
Equiſetum 1283, 1288
arvenſe 1288
fluviatile ib.
giganteum ib.
hiemale ib.
limoſum ib.
paluſtre ib.
pratenſe ib.
ſilvaticum ib.
Eracliſſa 313, 520
hexagyna 520
Eranthemum 19, 27
anguſtifolium 27
capenſe ib.
parvifolium ib.
ſalſoloides ib.

Erica 601, 622-629
abietina 627
arborea ib.
articularis 626
auſtralis 628
axillaris 623
baccans 628
Bergiana ib.
bicolor 626
bracteata 622
bryantha 623
calicina 628
capitata 623
cephalotes 625
cerinthoides 624
cernua 629
ciliaris 623
cinerea 628
coccinea 625
comoſa ib.
concinna ib.
conſpicua 624
corifolia 628
cruenta 626
cubica 625
curviflora 624
cylindrica ib.
Deboecia 622
dentata 625
depreſſa 626
empetrifolia 627
faſtigiata 624
florida 627
formoſa 628
fucata 622
glandulosa 624
glutinoſa 626
gnaphalodes 628
grandiflora 624
halicacaba 626
herbacea 624
hirta 626
hiſpida 623

Erica
imbricata 624
incarnata 628
inflata 627
leucanthera 623
lutea 626
mammoſa 627
margaritacea 629
marifolia 626
Maſſoni 624
mediterranea ib.
melanthera 623
Monſoniana 626
mucoſa 628
multiflora 625
nigrita 626
nudicaulis 625
obliqua 627
octophylla ib.
paſſerinæ 623
perfoliata 627
petiolata 622
Petiverii 623
phyſodes 628
pilulifera 627
pinea 625
planifolia 626
Plukenetii 623
pubeſcens 627
pulchella 625
purpuraſcens ib.
pyramidalis 624
racemoſa ib.
ramentacea 629
regerminans 626
retorta 629
rubens 628
ſcoparia ib.
Sparrmanni 624
ſpicata 627
ſpumoſa 623
ſtrigoſa 627
tenuifolia 622
tetragona 623

Erica
Tetralix 627
Thunbergii 623
Totta ib.
tubiflora 624
umbellata 623
urceolaris 626
vagans 625
ventricoſa 624
verticillata 625
veſtita ib.
vireſcens 626
virgata 623
viſcaria 625
vulgaris 628

Erigeron 1164, 1222-1224
acre 1224
ægyptiacum 1223
alpinum ib.
bahamenſe ib.
bonarienſe 1224
camphoratum 1223
canadenſe ib.
carolinianum 1222
cymoſum 1224
decurrens 1222
Droebachienſe 1224
fœtidum 1222
glanduloſum 1223
glutinoſum ib.
Gouani ib.
gramineum 1222
graveolens ib.
jamaicenſe 1224
japonicum 1223
incanum 1222
obliquum 1223
philadelphicum ib.
piloſum 1224
pinnatum ib.
purpureum 1223

Erigeron
rivulare 1224
ſcandens 1223
ſericeum ib.
ſiculum 1224
ſquarroſum ib.
ſumatrenſe 1223
tricuneatum 1224
tuberoſum 1222
uniflorum 1224
viſcoſum 1223

Erinus 889, 951
africanus 951
alpinus ib.
capenſis ib.
Lychnidea ib.
maritimus ib.
peruvianus ib.
triſtis ib.

Eriocaulon 89, 206
amplexicaule 206
anceps ib.
decangulare ib.
faſciculatum ib.
quinquangulare ib.
ſerotinum ib.
ſetaceum ib.
ſexangulare ib.
triangulare ib.

Eriocephalus 1166, 1277
africanus 1277
racemoſus ib.

Eriophorum 84, 124
alpinum 124
cyperinum ib.
polyſtachyon ib.
vaginatum ib.
virginicum ib.

Erithalis 299, 376
fruticoſa 376

Erithalis
inodora 376
polygama ib.
Ernodea 212, 244
littoralis 244
Eroteum 775
theoides
undulatum
Ervum 1075, 1078, 1112, 1113
erectum 1113
Ervilia ib.
hirſutum ib.
Lens ib.
monanthon 1112
ſolonienſe 1113
tetraſpermum ib.
volubile ib.
Eryngium 308, 466, 467
alpinum 467
americanum ib.
amethyſtinum ib.
aquaticum 466
Bourgati 467
campeſtre ib.
fœtidum 466
maritimum 467
planum 466
puſillum ib.
tricuſpidatum ib.
Eryſimum 967, 983
Alliaria 983
Barbarea ib.
bicorne ib.
cheiranthoides ib.
hieracifolium ib.
hybridum ib.
officinale ib.
pinnatum ib.
polyceraton ib.
repandum ib.
Erythrina 1075, 1076, 1087
carnea 1087
Corallodendrum ib.
Criſta galli ib.
herbacea ib.
picta ib.
planiſiliqua ib.
Erythronium 525, 546
carolinianum 546
Dens canis ib.
Erythroxylum 662, 725, 726
areolatum 725
buxifolium 726
ferrugineum ib.
havanenſe 725
hypericifolium 726
laurifolium ib.
longifolium ib.
macrophyllum ib.
rufum 725
ſideroxyloides 726
ſquamatum 725
ESCALLONIA 302, 418
myrtilloides 418
Ethulia 1162, 1197
bidentis 1197
conyzoides ib.
divaricata ib.
Sparganophora ib.
Struchium ib.
tomentoſa ib.
uniflora ib.
Eucalyptus 770, 790
obliqua 790
EUCLEA 742, 756
racemoſa 756
Eugenia 770, 787, 788
acutangula 788
aquea 787
baruenſis 788
carthagenenſis 787
cotinifolia 788
gujanenſis ib.
Jambos 787
latifolia ib.
malaccenſis ib.
Mini ib.
montana ib.
paniculata ib.
periplocifolia ib.
Pſeudopſidium ib.
racemoſa 788
ſinemarienſis ib.
undulata ib.
uniflora ib.
Euonymus 300, 407
americanus 407
atro-purpureus ib.
europæus ib.
japonicus ib.
inermis ib.
latifolius ib.
Tobira ib.
verrucoſus ib.
Euparea 303, 332
amœna 332
Eupatorium 1162, 1197-1200
ageratoides 1200
album 1198
altiſſimum 1199
aromaticum 1200

Eupatorium
cæleſtinum 1200
cannabinum 1199
chilenſe 1198
cinereum 1200
compoſitifolium 1199
cordifolium 1200
Dalea 1198
fœniculoides 1199
fuſco rubrum 1198
haſtatum *ib.*
Houſtoni *ib.*
hyſſopifolium *ib.*
japonicum 1199
incarnatum 1200
ivæfolium *ib.*
lineariifolium 1198
maculatum 1199
Marrubium 1198
micranthon *ib.*
microphyllum 1199
molle 1200
montanum *ib.*
myoſotifolium *ib.*
nervoſum 1199
odoratum 1200
parviflorum 1197
perfoliatum 1199
piloſum 1198
purpureum 1199
rigidum *ib.*
rotundifolium 1198
ſcabrum 1199
ſcandens 1198
ſeſſilifolium *ib.*
ſinenſe 1198
ſtœchadifolium 1200
ſyriacum 1199
triflorum 1198
trifoliatum 1199
urticæfolium 1200
villoſum 1199
zeylanicum 1198

Euphorbia 743.759-766
abyſſinica 759
aculeata *ib.*
aleppica 765
amygdaloides 766
anacantha 760
angulata 765
antiquorum 759
Apios 763
articulata 761
Atota 762
balſamifera 760
belgradica 761
biumbellata 766
bombenſis 761
canarienſis 759
caneſcens 761
Capus Meduſæ 759
carniolica 764
cereiformis 759
Chamæſyce 761
Characias 766
Clava 760
corallioides 765
cordata 764
corollata 765
cotinifolia 760
cuneiformis 763
cyathophora *ib.*
Cypariſſias 766
dendroides *ib.*
dichotoma 761
diffuſa 763
divaricata *ib.*
dulcis 764
emarginata 766
epithymoides 764
Eſula 766
exigua 763
falcata *ib.*
fimbriata 754
fruticoſa *ib.*

Euphorbia
geniſtoides 764
Gerardiana 766
glabrata 760
glauca 764
graminea 762
granulata 761
helioſcopia 765
heptagona 759
heterophylla 760
hiberna 766
hirta 762
hypericifolia *ib.*
hyſſopifolia *ib.*
Ipecacuanha 761
juncea 765
læta 763
Lathyris *ib.*
linearis 761
linifolia 760
litterata 765
maculata 761
mammillaris 759
mauritanica 760
mellifera *ib.*
meloformis *ib.*
myrtinites 766
myrtifolia 761
nereifolia 759
nicæenſis 763
nudiflora 760
obliquata 762
oblitterata *ib.*
ocymoides 760
officinalis 759
orientalis 765
origanoides 762
paluſtris 766
Paralias 764
parviflora 761
Peplis *ib.*
peploides 762
Peplus 763
picta 760

Euphorbia
piloſa 765
pilulifera 762
pinea 765
piſcatoria 760
Pithyuſa 764
platyphyllos 765
polygonifolia 761
portlandica 764
portulacoides 761
proſtrata 762
punctata 761
punicea 765
retuſa 763
roſea 762
ſaxatilis 764
ſegetalis ib.
Sequieri 766
ſerrata 765
ſeticornis 764
ſilvatica ib.
ſpinoſa ib.
taurinenſis ib.
terracina 763
thymifolia 762
Tiraculli 760
tithymaloides ib.
triaculeata 759
tuberoſa 763
verrucoſa 765

Euphoria 598, 611
ſinenſis 611

Euphraſia 888, 923, 924
cuneata 924
latifolia 923
linifolia 924
lutea 923
Odontites ib.
officinalis ib.
rubra ib.
tricuſpidata ib.

Euphraſia
viſcoſa 924

EURYA 741, 750
japonica 750

Euryandra 778, 835
ſcandens 835

Evea 210, 231
gujanenſis 231

Evolvulus 312, 508
alſinoides 508
emarginatus ib.
gangeticus ib.
hederaceus ib.
linifolius ib.
nummularius ib.
ſericeus ib.
tridentatus ib

Exacum 212, 250, 251
albens 250
aureum ib.
cordatum 251
gujanenſe ib.
punctatum ib.
ramoſum ib.
ſpicatum ib.
tenuifolium ib.

Excæcaria 89, 203
Agallocha 203

Fabricia 770, 789
myrtifolia 789

Fagara 215, 258
acuminata 258
emarginata ib.
Euodia ib.
octandra ib.
pentandra ib.
Piperita ib.
Pterota ib.

Fagara
ſpinoſa 258
tragodes ib.
trifoliata ib.
zeylanica ib.

Fagelia 20, 40
flavicans 40

Fagonia 683
arabica ib.
cretica ib.
hiſpanica ib.
indica ib.
ſcabra ib.

FAGRÆA 296, 336
zeylanica 336

Fagus 743, 757, 758
Caſtanea 757
ferruginea 758
pumila ib.
ſilvatica ib.

Falcata 1078, 1131
caroliniana 1131

FALCKIA 526, 580
repens 580

Faramea 212, 279
corymboſa 279
ſeſſiliflora ib.

Fernelia 213, 244
mauritiana 244

Ferraria 81, 119
pavonia 119
undulata ib.

Ferula 309, 478, 479
Aſſa fœtida 479
canadenſis ib.
communis 478
Ferulago ib.
glauca ib.
meoides ib.
nodiflora 479
orientalis 478

Ferula
perſica 479
tingitana 478
villoſa 479

Feſtuca 88, 185-188
amethyſtina 186
arundinacea 187
bromoides 185
calicina 187
cinerea 186
criſtata 187
dichotoma ib.
dumetorum 186
duriuſcula ib.
elatior ib.
faſciculata ib.
fluitans 187
fuſca ib.
heterophylla ib.
Halleri 186
indica 187
lanceolata 188
miſera 187
monoſtachya 188
mucronata 187
multiflora 188
myurus 186
nemorum ib.
octoflora 188
ovina 185
pauciflora 187
phœnicoides 186
picta 187
pumila 186
quadriflora 188
reptatrix 186
rubra 187
ſciuroides 186
ſilvatica 187
ſpadicea 186
ſpecioſa 187
ſpinoſa 188

Feſtuca
triflora 187
varia ib.

Feuillea 310, 500
cordifolia 500
trilobata ib.

Ficus 83, 96-99
americana 98
aſpera ib.
bengalenſis 96
benjamina ib.
capenſis 99
Carica 96
Chanas 97
cordata 98
coriacea 97
coſtata 96
drupacea 99
falcata 98
Granatum ib.
heterophylla 97
hiſpida ib.
indica 96
lucida ib.
maculata 97
microcarpa ibi
moriforia 97
nymphæifolia 96
obliqua 98
palmata 97
pedunculata 96
pertuſa 97
prolixa 98
pumila 97
punctata 98
racemoſa 97
religioſa 96
reticulata 99
retuſa 97
ſcabra 98
ſeptica ib.
ſerrata 97

Ficus
ſinuata 99
ſtipulata 98
Sur 97
Sycomorus 96
Taab 98
Toka ib.
toxicaria 97
trigona ib.
vaſta ib.
venoſa 96
virens ib.

Filago 1166, 1278
acaulis ib.
arvenſis ib.
gallica ib.
germanica ib.
Leontopodium ib.
montana ib.
pyramidata ib.

Fiſſilia 82, 93
pſittacorum 93

Fiwa 740, 745
japonica 745

Flacourtia 780, 852
Ramontchi 852

Flagellaria 527, 586
indica 586

Flaveria 1166, 1269
chilenſis 1269
peruviana ib.

Fœtidia 771, 793
borbonica 793

Fontinalis 1284, 1324
albicans 1324
alpina ib.
antipyretica ib.
capillacea ib.
criſpa ib.

Fontinalis
diſticha 1324
minor ib.
ſquamoſa ib.
Forgeſia 297, 353
racemoſa 353
Forskahlea 663, 738
anguſtifolia 738
candida ib.
tenaciſſima ib.
FORSTERA 21, 70
ſedifolia 70
Forſythia 776, 808
ſcandens 808
FOTHERGILLIA 777, 839
alnifolia 839
Fragaria 781, 857
monophylla 857
veſca ib.
Frankenia 522, 577
hirſuta 577
lævis ib.
pulverulenta ib.
revoluta 578
Franklinia 775, 810
americana 810
Fraſera 215, 256
carolinienſis 256
Fraxinus 22, 75
americana 75
excelſior ib.
integrifolia ib.
novæ Angliæ ib.
Ornus ib.
pubeſcens ib.
rotundifolia ib.
Fritillaria 525, 545, 546
imperialis 545
Meleagris ib.
Fritillaria
nana 546
perſica 545
punctata ib.
pyrenaica ib.
regia 546
Fuchſia 601, 617
coccinea 617
excorticata ib.
involucrata ib.
multiflora ib.
triphylla ib.
Fucus 1285, 1380-1390
abrotanifolius 1385
abrotanoides 1382
aceroſus 1389
acinarius 1380
aculeatus 1384
Agarum 1390
alatus 1387
albus 1384
angulatus 1383
anguſtifolius 1389
aphyllanthos 1385
articulatus 1381
baccatus 1382
Bailloviana 1386
Baſtera ib.
bicornis 1388
bifidus 1389
bracteatus 1390
buccinalis 1389
Burſa paſtoris 1383
canaliculatus 1381
capillaceus 1384
capitatus 1383
cartilagineus 1385
ceranoides 1380
ceſpitoſus 1386
ciliatus ib.
Clathrus 1390
concatenatus 1382
Fucus
confervoides 1384
contortus 1387
coralloides 1384
corneus ib.
corymbiferus 1383
crenatus 1383
crinitus 1386
criſpatus 1387
criſpus ib.
cuneiformis 1389
debilis ib.
dentatus 1383
denticulatus 1381
digitatus 1388
diſcors 1384
diſtichus 1381
divaricatus 1380
edulis 1382
elongatus 1381
ericoides 1384
eſculentus 1389
faſtigiatus 1383
filicinus 1388
Filum 1384
Flagellum 1389
flavus 1390
fœniculaceus 1382
foliifer 1388
fragilis 1389
fruticuloſus ib.
furcellatus 1383
Gærtnera 1386
geniculatus 1381
gigartinus 1386
glacialis 1388
granulatus 1382
hirſutus 1384
holoſetaceus 1387
hypnoides 1390
inflatus 1380
Kœlreuteri 1388
laceratus 1387

Fucus
laciniatus 1388
laminoſus ib.
lanoſus 1383
lendigerus 1380
lichenoides 1383
ligulatus 1387
linearis 1388
longiſſimus 1384
loreus 1382
lycopodioides 1384
marginalis ib.
muſciformis ib.
Myrica 1382
natans 1380
nodoſus 1381
Oſmunda 1385
ovarius 1380
palmatus 1389
Palmetta 1388
papilloſus 1386
penicilliformis 1382
peucedanifolius 1381
Pilularia 1383
pinnatifidus 1385
pinnatus 1390
piſtillatus 1386
plicatus 1385
plumaris 1388
plumoſus 1385
polyphyllus 1389
polypodioides 1388
prolifer 1390
pſeudoceranoides 1383
purpureus 1384
pyriferus 1381
racemoſus 1382
ramentaceus 1387
Roſa marina 1381
rotundus 1383
rubens 1387
rudis 1385
ſaccharinus 1389

Fucus
ſalicifolius 1380
ſanguineus 1387
ſcorpioides 1384
ſelaginoides 1382
ſericeus 1385
Serra ib.
ſerratus 1380
ſerrulatus 1388
ſertularioides 1385
ſeticuloſus 1382
ſiliculoſus 1381
ſiliquoſus ib.
ſpermophorus 1386
ſpinoſus ib.
ſpinuloſus ib.
ſpiralis 1380
ſubrepandus 1381
Tendo 1384
triangularis 1383
trinodis 1382
triqueter ib.
truncatus 1388
turbinatus 1380
undulatus 1381
uvifer 1386
venoſus 1387
vermicularis 1386
veſiculoſus 1380
viridis 1383
viſcidus 1389
vittatus 1387
volubilis ib.

FUIRENA 84, 123
paniculata 123

Fuligo 1287, 1466
capitata 1466
Lycoperdon ib.
panicea ib.
ſeptica ib.

Fumaria 1075, 1079, 1080
acaulis 1080

Fumaria
bulboſa 1080
capnoides ib.
capreolata ib.
claviculata ib.
Cucullaria 1079
enneaphylla 1080
fungoſa 1079
intermedia ib.
lutea 1080
minor ib.
nobilis 1079
officinalis 1080
Schangini ib.
ſempervirens ib.
ſpectabilis 1079
ſpicata 1080
veſicaria ib.

Gærtnera 656, 685
indica 685

GAHNIA 526, 578
procera 578
ſchœnoides ib.

Galanthus 523, 534
nivalis 534

Galardia 1165, 1259
alternifolia 1259

Galax 415
aphylla ib.

GALAXIA 995, 1005
graminea 1005
obſcura ib.
ovata ib.

Galedupa 1076, 1086
pungam 1086

Galega 1075, 1078, 1129-1131
cærulea 1130
capenſis ib.

Galega
canibæa 1129
cinerea ib.
daurica 1130
filiformis 1131
littoralis 1130
longifolia 1131
maxima 1130
ochroleuca ib.
officinalis 1129
pallens ib.
piſcatoria 1130
pulchella ib.
purpurea ib.
fruticoſa ib.
ſpicata 1131
ſpinoſa 1130
ſtricta ib.
tinctoria 1129
villoſa 1130
virginica ib.
Galenia 602, 636
africana 636
procumbens ib.
Galeopſis 885, 905
cannabina 905
grandiflora ib.
Ladanum ib.
Tetrahit ib.
Galipea 887, 944
trifoliata 944
Galium 214, 237-240
antſophyllum 238
Aparine 240
aparinoides ib.
ariſtatum 239
aſperum 238
auſtriacum ib.
bermudianum 240
Bocconi 238
boreale 239
cinereum 238
Galium
corrudæfolium 237
elatum 238
glaucum 239
græcum 240
hercynicum 238
hieroſolymitanum 239
Juſſieui 237
Linckii 240
linifolium 235
lucidum ib.
maritimum 240
megaloſpermum 238
minutum 239
Mollugo ib.
montanum 237
montium ib.
obliquum 238
paluſtre 237
pariſienſe 240
paſchale 237
piloſum 250
purpureum 239
puſillum ib.
pyrenaicum 238
rigidum 239
rubioides 237
rubrum 239
ſaxatile 237
ſcabrum 239
ſilvaticum ib.
ſilveſtre ib.
ſpurium ib.
tenue 238
tenuifolium ib.
tinctorium 237
trifidum ib.
tunetanum 240
uliginoſum 237
verum 239
Walteri 237
GALOPINA 219, 281
circæoides 281
Galveſia 888, 937
fruticoſa 937
Garcinia 740, 748
celebica 748
cornea ib.
Mangoſtana ib.
Gardenia 298, 433-434
dumetorum 434
florida 433
gummifera ib.
jaſminoides 434
latifolia 433
micranthos 434
Muſſænda 433
Pandacaki 434
radicans 433
Rothmannia 434
ſcandens ib.
ſpinoſa ib.
Thunbergia 433
uliginoſa 434
Garidella 661, 722
Nigellaſtrum 722
Gaſtonia 744, 769
ſpongioſa 769
Gaura 599, 607
biennis 607
Genioſtoma 377
rupeſtre ib.
Genipa 298, 388
americana 388
Geniſta 1075, 1076, 1090, 1091
anglica 1091
aſpalathoides ib.
canarienſis 1090
candicans ib.
florida ib.
germanica 1091
hirſuta ib.
hiſpanica ib.
humi-

Geniſta
- humifuſa 1090
- linifolia ib.
- luſitanica 1091
- *pendulina* 1090
- piloſa ib.
- ſagittalis ib.
- *ſericea* ib.
- ſibirica ib.
- tinctoria ib.
- tridentata ib.

Gentiana 307, 460-462
- acaulis 460
- Amarella 462
- aphylla ib.
- aquatica 461
- aſclepiadea 460
- aurea 461
- bavarica ib.
- *Cachanlahuan* 462
- campanulata 460
- campeſtris ib.
- *Catesbæi* 461
- Centaurium ib.
- ciliata 462
- Cruciata ib.
- decumbens 461
- *elongata* 462
- exacoides ib.
- exaltata 461
- filiformis 462
- *frigida* 461
- heterodita 462
- lutea 460
- maritima 462
- *montana* 461
- nana ib.
- nivalis ib.
- pannonica 460
- Pneumonanthe ib.
- *Porphyrio* 462
- *proſtrata* ib.

Gentiana
- *pulchella* 461
- pumila ib.
- punctata 460
- purpurea ib.
- pyrenaica ib.
- quinquefolia 462
- Saponaria 460
- ſaxoſa 461
- ſcilloides 462
- ſeſſilis ib.
- ſpicata ib.
- *tetragona* ib.
- utriculoſa ib.
- verna 461
- verticillaris 462
- verticillata ib.
- villoſa 460
- *viſcoſa* 462

Geoffroya 1078, 1115
- *inermis* 1115
- ſpinoſa ib.

Geranium 997, 1015-1026
- *abrotanifolium* 1024
- *acerifolium* 1022
- acetoſum 1021
- *aculeatum* 1024
- *africanum* 1022
- alceoides 1024
- alchimilloides 1021
- *alpinum* 1020
- althæoides 1022
- appendiculatum 1025
- *arabicum* 1015
- arduinum 1019
- *arenarium* 1024
- argenteum 1016
- *articulatum* 1023
- *aſphodeloides* 1017
- *aſtragalifolium* 1025

Geranium
- auſitum 1021
- *betrachioides* 1017
- *betonicum* 1024
- betulinum 1021
- *bicolor* 1023
- *biflorum* 1022
- *bifolium* ib.
- *bipinnatum* 1018
- bohemicum 1016
- *Botrys* 1018
- *capillare* 1025
- capitatum 1023
- carnoſum 1024
- *carolinianum* 1016
- *chærophyllum* 1019
- chium ib.
- ciconium ib.
- cicutarium 1020
- *ciliatum* 1021
- *cinereum* 1016
- columbinum ib.
- *cordifolium* 1021
- coriandrifolium 1025
- cotyledonis 1022
- *craſſifolium* 1018
- *craſſum* 1025
- criſpum 1023
- cucullatum 1022
- daucifolium 1025
- diſſectum 1016
- *elongatum* 1020
- emarginatum 1015
- *exſtipulatum* 1023
- *ferulaceum* 1025
- flavum 1026
- *fruticoſum* 1025
- fulgidum 1024
- fuſcum 1017
- gibboſum 1024
- *glanduloſum* 1020
- *glaucophyllum* 1019

Geranium
glaucum 1021
groſſularioides 1022
gruinum 1018
heliotropioides ib.
hermanniifolium 1022
hirſutum 1023
hirtum 1020
hiſpidum 1023
humile 1016
hibridum 1021
ibericum 1017
incanum 1016
incarnatum 1019
inquinans 1022
lacerum 1018
laciniatum 1019
lævigatum 1024
lanceolatum 1021
littoreum 1019
lobatum 1024
longifolium 1021
lucidum 1018
lupinoides 1016
macrorhizon 1017
maculatum ib.
malacoides 1018
marginatum 1020
maritimum 1018
minimum 1025
molle ib.
montanum 1016
moſchatum 1019
murcicum ib.
myrrhifolium 1025
nodoſum 1017
odoratiſſimum 1022
œnotheræ 1021
ovatum ib.
oxaloides ib.
palmatum 1018
paluſtre 1017

Geranium
papilionaceum 1022
parvulum 1015
peltatum 1020
petræum ib.
phæum 1017
piloſum 1022
pinnatifidum 1024
pinnatum 1025
præcox 1018
pratenſe 1017
proliferum 1025
proſtratum 1015
pulverulentum 1019
puſillum 1016
pyrenaicum ib.
quercifolium 1023
ramoſiſſimum 1025
ranunculoides 1015
reflexum 1017
revolutum 1024
Richardi 1015
robertianum 1018
romanum 1020
rotundifolium 1018
rupeſtre 1020
ſanguineum 1015
ſcabrum 1023
ſeſſiliflorum 1015
ſibiricum ib.
ſilvaticum 1017
ſpinoſum 1015
ſtipulaceum 1022
ſtriatum 1017
tubulare 1020
terebinthinaceum 1023
ternatum 1024
tetragonum 1020
triangulare 1019
trifidum 1023
trifolium 1019
triſte 1025

Geranium
tuberoſum 1015
variegatum 1023
villoſum 1025
viſcoſum 1023
vitifolium ib.
zonale 1020

Gerardia 889, 927, 928
delphinifolia 928
erecta ib.
flava 927
glutinoſa ib.
japonica ib.
nigrina ib.
pedicularia ib.
purpurea 928
ſcabra ib.
ſetacea ib.
tuberoſa 927
tubuloſa 928

Gerbera 647, 652
recentior 652

Geropogon 1161, 1168
caliculatus 1168
glaber ib.
hirſutus ib.

Geruma 301, 411
alba 411

Geſneria 888, 929, 930
acaulis 930
calicina ib.
corymboſa 929
exſerta ib.
grandis 930
humilis ib.
pulchella 929
pumila ib.
ſcabra ib.

Geſneria
tomentoſa 929
ventricoſa ib.
GETHYLLIS 524, 564
ciliaris 564
lanceolata ib.
ſpiralis ib.
villoſa ib.
Geum 781, 860, 861
album 861
aleppicum 860
canadenſe ib.
carolinianum 861
hybridum ib.
japonicum 860
montanum 861
reptans ib.
rivale ib.
urbanum 860
virginianum ib.
Gevuina 891, 966
Avellana 966
Ghinia 20, 37
Tamonea 37
Gilibertia 656, 682
decandra 682
heterophylla ib.
oppoſitifolia ib.
ovata ib.
Ginannia 647, 653
gujanenſis 653
GINORA 741, 754
americana 754
GISECKIA 312, 515
pharnacioides 515
GLABRARIA 1149, 1153
terſa 1153
Gladiolus 82, 110-112
alatus 110
alopecuroides 111
anceps ib.
anguſtus ib.
blandus ib.
capitatus 112
carinatus 111
carneus ib.
communis 110
criſpus 112
falcatus ib.
flavus 111
flexuoſus ib.
gramineus 112
imbricatus 110
junceus 112
latifolius ib.
Iomenia ib.
longiflorus 111
marginatus 112
montanus 111
plicatus 110
ramoſus 111
recurvus 110
ſecuriger 111
ſpathaceus 112
ſpicatus 111
ſtrictus 112
ſulphureus 111
tenellus 112
triſtis 111
tubiflorus 112
undulatus 110
viridis ib.
Watſonius 111
Glandularia 886, 920
carolinienſis 920
Glaux 304, 428
maritima 428
Glecoma 885, 904
hederaceum 904
Gleditſchia 521, 566
inermis 566
triacantha ib.
Glinus 744, 768
cryſtallinus 768
dictamnoides ib.
lotoides ib.
ſetiflorus ib.
GLOBBA 21, 49
marantina 49
nutans ib.
uviformis ib.
Globifera 19, 32
Umbroſa 32
Globularia 210, 226
Alypum 226
biſnagarica ib.
cordifolia ib.
longifolia ib.
nudicaulis ib.
orientalis ib.
ſpinoſa ib.
vulgaris ib.
Glochidion 82, 104
uniflorum 104
Glorioſa 525, 546
ſimplex 546
ſuperba ib.
Gloſſopetalum 312, 510
glabrum 510
tomentoſum ib.
GLUTA 301, 417
Benghas 417
Glycina 1075, 1078, 1105, 1106
Apios 1106
bituminoſa ib.

Glycina
caribæa 1106
comoſa *ib.*
debilis 1105
fruteſcens 1106
javanica *ib.*
labialis *ib.*
lucida *ib.*
monoica 1105
monophylla *ib.*
numularia 1106
phaſeoloides 1105
reticulata *ib.*
roſea 1106
ſtriata *ib.*
ſuaveolens *ib.*
ſubterranea 1105
tomentoſa 1106
triloba *ib.*
villoſa 1105

Glycyrrhiza 1075, 1077, 1117
aſperrima 1117
echinata *ib.*
glabra *ib.*
hirſuta *ib.*

Gmelina 888, 944
aſiatica 944
coromandeliana *ib.*
indica *ib.*

Gnaphalium 1163, 1213-1218
albeſcens 1215
alpinum 1216
americanum *ib.*
appendiculatum 1213
arabicum 1216
arboreum 1213
arenarium 1215
cinereum 1216
coronatum 1213

Gnaphalium
craſſifolium 1214
criſpum 1215
cuneifolium 1216
cylindricum 1215
cymoſum *ib.*
declinatum 1217
dentatum 1214
denudatum 1216
dioicum *ib.*
diſcolorum 1213
ericoides *ib.*
eximium *ib.*
fœtidum 1215
Forskohlii 1214
fruticans 1213
glomeratum 1217
grandiflorum 1213
helianthemifolium 1216
hiemale 1218
hiſpidum 1214
japonicum 1218
igneſcens 1214
imbricatum 1215
indicum 1216
involucratum 1217
lanatum *ib.*
luteo-album 1215
margaritaceum 1216
maritimum 1214
milleflorum *ib.*
mucronatum *ib.*
muricatum 1213
norwegicum 1217
nudifolium 1215
nudum 1217
obtuſifolium 1216
Oculus cati 1217
odoratiſſimum 1215
orientale 1214
patulum *ib.*
pedunculare 1215
petiolatum 1214

Gnaphalium
piloſellum 1217
plantagineum 1216
purpureum *ib.*
radiatum 1217
repens 1214
rutilans 1215
ſanguineum *ib.*
ſerratum 1214
ſilvaticum 1217
ſpicatum *ib.*
ſquarroſum 1216
ſtellatum *ib.*
Stoechas 1214
ſupinum 1217
tegetifolium 1213
tomentoſum 1217
trinerve 1213
uliginoſum 1217
umbellatum 1214
undatum 1213
undulatum 1215
uniflorum *ib.*
verticillatum 1217
Vira vira 1215

Gnetum 995, 1003
Gnemon 1003

Gnidia 600, 633
aceroſa 633
capitata *ib.*
daphnæfolia *ib.*
filamentoſa *ib.*
imbricata *ib.*
oppoſitifolia *ib.*
pinifolia *ib.*
polyſtachya *ib.*
radiata *ib.*
ſericea *ib.*
ſimplex *ib.*
tomentoſa *ib.*

Gomozia 219, 286
granadenſis 286

Gomphrena 305, 455
arboreſcens 455
braſilienſis ib.
flava ib.
globoſa ib.
hiſpida ib.
interrupta ib.
perennis ib.
ſerrata ib.

GONOCARPUS 218, 276
micranthus 276

GORDONIA 999, 1069
Laſianthus 1069
pubeſcens ib.

Gorteria 1165, 1262
Aſteroides 1262
barbata ib.
cernua ib.
ciliaris ib.
echinata ib.
herbacea ib.
hiſpida ib.
perſonata ib.
ringens ib.
ſetoſa ib.
ſpinoſa ib.
ſquarroſa ib.
uniflora ib.

Goſſypium 1000, 1059, 1060
arboreum 1059
barbadenſe ib.
eglanduloſum ib.
herbaceum ib.
hirſutum ib.
indicum ib.
latifolium 1060
micranthum 1059

Goſſypium
peruvianum 1059
religioſum ib.
rubrum ib.
vitifolium ib.

Gouania 304, 432
domingenſis 432

Grangeria 771, 796
borbonica 796

Granularia 1487, ib.
piſiformis ib.

Gratiola 19, 37, 38
acuminata 38
betonicifolia ib.
grandiflora ib.
hyſſopioides 37
inæqualis 38
lobelioides ib.
Monnieria 37
officinalis ib.
oppoſitifolia 38
peruviana ib.
ramoſa ib.
repens ib.
rotundifolia 37
virginiana 38

Greggia 774
aromatica ib.

Grewia 775, 817, 818
aſiatica 818
Microcos ib.
occidentalis 817
orientalis 818

Grias 774, 814
cauliflora 814

Grielum 663, 733
tenuifolium 733

Griſelinia 310, 493
lucida 493

Griſlea 600, 612
ſecunda 612

Gronovia 303, 421
ſcandens 421

Grubbia 599, 629
capenſis 629

Guajacum 656, 673, 674
dubium 674
officinale 673
ſanctum ib.

Gualtheria 659, 697
antipoda 697
procumbens ib.

Guapira 522, 574
gujanenſis 574

Guapurum 771, 793
peruvianum 793

GUAREA 600, 614
trichilioides 614

Guettarda 521, 566
elliptica 566
membranacea ib.
rugoſa ib.
ſpecioſa ib.

Gujera 656, 675
ſenegalenſis 675

Guilandina 655, 672, 673
Bonduc 672
Bonducella 673
Nuga ib.

Gundelia 1167, 1281
Tournefortii 1281

Gunnera 22, 76
perpenta 76

GUSTAVIA 999, 1038
anguſta 1038

Gymnanthes 995, 1005
elliptica 1005
lucida ib.
Gymnocarpos 304, 429
decandrus 429
Gynopogon 295, 430
Alyxia 430
ſcandens ib.
ſtellatus ib.
Gypſophila 661, 708, 709
aſcendens 709
alpina ib.
altiſſima ib.
faſtigiata ib.
muralis ib.
paniculata ib.
perfoliata 708
proſtrata ib.
repens 709
rigida ib.
ſaxifraga ib.
Struthium ib.
viſcoſa ib.

Hæmanthus 523, 534
carinatus 534
coccineus ib.
pubeſcens ib.
puniceus ib.
Hæmatoxylon 656, 677
campechianum 677
Hagenia 598, 613
abyſſinica 613
Haleſia 740, 749
diptera 749
tetraptera ib.

Halleria 887, 943
lucida 943
Haloragis 603, 643
alata 643
proſtrata ib.
Hamadryas 783, 876
magellanica 876
Hamamelis 218, 281, 282
androgyna 281
dioica 282
monoica ib.
Hamellia 299, 366
axillaris 366
chryſantha ib.
grandiflora ib.
patens ib.
ventricoſa ib.
Hartogia 215, 278
capenſis 278
Haſſelquiſtia 309, 471
ægyptiaca 471
cordata ib.
Hebe 19, 27
magellanica 27
Hebenſtreitia 887, 950, 951
ciliata 950
cordata ib.
dentata ib.
erinoides 951
fruticoſa ib.
integrifolia 950
Hedera 302, 420, 421
Helix 420
nutans 421
pendula ib.
quinquefolia 420

Hedwigia 601, 614
balſamifera 614
HEDYCARIA 781, 862
dentata 862
Hedycrea 304, 428
incana 428
Hedychium 1, 9
coronarium 9
Hedyoſmum 772, 826
arboreſcens 826
nutans ib.
Hedyotis 213, 232
americana 232
Auricularia ib.
fruticoſa ib.
graminifolia ib.
herbacea ib.
hiſpida ib.
maritima ib.
pumila ib.
rupeſtris ib.
umbellata ib.
Hedyſarum 1075, 1077, 1121-1127
aſcendens 1124
Alhagi 1122
alpinum 1126
argenteum 1125
axillare 1124
barbatum 1123
biarticulatum ib.
bupleurifolium 1122
canadenſe 1123
caneſcens 1125
canum 1124
Caput galli 1126
caudatum 1123
cornutum 1126
coronarium ib.

Hedyſarum
crinitum 1126
Criſta galli ib.
diphyllum 1122
diſtortum 1125
flexuoſum 1126
fruteſcens 1124
gangeticum 1122
glumaceum 1121
gramineum ib.
grandiflorum 1125
gujanenſe ib.
gyrans ib.
heterocarpon 1123
hirſutum 1122
hirtum 1124
humile 1126
imbricatum 1122
immaculatum 1127
incanum 1126
junceum 1125
lagopodioides 1123
lappaceum 1125
latebroſum 1122
lineatum 1123
maculatum 1122
marilandicum 1124
microphyllum ib.
moniliferum 1122
nudiflorum 1123
nummularifolium 1122
obſcurum 1127
Onobrychis 1126
paniculatum 1125
pictum 1127
piloſum 1124
pulchellum 1123
pumilum 1126
racemiferum 1125
racemoſum 1123
reniforme 1122
repens 1125
retroflexum 1123
axatile 1126

Hedyſarum
Scorpiurus 1123
ſericeum 1125
ſerotinum 1122
ſpartium 1126
ſpinoſiſſimum ib.
ſpiraie 1124
ſtriatum 1123
ſtrobiliferum 1122
ſtyracifolium ib.
ſupinum 1124
tomentoſum 1125
tortuoſum 1124
triangulare ib.
triflorum 1125
trigonum 1126
triquetrum 1122
umbellatum 1123
vaginale 1126
veſpertilionis 1122
violaceum 1124
virgatum 1125
virginicum 1126
viridiflorum 1125
viſcidum 1123
volubile 1124

Heinzia 599, 609
peregrina 609

Heiſteria 658, 686
coccinea 686

Helenium 1164, 1244
æſtivale 1244
auctumnale ib.
pubeſcens ib.
ſerotinum ib.
vernale ib.

Helianthus 1165, 1258 *ſq.*
altiſſimus 1258

Helianthus
anguſtifolius 1259
annuus 1258
atro-rubens ib.
decapetalus ib.
divaricatus ib.
frondoſus ib.
giganteus 1259
indicus 1258
lævis 1259
multiflorus 1258
ſtrumoſus 1259
thurifer ib.
tuberoſus 1258

HELICONIA 303, 423
alba 423
Bihai ib.
hirſuta ib.
pſittacorum ib.
Strelizia ib.

Helicteras 662, 727
anguſtifolia 727
apetala ib.
baruenſis ib.
carthagenenſis ib.
Iſora ib.
pentandra ib.

Heliocarpus 742, 755
americana 755

Heliophila 968, 985, 986
amplexicaulis 985
circæoides ib.
coronopifolia 985
digitata ib.
filiformis ib.
flava ib.
integrifolia 985

Heliophila
pinnata 986
puſilla *ib.*

Heliotropium 291, 314, 315
bacciferum 314
coromandelianum *ib.*
curaſſavicum *ib.*
europæum *ib.*
fruticoſum *ib.*
gnaphalodes 315
hiſpidum 314
indicum *ib.*
inundatum *ib.*
lineatum *ib.*
malabaricum *ib.*
marifolium *ib.*
orientale 315
ovalifolium 314
parviflorum *ib.*
peruvianum *ib.*
ſcabrum *ib.*
ſupinum *ib.*

Helleborus 782, 882
fœtidus 882
hiemalis *ib.*
niger *ib.*
trifolius *ib.*
viridis *ib.*

Helonias 527, 589
aſphodeloides 589
bullata *ib.*
pumila *ib.*

Helotium 1287, 1442
agaricoides 1442
aureum *ib.*
cucullatum *ib.*
glabrum *ib.*
hirſutum *ib.*
vadyoſum *ib.*

Helvella 1285, 1249-1251
æruginoſa 1450
atra *ib.*
atrata 1451
brunnea 1450
caliciformis *ib.*
ceraſina *ib.*
ciliaris *ib.*
clavata *ib.*
cochleata *ib.*
coccinea 1451
fuliginoſa 1449
gelatinoſa *ib.*
hiſpida 1450
horizontalis *ib.*
lilacea 1450
meſenterica 1451
Mitra 1450
pallida 1451
pezizoides 1449
revoluta *ib.*
ſulcata 1450
tremellina 1451
verſicolor 1450

Hemerocallis 525, 565
cordata 565
flava *ib.*
fulva *ib.*
japonica *ib.*

HEMIMERIS 889, 939
diffuſa 939
montana *ib.*
ſabuloſa *ib.*

Hemionitis 1283, 1300
japonica 1300
lanceolata *ib.*
lineata *ib.*
palmata *ib.*
paraſitica 1300
reticulata *ib.*

Hepetis 522, 531
anguſtifolia 531

Heracleum 308, 480
alpinum 480
anguſtifolium *ib.*
auſtriacum *ib.*
longifolium *ib.*
Panaces *ib.*
pumilum *ib.*
ſibiricum *ib.*
Sphondylium *ib.*
tuberoſum *ib.*

Heritiera 81, 113
tinctorum 113

Hermannia 996, 1009-1011
alnifolia 1011
althæifolia 1009
biſerrata 1010
candicans *ib.*
capenſis 1011
ciliaris 1010
denudata *ib.*
diffuſa 1011
filifolia *ib.*
glabrata 1010
groſſulariifolia *ib.*
hyſſopifolia *ib.*
incana *ib.*
involucrata *ib.*
lavandulifolia *ib.*
linifolia 1011
odorata 1010
plicata *ib.*
procumbens 1011
pulchella *ib.*
ſalvifolia 1010
ſcabra *ib.*
trifoliata 1011

Hermannia
trifurca 1010
triphylla 1011
veſicaria ib.

HERMAS 308, 465
capitata 465
ciliara ib.
depauperata ib.
gigantea ib.
quinquedentata ib.

Hernandia 83, 95
gujanenſis 95
ovigera ib.
ſonora ib.

Herniaria 306, 448
fruticoſa 448
glabra ib.
hirſuta ib.
lenticulata ib.
Payco ib.

Heſperis 967, 986
acris 986
africana ib.
inodora ib.
lacera ib.
matronalis ib.
tatarica ib.
triſtis ib.
verna ib.

Heuchera 307, 459
americana 459
dichotoma ib.

Heymaſſoli 599, 629
inermis 629
ſpinoſa ib.

Hibiſcus 1000, 1062-1067
Abelmoſchus 1066
aculeatus 1067
acuminatus 1062
æthiopicus 1064

Hibiſcus
arenarius 1067
bifurcatus 1063
braſillenſis 1066
calyphyllus 1067
cannabinus 1063
clypeatus 1066
columnaris ib.
cordifolius 1065
digitatus 1063
diverſifolius ib.
domingenſis ib.
elatus 1066
eſculentus ib.
ferrugineus 1065
ficulneus 1063
flaveſcens 1066
fraternus 1067
gujanenſis ib.
haſtatus 1062
hirtus 1064
hiſpidulus 1067
lævis 1062
Lampas 1064
laſiocarpus 1065
liliflorus 1064
Manihot 1067
membranaceus 1065
micans 1066
micranthus 1064
microphyllus ib.
militaris 1071
Moſcheutos 1065
mutabilis 1066
ovalifolius 1064
ovatus 1062
palmatus 1066
paluſtris 1065
pedunculatus 1066
pentacarpos 1062
phœniceus 1065
populneus 1064
præcox 1067
purpureus ib.

Hibiſcus
radiatus 1063
rhombifolius 1064
rigidus ib.
Roſa ſinenſis 1065
Sabdariffa 1066
ſenegalenſis 1065
ſinuatus 1063
ſororius 1065
ſpecioſus 1063
ſpicatus 1066
ſtriatus 1062
ſurattenſis 1063
ſyriacus 1066
ternatus 1067
tiliaceus 1063
tricuſpis 1064
trilobatus 1067
trilobus 1063
Trionum 1067
tripartitus ib.
tubuloſus 1065
unilateralis ib.
urens ib.
veſicarius 1067
virginicus 1062
vitifolius ib.

Hieracium 1161, 1176-1179
alpeſtre 1176
alpinum ib.
amplexicaule 1178
aurantiacum 1177
Auricula 1176
aurimontanum 1178
auſtriacum ib.
blattarioides ib.
capenſe 1176
cerinthoides 1178
chondrilloides ib.
cymoſum 1177
dichotomum 1179
dubium 1176

Hieracium
echioides 1177
flexuoſum 1179
glutinoſum ib.
Gmelini 1177
Gronovii ib.
helveticum 1178
hiſpidum 1177
humile ib.
incanum 1176
incarnatum 1177
Kalmii ib.
lactucaceum ib.
lyratum 1178
molle 1179
murorum 1178
paludoſum ib.
paniculatum ib.
Piloſella 1176
piloſum 1178
pontanum 1177
porrifolium 1178
præmorſum 1176
pumilum ib.
pyrenaicum 1178
rhomboidale 1179
ſabaudum 1177
ſanctum ib.
Sprengerianum 1178
ſquamoſum 1179
ſtaticefolium 1177
ſtipitatum ib.
taraxaconis 1176
umbellatum 1179
undulatum 1178
venoſum 1176
villoſum 1178
viroſum 1179
Hillia 522, 576
longiflora 576
tetrandra ib.
HIPPIA 1166, 1277
fruteſcens 1277
HIPPIA
integrifolia 1277
minuta ib.
Hippocratea 82, 107
comoſa 107
volubilis ib.
Hippocrepis 1075, 1078, 1119
balearica 1119
comoſa ib.
multiſiliquoſa ib.
uniſiliquoſa ib.
Hippomane 995, 1003
biglanduloſa 1003
Mancinella ib.
ſpinoſa ib.
Hippomanica 656, 674
ſeſſilifolia 674
Hippophae 218, 274
canadenſis 274
rhamnoides ib.
Hippuris 2, 16
lanceolata 16
tetraphylla ib.
vulgaris ib.
Hiræa 662, 725
reclinata 725
Hirtella 301, 418, 419
americana 418
paniculata 419
Hoffmannia 213, 245
pedunculata 245
Hoitzia 294, 347
mexicana 347
Holcus 87, 172-174
Arduini 174
avenaceus 173
biariſtatus 172
bicolor 173
Holcus
cafer 174
Dochna 173
Durra ib.
exiguus ib.
halepenſis ib.
lanatus ib.
latifolius 172
laxus 173
mollis ib.
niger 174
odoratus 172
pertuſus 173
racemoſus ib.
ſaccharatus ib.
ſerratus ib.
Sorghum ib.
ſpicatus ib.
ſtriatus ib.
Taff 174
Holoſteum 90, 207
cordatum 207
diandrum ib.
hirſutum ib.
ſucculentum ib.
umbellatum ib.
Homalium 778, 836
racemoſum 836
Rocoubea ib.
Honkenya 599, 609
Willdenovii 609
Hopea 1149, 1155
tinctoria 1155
Hordeum 88, 198, 199
bulboſum 199
diſtichon 198
geniculatum 199
hexaſtichon 198
murinum 199
jubatum ib.
maritimum ib.

Hordeum
montanum 199
murinum *ib.*
nodoſum *ib.*
perverſum *ib.*
pratenſe *ib.*
ſecalinum *ib.*
vulgare 198
Zeocrithon 199
Horminum 886, 916
pyrenaicum 916
HORTENSIA 662, 722
japonica 722
Hottonia 293, 329
indica 329
paluſtris *ib.*
Houſtonia 214, 236
cærulea 236
longifolia *ib.*
purpurea *ib.*
puſilla *ib.*
Houttuynia 782, 883
cordata 883
HOVENIA 301, 410
dulcis 410
Hudſonia 740, 751
ericoides 751
Hugonia 998, 1014
Myſtax 1014
tomentoſa *ib.*
Humulus 305, 451
Lupulus 451
Hura 999, 1035
crepitans 1035
Hyacinthus 525, 560, 561
amethyſtinus 560
botryoides *ib.*

Hyacinthus
cernuus 560
comoſus 561
convallarioides 560
corymboſus *ib.*
lanatus 561
monſtruoſus 560
Muſcari *ib.*
non ſcriptus *ib.*
orientalis *ib.*
racemoſus *ib.*
revolutus *ib.*
romanus *ib.*
Hydnum 1285, 1438-1440
agaricoides 1439
Auriſcalpium *ib.*
Barba Jovis 1440
candidum 1439
carnoſum 1438
carolinianum 1440
clandeſtinum 1439
clathroides 1440
coralloides 1438
cyathiforme 1439
Erinaceus *ib.*
floriforme *ib.*
gelatinoſum *ib.*
hybridum *ib.*
hyſtricinum 1440
imbricatum 1438
mucidum 1440
Occarium 1439
ochraceum 1440
papyraceum *ib.*
paraſiticum 1439
pectiniforme *ib.*
repandum 1438
reſupinatum 1439
rubicundum *ib.*
ſericeum *ib.*
ſtalacticum 1440
ſuberoſum 1439

Hydnum
ſublamelloſum 1438
tomentoſum *ib.*
zonatum *ib.*
Hydrangea 661, 703
arboreſcens 703
Hydraſtis 782, 888
canadenſis 883
Hydrocharis 648, 654
Morſus ranæ 654
Hydrocotyle 308, 467, 468
americana 467
aſiatica *ib.*
bidentata 468
cordata *ib.*
erecta *ib.*
glabrata *ib.*
hirſuta 467
moſchata *ib.*
natans *ib.*
ranunculoides 468
reniformis *ib.*
ſinenſis *ib.*
Solandra *ib.*
umbellata 467
villoſa 468
virgata *ib.*
vulgaris 467
Hydrolea 307, 458
quadrivalvis 458
ſpinoſa *ib.*
trigyna *ib.*
Hydrophora 1486
minima *ib.*
ſtercorea *ib.*
tenella *ib.*
HYDROPHYLAX 213, 260
maritima 260

Hydrophyllum 292, 330
canadenſe 330
virginicum ib.
Hymenæa 655, 667
Courbarit 667
HYOBANCHE 891, 955
ſanguinea 955
Hyoſcyamus 293, 379, 380
albus 379
aureus ib.
Datora ib.
muticus ib.
niger ib.
phyſaloides ib.
puſillus ib.
reticulatus ib.
Scopolia 380
Hyoſeris 1162, 1181-1182
caliculata 1182
caroliniana ib.
cretica ib.
fœtida 1181
Hedypnois 1182
lucida ib.
major ib.
minima ib.
minor ib.
pygmæa ib.
radiata 1185
rhagadioloides 1182
ſcabra ib.
virginica ib.
Hypecoum 218, 285
erectum 285
littorale ib.
pendulum ib.
procumbens ib.
Hypelate 598, 613
trifoliata 613
Hyperanthera 301, 408
arborea 408
Hypericon 1130, 1156-1170
ægyptium 1158
Androſæmum 1157
arboreum 1156
Aſcyron ib.
bacciferum ib.
balearicum ib.
barbatum 1160
Brathys 1156
calicinum ib.
campanulatum 1160
canadenſe 1158
canarienſe 1157
cayanenſe 1156
Coris 1160
criſpum 1158
denticulatum 1160
elatum 1157
elodes 1159
erectum ib.
ericoides 1158
floribundum 1157
folioſum ib.
glanduloſum ib.
gramineum 1158
gujanenſe 1156
guineenſe ib.
hircinum 1157
hirſutum 1160
humifuſum 1158
japonicum ib.
Kalmianum 1156
lævigatum 1158
latifolium 1156
linarifolium 1158
maculatum 1160
mexicanum 1158
Hypericon
monogynum 1160
montanum 1158
mutilum 1160
nudicaule ib.
numularium ib.
olympicum 1157
orientale ib.
patulum 1156
perfoliatum 1158
perforatum ib.
petiolatum 1157
piloſum 1160
prolificum 1157
pulchrum 1160
pyramidatum 1157
quadrangulare 1158
quinquenervium 1160
reflexum 1157
repens ib.
revolutum 1160
ſcabrum 1158
ſeſſilifolium 1156
ſetoſum 1160
ſinenſe 1157
tomentoſum 1160
tubuloſum ib.
virginicum 1158
Walteri 1160
Hypnum 1284, 1338-1347
abietinum 1343
acacioides 1339
adiantoides ib.
aduncum 1340
albens 1343
albicans 1341
alopecurum 1344
aſplenioides 1339
atrovirens 1346
attenuatum 1341
bryoides 1339
capillare 1345

Hypnum
cæſpitoſum 1345
chryſocomum 1347
cirrhoſum 1346
clavellatum ib.
complanatum 1341
compoſitum 1345
compreſſum 1343
congeſtum 1346
criſpatum 1340
criſpum ib.
Criſta caſtrenſis 1343
cupreſſiforme ib.
curtipendulum 1340
cuſpidatum 1345
cylindricum 1347
delicatulum 1343
dendroides 1340
denſum 1344
denticulatum 1339
depreſſum 1345
diaphanum 1342
Dickſoni ib.
faſciculatum 1344
filamentoſum 1347
filicinum 1343
filicoides 1340
filifolium 1341
filiforme 1340
flagellare 1341
flagellatum 1346
flexile 1344
fluitans 1342
fulgens ib.
glabellum 1343
gracile 1346
Halleri ib.
heteromallum 1340
jamaicenſe 1341
illecebrum 1345
intricatum 1343
julaceum 1346
loreum 1344
lucens 1342

Hypnum
luteſcens 1342
medium 1347
microphyllum 1345
molle 1347
myoſuroides 1341
myoſuron 1346
nigreſcens 1344
nitens 1346
ornithopodioides 1339
palmatum ib.
paluſtre 1341
parietinum 1343
patulum 1344
pennatum 1340
piliferum 1342
plumoſum 1343
polycarpon 1339
polypodioides ib.
polytrichoides 1345
prælongum 1343
proliferum ib.
prolixum 1347
pulchellum ib.
pumilum 1341
pungens 1346
purum 1345
reptans 1344
riparium 1345
rotundifolium 1346
rugoſum 1342
ruſcifolium ib.
Rutabulum 1347
Schreberi 1344
ſciuroides 1339
ſcorpioides 1344
ſemicompletum 1339
ſericeum 1340
ſerpens 1341
ſetaceum ib.
ſilvaticum 1342
Smithii 1347
ſpiniforme 1338

Hypnum
ſquamoſum 1344
ſtramineum 1342
ſtriatum ib.
ſtrumoſum 1339
tamariſci 1344
taxifolium 1339
tetragonum 1346
tomentoſum 1345
torquatum 1346
trichomanoides 1341
trichophyllum 1345
triquetrum 1342
undulatum ib.
velutinum 1345
viticuloſum 1340

Hypochœris 1161, 1183
glabra 1183
helvetica ib.
maculata ib.
minima ib.
radicata ib.

Hypoxis 324, 548, 549
alba 548
aquatica ib.
decumbens ib.
erecta ib.
faſcicularis ib.
minuta ib.
ovata ib.
plicata ib.
ſerrata ib.
ſeſſilis ib.
ſpicata ib.
ſtellata ib.
villoſa 549
violacea ib.

Hyptis 886, 898
capitata 898

Hyſſopus 885, 898
Lophanthus 898
nepetoides *ib.*
officinalis *ib.*
Hyſterium 1287, 1480
cæruleum 1480
candidum *ib.*
Jaboroſa 295, 380
bonarienſis 380
Jacquinia 295, 390
armillaris 390
linearis *ib.*
ruſcifolia *ib.*
venoſa *ib.*
Jambolifera 600, 613
pedunculata 613
Jaſione 303, 373
capenſis 373
montana *ib.*
Jaſminum 19, 24
azoricum 24
didymum *ib.*
fruticans *ib.*
grandiflorum *ib.*
humile *ib.*
oblongum *ib.*
odoratiſſimum *ib.*
officinale *ib.*
ſimplicifolium *ib.*
Jatropha 998, 1026, 1027
Curcas 1027
glanduloſa *ib.*
glauca *ib.*
goſſypifolia *ib.*
herbacea *ib.*
Janipha *ib.*
Jatropha
Manihot 1027
moluccana 1026
multifida 1027
ſpinoſa *ib.*
urens *ib.*
variegata *ib.*
Iberis 967, 975, 976
amara 975
arabica *ib.*
capæfolia *ib.*
gibraltarica *ib.*
linifolia 976
nudicaulis *ib.*
odorata *ib.*
pinnata *ib.*
rotundifolia 975
ſaxatilis *ib.*
ſemperflorens *ib.*
ſempervirens *ib.*
umbellata 976
Icica 600, 619
Acuchini 619
altiſſima *ib.*
decandra *ib.*
gujanenſis *ib.*
heptaphylla *ib.*
IGNATIA 294, 388
amara 388
Ilex 220, 287, 288
Aquifolium 287
aſiatica *ib.*
Caſſine *ib.*
cuneifolia *ib.*
Dahoon *ib.*
decidua 288
emarginata 287
japonica *ib.*
integra *ib.*
latifolia *ib.*
myrtifolia 288
opaca 287
Perado *ib.*
Ilex
rotunda 287
ſerrata *ib.*
Illecebrum 304, 426, 427
Achyrantha 427
alſinefolium *ib.*
arabicum *ib.*
ariſtatum 426
benghalenſe 427
brachiatum 426
canarienſe *ib.*
capitatum 427
cymoſum 426
echinatum 427
ficoideum *ib.*
fruteſcens 426
javanicum *ib.*
lanatum *ib.*
Monſoniæ *ib.*
Paronychia 427
polygonifolium *ib.*
polygonoides *ib.*
ſanguinolentum 426
ſeſſile 427
ſuffruticoſum 426
vermiculatum 427
verticillatum *ib.*
Illicium 783, 867
aniſatum 867
floridanum *ib.*
Imbricaria 600, 612
borbonica 612
Impatiens 301, 415
Balſamina 415
biflora *ib.*
cornuta *ib.*
latifolia *ib.*
Noli tangere *ib.*
oppoſitifolia *ib.*
roſmarinifolia *ib.*

Impatiens
ſinenſis 415
triflora *ib.*
Imperatoria 309, 488
Oſtrutium 488
Indigoſera 1075, 1078, 1127-1129
amœna 1127
anguſtifolia 1129
Anil *ib.*
argenteum *ib.*
candicans 1127
caroliniana 1129
cytiſoides 1128
dendroides 1129
denudata 1128
digitata *ib.*
diſperma 1129
enneaphylla 1128
filiformis *ib.*
fragrans *ib.*
frutèſcens *ib.*
glabra *ib.*
hendecaphylla 1129
hirſuta *ib.*
linifolia 1127
mexicana *ib.*
oblongifolia *ib.*
ovata *ib.*
pentaphylla 1128
procumbens *ib.*
pſoraloides 1127
ſarmentoſa *ib.*
ſemitrijuga 1128
ſericea 1127
ſpicata 1128
ſpinoſa 1127
ſtricta 1129
tinctoria 1128
trifoliata 1127
trita 1128
INOCARPUS 659, 698
edulis 698
Inula 1164, 1240-42
æſtuans 1242
arabica 1240
aromatica 1242
bifrons 1241
Britannica *ib.*
Budonium *ib.*
cærulea 1240
chryſocomoides 1241
crithmifolia 1242
dubia 1240
dyſenterica 1241
enſifolia 1242
fœtida 1241
germanica *ib.*
Helenium 1240
hirta 1241
japonica *ib.*
indica *ib.*
mariana *ib.*
montana *ib.*
Oculus Chriſti 1240
odora *ib.*
pinifolia 1242
provincialis 1240
Pulicaria 1241
ſalicina *ib.*
ſpiralifolia 1240
ſquarroſa *ib.*
ſuaveolens 1241
undulata *ib.*
Ioncquetia 663, 728
gujanenſis 728
Ipomœa 294, 345-347
anguſtifolia 346
aquatica 345
biloba *ib.*
Bona nox 346
campanulata 346
carnea *ib.*
carolina 345
coccinea 346
digitata 345
filiformis 346
glaucifolia *ib.*
haſtata *ib.*
hederacea *ib.*
hederifolia 345
hepaticifolia 346
lacunoſa *ib.*
leucantha 345
luteola 346
palmata 345
paniculata 346
pentaphylla 347
Pes tigridis *ib.*
Quamoclit 345
repanda 346
rubra 345
ſcabra *ib.*
ſolanifolia 346
ſtolonifera 345
tamnifolia 347
triflora 345
triloba *ib.*
tuberoſa *ib.*
umbellata *ib.*
verticillata 346
violacea *ib.*
Ireſine 307, 463
Celoſia 463
Iris 81, 113-116
alata 115
anguſta *ib.*
aphylla 114
biflora 113
bituminoſa 116
ciliata 113
compreſſa 114
criſpa 116

Iris
criſtata 113
dichotoma 114
edulis 116
flaviſſima 114
flexuoſa ib.
florentina 113
fœtida 115
germanica 114
graminea 116
Güldenſtædtii 115
halophila ib.
hexagona 114
juncea 116
lucida 114
martinicenſis 116
minuta 113
ochroleuca 115
papilionacea 116
pavonia ib.
perſica 115
plumaria 114
polyſtachia 116
Pſeudacorus 115
pumila 113
ramoſa 115
ſambucina 114
ſetacea 115
ſibirica 116
Siſyrinchium 115
ſpathacea ib.
ſpuria 116
ſqualens 114
ſuſiana 113
tenuifolia 116
tricuſpis 114
tripetala ib.
triſtis 116
tuberoſa ib.
unguicularis 115
variegata 114
ventricoſa 115
verſicolor ib.
verna ib.

Iris
viſcaria 116
Xiphium 114
Iſatis 968, 992
ægyptia 992
aleppica ib.
armena ib.
luſitanica ib.
pinnata ib.
tinctoria ib.
Iſchæmum 87, 177
ariſtatum 177
glabrum ib.
involutum ib.
murinum ib.
muticum ib.
ſcarioſum ib.
ſecundatum ib.
Iſertia 521, 567
coccinea 567
Iſnardia 218, 265
paluſtris 265
Iſoetes 1284, 1322
coromandeliana 1322
lacuſtris ib.
Iſopyrum 782, 881, 882
aquilegioides 882
fumarioides 881
thalictroides 882
Itea 302, 411
virginica 411
Juglans 742, 755
alba 755
anguſtifolia ib.
baccata ib.
cinerea ib.
glabra ib.
nigra ib.

Juglans
Pacan 755
regia ib.
Juncus 526, 571-573
acutus 571
alpinus 572
aquaticus 571
biglumis 572
bufonius ib.
bulboſus ib.
campeſtris 573
conglomeratus 571
effuſus ib.
filiformis ib.
gracilis ib.
grandiflorus 572
Jacquini ib.
inflexus 571
luteus 573
luzulinus 572
maximus ib.
niveus 573
nodoſus 571
pediformis 572
piloſus ib.
punctorius 571
ſerratus 573
ſilvaticus 571
ſpadiceus 572
ſpicatus 573
ſpinoſus ib.
ſquarroſus 571
ſtygius 572
ſubulatus 573
ſubverticillatus 572
ſupinus ib.
Tenageia ib.
trifidus 571
triglumis ib.
uliginoſus ib.
Jungermannia 1285, 1347-1353
adiantoides 1348
albi-

Jungermannia
albicans 1352
alpina 1352
angulosa 1348
aquatica 1349
aſplenioides 1347
atrata 1351
barbata 1350
bicornis 1348
bicuſpidata 1349
bidentata 1348
biſuria 1352
bipinnata 1353
brachiata 1351
capillaris 1350
ciliaris 1351
cinerea 1352
cochleariformis 1350
complanata 1351
connata 1349
criſtata 1348
cupreſſina 1350
curvifolia 1352
dichotoma 1353
diffuſa 1351
dilatata ib.
emarginata 1348
epiphylla 1353
filicina 1351
filiformis ib.
flava ib.
fucoidea 1353
furcata ib.
globulifera 1348
javanica ib.
julacea 1352
juniperina 1350
lanceolata 1348
linearis 1353
macrorhiza 1349,1353
minuta 1349
multifida 1353
multiflora 1350
nemoroſa ib.

Jungermannia
pallens 1349
pauciflora ib.
perfoliata 1348
pinguis 1353
platyphylla 1351
polyanthos 1348
polyphylla 1353
proſtrata 1348
pulcherrima 1352
puſilla ib.
pygmæa ib.
quadridentata 1349
quinquedentata ib.
reptans 1350
reſupinata ib.
rupeſtris 1352
ſcalaris 1348
ſerrulata 1350
ſertularioides 1352
ſetiformis 1349
ſimplex 1350
ſinuata 1353
ſphærocephala 1349
ſphagni 1348
ſpinuloſa 1349
ſtolonifera 1351
tamariſcifolia ib.
tenera 1349
tomentoſa 1352
tranſverſalis 1351
trichophylla 1352
trilobata 1350
undulata ib.
vaginata 1352
varia ib.
ventricoſa 1349
viticuloſa 1348

Junghanſia 212,259
faginea 259

JUNGIA 1167-1281
ferruginea 1281

Juniperus 995,1005
barbadenſis 1005
bermudiana ib.
caroliniana ib.
communis ib.
lycia ib.
Oxycedrus ib.
phœnicea ib.
Sabina ib.
ſinenſis ib.
thurifera ib.
virginiana ib.

Juſſieua 658,686
diffuſa 686
edulis ib.
erecta ib.
inclinata ib.
peruviana ib.
pubeſcens ib.
repens ib.
ſuffruticoſa ib.
tenella ib.

Juſticia 20, 32-35
acaulis 34
acicularis 33
Adharoda 32
armata 33
aſſurgens 34
Betonica 32
bivalvis 35
bracteolata 33
cærulea ib.
carthaginenſis 34
ciliaris ib.
coccinea 35
Ecbolium 32
echioides 34
faſtuoſa 33
fœtida ib.
Grandaruſſa ib.
gangetica 35
hyſſopifolia 33

Juſticia
- japonica 35
- infundibuliformis 32
- *lanceata* 33
- *longifolia* ib.
- *madurenſis* 34
- *moretiana* 35
- naſuta 34
- *nemoroſa* 35
- *nitida* 33
- *nutans* 35
- orchioides 33
- *paniculata* 34
- *parviflora* 35
- pectinata 34
- picta 32
- procumbens 34
- pulcherrima 32
- purpurea 35
- *repanda* 33
- repens 34
- ſcorpioides 32
- *ſexangularis* 34
- ſinenſis ib.
- ſpinoſa 32
- tranquebarenſis 33
- *triflora* 34
- *triſpinoſa* 32
- *variegata* 33
- verticillaris ib.
- *viridis* 34

Iva 305, 463
- annua 463
- fruteſcens ib.
- *imbricata* ib.
- *monophylla* ib.

Ixia 82, 108, 110
- *ariſtata* 109
- *aulica* ib.
- bulbifera 109
- Bulbocodium 108
- *capillaris* 109
- *cinnamomea* 109
- corymboſa ib.
- *criſpa* ib.
- crocata 110
- *deuſta* 109
- erecta ib.
- *exciſa* 110
- *falcata* ib.
- *feneſtrata* ib.
- *fruticoſa* 108
- *hirta* ib.
- *humilis* ib.
- *Lancea* 110
- *Lapeironſia* 108
- *linearis* 109
- maculata ib.
- *minuta* 108
- *patens* 109
- *pendula* ib.
- *pentandra* 110
- *piloſa* 108
- *polyſtachya* 110
- *purpurea* ib.
- *rubra cyanea* 108
- ſcyllaris 109
- ſecunda 108
- *ſetacea* 109
- *ſqualida* ib.
- *villoſa* 108
- *villoſula* 110

Ixora 212, 243
- alba 243
- *alternifolia* ib.
- americana ib.
- coccinea ib.
- *faſciculata* ib.
- multiflora ib.

Kæmpferia 1, 8, 9
- Galanga 8
- *purpurea* 9
- rotunda 8

Kalmia 659, 693
- anguſtifolia 693
- *glauca* ib.
- *hirſuta* ib.
- latifolia ib.
- *polifolia* ib.

Kiggelaria 663, 727
- africana 727
- integrifolia ib.

Kirganella 996, 1008
- *virginea* 1008

Kleinhovia 656, 683
- Hoſpita 683

Knautia 210, 231
- orientalis 231
- palæſtina ib.
- plumoſa ib.
- propontica ib.

Knoxia 214, 236
- *ſtricta* 236
- zeylanica ib.

Kœnigia 89, 207
- iſlandica 207

Krameria 278
- Ixina ib.

Kraſchenninikoſia 218, 274
- *latens* 274

Kuhnia 292, 375
- eupatorioides 375
- pinnata ib.

KYLLINGA 84, 122
- *filiformis* 122
- monocephala ib.
- punicea ib.
- *ſumatrenſis* ib.
- triceps ib.
- umbellata ib.

Kyrtandra 20, 37
biflora 37
cymoſa ib.
Kyrtanthus 298, 362
longiflorus 362

Labatia 212, 250
ſeſſiliflora 250
Lachenalia 522, 532
contaminata 532
mediana ib.
orchioides ib.
orthopetala ib.
pallida ib.
pendula ib.
puſtulata ib.
tricolor ib.
Lachnæa 602, 635
conglomerata 635
eriocephala ib.
Lacis 777, 834
fluviatilis 834
Laciſtema 3, 16
myricoides 16
Lactuca 1161, 1172
canadenſis 1172
caroliniana ib.
decorticata ib.
flava ib.
indica ib.
inermis ib.
intybacea ib.
perennis ib.
quercina ib.
ſativa ib.
Scariola ib.
ſinuata ib.
tuberoſa ib.
viroſa ib.
Laëtia 772, 816
apetala 816
Laëtia
completa 816
Guidonia ib.
Thamnia ib.
Lagerſtrœmia 770, 821
indica 821
Lagœcia 303, 422
cuminoides 422
Laguna 1000, 1039
aculeata 1039
Lagurus 87, 194
cylindricus 194
ovatus ib.
Lamium 885, 904, 905
album 904
bifidum ib.
garganicum ib.
lævigatum ib.
maculatum ib.
molle 905
multifidum ib.
Orvala 904
purpureum 905
rugoſum 904
Lantana 888, 945, 946
aculeata 945
africana 946
annua 945
Camara ib.
involucrata 946
meliſſæfolia 945
mista ib.
odorata 946
Radula 945
ſalvifolia ib.
ſcabrida ib.
ſtricta ib.
trifolia 946
viburnoides ib.
Lapſana 1162, 1183
communis 1183
Kœlpinia ib.
Rhagadiolus ib.
ſtellata ib.
taraxaconoides ib.
Zacintha ib.
Laſerpitium 308, 479, 480
Aciphylla 480
anguſtifolium 479
aquilegifolium ib.
Chironium 480
dauricum 479
ferulaceum 480
gallicum 479
Halleri ib.
latifolium ib.
peucedanoides ib.
prutenicum ib.
ſilaifolium ib.
Siler ib.
ſimplex 480
trilobum 479
Laſioſtoma 211, 248
Ruhamon 248
Latania 999, 1035
Commerſoni 1035
Lathræa 887, 924, 925
Anblatum 924
Clandeſtina ib.
Phelypæa ib.
quinquefida ib.
Squamaria 925
Lathyrus 1075, 1077, 1109, 1110
amphicarpos 1109
angulatus ib.
annuus ib.
Aphaca ib.

Lathyrus
articulatus 1109
Cicer ib.
Clymenum 1110
heterophyllus ib.
hirſutus ib.
inconſpicuus 1109
latifolius 1110
Niſſolii 1109
odoratus ib.
paluſtris 1110
piſiformis ib.
pratenſis ib.
ſativus 1109
ſetifolius ib.
ſilveſtris 1110
ſphæricus 1109
tingitanus 1110
tomentoſus 1109
tuberoſus 1110

Laugeria 295, 395
lucida 395
odorata ib.
tomentoſa ib.

Laurembergia 219, 284
capenſis 284

Laurus 647, 649-651
æſtivalis 650
Benzoin ib.
Borbonia 651
Camphora 650
Caſſia 649
cauſtica 651
Chloroxylon 649
Cinnamomum ib.
coriacea 650
Culilaban 649
exaltata 650
floribunda 651
fœtens ib.

Laurus
geniculata 650
glauca ib.
indica 651
Leucoxylon ib.
lucida ib.
martinicenſis 650
meliſſæfolia ib.
membranacea ib.
montana ib.
nobilis ib.
patens 651
pedunculata 650
pendula ib.
Perſea ib.
Saſſafras 651
fumatrenſis 650
triandra 651
umbellata ib.

Lavandula 885, 900, 901
carnoſa 901
dentata 900
multifida ib.
pinnata ib.
Spica ib.
Stœchas ib.
viridis ib.

Lavatera 1002, 1057, 1058
africana 1057
americana ib.
arborea ib.
cretica ib.
luſitanica ib.
maritima ib.
micans ib.
olbia ib.
thuringiaca ib.
triloba ib.
trimeſtris 1058

Lawſonia 599, 619
Acronychia 619

Lawſonia
inermis 619
ſpinoſa ib.

Leæba 521, 567
dubia 567

Lechea 89, 209
junctfolia 209
major ib.
minor ib.

Lecythis 776, 818, 819
amara 818
grandiflora ib.
Idatimon 819
lutea ib.
minor ib.
Ollaria 818
parviflora ib.
Zabucajo 819

Ledum 658, 693, 694
groenlandicum 694
latifolium ib.
paluſtre 693

Leea 299, 405
æquata 405
criſpa ib.

Leerſia 526, 578
hexandra 578
monandra ib.

Legnotis 775, 817
Caſſipurea 817
elliptica ib.

Lemna 22, 70
arhiza 70
gibba ib.
minor ib.
polyrhiza ib.
triſulca ib.

Lemniſcia 775, 817
gujanenſis 817

Leontice 523, 556
altaica 556
Chryſogonum *ib.*
leontopetaloides *ib.*
Leontopetalum *ib.*
thalictroides *ib.*
veſicaria *ib.*

Leontodon 1161, 1174-1176
alpinus 1175
aſper *ib.*
aureus *ib.*
autumnalis *ib.*
bulboſus *ib.*
carolinianus *ib.*
croceus *ib.*
danubialis 1176
Hallite 1175
hirtus *ib.*
hiſpidus *ib.*
megalorhizos *ib.*
mucronatus *ib.*
officinalis *ib.*
Taraxacon 1175
tomentoſus *ib.*
tuberoſus *ib.*

Leonurus 885, 909
Cardiaca 909
criſpus *ib.*
Marrubiaſtrum *ib.*
ſibiricus *ib.*
tataricus *ib.*

Lepidium 967, 972, 973
alpinum 973
bonarienſe *ib.*
cardamines 972
chalepenſe *ib.*
didymum 973
divaricatum *ib.*
Draba 972

Lepidium
graminifolium 972
Iberis 973
latifolium 972
lyratum *ib.*
nudicaule 973
oleraceum *ib.*
perfoliatum 972
petræum *ib.*
Piſcidium *ib.*
procumbens *ib.*
ruderale 973
ſativum 972
ſpinoſum *ib.*
ſubulatum *ib.*
ſuffruticoſum *ib.*
veſicarium *ib.*
virginicum 973

LERCHEA 996, 1008
longicauda 1008

Leucojum 523, 534
æſtivum 534
auctumnale *ib.*
vernum *ib.*

Leyſera 1164, 1245 *ſq.*
Callicarnia 1245
caroliniana 1246
gnaphalodes 1245
paleacea 1246

Lichen 1285, 1356-1379
Acetabulum 1365
aculeatus 1377
æruginoſus 1362
aggregatus 1377
albeſcens 1364
albidus 1378
albo-ater 1359

Lichen
albo-cæruleſcens 1358
albo-flaveſcens 1368
albo-incarnatus 1362
albus 1356
ampullaceus 1370
androgynus 1361
anguloſus *ib.*
anguſtatus 1368
antarcticus 1373
anthracinus 1375
antiquitatis 1356
aphthoſus 1373
aquaticus *ib.*
arcticus *ib.*
articulatus 1379
ater 1363
atratus 1368
atro-albus 1360
atro-virens 1357
aurantiaco-ater 1379
aurantiacus 1364
badius 1362
barbatus 1378
betulinus 1360
bicolor 1379
botryoides 1356
botrytis 1376
Burgeſſii 1369
byſſinus 1364
byſſoides 1357
cæruleo-nigricans 1359
cæruleſcens 1363
cæſius 1365
calcareus 1359
calicaris 1370
candelaris 1361
candidus 1358, 1365
calvus 1360
caneſcens *ib.*
caninus 1373
canus 1364

Lichen
capenſis 1379
caperatus 1371
capitatus 1357
carbonarius 1361
carnoſus 1365
carpineus 1361
centrifugus 1366
ceratophyllus 1372
cerinus 1368
ceſpitoſus 1377
chalybeiformis 1379
chryſophthalmos 1369
ciliaris ib.
ciliatus 1367
cinchonæ 1378
cinereſcens 1359
cinereo-fuſcus 1360, 1364
cinereus 1356
cinnabarinus 1365
circumſcriptus 1360
citricolorus 1378
citrinus 1369
clauſus 1362
cocciferus 1375
coccineus 1358
cochleatus 1371
Cocoës 1367
colliculoſus 1359
concentricus ib.
confluens ib.
corallinus 1364
corniculatus 1373
coriiformis 1369
cornucopioides 1375
cornutus 1376
craſſus 1365
criſpus 1368
criſtatus ib.
crocatus 1371
croceus 1374
cruentus 1363
cupularis ib.

Lichen
curcumatus 1356
damæcornis 1372
decipiens 1378
deformis 1375
deuſtus 1374
diaphanus 1372
Dickſoni 1363
diffuſus 1367
digitatus 1375
diſſectus 1372
divaricatus 1379
elegans 1361
elveliformis 1362
elveloides 1358
Endocarpon 1370
ericetorum 1357
eroſus 1374
eſculentus 1359
exaſperatus 1374
excavatus 1362
fagineus 1360
Fahlunenſis 1367
fallax 1371
farinaceus 1370
farinoſus 1357
faſcicularis 1369
ferrugineus 1357
ferruginoſus 1360
filiformis 1375
Filix 1370
fimbriatus 1375
flammeus 1376
flavens 1372
flaveolus 1362
flaveſcens 1363
flavicans 1364
flavidus 1379
flavo-fuſcus 1359
flavo-rubeſcens 1360
flavo-vireſcens 1360
flavus 1356
flocculoſus 1375
floridus 1378

Lichen
fluviatilis 1373
foliaceus 1375
fragilis 1377
fraudulentus 1371
fraxineus 1370
fuciformis ib.
fucinus 1378
fucoides 1371
fugax 1369
fulgens 1364
fuliginoſus 1374
fulvus 1362
fungiformis 1357
fungoides ib.
furcatus 1376
furfuraceus 1370
fuſco-ater 1359
fuſco-luteus 1363
fuſco-rubens 1368
fuſcus 1357
gelidus 1361
geographicus 1357
gibboſus 1363
glaucus 1371
globifer 1377
goſſypinus 1362
gracilis 1375
gramineus 1356
graniformis 1359
granoſus 1365
granulatus 1369
griſeus 1361
gujanenſis 1379
Hæmatomma 1361
hemiſphæricus 1358
herbaceus 1368
hippotrichioides 1378
hirtus 1379
hiſpidus 1376
horizontalis 1373
jacobæifolius 1368
Jacquini 1374
japonicus 1371

Lichen		Lichen		Lichen	
Icmadophila	1358	abſcurus	1365	pulverulentus	1367
incanus	1356	oculatus	1357	punctiformis	1358
Jolithus	ib.	ocellatus	1361	puſtulatus	1374
islandicus	1369	ochrochlorus	1360	putredinis	1356
jubatus	1379	odoratus	1356	pyxidatus	1375
juniperinus	1371	Œderi	1360	quercifolius	1366
lacerus	1372	olivaceus	1367	quercinus	1367
laciniatus	1367	omphalodes	ib.	quernεus	1358
lacinioſus	1372	opuntioides	1369	quiſquiliaris	1377
lacteus	1358	orbicularis	1365	radiatus	1376
lanatus	1379	ornatus	1371	radiciformis	1378
lanuginoſus	1367	palleſcens	1363	radioſus	1365
laqueatus	1368	pallidus	ib.	ramuloſus	1377
lentiger	1361	pannoſus	1362	rangiferinus	1376
leucomelas	1370	Papillaria	1377	reſupinatus	1373
leucophæus	1366	paraſiticus	1357	reticulatus	1379
Linckii	1361	Parellus	1364	rigidus	1366
linearis	1370	parietinus	1368	rimoſus	1363
lobatus	1372	paſcalis	1377	Roccella	1377
lucidus	1365	patellatus	1366	roridus	1372
luteolus	1368	perforatus	1374	roſaceus	1360
lutereus	1359	perlatus	ib.	roſetus	1362
luteſcens	1356	pertuſus	1358	roſeus	1356
luteus	1363	petræus	ib.	rubens	ib.
madreporæformis	1378	petroſus	1360	rufeſcens	1363
marginellus	1372	peziʒoides	1364	rufus	1357, 1373
marmoratus	1365	phyſodes	1368	rugoſus	1357
marmoreus	1363	pictus	1366	rupeſtris	1369
melanocarpos	1377	pinaſtri	1371	rupicola	1358
melanoleucos	1365	plicatus	1378	rutilus	1360
melanoſticos	1364	plumbeus	1370	ſabuletorum	1353
membranaceus	1371	polydactylos	1373	ſaccatus	1374
meſentericus	1375	polyphyllus	1374	ſalicinus	1363
miniatus	1374	polyrhiʒos	ib.	ſanguinarius	1359
minutiſſimus	1364	proboſcideus	ib.	ſanguineo-ater	1362
muralis	1365	prunaſtri	1371	ſarcoides	1374
		pubeſcens	1379	ſaturninus	1371
muſcicola	1378	pulchellus	1367	ſaxatilis	1367
muſcorum	1358	pulcher	1368	ſaxicola	1366
niger	1360	pullus	1367	ſaxoſus	1378
nigreſcens	1369	pulmonarius	1370	ſcopulorum	1373
nivalis	1370	pulpoſus	1372	ſcriptus	1357

Lichen
ſcruposus 1362
ſemipinnatus 1372
ſepincola 1370
ſerratus 1372
Sertularia 1377
ſetoſus 1378
ſiliquoſus 1377
ſilvaticus 1373
ſimplex 1375
ſpadiceus 1377
ſpecioſus 1366
ſphæroides 1359
ſpinoſus 1376
ſquamatus 1366
ſquamoſus 1368
ſtellariformis 1367
ſtellaris *ib.*
ſtygius *ib.*
ſubfuſcus 1363
ſubimbricatus 1364
ſubulatus 1376
ſubuliformis *ib.*
ſubvireſcens 1378
ſulphureus 1359
tartareus 1362
tenax 1368
tenellus 1369
tenuiſſimus 1371
tiliaceus 1365
tinctorius 1370
tomentoſus 1372
Tremella 1369
tremelloides 1371
triſtis 1376
tuberculoſus 1357
uncialis 1376
upſalienſis 1364
urceolaris *ib.*
Uſnea 1379
variegatus 1356
velleus 1374
venoſus 1373

Lichen
ventoſus 1360
ventricoſus 1375
vermicellaris 1377
vernalis 1359
verniciformis *ib.*
verrucarius 1366
verrucifer 1373
verruciger 1377
verrucoſus 1364
veſiculoſus 1372
villoſus 1356
viridatus 1358
virideſcens 1361
viridi-ater 1361
viridis 1375
viridulus 1359
vitellinus 1361
vulpinus 1379

LICUALA 522, 529
ſpinoſa 529

Lidbeckia 210, 227
capenſis 227

Lightfootia 772, 826
oxycoccoides 826
ſerrata *ib.*
ſubulata *ib.*

Lignonia 303, 373
monodynama 373

Liguſticum 309, 481
auſtriacum 481
baicalicum *ib.*
candicans *ib.*
cornubienſe *ib.*
Gingidium *ib.*
Gmelini *ib.*
Leviſticum *ib.*
luteum *ib.*
nodiflorum *ib.*
peloponnenſe *ib.*

Liguſticum
peregrinum 481
pyrenæum *ib.*

Liguſtrum 18, 25
japonicum 25
vulgare *ib.*

Lilium 525, 544, 545
bulbiferum 544
camtſchatcenſe 545
canadenſe *ib.*
candidum 544
Catesbæi 545
chalcedonium 544
japonicum 545
Martagon *ib.*
philadelphcium *ib.*
pomponicum 544
ſuperbum 545

Limeum 593, 597
africanum 597
aphyllum *ib.*
humile *ib.*

Limodorum 21, 60
altum 60
autumnale 61
enſatum 60
gentianoides *ib.*
grandiflorum *ib.*
pendulum *ib.*
præcox 61
ſtriatum 60
Tancarvillea *ib.*
tuberoſum *ib.*
utriculatum *ib.*

Limonia 658, 684
acidiſſima 684
dulcis *ib.*
lucida *ib.*
minuta *ib.*
monophylla *ib.*
pentaphylla *ib.*
trifoliata *ib.*

Limoſella 888,953
aquatica 953
calicina ib.
diandra ib.
LINCONIA 307,448
alopecuroidea 448
LINDERA 525,565
umbellata 565
LINDERNIA 888, 947
dianthera 947
japonica ib.
pyxidaria ib.
Linnæa 890,952
borealis 952
Linum 313,512-514
africanum 513
alpinum ib.
aquilinum 512
arboreum 513
auſtriacum ib.
campanulatum ib.
catharticum ib.
flavum ib.
gallicum ib.
hirſutum 512
maritimum 513
monogynum ib.
narbonenſe 512
nodiflorum 513
perenne 512
quadrifolium 513
ſtriatum 514
ſtrictum 512
ſuffruticoſum 513
uſitatiſſimum 512
verticillatum 513
virginianum ib.
viſcoſum ib.
LIPARIA 1078,1113
graminifolia 1113
ſericea ib.
ſphærica ib.
umbellata ib.
villoſa ib.
Lippia 887,955,956
americana 955
cymoſa 956
hemiſphærica 955
hirſuta 956
ovata ib.
Liquidambar 777, 832
imberbe 832
peregrinum ib.
ſtyraciſluum ib.
Liriodendron 782, 867
Liliifera 867
Tulipifera ib.
Liſianthus 293,334 335
alatus 335
cærulescens 334
chelonoides 335
cordifolius ib.
exſertus ib.
frigidus ib.
glaber ib.
glaucifolius ib.
grandiflorus ib.
latifolius ib.
longifolius 334
purpuraſcens 335
umbellatus ib.
Litchi 603,635
ſinenſe 635
Lithophila 20, 49
japonica 49
muſcoides ib.
Lithoſpermum 291, 316,317
anguſtifolium 317
arvenſe 316
ciliatum 317
digynum ib.
diſpermum 316
fruticoſum ib.
heliotropoides 317
hiſpidum ib.
incanum ib.
officinale 316
orientale ib.
purpuro-cæruleum ib.
retortum 317
tenuiflorum 316
virginicum ib.
LITTORELLA 211, 251
lacuſtris 251
Lobelia 294, 355-358
acuminata 355
anceps ib.
angulata 357
arborea 355
aſſurgens 356
bellidiflora ib.
bulboſa ib.
Cardinalis ib.
cliffortiana 357
Columnæ 356
comoſa 357
cornuta 355
coronopifolia 357
Cyphia ib.
debilis ib.
depreſſa 355
Dortmanna ib.
erinoides 357
Erinus ib.

Lobelia
ferruginea 356
fruticoſa 358
glanduloſa 356
grandis 355
hirſuta 357
inflata *ib.*
Kalmii 355
lævigata 356
Laurentia 357
longiflora 356
lutea 357
minuta *ib.*
paniculata 355
patula 356
Phyteuma *ib.*
pinifolia 355
pubeſcens 358
ſecunda 356
ſimplex 355
ſiphylitica 357
ſtricta 356
ſubulata 368
ſurinamenſis 356
tenella 368
tomentoſa 356
triquetra *ib.*
Tupa 355
urens 357
volubilis 355
zeylanica 357
Loeflingia 82, 105
caſpica 105
hiſpanica *ib.*
indica *ib.*
Loeſelia 888, 946
ciliata 946
Logania 302, 422
pentacrina 422
Lolium 88, 196
diſtachyum 196
perenne *ib.*
Lolium
remotum 196
temulentum *ib.*
tenue *ib.*
Lonchitis 1283, 1300 *ſq.*
aurita 1301
bipinnata *ib.*
hirſuta 1300
pedata *ib.*
repens 1301
tenuifolia *ib.*
Lonicera 298, 368-369
alpigena 369
bubalina *ib.*
cærulea *ib.*
Caprifolium 368
caucaſica 369
corymboſa *ib.*
Diervilla *ib.*
dioica 368
grata *ib.*
japonica *ib.*
implexa *ib.*
media *ib.*
mongolica 369
nigra 368
Periclymenum *ib.*
pyrenaica 369
ſempervirens 368
ſymphoricarpos 369
tatarica *ib.*
Xyloſteum *ib.*
Loosa 774, 819
hiſpida 819
Loranthus 522, 575, 576
americanus 576
emarginatus *ib.*
europæus 575
falcatus 576
Loranthus
loniceroides 576
occidentalis *ib.*
parvifolius *ib.*
pauciflorus *ib.*
pentandrus *ib.*
Scurrula 575
ſpicatus 576
Stelis *ib.*
tetrapetalus 575
uniflorus *ib.*
Lotus 1075, 1078, 1144, 1145
anguſtiſſima 1144
arabica *ib.*
arborea 1145
conjugata 1144
corniculata 1145
cretica 1144
cytiſoides 1145
Dorycnium *ib.*
edulis 1144
glauca 1145
græca *ib.*
hirſuta *ib.*
jacobæa 1144
maritima *ib.*
medicaginoides 1145
oligoceratos 1144
ornithopodioides *ib.*
peregrina *ib.*
recta 1145
ſiliquoſa 1144
tetragonoloba *ib.*
tetraphylla *ib.*
Lucuma 777, 830, 831
biflora 830
Keula *ib.*
ſpinoſa 831
turbinata 830
valparadiſea *ib.*

Ludiæ 779, 839
mauritanica 839

Ludwigia 216, 261
alternifolia 261
apetala ib.
arcuata ib.
decurrens ib.
glanduloſa ib.
irrigata ib.
linearis ib.
oppoſitifolia ib.
piloſa ib.
ramoſiſſima ib.
repens ib.
rudis ib.
ſuffruticoſa ib.
trifolia ib.

Lunaria 967, 978
annua 978
rediviva ib.

Lupinus 1076, 1100, 1101
albus 1100
anguſtifolius ib.
hirſutus ib.
integrifolius 1101
luteus ib.
perennis 1100
piloſus 1101
Termis 1100
varius 1101

Luziola 602, 637
peruviana 637

Lychnis 662, 736
alpeſtris 736
alpina ib.
apetala ib.
chalcedonica ib.
coronata ib.

Lychnis
dioica 736
Flos cuculi ib.
grandiflora ib.
læta ib.
quadridentata ib.
ſibirica ib.
Viſcaria ib.

Lycium 296, 389
afrum 389
barbarum ib.
barbatum ib.
capſulare ib.
europæum ib.
fœtidum ib.
heterophyllum ib.
japonicum ib.
ruthenicum ib.
tetrandrum ib.

Lycoperdon 1286, 1462-1466
admorium 1463
æſtivum ib.
ardeſiacum 1464
arhizon 1465
aurantium 1463
Boviſta 1464
capitatum 1463
carcinomale 1465
cervinum 1462
circumſciſſum 1463
coliforme 1465
corollinum ib.
corticale 1466
diſpar 1463
Epidendron 1466
equinum 1464
feneſtratum 1465
furfuraceum 1464
Geaſter 1465
gemmatum 1463
giganteum 1464

Lycoperdon
goſſypinum 1464
gregarium 1466
herculeum 1465
Hypoxylon ib.
Infundibulum 1464
lacerum ib.
lanatum ib.
multifidum 1465
muricatum 1464
nitidulum 1465
pedicellatum 1465
phalloides 1464
piliforme 1465
piſtillare ib.
polyrhizon 1464
Proteus 1463
pruinatum 1465
puſillum 1464
radians 1465
ramoſum 1466
rufum 1464
ſcabridum 1466
ſcabrum 1463
ſpadiceum ib.
ſquamoſum ib.
ſtellatum 1465
ſubalpinum 1464
utriforme 1465
verrucoſum 1463

Lycopodium 1283, 1288-1291
alopecuroides 1288
alpinum 1290
annotinum 1289
apus 1290
Bryopteris 1289
canaliculatum 1290
carolinianum ib.
cernuum 1289
ciliare 1290
circinale ib.
clavatum 1289

Lycopodium
complanatum 1289
denticulatum 1290
dichotomum 1289
flabellatum 1290
gnidioides 1289
helveticum 1290
japonicum ib.
inundatum 1289
linifolium ib.
myrtifolium 1290
nudum 1288
obſcurum 1289
ornithopodioides 1290
Phlegmaria 1289
plumoſum 1290
radicans 1291
rigidum 1289
rupeſtre ib.
ſanguinolentum 1290
ſcarioſum 1289
ſelaginoides 1288
Selago 1289
ſerratum ib.
ſquarroſum 1283
ſtoloniferum 1290
taxifolium 1288
verticillatum 1290

Lycopſis 292, 322
ægyptia 322
arvenſis ib.
bullata ib.
orientalis ib.
pulla ib.
variegata ib.
veſicaria ib.
virginica ib.

Lycopus 20, 42
europæus 42
exaltatus ib.
virginicus ib.

Lygeum 84, 123
Spartum 123

Lyſimachia 202, 331, 332
atro-purpurea 331
ciliata ib.
decurrens ib.
Ephemerum ib.
japonica 332
lanceolata 331
Linum ſtellatum ib.
nemorum 332
Numularia ib.
punctata 331
quadrifolia ib.
ſtricta ib.
thyrſiflora ib.
vulgaris ib.

Lythrum 741, 752, 753
carthagenenſe 753
ciliatum ib.
cordifolium 752
Cuphæa 753
dipetalum ib.
fruticoſum ib.
Hyſſopifolia ib.
lineare ib.
Melanium ib.
Parſonſia ib.
Pemphis ib.
petiolatum ib.
racemoſum ib.
Salicaria 752
Thymifolia 753
triflorum ib.
verticillatum ib.
virgatum 752

MABA 83, 95
elliptica 95

Mabea 740, 746
Piriri 746

Macrocnemum 297, 360
jamaicenſe 360
Macrolobium 83, 93
Smira 93
Utea ib.
Vuapa ib.
Macucua 210, 262
gujanenſis 262
Madhuca 773, 799
indica 799
Madia 1164, 1249
mellita 1249
ſativa ib.
Mærua 772, 827
arabica 827
Mæſa 298, 403
arabica 403
Magnolia 782, 867
acuminata 867
Fraſeri ib.
glauca ib.
grandiflora ib.
Plumieri ib.
tripetala ib.
Mahernia 313, 519, 520
heterophylla 520
pinnata 519
verticillata ib.
Majanthemum 217, 266
Convallaria 266
Malachodendron 1001, 1069
corchoroides 1069
ovatum ib.

Malachra 1002, 1051
alceæfolia 1051
bracteata ib.
capitata ib.
faſciata ib.
radiata ib.

Malanea 213, 279
ſarmentoſa 279

Malaxis 21, 58
ſpicata 58
umbelliflora ib.

Mallococca 775, 811
crenata 811

Malope 1002, 1058
malacoides 1058
multiflora ib.
trifida ib.

Malpighia 662, 722-724
altiſſima 723
anguſtifolia 724
aquifolia ib.
armeniaca 723
caneſcens 724
coccigera 723
coriacea ib.
craſſifolia ib.
diphylla ib.
dubia 724
faginea 723
glabra 722
glanduloſa 723
grandifolia 724
lucida 723
martinicenſis 722
Mureila 723
nitida ib.
odorata ib.
punicifolia ib.
ſpicata ib.
urens ib.
verbaſcifolia ib.

Malva 1002, 1052-1056
abulenſis 1055
abutiloides 1053
acaulis 1056
ægyptia 1053
Alcea 1055
americana ib.
anguſtifolia 1053
bonarienſis 1054
bryonifolia ib.
calicina 1056
capenſis ib.
capitata 1053
caroliniana 1052
ceromandeliana 1054
cretica ib.
criſpa 1055
cuneifolia 1053
elegans 1052
faſtigiata 1055
fragrans ib.
gangetica 1056
groſſularifolia 1054
hiſpanica 1053
lactea 1054
limenſis ib.
lobata 1055
mauritiana 1056
moſchata 1055
nicæenſis 1056
operculata 1053
ovata 1056
Papaver 1053
parviflora 1054
peruviana ib.
polyſtachya 1056
proſtrata 1052
pumila 1056
retuſa 1055
rotundifolia ib.
ſcabra 1053
ſcoparia 1054
Sperardiana ib.

Malva
ſilveſtris 1056
ſinenſis ib.
ſpicata ib.
ſpithamæa 1053
ſtipulacea ib.
ſubhaſtata 1055
tomentoſa 1056
Tourneſortiana 1055
tridactylites 1054
trifida 1053
verticillata 1054
virgata ib.

Malvaviſcus 1000, 1060
arboreus 1060
mollis ib.
piloſus ib.

Mammea 774, 813
americana 813

MANETTIA 213, 277
Lygiſtum 277
reclinata ib.

Mangifera 301, 418
Amba 418
glauca ib.
indica ib.
pinnata ib.

Manglilla 296, 398
peruviana 398

MANISURIS 85, 149
myuros 149

Manſana 526, 580
arborea 580

Manulea 889, 949, 950
altiſſima 950
antirrhinoides 949
argentea 950
cærulea ib.
capillaris ib.

Manulea
capitata 949
Cheiranthus ib.
corymboſa 950
cuneifolia 949
heterophylla 950
integrifolia 949
microphylla ib.
pinnatifida ib.
plantaginis ib.
thyrſiflora 950
tomentoſa 949
Maprunea 217, 272
gujanenſis 272
Mapuria 299, 371
gujanenſis 371
Maranta 1, 8
Allovia 8
Arcuma ib.
arundinacea ib.
comoſa ib.
Galanga ib.
humilis ib.
lutea ib.
malaccenſis ib.
ſpicata ib.
Tonkat ib.
Marattia 1283, 1293 *ſq.*
alata 1293
fraxinea 1294
lævis ib.
Marcgravia 773, 797
umbellata 797
Marchantia 1284, 1353 *ſq.*
androgyna 1354
chenopoda ib.
conica ib.
cruciata ib.
hemiſphærica ib.
hirſuta ib.

Marchantia
polymorpha 1353
quadrata 1354
tenella ib.
triloba ib.
trilocularis ib.
umbellata 1353
Margaritaria 604, 645
nobilis 645
Marica 82, 118
Cipura 118
Marilla 775, 816
racemoſa 816
Maripa 296, 393
ſcandens 393
Marrubium 885, 908, 909
acetabuloſum 909
africanum ib.
Alyſſon 908
candidiſſimum ib.
criſpum 909
hiſpanicum ib.
peregrinum 908
plicatum ib.
Pſeudodictamus 909
ſupinum ib.
vulgare ib.
Marſana 656, 675
buxifolia 675
Marshallia 778, 836
Lagunæ 836
Marſchallia 1162, 1208
Schreberi 1208
Marſilea 1284, 1322
minuta 1322
natans ib.
quadrifolia ib.

Martynia 890, 935
annua 935
longiflora ib.
perennis ib.
proboſcidea ib.
Massonia 525, 537
anguſtifolia 537
echinata ib.
latifolia ib.
undulata ib.
Matelea 306, 443
paluſtris 443
Matricaria 1164, 1249
argentea 1249
Chamomilla ib.
maritima ib.
Parthenium ib.
proſtrata ib.
ſuaveolens ib.
Matthiola 298, 376
ſcabra 376
Mattuſchkia 528, 589
aquatica 589
Maturea 887, 939
pratenſis 939
Mauritia 521, 568
flexuoſa 568
Mayepea 215, 259
gujanenſis 259
Mayna 776, 808
odorata 808
Maytenus 19, 25
Boaria ib.
Meborea 207
gujanenſis ib.
Medeola 527, 588
anguſtifolia 588
aſparagoides ib.
virginica ib.

Medicago 1075, 1078, 1146-1148
arabica 1147
arborea 1146
ciliaris 1147
circinata ib.
coronata ib.
Falcata 1146
hirſuta 1147
intertexta ib.
Karſtienſis ib.
laciniata 1148
lupulina 1147
marginata ib.
marina 1148
minima 1147
muricata ib.
nigra ib.
obſcura 1146
orbicularis 1147
polymorpha ib.
proſtrata 1148
radiata 1147
rigidula ib.
ſativa 1146
ſcutellaris 1147
tornata 1148
tuberculata 1147
turbinata 1148
virginica 1146
Meduſula 1286, 1487
labyrinthica 1487
Meeſia 300, 417
ſerrata 417
Meiſleria 297, 391
anonima 391
Melaleuca 1149, 1154, 1155
æſtuoſa 1154
anguſtifolia ib.
ciliata 1155
diffuſa 1154
florida 1155

Melaleuca
latifolia 1154
Leucadendron ib.
lucens 1155
lucida 1154
perforata 1155
ſcoparia 1154
ſuaveolens 1155
trinervia 1154
villoſa ib.
virgata 1155
viridiflora ib.
Melampodium 1166, 1271
americanum 1271
auſtrale ib.
humile ib.
Melampyrum 888, 924
arvenſe 924
criſtatum ib.
nemoroſum ib.
pratenſe ib.
ſilvaticum ib.
Melanthium 527, 587, 588
capenſe 587
ciliatum ib.
dioicum 588
hybridum 587
indicum 588
monoicum 587
monopetalum 588
myoctonum 587
racemoſum 588
ſibiricum 587
ſpicatum ib.
triquetrum ib.
virginicum ib.
viride 588
Melaſtoma 658, 687-692
Acinodendron 688

Melaſtoma
agreſte 690
alatum 689
albicans ib.
alpinum 691
anguſtifolium ib.
aquaticum 692
arboreſcens 689
argenteum ib.
aſperum 687
bivalve 688
Cacatin ib.
capillare 692
cinnamomifolium 688
coriaceum 690
criſpatum 688
diſcolor 692
elaagroides 691
elatum 690
elegans 691
faſciculare ib.
flaveſcens 689
fragile 691
glabratum ib.
glabrum 687
grandiflorum 690
groſſularioides 688
groſſum ib.
hirſutum 691
hirtellum ib.
hirtum 690
hiſpidum 692
holoſericeum 687
impetiolare 690
lævigatum 689
longifolium 687
Majeta 691
Malabathrum 689
micranthum 692
microphyllum 691
montanum 688
octandrum 691
ornatum 687
parviflorum 695

Malaſtoma
patens 687
piloſum 692
praſinum 688
procerum ib.
purpuraſcens 691
quadrangulare 687
racemoſum 690
ramiflorum 683
rigidum ib.
rubens 692
rubeſcens 689
rubrum 690
ruſeſcens ib.
ſcabroſum ib.
ſcandens ib.
ſeſſilifolium 688
ſpicatum 690
ſplendens 689
ſtrigiloſum ib.
ſtrigoſum 687
ſuccoſum 689
Tamonea ib.
Taniboa ib.
tetrandrum 692
Tibuekina 691
Tococa 690
trinervium 687
trivalve 688
umbroſum 692
villoſum 689
virgatum 692

Melhania 301, 416
velutina 416

Melia 656, 680, 681
Azadirachta 681
Azederach 680
dubia 681
Koetjape ib.
ſempervirens 680

Melianthus 891, 966
major 966
minor ib.

Melica 87, 176
altiſſima 176
arundinacea ib.
cærulea ib.
ciliata ib.
Falx ib.
Lobelii ib.
minuta ib.
mutica ib.
nodoſa ib.
nutans ib.
papilionacea ib.
pyramidalis ib.
ramoſa ib.
uniflora ib.

Melicocca 599, 613
bijuga 613

Melicope 599, 620
ternata 620

Melicytus 302, 421
ramiflorus 421

Meliſſa 886, 914
Calamintha 914
cretica ib.
fruticoſa ib.
grandiflora ib.
Nepeta ib.
officinalis ib.

Melittis 886, 916

Meliſſophyllum 916

Melochia 996, 1011, 1012
borbonica 1012
caracaſſana ib.
concatenata 1011
corchorifolia 1012
depreſſa 1011
hirſuta 1012
lupulina ib.
nodiflora ib.

Melochia 1011
odorata 1011
pyramidata 1012
ſupina ib.
tomentoſa ib.
venoſa 1011

Melodinus 307, 440
ſcandens 440

Melothria 81, 99
pendula 99

Memecylon 600, 619
capitellatum 619
grande ib.

Menais 296, 376
topiaria 376

Menichea 770, 799
roſata 799

Meniſpermum 742, 756
acutum 756
canadenſe ib.
carolinum ib.
Cocculus ib.
criſpum ib.
edule ib.
feneſtratum ib.
hirſutum ib.
japonicum ib.
myoſotoides ib.
orbiculatum ib.
trilobum ib.
virginicum ib.

Mentha 885, 902-904
aquatica 903
arvenſis ib.
Auricularia 902
auſtriaca 903
cahirina ib.

Mentha
canadenſis 903
canarienſis ib.
cervina 904
criſpa 903
dubia ib.
exigua ib.
gentilis ib.
hirſuta ib.
niliaca 902
origanifolia ib.
perilloides ib.
piperita 903
plumoſa 902
Pulegium 903
punctata ib.
rotundifolia 902
ſativa 903
ſilveſtris 902
viridis ib.

Mentzelia 774, 819
aſpera 819

Menyanthes 293, 329
indica 329
nimphoides ib.
ovata ib.
trifoliata ib.

Mercurialis 648, 653
ambigua 653
annua ib.
perennis ib.
tomentoſa ib.

Merorea 89
gujanenſis 89

Merulius 1285, 1429-1432
agaricoides 1430
alectorolophoides ib.
alneus 1431
alutaceus ib.

Merulius
aurantiacus 1430
betulinus 1431
cantharelloides 1430
Cantharellus ib.
cornucopioides 1429
Criſpus 1430
Cyathus ib.
dimidiatus 1431
fiſſus ib.
helvelloides 1430
inflexus ib.
hydropipes ib.
infundibuliformis ib.
labyrinthiformis 1431
lichenoides ib.
muſcigenus ib.
niveus ib.
pezizoides ib.
pruinatus 1430
quercinus 1431
reticulatus ib.
ſerpens 1432
ſquamoſus 1431
Squamula 1430
umbonatus ib.
vaſtator 1432

Meſembryanthemum 779, 843-848
albidum 848
apetalum 844
auſtrale 845
barbatum 846
bellidiflorum 844
bicolorum 847
brachiatum ib.
bracteatum 846
brevifolium 845
caducum 844
calamiforme ib.
capillare 848
ciliatum 843

Meſembryanthemum
compactum 848
copticum 844
cordifolium ib.
corniculatum 846
craſſifolium 845
criniflorum 844
cryſtallinum 843
cuneifolium 846
deflexum 845
deltoides 844
difforme 847
digitatum 843
dolabriforme 847
echinatum 846
edule ib.
emarginatum 845
expanſum 844
falcatum 846
filamentoſum 845
forficatum 846
geniculiflorum 844
glabrum 847
glaucum 846
glomeratum 845
groſſum 847
helianthoides ib.
hiſpidum 845
humifuſum 844
læve 845
linguiforme 848
loreum 845
mirans 847
molle 846
noctiflorum 844
nodiflorum 843
pallens ib.
papuloſum 847
pinnatifidum ib.
pomeridianum ib.
pugioniforme 846
reptans 845
ringens 847

Meſembryanthemum
roſtratum 847
ſcabrum 845
ſerratum 846
ſeſſiliflorum 847
ſpinoſum 845
ſplendens 844
ſtipulaceum 845
tenuifolium 846
teſticulare 844
tortuoſum 847
Tripolium 843
tuberoſum 845
umbellatum 844
uncinatum 846
verruculatum 847
villoſum 846
viridiflorum 848
Meſenterica 1286, 1485
tremelloides 1485
Meſpilus 779, 840, 841
æſtivalis 840
Amelanchier 841
arbutifolia ib.
canadenſis ib.
Chamæmeſpilus ib.
Cotoneaſter ib.
germanica ib.
hiemalis 840
japonica 841
laciniata 840
phœnopyrum 841
Pyracantha 840
Xanthocarpos 841
Meſſerſchmidia 291, 324
Arguzia 324
fruticoſa ib.
Meſua 999, 1069
ferrea 1069
glabra ib.
Metroſideros 771, 788, 789
albiflora 789
arachnoidea ib.
armillaris ib.
coſtata ib.
excelſa ib.
fulgens ib.
gummifera 788
myrtifolia 789
falcifolia ib.
ſcandens ib.
ſpectabilis ib.
ſquarroſa ib.
umbellata ib.
viminalis ib.
Metroxylon 521, 570
Sagu 570
Michauxia 600, 618
nova 618
Michelia 782, 868
Champaca 868
Tſjambaca ib.
Microcarpon 1470
nigrum ib.
Micropus 1166, 1278
erectus 1278
ſupinus ib.
Microtea 305, 452
debilis 452
Milium 86, 168
capenſe 168
compreſſum ib.
confertum ib.
digitatum ib.
effuſum ib.
globoſum ib.
Milium
lendigerum 168
paradoxon ib.
punctatum ib.
Milleria 1166, 1269
biflora 1269
quinqueflora ib.
Millingtonia 890, 961
hortenſis 961
Mimoſa 773, 800-805
alba 801
arborea 802
Aſak 803
aſperata 804
balſamica 802
bigemina 800
bipinnata 803
Burgoni 801
cæſia 804
caſta 800
Catechu 804
Cavenia 803
Ceratonia 805
cineraria 800
cinerea 803
circinalis 800
comoſa 802
cornigera 804
cornuta ib.
eburnea ib.
Entada 801
fagifolia ib.
farneſiana 804
flava 803
glauca 802
glomerata 803
grandiflora 802
gujanenſis 803
horrida 804
Juga 801

Mimoſa
Intſia 804
juliflora 803
latifolia 800
latiſiliqua 802
latronum 804
laurina 801
Lebbek 802
mangenſis 803
muricata ib.
natans 801
nilotica 803
nodoſa 801
odoratiſſima 802
pennata 804
Orſota 803
peregrina 802
pernambucana ib.
pigra 804
plena 801
polyſtachya 802
pudica 801
punctata ib.
purpurea 800
quadrivalvis 804
reticulata 800
ſanguinea 803
ſcandens 801
Sejal 802
ſemiſpinoſa 804
Senegal 803
ſenſitiva 801
ſimplicifolia 800
ſpecioſa 802
ſtellata 801
tamarindifolia 805
tenuifolia 804
tergemina 800
tortilis 803
tortuoſa 804
Unguis cati 800
vaga 802
verticillata 800
villoſa 802
Mimoſa
virgata 801
viva 800
Mimulus 889, 956
957
alatus 957
luteus ib.
ringens 956
Mimuſops 598, 612
Elengi 612
Kanki ib.
Mindium 601, 618
ſpicatum 618
Minuartia 89, 208
campeſtris 208
dichotoma ib.
montana ib.
Mirabilis 291, 377
dichotoma 377
Jalapa ib.
longiflora ib.
Miſandra 22, 76
magellanica 76
Michella 213, 245
repens 245
Mitella 961, 708
diphylla 708
nuda ib.
Mitraria 771, 799
Commerſoni 799
Mnaſium 524, 533
paludoſum 533
Mnemoſilla 967
ægyptiaca ib.
MNIARUM 3, 17
biflorum 17
Mnium 1284, 1327-1330
aciculare 1328
Mnium
annotinum 1329
capillare ib.
ceſpititium 1330
crudum 1329
cuſpidatum 1330
fontanum 1329
glaucum 1328
heteromallon 1328
hornum 1329
hygrometricum 1327
latifolium 1328
marchicum 1329
megapolitanum 1327
nutans 1330
paluſtre 1329
pellucens 1328
pellucidum 1327
proliferum 1330
punctatum ib.
purpureum 1328
puſillum ib.
ramoſum 1329
roſtratum 1330
ſcoparium 1328
ſerratum 1330
ſimplex ib.
ſphærocarpon 1329
ſpurium 1328
ſtrictum ib.
tomentoſum 1329
tortile 1328
triquetrum 1329
uliginoſum ib.
undulatum 1330
Mœhringia 602, 636
mucoſa 636
Mœnchia 967, 971
aizoides 971
campeſtris ib.
incana ib.
ſativa ib.

Molinæa 598, 611
arborea 611
Mollia 303, 420
imbricata 420
Mollugo 89, 208
oppoſitifolia 208
paniculata ib.
pentaphylla ib.
ſtricta ib.
triphylla ib.
verticillata ib.
Moluccella 885, 911
fruteſcens 911
lævis ib.
ſpinoſa ib.
tuberoſa ib.
Momordica 81, 101, 102
Balſamina 101
Charantia ib.
cylindrica ib.
Elaterium 102
Luffa 101
operculata ib.
pedata 102
trifoliata ib.
Monarda 20, 44
ciliata 44
clinopodia ib.
didyma ib.
fiſtuloſa ib.
oblongata ib.
punctata ib.
rugoſa ib.
Monetia 215, 254
barlerioides 254
Monilia 1287, 1487
alba 1487
Aſpergillus ib.
aurea ib.
ceſpitoſa ib.
cruſtacea ib.
glauca 1487
leproſa ib.
ochroleuca ib.
purpurea ib.
Monnieria 1075, 1079
trifolia 1079
Monodynamis 3, 10
Iſerti 10
Monotropa 658, 685
Hypopithys 685
uniflora ib.
Monſonia 1149, 1152
filia 1152
lobata ib.
ſpecioſa ib.
Montia 89, 206
fontana 206
MONTINIA 216, 277
acris 277
Montira 889, 936
gujanenſis 936
Moquilea 771, 820
gujanenſis 820
Moræa 81, 116-118
africana 117
aphylla ib.
collina 118
criſpa ib.
filiformis 117
flexuoſa ib.
fugax ib.
gladiata ib.
iridioides ib.
ixioides 118
lugens 117
polyanthos 116
ſinenſis 117
ſpathacea ib.
Moræa
ſpiralis 117
umbellata 118
virgata 117
Morina 21, 49
perſica 49
Morinda 298, 371
citrifolia 371
muſcoſa ib.
Royeni ib.
umbellata ib.
Moriſonia 999, 1070
americana 1070
Moronobea 1149, 1160
coccinea 1160
Morus 219, 283
alba 283
indica ib.
mauritanica ib.
nigra ib.
papyrifera ib.
rubra ib.
tatarica ib.
tinctoria ib.
Xanthoxylum ib.
Moſcharia 219, 275
Forskaklii 275
Mucilago 1287, 1488
ceſpitoſa 1488
cinerea ib.
miniata ib.
plumoſa ib.
Mucor 1287, 1485 *ſq.*
albus 1485
araneoſus 1486
Eryſiphe ib.
flavus ib.
globoſus ib.

Mucor
infuſorius 1486
minimus 1485
Mucedo 1486
ovalis 1485
paniceus ib.
plumoſus 1486
purpureus ib.
tremelloides ib.
virens ib.
Muhlenbergia 87, 171
Schreberi 171
Mullera 1075, 1078, 1115
monilifera 1115
MUNCHHAUSIA 1150, 1153
ſpecioſa 1153
Muntingia 775, 811
Calabara 811
Muriri 656, 693
gujanenſis 693
MURRAYA 658, 678
exotica 678
Murucoa 294, 344
violacea 344
Muſa 523, 567
Enſete 567
humilis ib.
paradiſiaca ib.
ſapientum ib.
Troglodytarum ib.
Muſſænda 299, 376
frondoſa 376
ſpinoſa ib.
Mutubea 996, 1009
gujanenſis 1009
MUTISIA 1164, 1244
Clematis 1244
Mutuchi 1076, 1085
ſuberoſa 1085
Myagrum 967, 969
ægyptium 969
auſtriacum ib.
hiſpanicum ib.
orientale ib.
paniculatum ib.
perenne ib.
perfoliatum ib.
rigidum ib.
rugoſum ib.
ſaxatile ib.
Myginda 220, 290
latifolia ib.
uragoga ib.
Myonima 211, 246
Borbonica 246
Myoporum 890, 936
craſſifolium 936
lætum ib.
pubeſcens ib.
tenuifolium ib.
Myoſotis 292, 315, 316
apula 315
arvenſis ib.
echinophora 316
fruticoſa 315
Lappula ib.
nana 316
paluſtris 315
pectinata 316
rupeſtris 315
ſpatulata ib.
ſquarroſa 316
terglovienſis 315
virginiana ib.
Myoſurus 313, 520
minimus 520
Myrica 219, 284
æthiopica 284
Myrica
cerifera 284
cordifolia ib.
Faya ib.
Gale ib.
Nagi ib.
quercifolia ib.
ſegregata ib.
trifoliata ib.
Myriophyllum 603, 646
ſpicatum 646
verticillatum ib.
MYRISTICA 2, 10, 11
dactyloides 11
fatua ib.
moſchata ib.
ſebifera ib.
tomentoſa 10
Myrmecia 211, 247
Tacnia 247
Myrobalanifera 660, 702
fertilis 702
Myrodendrum 775, 817
balſamiferum 817
Myrodia 999, 1070
turbinata 1070
MYROSMA 1, 7
cannæfolium 7
Myroſpermum 655, 665
fruteſcens 665
Myrothecium 1285, 1460
dubium 1460
hiſpidum ib.
inundatum ib.
roridum ib.
ſtercoreum ib.

MYROXYLON 655, 672
peruiferum 672
Myrſine 295, 404
africana 404
retuſa ib.
ſcabra ib.
Myrtus 770, 790-793
acris 792
alpina 790
androſæmoides 792
anguſtifolia 791
axillaris ib.
biflora 790
braſiliana ib.
buxifolia 791
caryophyllata 792
Chytraculia ib.
communis 790
cordata * 791
cotinifolia 792
crenulata 790
cumini 791
dioica ib.
diſticha ib.
fragrans 792
glabrata 791
Gregii ib.
lævis ib.
laurina ib.
liguſtrina 790
linearis 793
lineata 791
lucida 790
Luma ib.
Makul 792
maxima 791
monticola ib.
nitida 792
paniculata ib.
Pimenta ib.
procera 790
rigida 792
Myrtus *ſaligna* 793
ſplendens 792
tomentoſa 790
triflora 792
Ugni 790
virgultoſa 791
zeylanica 792
Zuzygium ib.

Nacibea 213, 279
alba 279
coccinea ib.
Najas 4, 18
marina 18
Nama 307, 457
jamaicenſis 457
zeylanica ib.
Nâpæa 1002, 1050
lævis 1050
ſcabra ib.
Napimoga 743, 767
gujanenſis 767
Narciſſus 523, 535, 536
bicolor 535
Bulbocodium ib.
calathinus 536
dubius ib.
hiſpanicus ib.
jonquilla ib.
minor 535
moſchatus ib.
odorus ib.
orientalis 536
poëticus 535
Pſeudonarciſſus ib.
ſerotinus ib.
Tazetta 536
triandrus 535
trilobus 536

NARDINA 523, 577
domeſtica 577
Nardus 114, 123
ariſtata 123
ciliaris ib.
gangitis ib.
indica ib.
ſtricta ib.
Thomæa ib.
Naſſauia 1167, 1281
magellanica 1281
Naſtus 526, 580
borbonicus 580
Nauclea 302, 358
orientalis 358
Neckeria 3, 16
campeſtris 16
Nectandra 773, 799
bijuga 799
ſanguinea ib.
Nectris 522, 580
aquatica 580
Nemia 888, 936
capenſis 936
Nepenthes 275
diſtillatoria 275
Nepeta 885, 898, 900
amboinica 899
americana ib.
anguſtifolia 900
cærulea 899
caneſcens 900
Cataria 899
hirſuta ib.
incana 900
indica ib.
italica 899
lanata ib.
lavandulifolia ib.
malabarica ib.
multifida ib.

Nepeta
Nepetella 900
nuda 899
pannonica 900
pectinata 898
ſcordotis 899
ſidæfolia 898
tomentoſa 899
tuberoſa ib.
ucranica 900
violacea 899
virginica 900
Nephelium 305, 464
lappaceum 464
Nephrandra 888, 946
dubia 946
Nerium 294, 435
antidyſentericum 435
coronarium ib.
divaricatum ib.
Oleander ib.
zeylanicum ib.
Nertera 218, 282
depreſſa 282
Neurada 663, 739
procumbens 739
Nicandra 658, 677
amara 677
Nicotiana 293, 380
fruticoſa 380
glutinoſa ib.
minima ib.
paniculata ib.
puſilla ib.
ruſtica ib.
Tabacum ib.
urens ib.
Nigella 779, 851
arvenſis 851
damaſcena ib.
hiſpanica ib.
Nigella
orientalis 851
ſativa ib.
Nigrina 216, 275, 293
ſpicata 275
NIPA 2, 12
fruticans 12
Niſſolia 1075, 1084
arborea 1084
fruticoſa ib.
Nitraria 741, 751
Schoberi 751
Nolana 292, 325
proſtrata 325
Nothria 997, 1012
capenſis 1012
Nyotanthes 19, 23
acuminata 23
anguſtifolia ib.
Arbor triſtis ib.
elongata ib.
glauca ib.
hirſuta ib.
multiflora ib.
pubeſcens ib.
Sambac ib.
ſcandens ib.
triflora ib.
undulata ib.
viminea ib.
Nymphæa 776, 811 812
advena 812
alba ib.
Lotus ib.
lutea 811
Naccheli ib.
Nelumbo 812
pentapetala ib.
reniformis ib.
ſagittifolia ib.
Niſſa 304, 431, 432
aquatica 431
biflora ib.
capitata 432
multiflora 431
Obolaria 887, 954
virginica 954
Ochna 657, 682, 683
Jabotapita 682
nitida 683
parvifolia 682
ſquarroſa ib.
Ochroma 996, 1008
Lagopus 1008
Ochroſia 295, 439
borbonica 439
Ocotea 1149, 1153
gujanénſis 1153
Ocymum 886, 915-918
acutum 916
album 917
americanum ib.
Baſilicum 918
capitatum ib.
criſpum 916
filamentoſum 917
frutícoſum ib.
gratiſſimum ib.
hadienſe ib.
holoſericeum 918
inflexum 916
inodorum ib.
menthoides 918
minimum ib.
molle ib.
monachorum ib.
Plectranthus 917
polyſtachyon ib.
proſtratum ib.

Ocymum
punctatum 917
punctulatum ib.
rugoſum 916
ſalinum 918
ſanctum ib.
ſcutellarioides 917
ſerpyllifolium 916
tenuiflorum 917
thyrſiflorum 916
verticillatum 917
virgatum ib.
Vaalæ 918
Zatarhendi 917
zeylanicum 918

OEDERA 1167, 1279
aliena 1279
prolifera ib.

Oenanthe 308, 484, 485
crocea 485
filiformis ib.
fiſtuloſa 484
globuloſa 485
peucedanifolia ib.
pimpinelloides ib.
prolifera ib.

Oenothera 599, 606-607
biennis 606
fruticoſa 607
hirta ib.
longiflora ib.
molliſſima ib.
muricata ib.
nocturna ib.
octovalvis ib.
parviflora ib.
pumila ib.
ſinuata ib.

Olax 83, 93
zeylanica 93

Oldenlandia 213, 263, 264
biflora 263
capenſis ib.
corymboſa 264
debilis 263
digyna 264
fœtida 263
hirſuta ib.
paniculata 264
pentandra 263
repens ib.
ſtricta 264
tenuifolia 263
trinervia ib.
umbellata ib.
uniflora ib.

Olea 19, 25
americana 25
cajetana ib.
capenſis ib.
europæa ib.
excelſa ib.
fragrans ib.

Olyra 85, 148
latifolia 148
pauciflora ib.

Omphalea 22, 71, 72
axillaris 71
cauliflora ib.
cordata ib.
nucifera 72

Omphalobium 1149, 1152
indicum 1152

Oncoba 776, 828
ſpinoſa 828

Onoclea 1283, 1291
polypodioides 1291
ſenſibilis ib.

Ononis 1075, 1077, 1096-1099
alba 1097
alopecuroides ib.
antiquorum 1096
argentea 1098
arvenſis 1096
capenſis 1097
cenſia ib.
cernua 1098
Cherleri 1099
criſpa 1098
filiformis ib.
flava 1097
fruticoſa 1098
geminata 1097
hircina ib.
hiſpanica 1098
involucrata ib.
mauritanica ib.
microphylla ib.
minutiſſima 1097
mitiſſima ib.
Natrix 1098
ornithopodioides 1099
pinguis 1098
proſtrata 1097
pubeſcens 1098
reclinata 1097
repens ib.
rotundifolia 1098
ſerrata 1097
ſpinoſa 1096
tridentata 1098
umbellata ib.
vaginalis 1099
variegata 1097
viſcoſa 1099

Onoperdon 1162, 1190
Acanthium 1190
acaule ib.
arabicum ib.
deltoides ib.
græcum ib.
illyricum ib.
Onoſma 291, 321
echioides 321
micranthon ib.
orientale ib.
ſimpliciſſimum ib.
Opercularia 214, 232, 233
aſpera 233
diphylla ib.
umbellata 232
Ophiogloſſum 1283, 1291
crotalophoroides 1291
flexuoſum ib.
japonicum ib.
luſitanicum ib.
nudicaule ib.
palmatum ib.
pendulum ib.
reticulatum ib.
ſcandens ib.
vulgatum ib.
Ophiorhiza 293, 333
lanceolata 333
Mitreola ib.
Mungos ib.
ſubumbellata ib.
Ophioxylum 299, 334
ſerpentinum 334
OPHIRA 599, 629
ſtricta 629
Ophrys 21, 56-58
alaris 58
alata 57
alpina 58
anthropophora 57
arachnites ib.
atrata 58
barbata ib.
bivalvata ib.
bracteata ib.
caffra ib.
camtſchatica 58
catholica 57
cernua 56
circumflexa 58
Corallorhiza 56
cordata ib.
crucigera 57
fimbriata ib.
gujanenſis ib.
lilifolia ib.
Loeſelii ib.
monophyllos ib.
monorchis ib.
myodes ib.
nervoſa 58
Nidus avis 56
ovata ib.
paludoſa 57
patens 58
peruviana 57
ſpiralis 56
ſquamata ib.
trifolia 57
unifolia 58
volucris 57
Orchis 21, 50, 55
abortiva 54
aphylla ib.
barbata 51
batrachites 55
bicornis 50
biflora ib.
bifolia 51
calcarata ib.
carnea 50
ciliaris 51
conopſea 53
coriophora 52
cornuta 51
cruenta 53
cubitalis 52
cucullata ib.
draconis 51
elata 53
falcata 54
filicornis ib.
fimbriata ib.
flava 53
flexicaulis 51
flexuoſa ib.
fuſca 52
fuſceſcens 54
globoſa 52
habenaria 53
hiſpidula 52
hyperborea 54
japonica ib.
incarnata 53
lata 51
latifolia 53
longicornis ib.
maculata ib.
maſcula 52
militaris ib.
monorhiza 54
moravica 52
Morio ib.
nigra 51
odoratiſſima 53
ophiogloſſoides 51
Ornithis ib.
pallens 52
paluſtris ib.
papilionacea ib.

Orchis
ptycodes 54
pyramidalis 52
rubra ib.
ſagittalis 51
ſambucina 53
ſancta 54
ſpatulata 51
ſpecioſa 53
ſpectabilis 54
ſtrateumatica ib.
ſuaveolens 53
Suſannæ 51
tenella ib.
tipuloides 54
tripetaloides 51
uſtulata 52
varia 53
variegata 52
viridis 54

Oribaſia 299, 367
longiflora 367
lutea ib.
officinalis ib.
paniculata ib.
racemoſa ib.
violacea ib.

Origanum 886, 912, 913
ægyptiacum 912
bengalenſe ib.
clinopodioides 913
creticum 912
Dictamnus ib.
flexuoſum 913
heracleoticum 912
Majorana 913
Maru ib.
Onites 912
ſipyleum ib.
ſmyrnaum ib.
ſyriacum ib.

Origanum
Tournefortii 912
vulgare ib.

Orixa 215, 255
japonica 255

Ornithogalum 525, 549-551
altiſſimum 551
arabicum ib.
bohemicum 550
bulbiferum 551
capenſe ib.
caudatum 550
ciliatum 551
circinatum ib.
comoſum 550
conicum ib.
crenulatum 551
flaveſcens 550
flavum 551
japonicum ib.
latifolium 550
longibracteatum ib.
luteum 549
maculatum 550
Maſſonii 551
miniatum 550
minimum 549
narbonenſe 550
niveum ib.
nutans 551
piloſum ib.
pyramidale 550
pyrenaicum 549
reticulatum ib.
rupeſtre 551
ſuaveolens 550
tenellum ib.
thyrſoides 551
uniflorum 549
unifolium 551

Ornithopus 10[...], 1077, 1119
compreſſus 1119
intermedium ib.
perpuſillus ib.
repandus ib.
ſcorpioides ib.
tetraphyllus ib.

Ornithrophe 603, 613
borbonica 613

Orobanche 887, 954, 955
Æginetia 955
americana 954
cernua ib.
crenata 955
fœtida 954
lævis ib.
major ib.
purpuraſcens ib.
purpurea 955
ramoſa ib.
tinctoria 954
uniflora 955
virginiana ib.

Orobus 1075, 1077, 1108
albus 1108
anguſtifolius ib.
caneſcens ib.
hirſutus ib.
lathyroides ib.
luteus ib.
niger ib.
pyrenaicus ib.
ſilvaticus ib.
tenuifolius ib.
tuberoſus ib.
vernus ib.
verſicolor ib.

Orontium 526, 568
aquaticum 568
japonicum *ib.*
Ortegia 83, 105
dichotoma 105
hiſpanica *ib.*
Orygia 775, 815
decumbens 815
portulacifolia *ib.*
Oriza 526, 578
ſativa 578
Osbeckia 599, 605
ſinenſis 605
zeylanica *ib.*
Oſmites 1166, 1261
aſteriſcoides 1261
Bellidiaſtrum *ib.*
calicina *ib.*
camphorata *ib.*
Oſmunda 1283, 1292 *ſq.*
adianthifolia 1292
bifurcata *ib.*
bipinnata *ib.*
capenſis 1293
caroliniana *ib.*
cervina 1292
cinnamomea 1293
Clytoniana *ib.*
criſpa *ib.*
diſcolor *ib.*
filiculifolia 1292
hirſuta *ib.*
hirta *ib.*
japonica 1293
Lancea *ib.*
Lunaria 1292
matricariæ *ib.*
phyllitidis *ib.*
procera 1293
ramoſa *ib.*
regalis 1292
Oſmunda
ſcandens 1293
Spicanthus *ib.*
Struthiopteris *ib.*
ternata 1292
trifida *ib.*
verticillata *ib.*
virginica *ib.*
zeylanica *ib.*
Oſteoſpermum 1166, 1274 *ſq.*
aritotoides 1275
cæruleum *ib.*
calendaceum 1274
ciliatum 1275
corimboſum 1274
herbaceum 1275
ilicifolium 1274
imbricatum 1275
junceum 1274
moniliferum 1275
niveum *ib.*
perfoliatum *ib.*
pinnatifidum *ib.*
piſiferum 1274
polygaloides *ib.*
rigidum 1275
ſpinoſum 1274
triquetrum *ib.*
Oſyris 83, 95
alba 95
japonica *ib.*
OTHERA 215, 255
japonica 255
Othonna 1166, 1275-1277
abrotanifolia 1277
arboreſcens 1276
Athanaſia 1277
bulboſa 1276
cacalioides *ib.*
Othonna
capillaris 1276
cheirifolia 1275
ciliata 1276
coronopifolia *ib.*
craſſifolia 1275
denticulata 1276
digitata *ib.*
ericoides 1275
fruteſcens 1276
heterophylla *ib.*
lateriflora *ib.*
Lingua *ib.*
linifolia 1275
munita 1277
parviflora 1276
pectinata *ib.*
pinnata 1277
Tagetes *ib.*
tenuiſſima 1275
trifida 1276
triſurcata *ib.*
virginea *ib.*
Ovieda 890, 961
mitis 961
ſpinoſa *ib.*
Oxalis 662, 733-735
Acetoſella 734
Barieheri *ib.*
bifida 735
caprina 734
cernua *ib.*
compreſſa *ib.*
corniculata *ib.*
flava 735
fruteſcens *ib.*
glabra *ib.*
hirta *ib.*
incarnata 734
lanata *ib.*
longiflora *ib.*
minuta *ib.*

Oxalis
monophylla 733
natans 734
punctata ib.
purpurea ib.
repens ib.
ſenſitiva 735
ſericea 734
ſtricta 735
tomentoſa ib.
tuberoſa 734
verſicolor 735
violacea 734
virgoſa ib.

Pacurina 1162, 1201
edulis 1201

Pæderia 295, 432
fœtida 432

Pæderota 19, 31
Ageria 31
bonæ ſpei ib.
Bonarota ib.
cærulea ib.
lutea ib.
minima ib.

Pæonia 777, 839
anomala 839
humilis ib.
integra ib.
officinalis ib.
tenuifolia ib.

Pagamea 219, 285
guianenſis 285

Palava 1001, 1040 1041
malvifolia 1040
moſchata 1041

PALLASIA 743, 767
caſpica 767

Panax 308, 466
arborea 466
attenuata ib.
fruticoſa ib.
Morototoni ib.
quinquefolia ib.
ſimplex ib.
ſpinoſa ib.
trifolia ib.

Pancratium 523, 536, 537
amboinenſe 537
caribæum 536
carolinianum ib.
declinatum ib.
illyricum 537
litterale ib.
maritimum 536
maximum ib.
mexicanum ib.
verecundum 537
zeylanicum 536

PANDANUS 2, 12
odoratiſſimus 12

Panicum 86, 156-163
acuminatum 159
adhærens 156
ægyptium 159
alopecuroides 156
anomalum 157
antidoton 161
arboreſcens 162
ariſtatum 160
arundinaceum 162
brevifolium ib.
brizoides 558
Burmanni ib.
caffrorum 162
capillare 161
carthaginenſe 159
ciliare 158

Panicum
cimicinum 160
clandeſtinum 161
colonum 157
coloratum 160
compoſitum 157
compreſſum 159
conglomeratum 157
Crus corvi ib.
Crus galli ib.
curvatum 161
dactilon 159
dichotomum 160
diffuſum ib.
diſtachyon 158
divaricatum 161
diviſum 156
elatius 157
falcatum 163
faſciculatum 159
filiforme ib.
flaveſcens 160
flavidum 156
flexuoſum 161
fluitans 158
fugax 162
fuſcum 160
geminatum 158
germanicum 156
glaucum ib.
glutinoſum 162
groſſarium 160
helvolum 156
hirtellum 157
hiſpidulum 158
hiſpidum 157
indicum 156
iſchæmoides 161
italicum 157
lanatum 162
lanceolatum 158
latifolium 160
laxum ib.

Panicum
lineare 159
longiflorum 158
maculatum 163
maximum 162
miliaceum 161
molle 159
muricatum 161
muticum 157
nemoroſum 159
notatum 161
nudum 162
oryzinum 157
oryzoides 160
pallens 161
palmæfolium 162
patens 161
piliferum 157
piloſum 159
polygamum 162
polyſtachyon 156
radicans 162
ramoſum 160
remotum 161
repens ib.
rigens 160
ſanguinale 159
ſericeum 156
ſetigerum ib.
ſetoſum 157
ſpecioſum 162
ſquarroſum 158
ſtagninum 157
tetraſtichon 158
trigonum 161
tumidum 157
turgidum 160
umbroſum 158
verticillatum 156
virgatum 161
viride 156

Panke 647, 652
acaulis 652
caulescens ib.
Panzeria 211, 247
caroliniana 247
Papaver 774, 809, 810
alpinum 809
Argemone ib.
cambricum 810
dubium ib.
hybridum 809
nudicaule ib.
orientale 810
Rhoeas 809
ſomniferum 810
Papuleria 304, 429
criſtallina 429
Paralea 773, 798
gujanenſis 798
Pariana 773, 828
campeſtris 828
Parietaria 217, 266
cretica 266
debilis ib.
indica ib.
judaica ib.
luſitanica ib.
officinalis ib.
urticæfolia ib.
Paris 603, 643
quadrifolia 643
Parivoa 1076, 1085
grandiflora 1085
tomentoſa ib.
Parkinſonia 655, 667
aculeata 667
Parnaſſia 312, 507, 508
paluſtris 508
polynectaria 507

Parthenium 291, 375
Hyſterophorus 375
integrifolium ib.
Paſpalum 87, 155
conjugatum ib.
decumbens ib.
diſſectum ib.
diſtichon ib.
filiforme ib.
hirſutum ib.
longiflorum ib.
membranaceum ib.
orbiculare ib.
paniculatum ib.
præcox ib.
ſcrobiculatum ib.
vaginatum ib.
villoſum ib.
virgatum ib.
Paſſerina 601, 634
anthylloides 634
capitata ib.
ciliata ib.
ericoides ib.
filiformis ib.
grandiflora ib.
hirſuta ib.
laxa ib.
Mitnak ib.
ſpicata ib.
uniflora ib.
Paſſiflora 311, 500-503
adulterina 501
alata ib.
anguſtifolia ib.
aurantia 502
cærulea 503
capſularis 501
ciliata 502
coccinea 501
cuprea ib.
fœtida 502

Paſſiflora
glauca 502
heterophylla ib.
hirſuta ib.
holoſericea ib.
incarnata ib.
laurifolia 500
lutea 502
maliformis 501
minima 502
mixta ib.
multiflora 501
Muracuja ib.
normalis ib.
oblongata ib.
pallida 500
parviflora 502
pedata 503
perfoliata 501
punctata 502
quadrangularis 501
rotundifolia 502
rubra 501
ſerrata 503
ſerratifolia 500
ſtipulata 502
ſuberoſa ib.
tiliaefolia 501
Veſpertilio ib.

Paſtinaca 310, 490
lucida 490
opopanax ib.
ſativa ib.

Patabea 213, 280
coccinea 280

Patagonula 293, 393
americana 393

Patima 299, 366
gujanenſis 366

Patterſonia 888, 925
caroliniana 925

Paullinia 603, 641, 642
aſiatica 641
barbadenſis ib.
caribæa ib.
carthaginenſis ib.
curaſſavica ib.
Curura ib.
divaricata ib.
diverſifolia 642
japonica 641
mexicana ib.
nodoſa ib.
pinnata 642
polyphylla 641
Seriana ib.
tetragona 642
tomentoſa ib.
triternata 641
Veſpertilia 642

Pavetta 212, 243
caffra 244
fœtidiſſima 243
indica 244

Pavonia 1000, 1060, 1061
ariſtata 1060
cancellata ib.
coccinea 1061
Columella ib.
cuneifolia ib.
haſtata ib.
paniculata 1060
papilionacea 1061
præmorſa ib.
Spicata 1060
ſpinifex ib.
urens 1061
zeylanica 1060

Paypayrola 303, 419
gujanenſis 419

Pectis 1164, 1246
ciliaris 1246
humifuſa ib.
linifolia ib.
punctata ib.

PEDALIUM 890, 965
Murex 965

Pedicularis 889, 925-927
acaulis 927
canadenſis 926
comoſa ib.
criſtata ib.
flammea ib.
flava ib.
folioſa ib.
hirſuta ib.
incarnata ib.
lapponica ib.
myriophylla 925
paluſtris ib.
recutita 926
reſupinata ib.
roſea ib.
roſtrata 925
Sceptrum carolinum 926
ſilvatica 925
ſpicata 927
ſtriata ib.
triſtis 926
tuberoſa ib.
verticillata ib.

Peganum 741, 750
dauricum 750
Harmala ib.
retuſum ib.

Peltaria 967, 977
alliacea 977
capenſis ib.

Penæa 212, 249
fruticuloſa 249
furcata ib.
lateriflora ib.
marginata ib.
mucronata ib.
myrtoides ib.
Sarcocolla ib.
ſquamoſa ib.
tetragona ib.

Pennantia 304, 430
corymboſa 430

Pentagloſſum 20, 50
linifolium 50

Pentapetes 998, 1028
acerifolia 1028
Erythroxylon ib.
ſuberoſa ib.
velutina ib.

Penthorum 662, 733
fedoides 733

Peplis 526, 578
Portula 578
tetrandra ib.

Pera 778, 840
arborea 840

Perama 210, 232
hirſuta 232

Perdicium 1163, 1243 *ſq.*
braſilienſe 1243
lævigatum 1244
magellanicum ib.
radiale 1243
ſemifloſculare 1243
tomentoſum 1244

PERGULARIA 306, 440
glabra 440
japonica 440
tomentoſa ib.

Periconia 1486
lichenoides ib.

Perilla 885, 904
ocymoides 904

Periploca 306, 440, 441
africana 440
capſularis ib.
emetica 441
eſculenta 440
græca ib.
indica ib.
lævigata ib.
Secamone ib.
ſilveſtris 441
tun caia ib.

Petagnana 1078, 1119
ſenſitiva 1119

Petaloma 658, 678
Mouriri 673
myrtilloides ib.

Peteſia 212, 244
carnea 244
ſtipularis ib.
tomentoſa ib.

Petitia 211, 245
domengenſis 245

Petiveria 528, 589
alliacea 589
octandra ib.

Petrea 889, 944
volubilis 944

Petrocarya 593, 596
campeſtris 596
montana ib.

Peucedanum 308, 477
alpeſtre 477
aſiaticum ib.
aureum ib.
geniculatum ib.
japonicum ib.
minus ib.
nodoſum ib.
officinale ib.
redivivum ib.
Silaus ib.

Peumus 523, 565, 566
alba 565
Boldus 566
mammoſa 565
rubra ib.

Peziza 1286, 1451-1459
aceris 1458
Acetabulum 1459
albidula 1454
applanata 1458
aquifolia 1457
araneoſa 1456
atra ib.
Auricula 1459
bicolor ib.
bolaris 1453
bulboſa 1451
cærulea 1457
caliciformis 1452
Caliculus ib.
calloſa 1456
candidiſſima 1454
carnea 1458
cartilaginea 1457
carpini 1451
cerea 1459
chryſocoma 1457
ciliaris 1453

Peziza
ciliata 1456
cinerea 1457
citrina 1454
clandeſtina 1453
comitialis 1458
convivalis 1453
coriacea 1451
coronata 1455
Crater 1452
Craterella ib.
crenata 1455
crinita 1458
criſpa ib.
crocea 1457
Crucibulum 1454
cupreſſi ib.
cupularis 1454
cyatoides ib.
Diadema 1455
diſcolor 1454
dubia 1452
echinophila 1451
elaſtica 1459
epiphylla 1455
cruciformis 1453
exilis 1459
expalleſcens 1457
fimetaria 1456
flava 1455, 1457
floccoſa 1456
fulva 1458
Fungoidaſter 1452
gelatinoſa 1459
granulata 1456
griſea 1458
Hæmaſtigma 1455
Halleri 1452
hemiſphærica 1455
hepatica 1458
hians 1453
hirſuta 1456
hirta 1455

Peziza
hirtella 1456
Hirundo 1452
hiſpida 1455
hiſpidula 1456
hypocrateriformis 1456
jenenſis 1457
immarginata ib.
infundibuliformis 1454
Infundibulum 1452
Labellum 1455
lacera ib.
lactea 1453
lanuginoſa 1455
leporina 1456
limbata 1459
livida 1457
leucoloma 1458
luteſcens 1454
marchica 1456
membranacea ib.
miniata 1453
minima 1454
minuta 1459
minutiſſima 1453
nana 1458
nigra 1456
nigreſcens 1455
nivea 1457
nutans 1452
olivacea 1458
paleacea 1453
palpebralis 1457
papyracea 1453
pedunculata 1453
Pileolus 1458
pineti ib.
pinguis 1455
polymorpha 1459
porphyrea ib.
porphyroſpermos ib.

Peziza
putla 1455
pulvinata 1457
punicea 1458
purpurea 1453
puſilla 1456
puſtulata 1455
pyriformis 1453
quercina 1452
rhizophora 1455
rugoſa 1457
ſanioſa 1459
ſarcoides 1454
Sceptrum 1451
Schenkii 1457
ſcutellata ib.
Seminulum 1458
ſepulcralis 1454
ſigillatoria 1453
ſpadicea 1454
ſtercorea 1457
ſtipitata 1453
ſulphurea 1452
tenella 1451
tomentoſa 1456
tremelloides 1454
Tuba 1451
tuberoſa ib.
umbrina 1453
urceolata ib.
urticæ ib.
varia 1452
villoſa ib.
violacea ib.
vireſcens 1457
virginea 1453
viridans 1456
viridis 1458
Phaca 1075, 1077, 1131, 1132
alpina 1131
arenaria ib.
auſtralis ib.

bætica

Phaca
bætica 1131
incana 1132
microphylla *ib.*
muricata *ib.*
oxyphylla 1131
proſtrata 1132
ſalſula 1131
ſibirica *ib.*
ſilvatica *ib.*
trifoliata *ib.*
veſicaria 1132

Phacelia 293, 330
ſecunda 330

Phalaris 86,153,154
alpina 153
aquatica *ib.*
arundinacea *ib.*
aſpera *ib.*
bulboſa *ib.*
canarienſis *ib.*
caroliniana 154
criſtata *ib.*
dentata *ib.*
diſticha *ib.*
erucæformis 153
hiſpida 154
muricata *ib.*
nodoſa 153
oryzoides *ib.*
paradoxa *ib.*
phleoides *ib.*
ſemiverticillata 154
ſetacea *ib.*
utriculata 153
vaginiflora 154
velutina *ib.*
zizanioides 153

Phallus 1285, 1448 *ſq.*
Anaſtomoſis 1449
caninus *ib.*
eſculentus 1449
fungoides 1448
Gigas *ib.*
impudicus 1449
Mokuſin *ib.*
patulus *ib.*
Rete *ib.*
undoſus 1448

Pharnaceum 311, 505, 506
albens 506
Cerviana 505
cordifolium 506
depreſſum *ib.*
dichotomum *ib.*
diſtichum *ib.*
glomeratum *ib.*
incanum *ib.*
lineare 505
maritimum 506
microphyllum 505
Mollugo 506
occultum *ib.*
quadrangulare *ib.*
ſerpyllifolium *ib.*
ſuffruticoſum *ib.*
umbellatum *ib.*

Pharus 526, 579
ariſtatus 579
ciliatus *ib.*
lappulaceus *ib.*
latifolius *ib.*

Phaſcum 1284, 1323 *ſq.*
alternifolium 1324
cauleſcens *ib.*
cernuum 1323
criſpum *ib.*
cuſpidatum *ib.*
muticum *ib.*

Phaſcum
nitidum 1324
patens 1323
pedunculatum *ib.*
piliferum *ib.*
repens 1324
ſerratum 1323
ſubulatum *ib.*

Phaſeolus 1075, 1077, 1101, 1102
aconitifolius 1102
alatus 1101
Aſellus 1102
bipunctatus 1101
Caracalla 1102
farinoſus 1101
helvolus *ib.*
hirtus 1102
inamœnus 1101
lathyroides 1102
lunatus 1101
Max 1102
Mungo *ib.*
nanus *ib.*
Palla 1101
perennis *ib.*
radiatus 1102
ſemierectus *ib.*
ſphærotpermos *ib.*
vexillatus 1101
vulgaris *ib.*

Phellandrium 309, 485
aquaticum 485
Mutellina *ib.*

Philadelphus 770, 786
aromaticus 786
coronarius *ib.*
floribundus *ib.*

Philadelphus
inodorus 786
laniger ib.

Phileſia 996, 1012
magellanica 1012

Phillyrea 19, 25
anguſtifolia 25
latifolia ib.
media ib.

Philydrum 1, 9
lanuginoſum 9

Phleum 86, 166, 167
alopecuroides 166
alpinum ib.
arenarium ib.
aſperum 167
Bellardi 166
Gerardi ib.
Micheli ib.
nodoſum ib.
paniculatum 167
pratenſe 166
ſchœnoides ib.
viride ib.

Phlomis 885, 910, 911
alba 910
alpina 911
caribæa 910
fruticoſa 911
glabrata 910
Herba venti 911
indica 910
laciniata ib.
Leonotis ib.
Leonurus ib.
Lychnitis ib.
martinicenſis 911
moluccoides 910

Phlomis
nepetifolia 911
Niſſolii 910
purpurea 911
ſamia ib.
ſinenſis 910
tuberoſa 911
zeylanica 910

Phlox 294, 338, 339
carolina 338
divaricata ib.
glaberrima ib.
maculata ib.
ovata ib.
paniculata ib.
piloſa ib.
ſetacea 339
ſibirica 338
ſuaveolens ib.
ſubulata ib.
undulata ib.

Phœnix 83, 95
dactylifera 95
puſilla ib.

PHORMIUM 525, 561
bulbiferum 561
tenax ib.

Phryma 886, 921
carolinenſe 921
Leptoſtachyon ib.

Phylica 302, 401, 402
bicolor 401
buxifolia 402
calloſa ib.
cordata ib.
dioica ib.
ericoides 401
eriophoros ib.
imberbis ib.
parviflora 402
pinifolia ib.

Phylica
plumoſa 402
pubeſcens 401
ſpicata 402
ſtipularis 401
ſtrigoſa ib.

Phyllachne 2, 11
uliginoſa 11

Phyllanthus 89, 203, 204
Arbuſcula 204
bacciformis 203
carolinianus 204
Conami 203
Emblica ib.
falcatus 204
grandifolius 203
Hamrur 204
maderaſpatenſis 203
mimoſoides ib.
Niruri ib.
nutans ib.
racemoſus ib.
rhamnoides 204
ſimplex ib.
ſpecioſus 203
ſtellatus 204
Urinaria ib.
virgatus ib.

Phyllis 307, 464
nobla 464

Phyſalis 296, 381, 382
Alkekengi 381
angulata 382
arboreſcens 381
ariſtata ib.
barbadenſis 382
curaſſavica 381
dubia 382
flexuoſa 381

Phyſalis
limenſis 382
lutea ib.
minima ib.
nutans ib.
penſilvanica 381
peruviana ib.
proſtrata ib.
pruinoſa 382
pubeſcens ib.
ramoſa ib.
ſomnifera 381
torrentoſa 382
viſcoſa 381

Phyteuma 297, 354, 355
americanum 355
betonicæfolium 354
Charmelii ib.
comoſum ib.
hemiſphæricum ib.
orbiculare ib.
pauciflorum ib.
pinnatum 355
ſcorzonerifolium 354
ſpicatum ib.

Phytolacca 663, 739
decandra 739
dioica ib.
icoſandra ib.
octandra ib.

Picris 1161, 1170
aſplenioides 1170
echioides ib.
hieracioides ib.
japonica ib.
ſcabra ib.

Pilobolus 1462
conglomeratus ib.
cryſtallinus ib.
roridus ib.

Pilularia 1284, 1322
globulifera 1322

Pimpinella 310, 491, 492
Anifum 492
dichotoma ib.
dioica ib.
glauca ib.
hircina ib.
magna ib.
nigra ib.
peregrina ib
ſaxifraga 491
Tragium 492

Pinguicula 20, 39
alpina 39
cærulea ib.
luſitanica ib.
lutea ib.
villoſa ib.
vulgaris ib.

Pinus 1001, 1071-1074
Abies 1073
alba ib.
americana ib.
araucana ib.
balſamea ib.
canadenſis ib.
Cedrus ib.
Cembra 1072
cupreſſoides 1074
glabra 1072
halepenſis ib.
laricina 1073
Larix 1072
lutea ib.
mariana 1073
maritima 1072
occidentalis. ib.
paluſtris ib.
pendula 1073

Pinus
Picea 1073
Pinaſter 1071
Pinea 1072
reſinoſa ib.
rigida ib.
ſilveſtris 1071
ſquarroſa 1072
Strobus ib.
Tæda ib.
virginiana 1071

Piper 22, 76-79
acuminatum 77
aduncum ib.
alpinum 78
Amalago 76
amplexicaule 79
Betel 76
blandum 77
capenſe ib.
cluſiæfolium ib.
cordifolium 79
Cubeba 77
decumanum ib.
diſcolor 78
diſtachyon ib.
excelſum 79
filiforme ib.
geniculatum 78
glabellum 79
hiſpidulum ib.
hiſpidum 78
latifolium 77
longum ib.
macrophyllum 78
maculatum 77
magnoliæfolium ib.
Malamiri 76
medium 77
methyſticum 78
nigrum 76
nitidum 78
numularifolium 79

Piper
obtuſifolium 77
pallidum 79
pellucidum 77
peltatum 78
pulchellum ib.
quadrifolium ib.
reflexum ib.
reticulatum 77
retuſum ib.
rotundifolium ib.
ſcandens 79
ſerpens ib.
Siriboa 76
ſtellatum 79
tenellum ib.
tetraphyllum ib.
trifolium 78
umbellatum ib.
verrucoſum ib.
verticillatum ib.

Pirigara 770, 787
hexapetala 787
tetrapetala ib.

Piripea 888

Piſcidia 1075, 1076, 1088
carthagenenſis 1088
Erithrina ib.

Piſonia 303, 431
aculeata 431
buxifolia ib.
coccinea ib.
inermis ib.
ſubcordata ib.

Piſtacia 305, 457
Lentiſcus 457
narbonenſis ib.
Terebinthus ib.
trifolia ib.
vera ib.

Piſtia 525, 565
Stratiotes 565

Piſum 1075, 1077, 1107, 1108
arvenſe 1107
maritimum 1108
Ochrus ib.
ſativum 1107

Pitcarnia 522, 530
anguſtifolia 530
bromeliæfolia ib.
latifolia ib.

Pittoſporum 311, 411, 412
coriaceum 412
tenuifolium 411
umbellatum ib.

Placoma 390
pendulum ib.

Plagianthus 998, 1026
divaricatus 1026

Planera 86, 150
aquatica 150

Plantago 212, 251-254
ægyptiaca 253
afra 254
albicans 252
alpina 253
altiſſima 252
argentea ib.
aſiatica ib.
Bellardi ib.
caroliniana 254
Columnæ 253
Cornuti ib.
coronopifolia ib.
craſſifolia ib.
cretica ib.
cylindrica ib.

Plantago
Cynops 254
decumbens 253
dentata 252
exigua 254
Gouani 251
gracilis 252
incurvata 253
indica 254
Lagopus 252
lanata ib.
lanceolata ib.
Loeflingii 253
luſitanica 252
macrorhiza 251
major ib.
maritima 253
media 252
minuta ib.
ovata 253
Pſyllium 254
ſerpentina 253
Serraria 252
ſubulata 253
virginica 252

Platanus 777, 821
occidentalis 821
orientalis ib.

Plectronia 302, 419
ventoſa 419

Plegorhiza 647, 652
Guaicuru 652

Plinia 771, 796
crocea 796
pedunculata ib.

Plocama 296, 428
pendulum 428

Plotea 295, 404
Adanſoni 404

Pluckenetia 997, 1013
volubilis 1013

Plumbago 291, 337, 338
europæa 337
roſea 42
ſcandens 338
zeylanica 337
Plumieria 294, 437
alba 437
obtuſa *ib.*
pudica *ib.*
rubra *ib.*
Poa 88, 179-183
abiſſinica 180
alpina 179
amabilis 180
amboinenſis 182
anceps 180
anguſtifolia 179
annua *ib.*
aquatica *ib.*
aſpera 181
barbata 180
bohemica 181
brizoides *ib.*
bulboſa *ib.*
capillaris 180
cilianenſis 181
ciliaris 182
cinerea 183
compreſſa 182
contracta *ib.*
criſtata *ib.*
cynoſuroides *ib.*
decumbens *ib.*
diſtans 181
diſticha 183
divaricata 181
dura *ib.*
Eragroſtis 180
expenſa 181
ferruginea 180
flava 179
Gerardi *ib.*
glomerata 182
glutinoſa 180
hirta *ib.*
japonica *ib.*
malabarica 181
maritima *ib.*
montana *ib.*
multiflora 182
nemoralis 181
nitens 179
nutans 182
paluſtris 179
peruviana 182
Phœnix 180
piloſa 179
planiculmis 182
plumoſa 180
pratenſis 179
prolifera 180
punctata *ib.*
rigida 181
ſalina 179
ſicuta 183
ſilvatica 180
ſimplex 179
ſinenſis 181
ſpicata 182
ſubnuda 179
tenella 181
trivialis 179
unioloides 182
Villarſii *ib.*
viſcoſa 180
Podophyllum 776, 808
diphyllum 808
peltatum *ib.*
Poinciana 655, 671
bijuga 671
elata *ib.*
pulcherrima *ib.*
Poiretia 213, 263
erecta 263
procumbens *ib.*
Polemonium 294, 347
cæruleum 347
campanuloides *ib.*
dubium *ib.*
reptans *ib.*
rœlioides *ib.*
Pollia 525, 556
japonica 556
Pollichia 885, 905
amplexicaulis 905
Galeobdolon *ib.*
Polyanthes 524, 559
tuberoſa 559
Polycardia 301, 407
madagaſcarienſis 407
Polycarpon 89, 207, 208
magellanicum 207
tetraphyllum 208
uniflorum *ib.*
Polycnemum 84, 106
arvenſe 106
monandrum *ib.*
oppoſitifolium *ib.*
ſcleroſpermum *ib.*
Polygala 1075, 1081, 1083
æſtuans 1082
alopecuroides *ib.*
amara *ib.*
aſpalatha *ib.*
bracteolata *ib.*
braſilienſis *ib.*
Chamæbuxus 1082

Polygala
ciliata 1083
cruciata ib.
cymoſa ib.
diverſifolia 1082
Fimutu ib.
glaucoides 1083
grandiflora ib.
Heiſteria 1082
incarnata 1081
lutea 1083
major 1081
microphylla 1082
mixtus ib.
monſpeliaca 1081
myrtifolia 1082
oppoſitifolia ib.
paniculata 1081
penæa 1082
polygama 1083
ſanguinea ib.
Senega ib.
ſibirica 1081
ſinenſis 1082
ſpinoſa 1081
ſquarroſa 1082
ſtipulacea 1083
teretifolia 1081
theezans 1082
trichoſperma 1081
triflora 1083
trinervia 1082
umbellata 1081
verticillata 1083
violacea 1082
viridefcens 1083
vulgaris 1081

Polygonum 603
637-639
amphibium 637
arifolium 638

Polygonum
articulatum 639
aviculare ib.
barbatum 638
Bellardi 639
Biſtorta 638
Convolvulus 639
craſſifolium ib.
divaricatum ib.
dumetorum ib.
erectum ib.
Fagopyrum ib.
filiforme 638
fruteſcens 637
Hydropiper 638
lapathifolium 637
maritimum 639
minus 638
multiflorum 639
ocreatum 638
orientale ib.
penſilvanicum ib.
perfoliatum ib.
Perſicaria ib.
ſagittatum ib.
ſcandens 639
ſerratum ib.
ſinenſe ib.
tataricum ib.
tinctorium 638
undulatum 639
virginianum 637
viviparum 639

Polymnia 1166, 1270
abiſſinica 1270
canadenſis ib.
carnoſa ib.
ſpinoſa ib.
Tetragonotheca ib.
Uvedelia ib.
Wedelia ib.

Polypodium 1283; 1304-1314
acroſtichoides 1305
aculeatum 1312
adiantiforme 1311
adiantoides 1310
æmulum 1308
affine 1313
alatum 1306
alpinum 1313
anguſtifolium 1305
arboreum 1313
ariſtatum 1311
armatum 1314
aſperum ib.
aſplenifolium 1306
aureum ib.
auriculatum 1309
axillare 1314
Barometis 1312
bulbiferum ib.
Callipteris 1311
cambricum 1307
capenſe 1313
cicutarium 1308
comoſum 1305
cordifolium 1309
coriaceum 1308
craſſifolium 1305
crenatum 1309
crenulatum 1313
criſpatum 1306
criſtatum 1311
dealbatum 1313
decuſſatum 1312
deltoideum 1307
dentatum 1308
denticulatum 1314
dichotomum 1313
diſſectum 1308
diſſimile 1309
Dryopteris 1313
echinatum 1309

Polypodium
effuſum 1308
ellipticum 1306
elongatum 1313
erectum 1310
exaltatum 1309
exoſum 1311
extenſum 1312
falcatum 1309
Filix fœmina 1312
Filix mas *ib.*
fontanum 1308
fragile 1312
fragrans 1310
fraxinifolium *ib.*
glaucum 1313
gramineum 1304
gujanenſe 1310
haſtatum 1306
heterophyllum 1305
Hippocrepis 1310
hirſutulum *ib.*
hirtum 1308
horridum 1314
inciſum 1307
inviſum *ib.*
lacerum 1313
laciniatum 1311
lanceolatum 1304
latifolium 1311
lineare 1305
Lonchitis 1309
loriceum 1306
lunulatum 1313
lycopodioides 1304
marginale 1309
marginatum 1313
marginellum 1305
medullare 1312
minimum 1304
molle 1310
molliſſimum *ib.*
montanum *ib.*

Polypodium
montium 1314
multifidum *ib.*
muricatum 1306
myoſuroides 1306
noveboracenſe 1312
nudum *ib.*
nymphale 1311
obliteratum 1307
orientale 1312
Otites 1307
paraſiticum 1310
patens 1308
pectinatum 1307
pendulum 1306
pennigerum 1311
Phegopteris 1310
phyllitidis 1305
phymatodes 1306
Pica *ib.*
piloſelloides 1305
plantagineum *ib.*
pubeſcens 1212
punctatum 1308
puſtulatum 1306
pyramidale 1313
quadripinnatum 1314
quercifolium 1307
regium 1313
repens 1305
reptans 1309
reticulatum 1310
retroflexum *ib.*
rhæticum 1312
rhizophyllum 1309
rigidum 1304
ſagittatum 1309
ſcandens 1306
ſcolopendroides 1307
ſemicordatum 1309
ſerpens 1305
Serra 1307
ſerratum 1310

Polypodium
ſetiferum 1312
ſetigerum *ib.*
ſetoſum 1311
ſimile 1309
ſpeluncæ 1313
ſpinoſum *ib.*
ſquamatum 1306
ſtoloniferum 1305
ſtruthionis 1307
ſurinamenſe 1305
ſuſpenſum 1306
taxifolium 1307
temellum 1310
tetragonum 1307
Thelypteris 1311
triangulare 1309
trichomanoides 1306
trifoliatum 1308
trifurcatum 1305
triphyllum 1308
umbroſum 1314
unitum 1309
varium 1311
veſtitum *ib.*
villoſum 1312
virginianum 1307
vulgare *ib.*

Polypremum 212, 248
procumbens

Polytrichum 1284, 1326 *ſq.*
aloides 1326
alpinum 1327
commune 1326
convolutum 1327
hercynicum *ib.*
juniperinum 1326
magellanicum *ib.*
nanum *ib.*
piliferum *ib.*

Paſſiflora
glauca 502
heterophylla ib.
hirſuta ib.
holoſericea ib.
incarnata ib.
laurifolia 500
lutea 502
maliformis 501
minima 502
mixta ib.
multiflora 501
Muracuja ib.
normalis ib.
oblongata ib.
pallida 500
parviflora 502
pedata 503
perfoliata 501
punctata 502
quadrangularis 501
rotundifolia 502
rubra 501
ſerrata 503
ſerratifolia 500
ſtipulata 502
ſuberoſa ib.
tiliæfolia 501
Veſpertilio ib.

Paſtinaca 310, 490
lucida 490
opopanax ib.
ſativa ib.

Patabea 213, 280
coccinea 280

Patagonula 293, 393
americana 393

Patima 299, 366
gujanenſis 366

Patterſonia 888, 925
caroliniana 925

Paullinia 603, 641, 642
aſiatica 641
barbadenſis ib.
caribæa ib.
carthaginenſis ib.
curaſſavica ib.
Cururu ib.
divaricata ib.
diverſifolia 642
japonica 641
mexicana ib.
nodoſa ib.
pinnata 642
polyphylla 641
Seriana ib.
tetragona 642
tomentoſa ib.
triternata 641
Veſpertilia 642

Pavetta 212, 243
caffra 244
fœtidiſſima 243
indica 244

Pavonia 1000, 1060 1061
ariſtata 1060
cancellata ib.
coccinea 1061
Columella ib.
cuneifolia ib.
haſtata ib.
paniculata 1060
papilionacea 1061
præmorſa ib.
Spicata 1060
ſpinifex ib.
urens 1061
zeylanica 1060

Paypayrola 303, 419
gujanenſis 419

Pectis 1164, 1246
ciliaris 1246
humifuſa ib.
linifolia ib.
punctata ib.

PEDALIUM 890, 965
Murex 965

Pedicularis 889, 925-927
acaulis 927
canadenſis 926
comoſa ib.
criſtata ib.
flammea ib.
flava ib.
folioſa ib.
hirſuta ib.
incarnata ib.
lapponica ib.
myriophylla 925
paluſtris ib.
recutita 926
reſupinata ib.
roſea ib.
roſtrata 925
Sceptrum caroli-num 926
ſilvatica 925
ſpicata 927
ſtriata ib.
triſtis 926
tuberoſa ib.
verticillata ib.

Peganum 741, 750
dauricum 750
Harmala ib.
retuſum ib.

Peltaria 967, 977
alliacea 977
capenſis ib.

Penæa 212, 249
fruticuloſa 249
furcata *ib.*
lateriflora *ib.*
marginata *ib.*
mucronata *ib.*
myrtoides *ib.*
Sarcocolla *ib.*
ſquamoſa *ib.*
tetragona *ib.*

Pennantia 304, 430
corymboſa 430

Pentagloſſum 20, 50
linifolium 50

Pentapetes 998, 1028
acerifolia 1028
Erythroxylon *ib.*
ſuberoſa *ib.*
velutina *ib.*

Penthorum 662, 733
fedoides 733

Peplis 526, 578
Portula 578
tetrandra *ib.*

Pera 778, 840
arborea 840

Perama 210, 232
hirſuta 232

Perdicium 1163, 1243 *ſq.*
braſilienſe 1243
lævigatum 1244
magellanicum *ib.*
radiale 1243
ſemifloſculare 1243
tomentoſum 1244

PERGULARIA 306, 440
glabra 440

PERGULARIA
japonica 440
tomentoſa *ib.*

Periconia 1486
lichenoides *ib.*

Perilla 885, 904
ocymoides 904

Periploca 306, 440, 441
africana 440
capſularis *ib.*
emetica 441
eſculenta 440
græca *ib.*
indica *ib.*
lævigata *ib.*
Secamone *ib.*
ſilveſtris 441
tunicata *ib.*

Petagnana 1078, 1119
ſenſitiva 1119

Petaloma 658, 678
Mouriri 678
myrtilloides *ib.*

Peteſia 212, 244
carnea 244
ſtipularis *ib.*
tomentoſa *ib.*

Petitia 211, 245
domengenſis 245

Petiveria 528, 589
alliacea 589
octandra *ib.*

Petrea 889, 944
volubilis 944

Petrocarya 593, 596
campeſtris 596
montana *ib.*

Peucedanum 308, 477
alpeſtre 477
aſiaticum *ib.*
aureum *ib.*
geniculatum *ib.*
japonicum *ib.*
minus *ib.*
nodoſum *ib.*
officinale *ib.*
redivivum *ib.*
Silaus *ib.*

Peumus 523, 565, 566
alba 565
Boldus 566
mammoſa 565
rubra *ib.*

Peziza 1286, 1451-1459
aceris 1458
Acetabulum 1459
albidula 1454
applanata 1458
aquifolia 1457
araneoſa 1456
atra *ib.*
Auricula 1459
bicolor *ib.*
bolaris 1453
bulboſa 1451
cærulea 1457
caliciformis 1452
Caliculus *ib.*
calloſa 1456
candidiſſima 1454
carnea 1458
cartilaginea 1457
carpini 1451
cerea 1459
chryſocoma 1457
ciliaris 1453

Peziza
ciliata 1456
cinerea 1457
citrina 1454
clandeſtina 1453
comitialis 1458
convivalis 1453
coriacea 1451
coronata 1455
Crater 1452
Craterella ib.
crenata 1455
crinita 1458
criſpa ib.
crocea 1457
Crucibulum 1454
cupreſſi ib.
cupularis 1454
cyatoides ib.
Diadema 1455
diſcolor 1454
dubia 1452
echinophila 1451
elaſtica 1459
epiphylla 1455
cruciformis 1453
exilis 1459
expalleſcens 1457
fimetaria 1456
flava 1455, 1457
floccoſa 1456
fulva 1458
Fungoidaſter 1452
gelatinoſa 1459
granulata 1456
griſea 1458
Hæmaſtigma 1455
Halleri 1452
hemiſphærica 1455
hepatica 1458
hians 1453
hirſuta 1456
hirta 1455

Peziza
hirtella 1456
Hirundo 1452
hiſpida 1455
hiſpidula 1456
hypocrateriformis 1456
jenenſis 1457
immarginata ib.
infundibuliformis 1454
Infundibulum 1452
Labellum 1455
lacera ib.
lactea 1453
lanuginoſa 1455
leporina 1456
limbata 1459
livida 1457
leucoloma 1458
luteſcens 1454
marchica 1456
membranacea ib.
miniata 1453
minima 1454
minuta 1459
minutiſſima 1453
nana 1458
nigra 1456
nigreſcens 1455
nivea 1457
nutans 1452
olivacea 1458
paleacea 1453
palpebralis 1457
papyracea 1453
pedunculata 1453
Pileolus 1458
pineti ib.
pinguis 1455
polymorpha 1459
porphyrea ib.
porphyroſpermos ib.

Peziza
putla 1456
pulvinata 1457
punicea 1458
purpurea 1453
puſilla 1456
puſtulata 1455
pyriformis 1453
quercina 1452
rhizophora 1455
rugoſa 1457
ſanioſa 1459
ſarcoides 1454
Sceptrum 1451
Schenkii 1457
ſcutellata ib.
Seminulum 1458
ſepulcralis 1454
ſigillatoria 1453
ſpadicea 1454
ſtercorea 1457
ſtipitata 1453
ſulphurea 1452
tenella 1451
tomentoſa 1456
tremelloides 1454
Tuba 1451
tuberoſa ib.
umbrina 1453
urceolata ib.
urticæ ib.
varia 1452
villoſa ib.
violacea ib.
vireſcens 1457
virginea 1453
viridans 1456
viridis 1458

Phaca 1075, 1077, 1131, 1132
alpina 1131
arenaria ib.
auſtralis ib.

bætica

Phaca
bætica 1131
incana 1132
microphylla ib.
muricata ib.
oxyphylla 1131
proſtrata 1132
ſalſula 1131
ſibirica ib.
ſilvatica ib.
trifoliata ib.
veſicaria 1132

Phacelia 293, 330
ſecunda 330

Phalaris 86, 153, 154
alpina 153
aquatica ib.
arundinacea ib.
aſpera ib.
bulboſa ib.
canarienſis ib.
caroliniana 154
criſtata ib.
dentata ib.
diſticha ib.
erucæformis 153
hiſpida 154
muricata ib.
nodoſa 153
oryzoides ib.
paradoxa ib.
phleoides ib.
ſemiverticillata 154
ſetacea ib.
utriculata 153
vaginiflora 154
velutina ib.
zizanioides 153

Phallus 1285, 1448 *ſq.*
Anaſtomoſis 1449
caninus ib.
eſculentus 1449
fungoides 1448
Gigas ib.
impudicus 1449
Mokuſin ib.
patulus ib.
Rete ib.
undoſus 1448

Pharnaceum 311, 505, 506
albens 506
Cerviana 505
cordifolium 506
depreſſum ib.
dichotomum ib.
diſtichum ib.
glomeratum ib.
incanum ib.
lineare 505
maritimum 506
microphyllum 505
Mollugo 506
occultum ib.
quadrangulare ib.
ſerpyllifolium ib.
ſuffruticoſum ib.
umbellatum ib.

Pharus 526, 579
ariſtatus 579
ciliatus ib.
lappulaceus ib.
latifolius ib.

Phaſcum 1284, 1323 *ſq.*
alternifolium 1324
cauleſcens ib.
cernuum 1323
criſpum ib.
cuſpidatum ib.
muticum ib.
nitidum 1324
patens 1323
pedunculatum ib.
piliferum ib.
repens 1324
ſerratum 1323
ſubulatum ib.

Phaſeolus 1075, 1077, 1101, 1102
aconitifolius 1102
alatus 1101
Aſellus 1102
bipunctatus 1101
Caracalla 1102
farinoſus 1101
helvolus ib.
hirtus 1102
inamœnus 1101
lathyroides 1102
lunatus 1101
Max 1102
Mungo ib.
nanus ib.
Palla 1101
perennis ib.
radiatus 1102
ſemierectus ib.
ſphærolpermos ib.
vexillatus 1101
vulgaris ib.

Phellandrium 309, 485
aquaticum 485
Mutellina ib.

Philadelphus 770, 786
aromaticus 786
coronarius ib.
floribundus ib.

Philadelphus
inodorus 786
laniger ib.

Phileſia 996, 1012
magellanica 1012

Phillyrea 19, 25
anguſtifolia 25
latifolia ib.
media ib.

Philydrum 1, 9
lanuginoſum 9

Phleum 86, 166, 167
alopecuroides 166
alpinum ib.
arenarium ib.
aſperum 167
Bellardi 166
Gerardi ib.
Micheli ib.
nodoſum ib.
paniculatum 167
pratenſe 166
ſchœnoides ib.
viride ib.

Phlomis 885, 910, 911
alba 910
alpina 911
caribæa 910
fruticoſa 911
glabrata 910
Herba venti 911
indica 910
laciniata ib.
Leonotis ib.
Leonurus ib.
Lychnitis ib.
martinicenſis 911
moluccoides 910

Phlomis
nepetifolia 911
Niſſolii 910
purpurea 911
ſamia ib.
ſinenſis 910
tuberoſa 911
zeylanica 910

Phlox 294, 338, 339
carolina 338
divaricata ib.
glaberrima ib.
maculata ib.
ovata ib.
paniculata ib.
piloſa ib.
ſetacea 339
ſibirica 338
ſuaveolens ib.
ſubulata ib.
undulata ib.

Phœnix 83, 95
dactylifera 95
puſilla ib.

PHORMIUM 525, 561
bulbiferum 561
tenax ib.

Phryma 886, 921
carolinenſe 921
Leptoſtachyon ib.

Phylica 302, 401, 402
bicolor 401
buxifolia 402
calloſa ib.
cordata ib.
dioica ib.
ericoides 401
eriophoros ib.
imberbis ib.
parviflora 402
pinifolia ib.

Phylica
plumoſa 402
pubeſcens 401
ſpicata 402
ſtipularis 401
ſtrigoſa ib.

Phyllachne 2, 11
uliginoſa 11

Phyllanthus 89, 203, 204
Arbuſcula 204
bacciformis 203
carolinianus 204
Conami 203
Emblica ib.
falcatus 204
grandifolius 203
Hamrur 204
maderaſpatenſis 203
mimoſoides ib.
Niruri ib.
nutans ib.
racemoſus ib.
rhamnoides 204
ſimplex ib.
ſpecioſus 203
ſtellatus 204
Urinaria ib.
virgatus ib.

Phyllis 307, 464
nobla 464

Phyſalis 296, 381, 382
Alkekengi 381
angulata 382
arboreſcens 381
ariſtata ib.
barbadenſis 382
curaſſavica 381
dubia 382
flexuoſa 381

Phyſalis
limenſis 382
lutea ib.
minima ib.
nutans ib.
penſilvanica 381
peruviana ib.
proſtrata ib.
pruinoſa 382
pubeſcens ib.
ramoſa ib.
ſomnifera 381
torrentoſa 382
viſcoſa 381

Phyteuma 297, 354, 355
americanum 355
betonicæfolium 354
Charmelii ib.
comoſum ib.
hemiſphæricum ib.
orbiculare ib.
pauciflorum ib.
pinnatum 355
ſcorzonerifolium 354
ſpicatum ib.

Phytolacca 663, 739
decandra 739
dioica ib.
icoſandra ib.
octandra ib.

Picris 1161, 1170
aſplenioides 1170
echioides ib.
hieracioides ib.
japonica ib.
ſcabra ib.

Pilobolus 1462
conglomeratus ib.
cryſtallinus ib.
roridus ib.

Pilularia 1284, 1322
globulifera 1322

Pimpinella 310, 491, 492
Anſum 492
dichotoma ib.
dioica ib.
glauca ib.
hircina ib.
magna ib.
nigra ib.
peregrina ib
ſaxifraga 491
Tragium 492

Pinguicula 20, 39
alpina 39
cærulea ib.
luſitanica ib.
lutea ib.
villoſa ib.
vulgaris ib.

Pinus 1001, 1071-1074
Abies 1073
alba ib.
americana ib.
araucana ib.
balſamea ib.
canadenſis ib.
Cedrus ib.
Cembra 1072
cupreſſoides 1074
glabra 1072
halepenſis ib.
laricina 1073
Larix 1072
lutea ib.
mariana 1073
maritima 1072
occidentalis ib.
paluſtris ib.
pendula 1073

Pinus
Picea 1073
Pinaſter 1071
Pinea 1072
reſinoſa ib.
rigida ib.
ſilveſtris 1071
ſquarroſa 1072
Strobus ib.
Tæda ib.
virginiana 1071

Piper 22, 76-79
acuminatum 77
aduncum ib.
alpinum 78
Amalago 76
amplexicaule 79
Betel 76
blandum 77
capenſe ib.
cluſiæfolium ib.
cordifolium 79
Cubeba 77
decumanum ib.
diſcolor 78
diſtachyon ib.
excelſum 79
filiforme ib.
geniculatum 78
glabellum 79
hiſpidulum ib.
hiſpidum 78
latifolium 77
longum ib.
macrophyllum 78
maculatum 77
magnoliæfolium ib.
Malamiri 76
medium 77
methyſticum 78
nigrum 76
nitidum 78
numularifolium 79

Piper
obtuſifolium 77
pallidum 79
pellucidum 77
peltatum 78
pulchellum ib.
quadrifolium ib.
reflexum ib.
reticulatum 77
retuſum ib.
rotundifolium ib.
ſcandens 79
ſerpens ib.
Siriboa 76
ſtellatum 79
tenellum ib.
tetraphyllum ib.
trifolium 78
umbellatum ib.
verrucoſum ib.
verticillatum ib.

Pirigara 770, 787
hexapetala 787
tetrapetala ib.

Piripea 888

Piſcidia 1075, 1076, 1088
carthagenenſis 1088
Erithrina ib.

Piſonia 303, 431
aculeata 431
buxifolia ib.
coccinea ib.
inermis ib.
ſubcordata ib.

Piſtacia 305, 457
Lentiſcus 457
narbonenſis ib.
Terebinthus ib.
trifolia ib.
vera ib.

Piſtia 525, 565
Stratiotes 565

Piſum 1075, 1077, 1107, 1108
arvenſe 1107
maritimum 1108
Ochrus ib.
ſativum 1107

Pitcarnia 522, 530
anguſtifolia 530
bromeliæfolia ib.
latifolia ib.

Pittoſporum 311, 411, 412
coriaceum 412
tenuifolium 411
umbellatum ib.

Placoma 390
pendulum ib.

Plagianthus 998, 1016
divaricatus 1026

Planera 86, 150
aquatica 150

Plantago 212, 251-254
ægyptiaca 253
afra 254
albicans 252
alpina 253
altiſſima 252
argentea ib.
aſiatica ib.
Bellardi ib.
caroliniana 254
Columnæ 253
Cornuti ib.
coronopifolia ib.
craſſifolia ib.
cretica ib.
cylindrica ib.

Plantago
Cynops 254
decumbens 253
dentata 252
exigua 254
Gouani 251
gracilis 252
incurvata 253
indica 254
Lagopus 252
lanata ib.
lanceolata ib.
Loeflingii 253
luſitanica 252
macrorhiza 251
major ib.
maritima 253
media 252
minuta ib.
ovata 253
Pſyllium 254
ſerpentina 253
Serraria 252
ſubulata 253
virginica 252

Platanus 777, 821
occidentalis 821
orientalis ib.

Plectronia 302, 419
ventoſa 419

Plegorhiza 647, 652
Guaicuru 652

Plinia 771, 796
crocea 796
pedunculata ib.

Plocama 296, 428
pendulum 428

Plotea 295, 404
Adanſoni 404

Pluckeneria 997, 1013
volubilis 1013

Plumbago 291, 337, 338
europæa 337
roſea 42
ſcandens 338
zeylanica 337
Plumieria 294, 437
alba 437
obtuſa ib.
pudica ib.
rubra ib.
Poa 88, 179-183
abiſſinica 180
alpina 179
amabilis 180
amboinenſis 182
anceps 180
anguſtifolia 179
annua ib.
aquatica ib.
aſpera 181
barbata 180
bohemica 181
brizoides ib.
bulboſa ib.
capillaris 180
cilianenſis 181
ciliaris 182
cinerea 183
compreſſa 182
contracta ib.
criſtata ib.
cynoſuroides ib.
decumbens ib.
diſtans 181
diſticha 183
divaricata 181
dura ib.
Eragroſtis 180
expenſa 181
ferruginea 180
flava 179
Gerardi ib.

Poa
glomerata 182
glutinoſa 180
hirta ib.
japonica ib.
malabarica 181
maritima ib.
montana ib.
multiflora 182
nemoralis 181
nitens 179
nutans 182
paluſtris 179
peruviana 182
Phœnix 180
piloſa 179
planiculmis 182
plumoſa 180
pratenſis 179
prolifera 180
punctata ib.
rigida 181
ſalina 179
ſicula 183
ſilvatica 180
ſimplex 179
ſinenſis 181
ſpicata 182
ſubnuda 179
tenella 181
trivialis 179
unioloides 182
Villarſii ib.
viſcoſa 180
Podophyllum 776, 808
diphyllum 808
peltatum ib.
Poinciana 655, 671
bijuga 671
elata ib.
pulcherrima ib.

Poiretia 213, 263
erecta 263
procumbens ib.
Polemonium 294, 347
cæruleum 347
campanuloides ib.
dubium ib.
reptans ib.
rœlioides ib.
Pollia 525, 556
japonica 556
Pollichia 885, 905
amplexicaulis 905
Galeobdolon ib.
Polyanthes 524, 559
tuberoſa 559
Polycardia 301, 407
madagaſcarienſis 407
Polycarpon 89, 207, 208
magellanicum 207
tetraphyllum 208
uniflorum ib.
Polycnemum 84, 106
arvenſe 106
monandrum ib.
oppoſitifolium ib.
ſcleroſpermum ib.
Polygala 1075, 1081, 1083
æſtuans 1082
alopecuroides ib.
amara ib.
aſpalatha ib.
bracteolata ib.
braſilienſis ib.
Chamæbuxus 1082

Polypodium
effuſum 1308
ellipticum 1306
elongatum 1313
erectum 1310
exaltatum 1309
exoſum 1311
extenſum 1312
falcatum 1309
Filix fœmina 1312
Filix mas ib.
fontanum 1308
fragile 1312
fragrans 1310
fraxinifolium ib.
glaucum 1313
gramineum 1304
gujanenſe 1310
haſtatum 1306
heterophyllum 1305
Hippocrepis 1310
hirſutulum ib.
hirtum 1308
horridum 1314
inciſum 1307
inviſum ib.
lacerum 1313
laciniatum 1311
lanceolatum 1304
latifolium 1311
lineare 1305
Lonchitis 1309
loriceum 1306
lunulatum 1313
lycopodioides 1304
marginale 1309
marginatum 1313
marginellum 1305
medullare 1312
minimum 1304
molle 1310
molliſſimum ib.
montanum ib.

Polypodium
montium 1314
multifidum ib.
muricatum 1306
myoſuroides 1306
noveboracenſe 1312
nudum ib.
nymphale 1311
obliteratum 1307
orientale 1312
Otites 1307
paraſiticum 1310
patens 1308
pectinatum 1307
pendulum 1306
pennigerum 1311
Phegopteris 1310
phyllitidis 1305
phymatodes 1306
Pica ib.
piloſelloides 1305
plantagineum ib.
pubeſcens 1212
punctatum 1308
puſtulatum 1306
pyramidale 1313
quadripinnatum 1314
quercifolium 1307
regium 1313
repens 1305
reptans 1309
reticulatum 1310
retroflexum ib.
rhæticum 1312
rhizophyllum 1309
rigidum 1304
ſagittatum 1309
ſcandens 1306
ſcolopendroides 1307
ſemicordatum 1309
ſerpens 1305
Serra 1307
ſerratum 1310

Polypodium
ſetiferum 1312
ſetigerum ib.
ſetoſum 1311
ſimile 1309
ſpeluncæ 1313
ſpinoſum ib.
ſquamatum 1306
ſtoloniferum 1305
ſtruthionis 1307
ſurinamenſe 1305
ſuſpenſum 1306
taxifolium 1307
temellum 1310
tetragonum 1307
Thelypteris 1311
triangulare 1309
trichomanoides 1306
trifoliatum 1308
trifurcatum 1305
triphyllum 1308
umbroſum 1314
unitum 1309
varium 1311
veſtitum ib.
villoſum 1312
virginianum 1307
vulgare ib.
Polypremum 212, 248
procumbens .
Polytrichum 1284, 1326 *ſq.*
aloides 1326
alpinum 1327
commune 1326
convolutum 1327
hercynicum ib.
juniperinum 1326
magellanicum ib.
nanum ib.
piliferum ib.

Polytrichum
pulverulentum 1326
ſerratum ib.
undulatum ib.
urnigerum 1327
Pometia 593, 595, 596
pinnata 595
ternata 596
POMMEREULLA 83, 123
cornucopiæ 123
monoica ib.
Ponæa 603, 640
gujanenſis 640
Pontederia 524, 533, 534
azurea 533
cordata 534
haſtata ib.
limoſa ib.
ovata 533
rotundifolia ib.
vaginalis 534
Populus 601, 630-631
alba 630
angulata ib.
balſamifera ib.
canadenſis 631
candicans 630
carolinenſis 631
dilatata 630
græca ib.
heterophylla ib.
lævigata ib.
monilifera ib.
nigra ib.
tremula ib.
PORANA 307, 339
volubilis 339
Poraqueiba 299, 331
gujanenſis 331
Porella 1284, 1322
pinnata 1322
Porteſia 600, 609, 610
mucronata 610
ovata 609
Portlandia 297, 360
coccinea 360
grandiflora ib.
hexandra ib.
tetrandra ib.
Portulaca 741, 751, 752
Anacampſeros 752
arabica ib.
craſſifolia ib.
fruticoſa ib.
halimoides 751
imbricata 752
meridiana ib.
oleracea 751
patens 752
piloſa 751
quadrifida 752
triangularis ib.
Poſſira 773, 797
ſimplex 797
triphylla ib.
Potamogeton, 220, 288, 289
compreſſum 288
criſpum ib.
denſum ib.
fluitans ib.
gramineum ib.
lucens ib.
marinum 289
natans 288
nitens ib.
pectinatum ib.
Potamogeton
perfoliatum 288
pinnatum 289
puſillum ib.
ſerratum 288
ſetaceum ib.
verticillatum 289
Potentilla 781, 857, 860
alba 859
alchimiloides ib.
Anſerina 858
argentea ib.
aſtracanica 859
aurea ib.
bifurca 858
canadenſis ib.
cauleſcens 859
Cluſiana ib.
fragarioides 858
fruticoſa ib.
grandiflora 860
hirta 858
intermedia 859
monſpelienſis ib.
multifida 858
nitida 859
nivalis 858
nivea 860
norwegica ib.
opaca 859
penſilvanica 858
pimpinelloides ib.
recta ib.
reptans 859
rupeſtris 858
ſalisburgenſis 859
ſericea 857
ſtipularis 858
ſubacaulis 860
ſupina 858
tridentata 860

Potentilla
valderia 858
verna 859

Poterium 777, 832
caudatum 832
hybridum *ib.*
Sanguiſorba *ib.*
ſpinoſum *ib.*

Pothos 218, 274, 275
acaulis 274
cordata 275
crenata 274
cuſcuaria *ib.*
lanceolata *ib.*
macrophylla 275
ovata 274
palmata 275
pinnata *ib.*
ſcandens 274
violacea *ib.*

Poupartia 663, 728
gujanenſis 728

Praſium 886, 921
coccineum 921
incarnatum *ib.*
majus *ib.*
minus *ib.*
purpureum *ib.*

Premna 887, 944
integrifolia 944
ſerratifolia *ib.*

Prenanthes 1161, 1173, 1174
alba 1174
altiſſima *ib.*
chondrilloides 1173
debilis *ib.*
dentata *ib.*
haſtata 1174
hiſpida 1173
humilis 1174

Prenanthes
japonica 1174
integra 1173
lyrata 1174
multiflora *ib.*
muralis *ib.*
pinnata *ib.*
purpurea *ib.*
repens *ib.*
ſinenſis 1173
ſpinoſa *ib.*
ſquarroſa 1174
tenuifolia 1173
viminea *ib.*

Primula 292, 326, 327
acaulis 326
Auricula 327
calycantha 326
carniolica 327
cortuſoides *ib.*
elatior 326
farinoſa 327
glutinoſa *ib.*
hirſuta *ib.*
integrifolia *ib.*
longiflora *ib.*
lutea *ib.*
minima *ib.*
nivalis *ib.*
officinalis 326
Palinuri 327
verticillata *ib.*
villoſa *ib.*
viſcoſa *ib.*

Prinos 523, 574
glaber 574
lucidus *ib.*
montanus *ib.*
ſideroxyloides *ib.*
verticillatus *ib.*

Prockia 772
Crucis *ib.*

Procris 217, 267
axillaris 267

Proſerpinaca 89, 207
paluſtris 207

Proſopis 657, 678
ſpicigera 678

Protea 215, 221 - 225
acaulis 224
alba 223
argentea 224
aulacea 223
bracteata 222
bruniades 223
caudata 222
cinerea 224
comoſa 222
conifera 224
conocarpa 222
cordata 225
corymboſa 223
crinita 222
cucullata *ib.*
cyanoides 221
cynaroides 225
decumbens 221
divaricata 225
elliptica 222
florida 221
Gaguedi 225
glabra *ib.*
glomerata 221
grandiflora 224
heterophylla 221
hirta 225
hypophylla 222
imbricata 224
incurva 222
Lagopus 221
lanata 223
Leviſanus 224
linearis 223
mellifera *ib.*

Protea
myrtifolia 224
nana 223
obliqua ib.
pallens 224
parviflora ib.
patula 221
phylicoides ib.
pinifolia 222
plumoſa 224
prolifera 223
puber 225
purpurea 223
racemoſa 222
repens 223
ſaligna 224
Sceptrum 222
Scolimus 223
ſericea 224
Serraria 221
ſpatulata 225
ſpecioſa ib.
ſphærocephala 221
ſpicata ib.
ſtrobilina 224
tomentoſa 222
torta 223
torta 225
triternata 221
umbellata 223

Prunella 886, 920
grandiflora 920
hyſſopifolia ib.
indica ib.
intermedia ib.
laciniata ib.
parviflora ib.
vulgaris ib.

Prunus 771, 794-796
americana 795
aſpera 796
avium 795
canadenſis 794
carolina ib.
Ceraſus 795
Chamæceraſus ib.
domeſtica ib.
elliptica ib.
glanduloſa ib.
japonica ib.
inciſa 796
inſititia 795
latifolia ib.
Lauro-ceraſus 794
luſitanica ib.
Mahaleb 795
nana 794
nigra 795
occidentalis 794
Padus ib.
paniculata 795
penſilvanica ib.
pumila ib.
rubra 794
ſibirica 795
ſphærocarpa 794
ſpinoſa 795
tomentoſa 796
virginiana 794

Pſathura 523, 577
borbonica 577

Pſidium 770, 786, 787
aromaticum 786
Cujavillus ib.
decaſpermum ib.
grandiflorum ib.
guineenſe ib.
montanum 787
pomiferum 786
pyriferum ib.

Pſoralea 1077, 1138, 1139
aculeata 1138
americana 1139
aphylla 1138
axillaris 1139
bituminoſa ib.
bracteata 1138
capitata ib.
corylifolia ib.
Dalea 1139
decumbens 1138
enneaphylla 1139
folioloſa ib.
glanduloſa ib.
hirta 1138
lævigata 1139
leporina ib.
lutea 1138
palæſtina ib.
pentaphylla 1139
pinnata ib.
proſtrata ib.
repens 1138
rotundifolia ib.
ſpicata ib.
ſtachydis ib.
tenuifolia ib.
tetragonoloba 1139

Pſychotria 298, 362, 364
alpina 364
aſiatica 363
brachiata 364
citrifolia 363
corymboſa 362
crocea 363
emetica 364
fœtens 363
glabrata ib.
grandis 364
herbacea ib.

Pſychotria
hirſuta 363
horizontalis ib.
laurifolia ib.
marginata ib.
Myrſtiphyllum ib.
nervoſa ib.
nutans ib.
paraſitica 364
Pavetta ib.
pedunculata 362
pubeſcens 363
ſerpens 364
ſpecioſa 362
tenuifolia 364
uliginoſa ib.
violacea ib.
Ptelea 215, 260
trifoliata 260
Pteris 1283, 1297-1299
aculeata 1299
anguſtifolia 1297
aquilina 1299
arborea 1298
arguta ib.
atro-purpurea 1299
biaurita 1298
caudata 1299
comans 1298
cretica ib.
decurſiva 1299
dentata ib.
denticulata 1298
eſculenta 1299
farinoſa ib.
furcata 1297
grandifolia ib.
heterophylla 1299
humilis 1298
lanceolata 1297
lineata ib.
longifolia 1298
Pteris
lunulata 1298
mutilata 1299
nervoſa 1298
pedata ib.
piloſelloides 1297
quadrifoliata ib.
quadripinnata 1299
regularis ib.
rotundifolia 1298
ſemipinnata 1299
ſerrata ib.
ſerrulata 1298
ſinuata ib.
ſtipularis ib.
ſubciliata ib.
trichomanoides ib.
tricuſpidata 1297
viridis 1299
vittata 1298
Pterocarpus 1076, 1086, 1087
anterus 1087
buxifolius ib.
Draco 1086
Ecaſtaphyllum ib.
hemipterus 1087
lunatus 1086
ſantalinus ib.
Pteronia 1163; 1201, 1202
camphorata 1201
caroliniana 1202
cephalotes 1201
cinerea ib.
faciculata 1202
flexicaulis 1201
glabrata ib.
glomerata ib.
hirſuta ib.
inflexa 1202
membranacea ib.
Pteronia
minuta 1201
oppoſitifolia ib.
pallens ib.
retorta 1202
ſcarioſa ib.
ſpinoſa 1201
ſtricta ib.
villoſa ib.
Puccinia 1286, 1462
biſſoides 1462
ſimplex ib.
Pulmonaria 291, 319, 320
anguſtifolia 319
maritima 320
officinalis 319
ſibirica 320
ſuffruticoſa 319
virginica ib.
Punica 770, 793
Granatum 793
nana ib.
Puya 525, 553
chilenſis 553
Pyrenium 1286, 1480 *ſq.*
aureum 1480
lignorum ib.
metallorum 1481
terreſtre ib.
Pyrola 658, 698
maculata 698
minor ib.
rotundifolia ib.
ſecunda ib.
umbellata ib.
uniflora ib.
Pyroſtria 211, 246
Commerſoni 246

Pyrus 779, 841, 842
anguſtifolia 842
baccata ib.
communis 841
coronaria 842
Cydonia ib.
dioica ib.
hadienſis ib.
hybrida ib.
japonica ib.
Malus ib.
nivalis ib.
Pollveria 841
præcox ib.
ſalicifolia 842
ſpectabilis ib.
ſpinoſa ib.

Qualea 3, 10
cærulea 10
roſea ib.
Quapoya 313, 514
ſcandens 514
Quararibea 997, 1014
guianenſis 1014
QUASSIA 657, 682
amara 682
excelſa ib.
Simaruba ib.
Quercus 603, 643-645
acuta 644
Ægilops ib.
alba 645
aquatica ib.
Cerris 644
coccifera ib.
cuſpidata ib.
dentata ib.
Eſculus 645
femina 644

Quercus
glabra 644
glauca ib.
humilis ib.
Ilex ib.
lævis 645
lyrata ib.
molucca 644
nigra 645
paluſtris ib.
Phellos 643
Prinus 644
pumila ib.
Robur ib.
rubra 645
ſempervirens 643
ſerrata 644
ſinuata 645
Suber 644
villoſa 645
Queria 89, 208
canadenſis 208
hiſpanica ib.
Quillaja 743, 767
ſaponaria 767
Quinchenamelium 311, 493
chilenſe 493
Quiſqualis 658, 686
indica 686
Quiviſia 600, 633
fruticoſa 633

Racua 213, 245
torrida 245
Radiola 220, 289
linoides 289
Rajania 527, 580, 581
anguſtifolia 580
caroliniana 581

Rajania
cordata 581
haſtata ib.
hexaphylla ib.
ovata 580
quinata 581
quinquefolia ib.
Randia 296, 335
aculeata 335
mitis ib.
Ranunculus 783, 877-881
abortivus 878
aconitifolius 881
acris 878
alpeſtris ib.
amplexicaulis 877
aquatilis 879
arvenſis 881
aſiaticus 879
auricomus 878
Breynii 880
bulboſus ib.
bullatus 877
caſſubicus 878
chærophyllos 880
Columnæ ib.
creticus 878
falcatus 880
Ficaria 877
Flammula ib.
fluviatilis 880
glacialis 879
gramineus 877
grandiflorus 879
hederaceus ib.
heterophyllus ib.
hirſutus 880
illyricus 881
lanuginoſus 879
lapponicus 880
Lingua 877
monſpelienſis 880

Ranunculus
multifidus 879
muricatus ib.
nitidus 878
nivalis ib.
nodiflorus 877
orientalis 879
paludoſus 880
parnaſſifolius 877
parviflorus 879
parvulus ib.
penſilvanicus 881
plantaginifolius 877
platanifolius 880
polyanthemos ib.
polymorphus 878
pyrenæus 877
repens 880
reptans 877
rutæfolius 881
ſceleratus 878
ternatus 881
Thora 878

Rapanea 298, 330
gujanenſis 330

Raphanus 967, 990, 991
caudatus 990
Erucaria 991
erucoides ib.
lyratus ib.
Raphaniſtrum 990
ſativus ib.
ſibiricus ib.
tenellus 991

Rauwolfia 295, 432
caneſcens 432
nitida ib.
tomentoſa ib.

Ravenala 523, 567
madagaſcarienſis 567

Ravenſara 742, 754
aromatica 754

Reaumuria 779, 851
vermiculata 851

Reichelia 311, 449
anguſtifolia 449
paluſtris ib.

Relhamia 211, 247
faginea 247

RENEALMIA 1, 5
exaltata 5

Reſeda 743, 758, 759
alba 758
caneſcens ib.
dipetala ib.
fruticuloſa 759
glauca 758
hexagyna ib.
lutea ib.
Luteola ib.
mediterranea ib.
odorata ib.
Phyteuma ib.
purpuraſcens ib.
ſeſamoides ib.
tetragyna ib.
undata ib.

RESTIO 89, 201, 202
acuminatus 202
argenteus ib.
ariſtatus 201
cernuus ib.
dichotomus ib.
digitatus 202
Elegia 201
erectus 202
fruticoſus ib.
imbricatus 201
incurvatus 202
paniculatus 201
parviflorus 202
ſcarioſus ib.

RESTIO
Scopa 202
ſimplex 201
ſpiciger ib.
tectorum ib.
tetragonus 202
thamnochortus ib.
triflorus 201
triticeus 202
umbellatus 201
vaginatus ib.
verticillaris ib.
vimineus ib.
virgatus 202

Reticularia 1287, 1471 *ſq.*
alba 1472
angulata ib.
cæſia 1471
cinerea ib.
complanata ib.
Epixylon ib.
fragilis ib.
hemiſphærica ib.
Lycogala ib.
Lycoperdon ib.
nigra 1472
ramoſa 1471
ſinuoſa 1472
ſphæroidalis ib.
Uſtilago ib.
utricularis 1471

Reynoutria 660, 702
japonica 702

Retzia 293, 333
ſpicata 333

Rhacoma 215, 255
Croſſopetalum 255

Rhamnus 300, 398-401
Alaternus 400
alnifolius ib.

Rhamnus
alpinus 399
buxifolius 398
carolinus 399
catharticus 398
circumſciſſus 401
colubrinus 399
crenulatus 398
cubenſis 399
dauricus 400
ellipticus 399
erythroxylon 400
Frangula 399
glanduloſus ib.
heterogeneus 400
hybridus ib.
hydrienſis 399
ignaneus 400
infectorius 398
Juſuba 401
latifolius 400
lineatus ib.
Lotus ib.
lycioides 398
micranthus 399
myrtinus ib.
myſtacinus ib.
Napeca 401
Numularia ib.
Œnoplia ib.
oleoides 398
Paliurus 400
pentaphyllus 398
prinoides 400
pumilus 399
rupeſtris 400
Sarcomphalus 398
ſaxatilis ib.
ſcandens 399
ſphæroſpermos ib.
Spina Chriſti 400
ſurinamenſis ib.
tetragonus 399
theezans 398

Rhamnus
volubilis 399
Xylopyrus 401
Zizyphus 400

Rhepis 521, 568
arundinacea 568
flabelliformis ib.

Rheedia 774, 805
lateriflora 805

Rheum 648, 654
compactum 654
hybridum ib.
palmatum ib.
Rhabarbarum ib.
Rhaponticum ib.
Ribes ib.
tataricum ib.

Rhexia 599, 605, 606
Acifanthera 605
Aliſanus 606
bicornis ib.
glutinoſa ib.
juſſieuoides ib.
lanceolata ib.
latifolia ib.
leucantha ib.
lutea ib.
mariana 605
petiolata 606
purpurea ib.
ſeptemnervia ib.
trichotoma ib.
villoſa ib.
virginica 605

Rhinanthus 888, 922, 923
Alectorolophus 923
capenſis ib.
Criſta galli 922
Elephas ib.
indicus 923

Rhinanthus
maximus 923
orientalis 922
trifidus 923
Trixago ib.
verſicolor ib.
virginicus ib.

Rhizobolus 779, 841
butyroſus 841
tuberculoſus ib.

Rhizomorpha 1485
capillaris ib.
cinchonæ ib.
fragilis ib.

Rhizophora 740, 746, 747
Agueras 747
Candel ib.
caſeolaris ib.
conjugata 746
corniculata 747
cylindrica ib.
gymnorhiza ib.
Mangle ib.

Rhodiola 603, 645
roſea 645

Rhododendrum 659, 694
camtſchaticum 694
caucaſium ib.
Chamæciſtus ib.
chryſanthum ib.
dauricum ib.
ferrugineum ib.
hirſutum ib.
maximum ib.
ponticum ib.
Rhodora ib.

Rhus 311, 494-496
anguſtifolium 495
aromaticum ib.

Rhus
atrum 495
cirrhifolium ib.
Cobbe ib.
Cominia ib.
corallinum 494
Coriaria ib.
Cotinus 495
cuneifolium ib.
digitatum 494
elegans 495
glabrum 494
Hypſelodendrum ib.
javanicum ib.
inciſum 495
lævigatum ib.
lanceum ib.
lucidum ib.
Metopium 494
pauciflorum ib.
radicans ib.
Sænab 496
ſemialatum 494
ſuaveolens 495
ſuccedaneum 494
tomentoſum 495
Toxicodendron 494
tridentatum 495
typhinum 494
Vernix ib.
villoſum 495
viminale ib.
Riana 396
gujanenſis ib.
Ribes 302, 419, 420
alpinum 419
cynorbati 420
diacanthum 419
floridum ib.
Groſſularia 420
nigrum 419
oxyacanthoides 420
petræum 419

Ribes
polycarpon 419
proſtratum ib.
reclinatum 420
rubrum 419
Uva criſpa 420
Riccia 1285, 1354 *ſq.*
arachnoidea 1355
cryſtallina 1354
fluitans 1355
fruticuloſa ib.
glauca ib.
minima ib.
natans 1354
pyramidata 1355
reticulata ib.
ſinuata ib.
Richardia 522, 573
ſcabra 573
Ricinus 1001, 1074
communis 1074
dioicus ib.
inermis ib.
Mappa ib.
medius ib.
Tanarius ib.
Ricotia 968, 979
ægyptiaca 979
Rinorea 303, 396
gujanenſis 396
Rivina 216, 278
humilis 278
lævis ib.
octandra ib.
paniculata ib.
Robergia 663, 729
fruteſcens 729
Robinia 1078, 1115, 1116
Caragena 1116
fruteſcens ib.
Halodendrum ib.

Robinia
hiſpida 1116
mitis ib.
Nicu ib.
Panacoco ib.
Pſeudacacia 1115
pygmea 1116
ſepium 1115
ſpinoſa 1116
veſicaria ib.
violacea 1115
Robinſonia 771, 795
gujanenſis 796
Rocama 305, 455
arabica 455
Rochefortia 307, 458
cuneata 458
ovata ib.
Roella 297, 353, 354
ciliata 353
decurrens 354
muſcoſa ib.
reticulata ib.
ſpicata ib.
ſquarroſa ib.
Rohria 83, 93
Schreberi 93
Tapura ib.
Rokejena 661, 703
deſerti 703
Rotandra 1167, 1280
argentea 1280
Ronabea 298, 365
latifolia 365
Rondeletia 297, 359
americana 359
aſiatica ib.
biflora ib.
diſperma ib.
hirſuta ib.

Rondeletia
hirta 359
incana ib.
obovata ib.
piloſa ib.
thyrſoidea ib.
tomentoſa ib.
trifoliata ib.
umbellata ib.
virgata ib.
Ropala 215, 225
montana 225
Rorida 213, 260
arabica 260
Roridula 302, 422
dentata 422
Roſa 780, 853-855
alba 855
alpina ib.
arvenſis 853
blanda 854
canina 855
carolina 854
centifolia ib.
cinnamomea 853
collina 855
corymboſa ib.
Eglanteria 853
gallica 854
indica 855
moſchata 854
multiflora 855
pendulina ib.
perſica ib.
pimpinellifolia 853
pumila 854
rubiginoſa ib.
rugoſa ib.
ſempervirens ib.
ſinica 855
ſpinoſiſſima 853
ſulphurea 854
turbinata ib.
Roſa
villoſa 854
virginiana ib.
Roſmarinus 20, 44
chilenſis 44
officinalis ib.
ROTALA 83, 105
verticillaris 105
ROTTBŒLLIA 88, 196, 197
altiſſima 197
cœlorhachis ib.
compreſſa 196
corymboſa 197
dimidiata 196
exaltata 197
hirſuta ib.
incurvata 196
lævis 197
muricata ib.
punctata ib.
repens ib.
ſanguinea ib.
Tranchelli ib.
Royena 661, 702
glabra 702
hirſuta ib.
lucida ib.
polyandra ib.
villoſa ib.
Rubentia 301, 408
olivina 408
Rubia 214, 242
anguſtifolia 242
Bocconi ib.
chilenſis ib.
cordifolia ib.
fruticoſa ib.
lævis ib.
lucida ib.
peregrina ib.
tinctorium ib.
Rubus 781, 855-857
arcticus 857
auſtralis 856
cæſius ib.
canadenſis 855
Chamæmorus 857
Dalibarda ib.
erectus 856
fruticoſus ib.
geoides 857
hiſpidus 856
jamaicenſis ib.
japonicus ib.
idæus ib.
inciſus ib.
moluccanus ib.
occidentalis ib.
odoratus ib.
palmatus ib.
parvifolius ib.
ſanctus 857
ſaxatilis ib.
trifidus 856
triphyllus ib.
villoſus 857
Rudbeckia 1165, 1259 *ſq.*
anguſtifolia 1260
digitata 1259
fulgida 1260
hirta 1259
laciniata ib.
oppoſitifolia 1260
purpurea ib.
triloba 1259
Ruellia 889, 957-959
acaulis 959
adhærens 957
alternata ib.
Anagalis ib.
anguſtifolia ib.
antipoda 959

Ruellia
balſamica 958
biflora 959
blechioides 957
Blechum ib.
clandeſtina 958
criſpa 957
depreſſa 958
difformis 959
erecta 958
faſciculata ib.
fragrans ib.
guttata 957
japonica 958
imbricata 959
intruſa ib.
littoralis ib.
longiflora 958
paniculata ib.
patula ib.
piloſa ib.
repanda 957
repens ib.
reptans 958
ringens ib.
rubra 957
ſtrepens 958
tentaculata ib.
tuberoſa ib.
uliginoſa ib.
violacea 957
Ruizia 1001, 1068
cordata 1068
laciniata ib.
lobata ib.
palmata ib.
Rumex 527, 584-586
Acetoſa 586
Acetoſella ib.
aculeatus ib.
acutus 585
ægyptius 584
alpinus 585
Rumex
aquaticus 585
arifolius ib.
aureus ib.
bipinnatus 586
Britannica 584
bucephalophorus 585
conglomeratus 584
criſpus ib.
dentatus 585
digynus ib.
divaricatus ib.
glaber 586
glaucus 585
Hydrolapathum 584
lacenus ib.
Lunaria 585
luxurians 586
maritimus 585
multifidus 586
obtuſifolius 585
paludoſus 584
Patientia ib.
perſicarioides 585
pictus 586
pulcher 584
roſeus 585
ſanguineus 584
ſcutatus 585
ſpinoſus 586
tingitanus 585
tuberoſus 586
verticillatus 584
veſicarius 585
Rumpfia 83, 99
amboinenſis 99
Ruppia 220, 289
maritima 289
Ruſcus 81, 104, 105
aculeatus 104
androgynus 105
Hypogloſſum ib.
Ruſcus
Hypophyllum 104
racemoſus 105
Ruſſea 214, 237
ſimplex 237
Russelia 463
capenſis ib.
Ruta 657, 676
chalepenſis 676
graveolens ib.
legitima ib.
linifolia ib.
patavina ib.
pinnata ib.
tuberculata ib.
Ruyschia 300, 407
clutiæfolia 407
Surubea ib.
Sabicea 299, 367
aſpera 367
cinerea ib.
hirta ib.
Saccharum 86, 152, 153
arundinaceum 152
benghalenſe ib.
biflorum ib.
hirſutum 153
Kœnigii 152
officinarum ib.
polyſtachyon ib.
Ravennæ ib.
ſpicatum ib.
ſpontaneum ib.
Tenerifiæ ib.
Thunbergii ib.
Sagina 220, 289
apetala 289
erecta ib.

Sagina
procumbens 289
virginica *ib.*
Sagittaria 782, 884
acutifolia 884
natans *ib.*
obtuſifolia *ib.*
ſagittifolia *ib.*
trifolia *ib.*
SALACIA 82, 107
ſinenſis 107
Salicornia 2, 15, 16
arabica 15
caſpica *ib.*
cruciata *ib.*
falcata *ib.*
fruticoſa *ib.*
herbacea *ib.*
perfoliata 16
ſtrobilacea 15
virginica *ib.*
Salix 22, 72-74
acuminata 74
ægyptiaca 72
alba 74
amygdalina 72
antifebrilis *ib.*
Arbuſcula 73
arenaria *ib.*
aurita *ib.*
babylonica *ib.*
berberifolia 74
Caprea *ib.*
chilenſis 73
cinerea 74
depreſſa 73
excelſa 74
fiſſa 73
flava 74
fragilis 72
fuſca 74
glauca 73
haſtata 72

Salix
herbacea 73
hermaphrodita 72
japonica *ib.*
incubacea 73
integra *ib.*
lanata *ib.*
lapponum *ib.*
molliſſima 74
monandra 72
Myrſinites 73
myrtilloides *ib.*
nitida 74
pentandra 72
phylicifolia *ib.*
reticulata 73
retuſa *ib.*
roſmarinifolia 74
ſerotina *ib.*
triandra 72
triſtis 74
viminalis *ib.*
vitellina 72
Salmaſia 311, 500
gujanenſis 500
Salſola 306, 452-454
altiſſima 452
aphylla 453
arboreſcens *ib.*
Arbuſcula *ib.*
articulata *ib.*
caroliniana 452
coquimbana 454
fruticoſa 453
hirſuta 452
hyſſopifolia *ib.*
imbricata 453
inermis *ib.*
Kali 452
laniflora 453
longiflora *ib.*
monandra 452
monobracteata 453

Salſola
mucronata 453
muricata *ib.*
orientalis *ib.*
polyclenos 452
proſtrata 453
roſacea 452
ſalſa *ib.*
ſativa *ib.*
Soda *ib.*
tetrandra 453
Tragus 452
vermiculata 453
Salvadora 217, 280
perſica 280
Salvia 20, 44-48
abyſſinica 48
acetabuloſa 47
ægyptiaca 44
Æthiopis 47
africana *ib.*
argentea *ib.*
aurea *ib.*
aurita 48
auſtriaca 45
canarienſis 47
ceratophylla *ib.*
ceratophylloides *ib.*
clandeſtina 45
coccinea 47
colorata *ib.*
cretica 44
dentata *ib.*
diſermas 45
dominica *ib.*
Forſkahlii 47
glutinoſa *ib.*
hæmatodes 45
hiſpanica 46
Horminum 45
japonica 48
indica 44
leonuroides *ib.*

Salvia
lyrata 45
Merjamia 48
mexicana 46
napiſblia ib.
nemoroſa 45
nilotica 46
nubia ib.
nutans 48
occidentalis ib.
officinalis 45
paniculata 47
phlomoides 45
pinnata 47
pomifera 45
pratenſis ib.
pſeudococcinea 48
pyrenaica 46
roſæfolia 48
rugoſa 46
runcinata 48
ſcabra ib.
Sclarea 47
ſerotina 45
ſilveſtris ib.
Spielmanni 48
ſpinoſa 47
ſyriaca 45
tenella 48
triloba ib.
urticifolia 45
verbenaca 46
verticillata ib.
virgata 47
viridis 45
viſcoſa ib.
SAMARA 215, 257
coriacea 257
læta ib.
pentandra ib.
Sambucus 310, 497, 498
canadenſis 497
Sambucus
Ebulus 497
japonica ib.
laciniata 498
nigra ib.
racemoſa ib.
Samolus 297, 358
Valerandi 358
Samyda 660, 699, 700
glabrata 699
pubeſcens 700
ſerrulata ib.
ſpineſcens 699
tomentoſa ib.
villoſa ib.
viridiflora ib.
Sandoricum 656, 680
indicum 680
Sanguinaria 776, 808
canadenſis 808
Sanguiſorba 213, 255
canadenſis 255
media ib.
officinalis ib.
Sanicula 308, 468
canadenſis 468
europæa ib.
marilandica ib.
Santalum 216, 276
album 276
Santolina 1162, 1205 *ſq.*
alpina 1206
anthemoides ib.
Chamæcypariſſus 1205
fragrantiſſima 1206
Santolina
roſmarinifolia 1205
tinctoria ib.
Sapindus 603, 642
rigidus 642
Saponaria ib.
ſinenſis ib.
ſpinoſus ib.
trifoliatus ib.
Saponaria 661, 709, 710
cretica 710
illyrica ib.
lutea ib.
ocymoides 709
officinalis ib.
orientalis 710
porrigens 709
Vaccaria 710
Sapota 742, 750
nigra 750
Saraca 1075, 1079
indica 1079
Sarothra 311, 507
gentianoides 507
Sarracenia 775, 811
flava 811
minor ib.
purpurea ib.
rubra ib.
Saſſa 999, 1038
gummifera 1038
Saſſia 599, 615
tinctoria 615
Satureja 885, 897, 898
capitata 897
græca ib.

Satureja
hortenſis 898
juliana 897
montana ib.
rupeſtris ib.
ſpinoſa 898
Thymbra 897
thymifolia 898
viminea 897

Satyrium 21, 55, 56
aculeatum 55
adnatum 56
albidum 55
capenſe ib.
elatum 56
Epipogium 55
giganteum ib.
hians ib.
hircinum ib.
hirtellum ib.
nigrum ib.
orchioides 56
orobanchoides 55
pedicellatum 56
plantagineum 55
repens ib.
ſpirale 56
tabulare 55
triſte ib.
viride ib.

Saururus 594, 597
cernuus 597

Sauvageſia 302, 422
Adima 422
erecta ib.

Savaſtana 88, 177
hirta 177

Saxifraga 661, 704-707
aſcendens 707
ajugifolia 706
aizoides ib.
Aizoon 704
androſacea 705
aſpera 706
autumnalis ib.
Bellardi 707
biflora 705
bronchialis 704
bryoides 705
bulbifera 706
burſeriana 704
cæſia ib.
cernua ib.
ceſpitoſa 707
Cluſii 706
Cotyledon 704
craſſifolia 705
cuneifolia ib.
cymbalaria 707
exarata 706
geranioides 707
Geum 705
granulata 706
groenlandica ib.
hederacea 707
Hirculus 706
hirſuta 705
hypnoides 707
media 704
moſchata 707
muſcoides 705
mutata 704
nivalis 705
oppoſitifolia ib.
orientalis 707
pedemontana ib.
penſilvanica 705
petræa 707
punctata 705
retuſa 706
rivularis ib.
rotundifolia ib.
ſarmentoſa 705
ſedoides 704
ſibirica 706
ſtellaris 705
tenella 704
trichodes 705
tridactylites 707
umbroſa 706

Scabioſa 210, 228-230
africana 230
alba ib.
alpina 228
amplexicaulis ib.
argentea 230
arvenſis 229
atropurpurea 230
attenuata 228
columbaria 229
crenata ib.
cretica ib.
dubia 230
graminifolia ib.
gramuntia 229
grandiflora 230
heterophyllos 229
indurata 230
integrifolia 228
iſetenſis 230
leucantha 228
lyrata 230
maritima 229
monſpelienſis 230
ochroleuca ib.
palæſtina ib.
pappoſa 229
prolifera ib.
pterocephala ib.
pumila 230
rigida 228
ſcabra ib.
ſicula 230
ſilvatica 229
ſtellata ib.

Scabioſa
Succiſa 228
ſyriaca ib.
tatarica ib.
tenuifolia 229
tomentoſa ib.
tranſilvanica 228
Trenta 229
ucranica 230
uralenſis 228
Scabrita 214, 233
ſcabra 233
SCÆVOLA 297, 361
Lobelia 361
Scandix 309, 486, 487
auſtralis 487
Cerefolium ib.
chilenſis ib.
gilanica 486
grandiflora 487
infeſta ib.
nodoſa ib.
odorata 486
Pecten 487
procumbens ib.
trichoſperma ib.
Sceura 210, 260
marina 260
Schæfferia 219, 284
completa 284
lateriflora ib.
Schefflera 313, 520
digitata 520
Scheuchzeria 527, 586
paluſtris 586
Schinus 658, 683
Arcira 683
Haygan ib.
Molle ib.
Schmidelia 602, 635
racemoſa 635
Schœnus 84, 133-137
albus 136
Bobartiæ ib.
bulboſus ib.
capillaris 137
Cladium ib.
compar 135
compreſſus 136
cuſpidatus 135
cyperinus 136
cyperoides 137
deuſtus 135
effuſus 137
Fribri 136
faſciatus ib.
ferrugineus 134
fuſcus ib.
glomeratus 136
gracilis 137
incanus 136
Mariſcus 135
mucronatus ib.
nigricans ib.
odoratus 137
paniculatus ib.
puſillus ib.
radiatus 136
reſtioides ib.
ſetaceus 137
ſtellatus 136
ſurinamenſis 137
thermalis 136
tuberoſus 137
umbellatus ib.
uſtulatus 135
Schœpfia 299, 376
Schreberi 376
Schollera 599, 622
Oxycoccos 622
Schotia 657, 673
ſpecioſa 673
Schranckia 313, 515
quinquefaria 515
Schrebera 307, 458
ſchinoides 458
Schwalbea 888, 925
americana 925
Schwenkia 20, 38
americana 38
Scilla 523, 552, 553
amœna 552
anthericoides ib.
autumnalis ib.
bifolia ib.
hyacinthoides ib.
Jacquini ib.
japonica ib.
italica ib.
Lilio-Hyacinthus ib.
lingulata ib.
luſitanica ib.
maritima ib.
numidica ib.
obtuſifolia ib.
peruviana ib.
tetraphylla ib.
unifolia ib.
verna 553
Scirpus 84, 124-129
acicularis 125
æſtivalis 128
annuus 124
anomalus 128
antarcticus 129
argenteus ib.
articulatus 124
arvenſis 127
atropurpureus 125
autumnalis 126
auſtralis 125
Bæothryon ib.

Scirpus
barbatus 129
capillaris 126
capitatus 124
caribæus 125
cephalotes 129
ceſpitoſus 125
ciliaris 128
complanatus 126
corymboſus 128
cyperoides *ib.*
dichotomus *ib.*
dipyllos 127
dipſaceus 126
echinatus 127
ellychniarius 126
ferrugineus 127
fiſtuloſus 125
fluitans *ib.*
geniculatus 124
globiferus 126
glomeratus *ib.*
groſſus 128
Halleri 126
Holoſchœnus 125
hottentottus 129
intricatus 128
junceus 125
Kali 127
lacuſtris 125
lateralis 127
lateriflorus *ib.*
Luzulæ 128
maritimus *ib.*
Michelianus 129
miliaceus 128
monander 126
mucronatus 127
mutatus 124
niloticus 126
nodoſus 127
nutans 125
paluſtris 124

Scirpus
plantagineus 124
polytrichoides 125
prolifer 126
retrofractus 127
Schœnoides 125
romanus 126
ſetaceus *ib.*
ſilvaticus 128
ſpadiceus 127
ſquarroſus 128
ſupinus 126
triginus 124
triquater 127
triſpicatus *ib.*

Sciuris 21, 49
aromatica 49

Scleranthus 660, 708
annuus 708
perennis *ib.*
polycarpos *ib.*

Sclerocarpus 1165, 1262
africanus 1262

Sclerotium 1287, 1481 *ſq.*
complanatum 1482
immerſum 1481
Mucor *ib.*
purpureum *ib.*
radicatum *ib.*
Semen *ib.*
ſubterraneum 1482
villoſum *ib.*

Scolopia 770, 793
Schreberi 793

Scolymus 1184
anguſtiſpermus 1184
hiſpanicus *ib.*
maculatus *ib.*

Scoparia 211, 254
arborea 254

Scoparia
dulcis 254
procumbens *ib.*
ternata *ib.*

SCOPOLIA 601, 630
compoſita 630

Scorpiurus 1075, 1077, 1120
muricata 1120
ſubvilloſa *ib.*
ſulcata *ib.*
vermiculata *ib.*

Scorzonera 1161, 1169, 1170
anguſtifolia 1170
carinifolia 1169
ciliata *ib.*
graminifolia 1170
hirſuta 1169
hiſpanica 1170
hiſpida 1169
humilis *ib.*
laciniata *ib.*
lanata *ib.*
parviflora *ib.*
picroides 1170
purpurea *ib.*
puſilla 1169
reſedifolia 1170
taraxacifolia *ib.*
tingitana *ib.*
tomentoſa 1169
tuberoſa 1170

Scrophularia 883, 937, 938
altaica 937
aquatica *ib.*
arguta *ib.*
auriculata *ib.*
betonicifolia *ib.*
canina 938
coccinea *ib.*

Scrophularia
fruteſcens 938
glabrata 937
lucida 938
marilandica 937
meridionalis 938
nodoſa 937
orientalis 938
peregrina ib.
ſambucifolia ib.
Scorodonia 937
ſinenſis 938
trifoliata ib.
vernalis 937
viridiflora 938
Scutellaria 886, 919, 920
albida 919
alpina ib.
altiſſima ib.
caroliniana ib.
Columnæ ib.
cretica ib.
galericulata ib.
haſtifolia 920
havanenſis 919
hyſſopifolia ib.
indica 920
integrifolia ib.
lateriflora 919
lupulina ib.
minor ib.
orientalis ib.
ovata 920
peregrina 919
purpuraſcens ib.
Scytalia 598, 612
ſinenſis 612
Secale 88, 198
cereale 198
creticum ib.
orientale ib.

Secale
proſtratum 198
villoſum ib.
Securidaca 1075, 1083, 1084
erecta 1083
ſcandens 1084
virgata ib.
Securinega 996, 1008
duriſſima 1008
Sedum 662, 730-732
acre 732
æſtivum ib.
Aizoon 731
album 732
alſinefolium 731
Anacampſeros ib.
anglicum 732
annuum ib.
atratum ib.
cæruleum 731
Cepæa ib.
daſyphyllum 732
divaricatum 731
heptapetalum ib.
hirſutum 732
hiſpanicum ib.
hybridum 731
libanoticum ib.
lineare ib.
nicæenſe 732
nudum ib.
populifolium 731
procumbens 732
quadrifolium ib.
reflexum ib.
rupeſtre ib.
ſaxatile 731
ſexangulare 732
ſtellatum 731
ſtoloniferum ib.
Telephium ib.
verticillatum 730

Sedum
villoſum 731
virens 732
Seguieria 772, 827
americana 827
Sehima 87, 178
iſchæmoides 178
Selago 887, 948, 949
caneſcens 949
capitata ib.
ciliata ib.
cinerea 948
coccinea ib.
corymboſa ib.
divaricata 949
faſciculata 948
fruticoſa 949
geniculata 948
hirta ib.
hiſpida ib.
polygaloides ib.
polyſtachya ib.
rapunculoides ib.
rotundifolia ib.
ſerrata ib.
ſpuria ib.
ſtricta ib.
triquetra ib.
verbenacea ib.
Selinum 309, 475, 476
auſtriacum 476
Carvifolia ib.
Chabræi ib.
Monnieri ib.
paluſtre ib.
Seguieri ib.
ſibiricum ib.
ſilveſtre 475
SEMECARPUS 311, 493
Anacardium 493

Sempervivum 744, 768, 769
aracnoideum 769
arboreum 768
canarienſe ib.
glanduloſum ib.
globiferum 769
glutinoſum 768
monanthes 769
montanum ib.
ſedoides ib.
tectorum ib.
tortuoſum ib.
villoſum ib.
Senecio 1164, 1226-1230
abrotanifolius 1228
ægyptius 1227
alpinus 1228
angulatus 1229
arabicus 1226
aſper 1229
aureus 1228
auriculatus ib.
biflorus 1226
byzantinus 1229
canadenſis 1228
cernuus 1226
ciliatus 1230
cineraſcens 1227
cordifolius 1230
cruciatus 1229
diffuſus 1228
divaricatus 1226
Doria 1229
Doronicum 1230
elegans 1228
eroſus 1229
erubeſcens 1226
erucifolius 1228
glaſtifolius 1229
glaucus 1227
hadienſis 1227
halimifolius 1230
haſtatus 1228
hieracifolius 1226
Jacobæa 1228
japonicus 1226
ilicifolius 1229
incanus 1228
junceus 1229
juniperinus ib.
lanatus ib.
laniger 1227
leucanthemifolius ib.
linifolius 1228
lividus 1227
longifolius 1229
lyratus 1228
marginatus 1229
maritimus ib.
nebrodenſis 1227
nemorenſis 1229
paludoſus ib.
perſicifolius 1226
peucedanifolius ib.
populifolius 1230
Pſeudochina 1227
pubigerus ib.
purpureus 1226
reclinatus ib.
rigidus 1230
roſmarinifolius 1229
ſarracenicus ib.
ſibiricus 1230
ſilvaticus 1227
ſqualidus 1228
tenuifolius ib.
triflorus 1227
trilobus ib.
tuſſilaginoides ib.
umbellatus 1228
Senecio
varicoſus 1227
venuſtus 1228
virgatus 1226
viſcoſus 1227
vulgaris 1226
Septus 594, 597
capenſis 597
Serapias 21, 59, 60
capenſis 60
Caravata 59
cordigera 60
enſifolia 59
erecta 60
falcata ib.
flava 59
lancifolia ib.
latifolia ib.
Lingua ib.
longifolia ib.
Neottia ib.
polyſtachya ib.
regularis ib.
rubra ib.
ſpecioſa ib.
Seriola 1161, 1182
æthmenſis 1182
cretenſis ib.
lævigata ib.
urens ib.
Seriphium 297, 374
ambiguum 374
cinereum ib.
fuſcum ib.
plumoſum ib.
Serpicula 216, 276
repens 276
verticillata ib.
Serra 997, 1026
incana 1026

Serratula 1162, 1184-1186
alpina 1185
amara ib.
arvenſis 1186
caſpia 1185
centauroides ib.
ciliata ib.
coronata ib.
glauca ib.
japonica ib.
multiflora ib.
noveboracenſis ib.
piloſa ib.
præalta ib.
ſalicifolia ib.
ſcarioſa ib.
ſpicata ib.
ſpinoſa ib.
ſquarroſa ib.
tinctoria 1184
Seſamum 890, 956
javanicum 956
indicum ib.
orientale ib.
proſtratum ib.
Seſeli 310, 488, 489
ammoides 489
annuum ib.
ariſtatum ib.
carvifolium ib.
elatum ib.
fragile ib.
glaucum ib.
Hippomarathrum ib.
montanum 488
multicaule 489
pimpinelloides 488
pyrenæum 489
ſaxifragum ib.
tortuoſum ib.
Turbith ib.
Seſuvium 778, 834
Portulacaſtrum 834
Shawia 299
SHEFFIELDIA 293, 336
repens 336
Sherardia 214, 234
arvenſis 234
fruticoſa ib.
muralis ib.
Sibbaldia 313, 520
altaica 520
erecta ib.
procumbens ib.
Sibthorpia 889, 953
africana 953
europæa ib.
Sicyos 81, 104
angulata 104
edulis ib.
Garcini ib.
laciniata ib.
Sida 1001, 1041-1050
Abutilon 1048
acuta 1044
alba 1045
alnifolia 1043
althæifolia 1049
americana ib.
anguſtifolia 1044
arabica 1049
arborea ib.
aſiatica 1048
atro-ſanguinea 1042
bicuſpidata 1050
biflora 1049
bivalvis 1043
borbonica 1042
braſilienſis 1049
calicina 1042
calyptrata 1046
caneſcens 1045
capenſis ib.
carpinifolia 1044
ciliaris ib.
cordifolia 1045
coronata 1046
craſſifolia 1048
criſpa 1047
dumoſa 1049
excelſior 1046
exſtipularis 1048
exſtipulata 1046
flaveſcens 1043
fœtida 1041
fragrans 1042
fruteſcens ib.
glomerata 1043
glutinoſa ib.
hederæfolia 1041
herbacea 1045
hernandioides 1046
hirta 1048
humilis 1041
jamaicenſis 1043
jatrophoides 1044
javenſis 1042
indica 1047
lanceolata 1049
lignoſa 1047
linifolia 1044
maculata 1045
mauritiana 1049
micans 1045
microphylla 1044
microſperma 1047
molliſſima ib.
morifolia 1042
multicaulis ib.
multifida 1046
multiflora 1045
obtuſa 1048

Sida
- occidentalis 1046
- *orientalis* 1045
- *ovata* 1041
- *palmata* 1044
- paniculata 1049
- periplocifolia 1045
- *perſica* 1049
- peruviana ib.
- *Phyllanthus* 1050
- *piloſa* 1042
- *planicaulis* 1045
- *planiflora* 1048
- *plumoſa* 1041
- *populifolia* 1048
- *procumbens* 1049
- *proſtrata* 1043
- *pubeſcens* 1047
- *puſilla* 1041
- *pyramidata* 1042
- *radicans* 1041
- *ramoſa* 1047
- *reflexa* 1048
- *repens* 1041
- retuſa 1045
- *Rezii* 1042
- rhombifolia 1045
- *ricinoides* 1044
- *rotundifolia* 1045
- *ſilvatica* 1046
- *ſinenſis* 1048
- *Sonneratii* 1047
- *ſpicata* 1046
- ſpinoſa 1042
- *ſtellata* 1046
- *ſtipulata* 1044
- *ſuberoſa* 1045
- *ſupina* 1042
- *terminalis* 1047
- *ternata* 1050
- *tricuſpidata* 1047
- *triloba* 1044
- *triquetra* 1046

Sida
- *truncata* 1043
- *truncatula* 1049
- *ulmifolia* 1043
- umbellata 1047
- urens 1043
- *veronicæfolia* 1041
- *verticillata* 1043
- *veſicaria* 1048
- *virgata* 1049
- viſcoſa 1043

Sideritis 885, 901, 902
- canarienſis 901
- *candicans* ib.
- ciliata 902
- cretica 901
- elegans ib.
- hirſuta 902
- hyſſopifolia 901
- incana ib.
- lanata 902
- montana 901
- perfoliata ib.
- romana ib.
- ſcordioides ib.
- *ſpinoſa* 902
- ſyriaca 901

Siderodendrum 214, 242
- *ferreum* 242

Sideroxylum 296, 396, 397
- cymoſum 397
- decumbens ib.
- fœtidiſſimum ib.
- inerme ib.
- *læve* ib.
- lycioides ib.
- *Maſtichodendrum* ib.
- melanophleum ib.
- mite 396

Sideroxylum
- *ſericeum* 397
- ſpinoſum ib.
- tenax ib.

Siegesbekia 1165, 1255
- *floſculoſa* 1255
- occidentalis ib.
- orientalis ib.

Silene 661, 713-717
- acaulis 716
- ægyptiaca 714
- *alpeſtris* 716
- amœna 714
- anglica 713
- *anguſtifolia* 717
- antirrhina 716
- Armeria 715
- Atocion 716
- Behen ib.
- bellidifolia 715
- bupleuroides ib.
- *caroliniana* 717
- *Catesbæi* ib.
- ceraſtoides 713
- *chloræfolia* 717
- *colorata* 714
- conica 715
- conoidea ib.
- *cordifolia* 717
- craſſifolia 715
- cretica 716
- *cuneifolia* 714
- *elongata* 716
- *exſcapa* ib.
- fruticoſa 715
- gallica 714
- gigantea 715
- *hirſuta* 717
- inaperta 716
- *involuta* 714
- *latifolia* ib.
- luſitanica 713

Silene
Muſcipula 716
mutabilis 714
nicæenſis 717
noctiflora 715
nocturna 714
nutans ib.
oppoſitifolia 717
orchidea 716
ornata 715
paradoxa ib.
pendula 716
polyphylla 717
portenſis 715
procumbens 717
pumilio 714
quinquevulnera ib.
rubella 716
rupeſtris ib.
Saxifraga ib.
ſedoides 714
ſericea 717
Smithii 714
ſtricta 716
ſucculenta 714
undulata 715
valleſia 716
veſpertina 715
villoſa 714
virginica 717
viridiflora 715
Siliquaria 523, 566
glanduloſa 566
Silphium 1166, 1269 *ſq.*
Aſtericus 1270
connatum ib.
laciniatum 1269
perfoliatum ib.
ſcabrum ib.
ſolidaginoides ib.
terebinthinaceum ib.

Silphium
trifoliatum 1270
trilobatum ib.
Simaba 657, 700
guianenſis 700
Simbuleta 214, 242
Forskahlii 242
Simira 296, 371
tinctoria 371
Sinapis 968, 989, 990
alba 989
Allioni ib.
arvenſis ib.
braſſicata 990
cernua ib.
erucoides 989
fruteſcens 990
Harra ib.
hiſpanica ib.
japonica ib.
incana 989
juncea 990
lævigata 989
millefolia 990
nigra 989
orientalis ib.
pubeſcens ib.
pyrenaica ib.
ſinenſis ib.
Siparuna 659, 701
guianenſis 701
Siphonanthus 214, 243
indica 243
SIRIUM 218, 260
myrtifolium 260
Siſon 309, 483, 484
Ammi 483
Amomum ib.
canadenſe ib.
crinitum 484
inundatum ib.

Siſon
falſum 484
ſegetum 483
verticillatum 484
Siſymbrium 968, 980-983
album 982
altiſſimum ib.
amphibium 980
arenoſum 982
aſperum ib.
Barbareæ 983
Barrelieri 981
burſifolium ib.
catholicum 982
Columnæ ib.
heterophyllum ib.
hiſpanicum 981
indicum 983
integrifolium ib.
Irio 982
iſlandicum 980
lippizenſe 981
Lœſelii 982
molle 981
monenſe ib.
murale ib.
Naſturtium 980
orientale 982
paluſtre 981
pannonicum 982
Parra ib.
pinnatifidum ib.
polyceration 981
pyrenaicum ib.
ſagittatum ib.
ſalſugineum ib.
ſilveſtre 980
ſimpliciſſimum 982
ſinapiſtrum ib.
Sophia ib.
ſtrictiſſimum 983
ſupinum 981

Siſymbrium
tanacetifolium 981
tenuifolium *ib.*
valentinum 982
vimineum 981
Siſyrinchium 81, 118, 119
anceps 118
Bermudiana *ib.*
grandiflorum *ib.*
ixioides 119
latifolium 118
micranthum *ib.*
narciſſoides *ib.*
palmifolium *ib.*
Sium 309, 482, 483
anguſtifolium 483
Berula 482
cicutæfolium *ib.*
decumbens 483
Falcaria *ib.*
græcum *ib.*
japonicum *ib.*
lancifolium 482
latifolium *ib.*
Ninſi 483
modiflorum *ib.*
repens *ib.*
rigidius *ib.*
ſiculum *ib.*
Siſarum *ib.*
ſuave *ib.*
SKIMMIA 215, 254
japonica 254
Sloanea 772, 813
dentata 813
emargiuata *ib.*
Maſſoni .. *ib.*
ſinemarienſis *ib.*
Smilax 527, 582, 583
aſpera 582
auriculata *ib.*

Smilax
bona nox 583
caduca *ib.*
China 582
excelſa *ib.*
glauca *ib.*
herbacea 583
inermis *ib.*
lanceolata *ib.*
laurifolia *ib.*
mauritanica 582
oblongata *ib.*
Pſeudo-China 583
pumila *ib.*
purpurata *ib.*
Ripogonum *ib.*
rotundifolia *ib.*
Saſſaparilla 582
tamnoides 583
tetragona *ib.*
variegata 582
zeylanica *ib.*
Smithia 295, 388
Tounia 388
Smyrnium 310, 490
ægyptiacum 490
aureum *ib.*
integerrimum *ib.*
nodiflorum *ib.*
Olus atrum *ib.*
perfoliatum *ib.*
Sodada 599, 615
decidua 615
SOLANDRA 1000, 1050
lobata 1050
ternata *ib.*
Solanum 296, 382-387
aculeatiſſimum 386
ægypticum 385
æthiopicum 384

Solanum
armatum 385
aviculare 383
bahamenſe 386
bombenſe 383
bonarienſe *ib.*
campechienſe 385
capenſe 387
Cari 384
carolinenſe 385
coagulans *ib.*
coccineum 386
cordatum *ib.*
corymbiferum 384
corymboſum 383
diphyllum *ib.*
Dulcamara *ib.*
ferox 385
fuſcatum 386
havanenſe 383
hybridum 386
igneum *ib.*
incanum 385
indicum 386
inſanum 385
lanceæfolium *ib.*
laurifolium 382
lycioides 387
Lycoperſicon 384
lyratum *ib.*
mactocarpon 383
mammoſum 385
marginatum 386
mauritianum 383
Melongena 384
memphiticum 385
montanum 384
nigrum *ib.*
nodiflorum 383
paniculatum 385
peruviaaum 384
pimpinellifolium *ib.*
Pſeudo-capſicum 383

Solanum
quadrangulare 384
quercifolium *ib.*
racemoſum 383
radicans 384
repandum *ib.*
rubrum *ib.*
ſanctum 386
ſcandens 385
ſodomeum 386
ſpurium 384
ſtellatum 387
ſubinerme 383
Tagore *ib.*
terminale *ib.*
trifoliatum 386
trilobatum *ib.*
triſte 383
tuberoſum 384
verbaſcifolium 382
villoſum 385
virginianum *ib.*
zeylanicum 387

Soldanella 292, 328
alpina 328

Solidago 1164, 1235-1237
altiſſima 1236
ambigua 1237
arboreſcens *ib.*
arguta 1235
aſpera 1237
bicolor 1236
cæſia *ib.*
cambrica 1237
canadenſis 1236
dubia 1235
elliptica *ib.*
flexicaulis 1237
gigantea 1235
juncea *ib.*
lævigata 1236

Solidago
lateriflora 1236
latifolia 1237
mexicana 1235
minuta 1236
multiradiata 1237
nemoralis 1236
noveboracenſis 1237
petiolaris 1236
piloſa 1235
procera 1236
reflexa *ib.*
rigida 1237
ſempervirens 1235
ſera 1236
ſerotina 1235
ſtricta 1236
ſuaveolens 1235
viminea *ib.*
Virga aurea 1237

Sonchus 1161, 1171
agreſtis 1171
alpinus *ib.*
arvenſis *ib.*
canadenſis *ib.*
floridanus *ib.*
fruticoſus *ib.*
maritimus *ib.*
oleraceus *ib.*
paluſtris *ib.*
pinnatus *ib.*
Plumieri *ib.*
radicatus *ib.*
ſibiricus *ib.*
tataricus *ib.*
tenerrimus *ib.*
tuberoſus *ib.*

SONNERATIA 656, 675
punctata 675

Sophora 655, 664, 665
alba 665

Sophora
alopecuroides 664
auſtralis *ib.*
buxifolia 665
calyptrata *ib.*
capenſis 664
flaveſcens *ib.*
geniſtoides *ib.*
havanenſis *ib.*
heptaphylla *ib.*
hirſuta 665
japonica 664
lanceolata 665
lupinoides *ib.*
microphylla 664
monoſperma *ib.*
occidentalis *ib.*
Retzii 665
rotundifolia *ib.*
tetraptera 664
tinctoria *ib.*
tomentoſa *ib.*
villoſa 665

Soramia 775, 821
gujanenſis 821

Sorbus 778, 834
aucuparia 834
domeſtica *ib.*
hybrida *ib.*

Spananthe 309, 478
paniculata 478

Sparganium 85, 147
erectum 147
natans *ib.*
ſimplex *ib.*

SPARRMANNIA 774, 814
africana 814

Spartina 84, 123
Schreberi 123

Spartium 1076, 1088, 1089
angulatum 1089
aphyllon 1088
complicatum 1089
contaminatum 1088
cytiſoides 1089
ferox ib.
horridum ib.
junceum ib.
monoſpermum ib.
purgans ib.
radiatum ib.
ſcoparium ib.
Scorpius ib.
ſepiarium 1088
ſericeum 1089
ſphærocarpon ib.
ſpinoſum ib.
ſupranubium ib.
villoſum ib.

Spathelea 311, 498
ſimplex 498

Spergula 663, 738
arvenſis 738
laricina ib.
nodoſa ib.
pentandra ib.
ſaginoides ib.

Spermacoce 214, 233, 234
alata 234
articularis 233
aſpera 234
cæruleſcens ib.
havanenſis ib.
hirta 233
hiſpida ib.
latifolia 234
longifolia ib.
ocymoides 234
procumbens 233
proſtrata 234
radicans ib.
ſcandens ib.
ſexangularis ib.
ſpinoſa 233
ſtricta ib.
ſumatrenſis ib.
tenuis ib.
verticillata ib.
villoſa ib.

Spermodermia 1286, 1482
clandeſtina 1482

Sphæranthus 1167, 1279 *ſq.*
africanus 1280
indicus 1279
ſinenſis 1280

Sphæria 1286, 1473-1480
minoſa 1477
Acroſpermum 1478
acuta 1479
æruginoſa 1474
agariciformis 1473
Artocreas 1478
atro-purpurea 1474
Bombarda 1477
bulboſa 1474
bullata 1476
byſſacea 1479
byſſina 1477
byſſiſeda 1479
calva ib.
cancellata 1477
Carcharias 1474
carpini 1476
caſtorea 1474
Ceratoſpermum 1476
ceſpitoſa ib.
ciliaris 1480
cinnabarina 1479
cirrata 1477
comata 1480
complanata 1478
confluens ib.
conica 1478
convergens 1476
coronata 1477
Cucurbitula 1475
cylindrica 1478
decidua 1474
deuſta 1475
digitata 1474
diſciformis 1476
dubia 1478
entomorhiza 1474
epiphylla 1479
epiſphæria 1478
fiſſivela 1476
flexuoſa 1474
fragifera 1475
fragiformis 1477
gelatinoſa 1475
globularis 1477
Gnomon ib.
granuloſa 1477
gregaria 1478
hemiſphærica 1479
hiſpida ib.
Hypoxylon 1474
Hyſtrix 1476
inquinans 1478
inſitiva 1475
lenta ib.
Lingua 1477
macroſtoma 1479
Macula 1475
melanogramma 1477
miliacea 1480
militaris 1474

Sphæria
mobilis 1479
mollis ib.
moriformis 1478
mucida 1479
mucoſa ib.
natans 1475
nivea 1477
ophiogloſſoides 1474
papillata 1476
parabolica 1478
penetrans ib.
Peziza ib.
phœnicea 1480
Placenta 1475
porphyrogona 1479
pulvinata 1476
puſtulata 1477
radians 1475
ribis 1474
roſtrata 1479
rugoſa ib.
ſanguinaria 1475
ſphincterica 1479
Stigma 1476
ſubulata 1478
ſuccenturiata 1476
Talus 1475
triſtis 1479
truncata 1474
tubæformis 1477
tunicata 1475
vireſcens 1476

Sphærobolus 1462
roſaceus ib.
ſtellatus ib.

Sphærocarpus 1,9
Hura 9

Sphagnum 1284, 1323
alpinum 1323
paluſtre ib.

Spigelia 293, 333
Anthelmia 333
marilandica ib.

Spilanthus 1163, 1193
Acmella 1193
atriplicifolia ib.
inſipida ib.
oleracea ib.
Pſeudo-acmella ib.
ſalivaria ib.
uliginoſa ib.
urens ib.

Spinacia 312, 508
fera 508
oleracea ib.

SPINIFEX 87, 177
ſquarroſus 177

Spiræa 779,849,850
alba 849
alpina ib.
altaica ib.
argentea ib.
Aruncus 850
betulifolia 849
calloſa ib.
camtſchatica ib.
chamædryfolia ib.
crenata ib.
Filipendula 850
hypericifolia 849
japonica ib.
inciſa 850
lævigata 849
lobata 850
opulifolia ib.
palmata ib.
ſalicifolia 849
ſorbifolia 850
thalictroides ib.
tomentoſa 849
trifoliata 850
triloba 850
Ulmaria ib.

Splachnum 1284, 1325 *ſq.*
ampullaceum 1325
anguſtatum ib.
Breweri ib.
longiſetum ib.
luteum 1325
ovatum 1326
rubrum 1325
ſphæricum ib.
tenue ib.
urceolatum ib.
vaſculoſum ib.

Spondia 663, 729
dulcis 729
Mombin ib.
Myrobalanus ib.

Spumaria 1466
Mucilago ib.

Stachys 885, 906-908
æthiopica 907
alpina 908
annua 907
arvenſis ib.
canarienſis ib.
circinata ib.
cretica ib.
germanica 908
glutinoſa 906
heraclea 907
hirta ib.
intermedia ib.
lanata ib.
latifolia 906
lavandulifolia 907
maritima 906
orientalis 907
palæſtina 906

Stachys
paluſtris 907
patens 906
recta 907
rugoſa ib.
ſilvatica ib.
ſpinoſa 906
Stæhelina 1163, 1202
arboreſcens 1202
Chamæpeuce ib.
corymboſa ib.
dubia ib.
elegans ib.
fruticoſa ib.
gnaphalioides ib.
haſtata ib.
ilicifolia ib.
imbricata ib.
ſpinoſa ib.
Stalagmitis 774, 810
cambogioides 810
Stapelia 306, 447
articulata 447
hirſuta ib.
incarnata ib.
mammillaris ib.
pilifera ib.
pulla ib.
quadrangula ib.
variegata ib.
Staphylea 311, 498
occidentalis 498
pinnata ib.
trifolia ib.
Statice 313, 510-512
aphylla 511
Armeria 510
aurea 512
axillaris ib.
caroliniana 511
cordata 511
cylindrifolia 512
echinus 511
echioides ib.
ferulacea 512
flexuoſa 511
graminifolia ib.
incana ib.
Limonium ib.
linifolia 512
lobata 511
minuta 512
monopetala ib.
mucronata ib.
pruinoſa 511
Pſeudarmeria 510
purpurata 511
ramoſiſſima ib.
reticulata ib.
rubella 512
ſinuata 511
ſpecioſa ib.
tatarica ib.
Steerbeckia 774, 820
gujanenſis 820
Stellaria 661, 717 *ſq.*
arenaria 718
biflora ib.
bulboſa ib.
ceraſtoides ib.
ciliata 719
craſſifolia 718
dichotoma ib.
Dilleniana ib.
graminea ib.
Holoſtea ib.
hypericifolia ib.
lateriflora ib.
nemorum 717
radians 718
rupeſtris 719
uliginoſa 718
undulata ib.
uniflora ib.
Stellera 600, 634
Chamæjaſme 634
Paſſerina ib.
Stemodia 889, 954
maritima 954
ruderalis ib.
Stemonitis 1286, 1467-1470
alba 1469
antiades ib.
argillacea ib.
aurantia ib.
bicolor ib.
bombacina 1470
botrytis 1468
cancellata ib.
cinerea 1467
cinnabarina 1469
coccinea 1468
crocea 1467
Embolus ib.
faſciculata 1468
favaginea 1470
ficoides 1469
flava 1468
floriformis 1469
fulva 1468
furfuracea ib.
fuſca 1467
globularis 1470
globulifera 1469
graniformis 1468
incarnata 1467
leucocephala ib.
leucopus 1470
lichenoides 1468
lumbricalis 1470
nigra 1467
nivea ib.

nutans

Stemonitis
nutans 1467
olivacea 1468
pomiformis 1469
pyriformis ib.
recutita 1467
rufa 1468
ſemitrichoides ib.
ſphærocephala ib.
ſulphurea 1470
Trichia ib.
turbinata 1469
typhina 1467
varia 1470
veſparia ib.
veſiculoſa ib.
violacea 1469
viridis ib.
vitellina 1470
Stephanium 299,368
gujanenſe 368
Sterculia 998, 1034
Balenghas 1034
cordifolia ib.
Firmiana ib.
fœtida ib.
Ivira ib.
lanceolata ib.
platanifolia ib.
Steris 307, 454
javana 454
Stewartia 1001, 1068
virginica 1068
Stilago 82, 107
Bunius 107
STILBE 210,226, 227
cernua 227
ericoides ib.
pinaſtra 226
Stilbum 1287, 1483
bulboſum 1483
minimum ib.
pubens ib.
rubicundum ib.
turbinatum ib.
vulgare ib.
Stillingia 995, 1003
ſilvatica 1003
Stiloſanthes 1077, 1121
elatior 1121
gujanenſis ib.
procumbens ib.
viſcoſa ib.
Stipa 87, 191
arguens 191
Ariſtella ib.
avenacea ib.
capillata ib.
juncea ib.
membranacea ib.
paleacea ib.
pennata ib.
ſpicata ib.
tenaciſſima ib.
Stockeſia 1192
cyanea 1192
Stoebe 1167, 1281 *ſq.*
æthiopica 1281
diſticha ib.
ericoides ib.
gnaphaloides 1282
gomphrenoides ib.
proſtrata ib.
reflexa ib.
rhinocerotis ib.
ſcabra ib.
Stratiotes 780, 852
acoroides 852
Stratiotes
aliſmoides 852
alooides ib.
Strigilia 659, 698
racemoſa 698
Strumpfia 302, 373
maritima 373
Struthiola 216, 277
erecta 277
juniperina ib.
lanceolata ib.
nana ib.
virgata ib.
Strychnos 296, 387
colubrina 387
Nux vomica ib.
potatorum ib.
Telancotta ib.
Styrax 659, 699
Benzoin 699
glabrum ib.
grandiflorum ib.
officinale ib.
Suæda 311, 503
anonyma 503
baccata ib.
fruticoſa ib.
hortenſis ib.
monoica ib.
vera ib.
vermiculata ib.
Subularia 967, 970
aquatica 970
purpurea ib.
Suriana 733
maritima ib.
Sutherlandia 998, 1027
littoralis 1027
Swartſia 296, 360
grandiflora 360

Swertia 306, 459
carinthiaca 459
corniculata ib.
decumbens ib.
dichotoma ib.
difformis ib.
perennis ib.
rotata ib.
Swietenia 657, 680
Mahagoni 680
Syena 83, 121
Majaca 121
SYMPHONIA 996, 1009
globulifera 1009
Symphytum 291, 320
officinale 320
orientale ib.
regium ib.
ſecundum ib.
tuberoſum ib.
Symplocos 1150, 1155
martinicenſis 1155
octopetala ib.
Syntheriſma 86, 154
præcox 154
ſerotinum ib.
villoſum ib.
Syringa 19, 26
capitata 26
perſica ib.
ſuſpenſa ib.
vulgaris ib.

T

Tabernæmontana 294, 438, 439
alternifolia 439
Amſonia ib.
amygdalifolia 438
anguſtifolia ib.
citrifolia ib.
cymoſa ib.
diſcolor ib.
echinata ib.
elliptica ib.
grandiflora ib.
laurifolia ib.
TACCA 743, 767
pinnatifolia 767
Tagetes 1164, 1245
erecta 1245
minuta ib.
patula ib.
Taligalea 887, 922
campeſtris 922
Taliſia 598, 620
gujanenſis 620
Tamarindus 82, 94
indica 94
Tamarix 311, 498, 499
africana 499
gallica 498
germanica 499
orientalis ib.
Tamburiſſa 3, 16
quadrifida 16
Tamonea 890, 965
mutica 965
Tamus 525, 570
communis 570
cretica ib.
elephantipes ib.
Tanacetum 1163, 1208 *ſq.*
angulatum 1209
annuum 1208
argenteum 1208
Balſamita 1209
cotuloides ib.
flabelliforme ib.
incanum 1208
monanthon ib.
myriophyllon ib.
ſibiricum ib.
ſuffruticoſum 1209
vulgare 1208
Tanæcium 886, 943
Jaroba 943
paraſiticum ib.
Tanibuca 660
Tapeinia 81, 108
magellanica 108
Tapura 300, 332
gujanenſis 332
Taralea 1075, 1084
oppoſitifolia 1084
Tarchonanthus 1163, 1204
camphoratus 1204
ericoides ib.
glaber ib.
Targionia 1285, 1353
hypophylla 1353
ſphærocarpos ib.
Tattia 778, 836
ignota 836
Taxus 1000, 1071
baccata 1071
elongata ib.
macrophylla ib.
nucifera ib.
verticillata ib.

Tectona 337
grandis ib.
Telephium 312, 504
Imperati 504
oppoſitifolium ib.
Temus 777, 831
moſchata 831
Terminalia 650, 701
anguſtifolia 701
arbuſcula ib.
Catappa ib.
Chebula ib.
latifolia ib.
TERNSTRŒMIA 773, 797, 798
dentata 798
elliptica 797
meridionalis 798
punctata ib.
Tetracera 779, 839
volubilis 839
Tetragonia 779, 842, 843
cryſtallina 843
echinata ib.
expanſa ib.
fruticoſa 842
herbacea 843
hirſuta ib.
japonica ib.
ſpicata ib.
Tetramnus 1076, 1094
uncinatus 1094
volubilis ib.
Tetranthus 1167, 1280
littoralis ...
Teucrium 885, 892, 897
abutiloides 896
Achæmenis 897
anguſtiſſimum 893
Arduini 894
arenarium 896
aſiaticum ib.
aureum 895
betonicæfolium ib.
betonicum 896
Botrys 893
brevifolium 894
buxifolium 896
cæleſte 893
campanulatum 892
canadenſe 895
capitatum 896
chamædrys 895
Chamæpitys 893
chium ib.
creticum ib.
cubenſe 895
flaveſcens 897
flavum 895
fruticans 894
gnaphalodes 897
heterophyllum 895
hircanicum 896
japonicum 894
inflatum 896
Iva 893
lævigatum ib.
latifolium 894
Laxmanni ib.
Libanitis 893
lucidum 894
luſitanicum 897
Marum 894
maſſilienſe ib.
mauritanum 893
montanum 894
Teucrium *moſchatum* 893
multiflorum 894
niſſolianum 893
nitidum 895
orientale 892
parviflorum ib.
Polium 896
Pſeudhyſſopus ib.
Pſeudo-chamæpitys 893
pumilum ib.
pycnophyllum 897
pyrenaicum 895
quadratulum ib.
regium ib.
rotundifolium ib.
ſalicifolium 894
Salviaſtrum 895
ſcordioides 896
Scordium ib.
Scorodonia ib.
ſibiricum 894
ſpinoſum 897
ſupinum 893
thymifolium 894
trifidum 896
trifoliatum 894
valentinum 897
villoſum 895
virginicum 894
Thelæphora 1285, 1440-1441
alutacea 1441
applanata ib.
carnea ib.
crocea ib.
ferruginoſa ib.
fuſca ib.
glabra ib.
hirſuta 1440
lilacea ib.
meſenterica ib.

Thelæphora
meſenteriformis 1440
papyracea 1441
phylacteris ib.
rubiginoſa ib.
ſericea ib.
ſtricta ib.
undulata ib.
variegata ib.
Thalia 1, 9
cannæformis 9
geniculata ib.
Thalictrum 782, 874, 875
alpinum 874
anguſtifolium ib.
aquilegifolium ib.
atro-purpureum ib.
carolinianum 875
contortum 874
Cornuti 875
dioicum ib.
elatum ib.
flavum 874
fœtidum ib.
longifolium ib.
lucidum ib.
majus 875
medium ib.
minus ib.
nigricans 874
purpuraſcens 875
rugoſum ib.
ſibiricum ib.
ſimplex 874
ſtamineum 875
tuberoſum ib.
Thapſia 310, 489, 490
Aſclepium 489
fœtida ib.
Thapſia
garganica 490
trifoliata ib.
villoſa 489
Thea 776, 821
Bohea 821
viridis ib.
Theleobolus 1286, 1461
ſtercorarius 1461
Theligonum 740, 745
Cynocrambe 745
Themeda 85, 149
polygama 149
Theobroma 1149, 1151
Cacao 1151
Guacuma ib.
gujanenſe ib.
Theophraſta 293, 333
americana 333
Theſium 304, 428, 429
alpinum 428
amplexicaule ib.
bavarum ib.
capitatum ib.
Colpoda 429
euphorbioides ib.
fragile ib.
Friſea 428
funale ib.
lineatum 429
Linophyllum 428
paniculatum ib
ſcabrum 429
ſpicatum 428
ſpinoſum 429
ſquarroſum ib.
Theſium
ſtrictum 429
triflorum ib.
umbellatum ib.
Thlaſpi 967, 973, 974
alliaceum 973
alpeſtre 974
alpinum ib.
arvenſe 973
Burſa paſtoris 974
campeſtre ib.
ceratocarpon ib.
hirtum ib.
montanum ib.
peregrinum 973
perfoliatum 974
præcox ib.
ſaxatile 973
Schranckii 974
Thoa 772, 826
urens 826
Thottea 773, 798
grandiflora 798
Thouinia 20, 49
liguſtrina 49
nutans ib.
Thrinax 526, 570
parviflora 570
Thryallis 658, 684
braſilienſis 684
Thuja 996, 1006
aphylla 1006
dolabrata ib.
occidentalis ib.
orientalis ib.
Thunbergia 891, 934
capenſis 934
Thuaria 661, 703
chilenſis 703

Thymbra 886, 898
ſpicata 898
verticillata ib.
Thymus 886, 913, 914
Acinos 913
alpinus 914
Brownei ib.
cephalotes 913
filiformis 914
imbricatus ib.
indicus ib.
Maſtichina 913
numidicus ib.
pannonicus 914
Piperella ib.
Serpyllum 913
Tragoriganum ib.
villoſus ib.
virginicus ib.
vulgaris ib.
Zygis ib.
Tiarella 661, 708
cordifolia 708
trifolia ib.
unifolia ib.
Ticorea 996, 1009
fœtida 1009
Tigarea 774, 813
aſpera 813
dentata ib.
Tilia 815
alba ib.
americana ib.
caroliniana ib.
cordata ib.
europæa ib.
pubeſcens ib.
tomentoſa ib.
Tillæa 220, 289
aquatica 289
capenſis ib.
Tillæa
muſcoſa 290
perfoliata 289
Tillandſia 522, 530, 531
anguſtifolia 531
caneſcens ib.
decumbens ib.
faſciculata 530
flexuoſa ib.
lingulata 531
monoſtachya ib.
nutans 530
paniculata 531
polyſtachya 530
recurvata 531
ſerrata ib.
tenuifolia ib.
uſneoides ib.
utriculata 530
Timmia 524, 538
anguſtifolia 538
obliqua ib.
Tinus 647, 652
occidentalis 652
Tithonia 1165, 1259
uniflora 1259
Tocoyena 296, 330
longiflora 330
Tolvifera 655, 677
Balſamum 677
Tomex 260
glabra ib.
Tondin 602, 635
ſurinamenſe 635
Tonina 525, 570
fluviatilis 570
Tonſella 82, 106
ſcandens 106
Tontanea 213, 280
gujanenſis 280
Topobea 741, 754
paraſitica 754
Tordylium 308, 472
apulum 472
maximum ib.
officinale ib.
peregrinum ib.
ſcifolium ib.
ſyriacum ib.
Torenia 887, 935
aſiaticum 935
Tormentilla 781, 860
erecta 860
reptans ib.
Tournefortia 295, 324
argentea 324
bicolor ib.
cymoſa ib.
fœtidiſſima ib.
glabra ib.
hirſutiſſima ib.
humilis ib.
maculata ib.
ſerrata ib.
ſuffruticoſa ib.
volubilis ib.
Tourrettia 889, 940
volubilis 940
Tovomita 774, 808
gujanenſis 808
Tozzia 888, 925
alpina 925
Trachelium 297, 358
cæruleum 358
diffuſum ib.
tenuifolium ib.

Tradeſcantia 522, 532, 533
Aubletii 533
axillaris ib.
cordifolia ib.
criſtata ib.
diſcolor ib.
geniculata 532
malabarica ib.
monandra ib.
multiflora 533
nervoſa 532
papilionacea 533
ſpathacea ib.
ſpecioſa ib.
virginica 532

Tragia 83, 94
cannabina 94
Chamelæa ib.
innocua ib.
involucrata ib.
Mercurialis ib.
urens ib.
volubilis ib.

Tragopogon 1161, 1168, 1169
aſper 1169
capenſis 1168
crocifolius ib.
Dalechampii 1169
Dundelion ib.
lanatus ib.
major 1168
mutabilis ib.
orientalis ib.
picroides 1169
pomifolius 1168
pratenſis ib.
ruber 1169
undulatus 1168
virginicus 1169
villoſus 1168

Trapa 216, 265
bicornis 265
natans ib.

Tremella 1286, 1446-1448
adnata 1446
allii 1447
annulata 1448
arborea 1446
atra 1448
cavernoſa 1446
cerebrina 1447
cinnabarina ib.
clavariæformis 1446
coralloides 1448
criſpa ib.
deliqueſcens ib.
difformis 1446
digitata 1448
encephaloides 1447
fucata 1446
glanduloſa 1448
granulata 1446
hemiſphærica ib.
hydnoidea 1448
inteſtinalis 1447
juniperina ib.
lithophila ib.
meſenterica ib.
meteorica 1446
miliaris 1448
moniliformis 1446
Noſtoc 1447
orbicularis 1446
perſiſtens 1447
Piſum 1446
plana 1447
pruniformis 1446
punctiformis ib.
rubella 1448
ruberrima 1447
rubra 1448
rufa 1446
Sagarum 1447
ſepincola ib.
ſtipitata 1446
torta 1447
undulata ib.
uſtulata ib.
verrucoſa 1448
verticalis ib.
veſicaria 1446
violacea 1447
viridis ib.

Trewia 772, 813
nudiflora 813

Trianthema 660, 703
cryſtallinum 703
decandrum ib.
fruticoſum ib.
monogynum ib.
pentandrum ib.

Tribulus 657, 683, 684
ciſtoides 684
lanuginoſus ib.
maximus 683
pentandrus 684
terreſtris ib.

Trichilia 657, 679
alliacea 679
glabra ib.
hirta ib.
moſchata ib.
pallida ib.
ſpectabilis ib.
ſpondioides ib.
terminalis ib.
trifolia ib.

Trichocarpus 777, 834
gujanenſis 834
Trichomanes 1283, 1318-1321
adiantoides 1319
aſplenioides 1318
bivalve 1320
canarienſe 1321
capillaceum *ib.*
ciliatum 1318
clavatum 1319
contiguum *ib.*
crinitum 1320
criſpum 1318
cuneiforme 1320
denſiſſum *ib.*
dilatatum 1319
elatum 1321
epyphyllum 1320
flaccidum 1321
fucoides 1319
gibberoſum 1320
hirſutum *ib.*
humile 1318
japonicum 1321
linearis 1320
lucens 1319
membranaceum 1318
multifidum 1321
polyanthon 1319
polypodioides 1318
puſillum *ib.*
pyxidiferum 1320
reniforme 1318
reptans *ib.*
rigidum 1319
ſanguinolentum 1320
ſcandens 1321
ſericeum 1318
ſinenſe 1321
ſolidum *ib.*
ſquarroſum 1320
Trichomanes
ſtrigoſum 1320
tamariſciforme *ib.*
tunbrigenſe 1319
undulatum *ib.*
Trichoſanthes 81, 102
amara 102
anguina *ib.*
cucumerina *ib.*
fœtidiſſima *ib.*
nervioſa *ib.*
Trichoſtema 886, 918
brachiatum 918
dichotomum *ib.*
lineare *ib.*
Tridax, 1165, 1254
procumbens 1254
Trientalis 593, 595
europæa 595
Trifolium 1075, 1077, 1140-1144
agrarium 1143
albidum 1142
alexandrinum 1141
alpeſtre 1142
alpinum 1141
anguſtifolium 1142
arvenſe *ib.*
aureum 1143
bicorne 1142
biflorum 1143
cæſpitoſum 1141
Cheleri *ib.*
clypeatum 1142
comoſum 1140
erectum 1143
filiforme *ib.*
flexuoſum 1142
fragiferum 1143
glaciale 1141
Trifolium
globoſum 1141
glomeratum *ib.*
gujanenſe 1143
hedyſarioides 1141
hybridum *ib.*
incarnatum 1142
lævigatum 1143
lappaceum 1142
Lupinaſter 1140
Melilotus *ib.*
cærulea *ib.*
cretica *ib.*
indica *ib.*
italica *ib.*
officinalis *ib.*
ornithopodioides *ib.*
polonica *ib.*
meſſanenſe *ib.*
montanum 1143
ochroleucum 1142
pannonicum *ib.*
pratenſe *ib.*
procumbens 1143
pſoraloides *ib.*
reflexum 1140
repens 1141
reſupinatum 1143
rubens 1142
ſcabrum 1141
ſimplicifolium 1144
ſpadiceum 1143
ſpumoſum *ib.*
ſquarroſum 1141
ſtellatum 1143
ſtriatum 1141
ſtrictum 1140
ſubterraneum 1141
ſuffocatum 1143
tomentoſum *ib.*
uniflorum 1142

Triglochin 527, 587
bulboſum 587
maritimum ib.
paluſtre ib.
Trigonella 1075, 1078, 1145, 1146
corniculata 1146
Fœnum græcum ib.
hamoſa ib.
indica ib.
laciniata ib.
monſpeliaca ib.
platycarpos 1145
polycerata ib.
ruthenica ib.
ſpinoſa 1146
ſtellata ib.
ſtriata 1145
Trigonia 655, 673
lævis 673
villoſa ib.
Trigonis 598, 610
tomentoſa 610
Triguera 295, 338
baccata 338
TRILLIX 774, 805
lutea 805
Trillium 527, 588
cernuum 588
erectum ib.
ſeſſile ib.
Triopteris 662, 725
citrifolia 725
jamaicenſis ib.
rigida ib.
Trioſteum 299, 369
anguſtifolium 369
perfoliatum ib.
Triplaris 743, 767
americana 767
ramiflora ib.
Tripſacum 87, 178
dactyloides 178
hermaphroditum ib.
Triſetaria 87, 177
Forskahlii 177
Triſtemma 656, 693
mauritianum 693
Triticum 88, 199, 200
æſtivum 199
bicorne 200
bromoides ib.
compoſitum ib.
hibernum 199
junceum 200
maritimum ib.
monococcum ib.
polonicum ib.
proſtratum ib.
pumilum ib.
repens ib.
Spelta ib.
tenellum ib.
turgidum ib.
unilaterale ib.
Triumfetta 740, 750
annua 750
Bartramia ib.
Lappula ib.
procumbens ib.
rhomboidea ib.
ſemitriloba ib.
Trixis 1166, 1271
aſpera 1271
eroſa ib.
terebinthinacea ib.
Trolius 782, 881
aſiaticus 881
europeus ib.
Tropæolum 598, 605
hybridum 605
majus ib.
minus ib.
peregrinum ib.
Trophis 217, 277
americana 272
Tſiana 1, 9
ſpecioſa ib.
Tubea 1286, 1481
album 1481
guloſorum ib.
oleraceum ib.
paraſiticum ib.
Tubercularia 1287, 1482
faſciculata 1482
nigricans ib.
ſulcata ib.
volvata ib.
vulgaris ib.
Tubifera 1472
cylindrica ib.
ferruginoſa ib.
fragiformis ib.
Tubiflora 19, 27
carolinenſis 27
TULBAGHIA 525, 535
alliacea 535
cepacea ib.
Tulipa 547
biflora 547
Breyniana ib.
Geſneriana ib.
ſilveſtris ib.
Tunatea 772, 820
gujanenſis 820

Turia 303, 403
cordata 403
cylindrica ib.
Gijef ib.
Leloja ib.
Moghada ib.
Turnera 311, 503, 504
ciſtoides 504
gujanenſis ib.
frutiſcens ib.
Pumilea 503
racemoſa 504
rupeſtris 503
ſidoides ib.
ulmifolia ib.
TURRÆA 657, 679, 680
glabra 679
lanceolata ib.
maculata 680
pubeſcens ib.
ſericea ib.
tomentoſa ib.
virens 679
Turritis 968, 987, 988
alpina 988
glabra 987
hirſuta 988
Tuſſilago 1164, 1224-1226
alba 1225
alpina ib.
Anandria 1224
dentata 1225
diſcolor ib.
Farfara ib.
frigida ib.
hybrida 1225
japonica ib.
lutea ib.

Tuſſilago
nana 1224
nutans 1225
palmata 1226
paradoxa 1225
Petaſites ib.
pumila 1224
radiata 1226
rubella 1225
ſibirica 1224
ſilveſtris 1225
ſpuria ib.
Tympanis 1285, 1460
ſaligna 1460
Typha 85, 147
anguſtifolia 147
latifolia ib.
Ubium 779, 839
quadrifarium 839
Ulex 1076, 1093
capenſis 1093
europæus ib.
Ulmus 305, 456
americana 456
campeſtris ib.
effuſa ib.
hollandica ib.
nemoralis ib.
pubeſcens ib.
pumila ib.
Ulva 1285, 1390, 1392
articulata 1391
codendulifolia 1392
compreſſa 1391
confervoides ib.
cuneata ib.
dichotoma ib.
glandiformis ib.

Ulva
inteſtinalis 1391
labyrinthiformis ib.
Lactuca ib.
lanceolata 1390
latiſſima ib.
Linza 1391
lumbricalis ib.
maccana ib.
montana 1390
oryziformis 1391
papilloſa ib.
pavonia 1390
porrifolia 1392
Priapus 1391
purpurea 1390
ramoſa 1391
reticulata 1390
rugoſa 1391
Sagarum 1392
ſquamaria 1390
ſtellata 1391
umbilicalis 1390
vermicularis 1391
Uncaria 299, 370
gujanenſis 370
Uniola 88, 183
bipinnata 183
mucronata ib.
paniculata ib.
ſpicata ib.
Unona 282, 869
diſcreta 869
UNXIA 1161, 1249
camphorata 1249
Uratea 656, 677
gujanenſis 677
Urceolaria 296, 390
exotica 390
Urena 1000, 1058, 1059
americana 1058

Urena
leprocarpa 1058
lobata ib.
multifida ib.
procumbens ib.
reticulata ib.
ſinuata ib.
tricuſpis ib.
Typhalæa 1059
viminea ib.

Urtica 217, 268-272
æſtuans 271
alata 268
alienata 269
arborea 272
argentea 271
baccifera ib.
balearica 269
betulifolia 270
canadenſis 271
cannabina ib.
capenſis ib.
capitata ib.
ciliaris 269
ciliata ib.
cuneifolia 273
cylindrica 269
depreſſa 270
diffuſa 269
dioica 268
divaricata 271
Dodartii 269
elongata ib.
ferox 270
filiformis 269
fruteſcens 272
gracilis 269
grandifolia ib.
herniarioides 270
japonica 271
iners 269
interrupta 271
lappulacea 271
lata 268
lucida 271
macrophylla 270
microphylla 268
nivea 272
nudicaulis 268
nummularifolia 270
palmata 271
paraſitica ib.
Parietaria 270
pilulifera 269
pumila ib.
radicans 270
repens ib.
reticulata ib.
rhombea ib.
ruderalis 271
rufa 270
rugoſa 268
ſerrulata 270
ſeſſiliflora 271
ſpicata 269
ſtimulans 272
ſtoloniſera 268
trianthemoides 270
urens ib.
villoſa 271
virgata 269

Utricularia 20, 39, 40
alpina 39
bifida 40
cærulea ib.
folioſa 39
fibroſa 40
gibba ib.
inflata ib.
inflexa ib.
minor ib.
obtuſa ib.
pumila ib.
purpurea ib.
ſtellaris 40
ſubulata ib.
vulgaris ib.

Uvaria 782, 858
javanica 858
lanceolata ib.
longifolia ib.
zeylanica ib.

Uvularia 525, 546
amplexifolia 546
cirrhoſa ib.
hirta ib.
lanceolata ib.
perfoliata ib.
ſeſſiliflora ib.

V

Vaccinium 601, 620-622
album 621
amœnum ib.
anguſtifolium 620
Arctoſtaphylos 621
bracteatum ib.
cereum 620
ciliatum 621
corymboſum ib.
diffuſum 620
frondoſum 621
fuſcatum ib.
hirtum 620
hiſpidulum 622
liguſtrinum 621
macrocarpon 622
meridionale ib.
mucronatum 621
Myrtillus 620
pallidum 621
reſinoſum ib.
ſtamineum 620
tenellum 621
uliginoſum 620

Vaccinium
venuſtum 621
virgatum ib.
virgineum 622
Vitis idæa 621
VAHLIA 307, 463
capenſis 463
Valantia 214, 240, 241
Aparine 241
articulata ib.
Cruciata ib.
Cucullaria ib.
filiformis 240
glabra 241
hiſpida 245
hypocarpa 241
muralis 240
Valentinia 601, 618
ilicifolia 618
Valeriana 81, 91, 92
Calcitrapa 91
celtica ib.
Cornucopiæ ib.
dentata 92
dioica 91
echinata 92
elongata ib.
Locuſta ib.
mixta ib.
montana 91
officinalis ib.
Pha ib.
pyrenaica 92
rubra 91
ſaxatilis 92
ſcandens ib.
ſibirica ib.
ſinenſis ib.
ſupina ib.
tripteris 91
Valeriana
tuberoſa 91
villoſa 92
Vallaris 137, 391
indica 391
VALLEA 294, 814
ſtipularis 814
Valliſneria 22, 80
ſpiralis 80
Vandellia 953
diffuſa 953
Vangueria 299, 367
madagaſcarienſis 367
Varronia 295, 394
alba 394
bullata ib.
curaſſavica ib.
globoſa ib.
humilis ib.
lineata ib.
macroſtachya ib.
martinicenſis ib.
mirabiloides ib.
Vatairea 1076, 1085
gujanenſis 1085
Vateria 775, 819
indica 819
VATICA 741, 748
ſinenſis 748
Velezia 307, 459
rigida 459
Vella 967, 969, 970
annua 969
Pſeudo-cytiſus 970
tenuiſſima ib.
Veratrum 527, 589
album 589
luteum ib.
nigrum ib.
Sabadilla ib.
viride ib.
Verbaſcum 294, 377, 378
bicolle 377
Blattaria 378
Boerhaavii ib.
Chaixi ib.
ferrugineum ib.
hæmorrhoidale ib.
lychnitis ib.
Myconi ib.
nigrum ib.
Osbeckii ib.
phlomoides ib.
phœniceum ib.
pulverulentum ib.
ſinuatum ib.
ſpinoſum ib.
thapſoides 377
Thapſus ib.
Verbena 20, 41, 42
Aubletia 41
bonarienſis ib.
capitata 42
caroliniana ib.
curaſſavica 41
globiflora 42
haſtata ib.
jamaicenſis 41
indica ib.
lappulacea ib.
mexicana ib.
mutabilis ib.
nodiflora ib.
officinalis 42
orubica 41
priſmatica ib.
procumbens 42
ſpuria ib.
ſtœchadifolia 41
ſupina 42
triphylla ib.
urticifolia ib.

Verbeſina 1165, 1255 ſq.
alata 1255
biflora 1256
Boſvellea ib.
calendulacea ib.
dichotoma ib.
fruticoſa ib.
gigantea ib.
laciniata ib.
Lavenia ib.
nodiflora ib.
pinnatifida ib.
ſinenſis ib.
virginica ib.

Vermicularia 1286, 1480
hiſpida 1480
Pſeudo-ſphæria ib.
pubeſcens ib.

Veronica 19, 28-31
acinifolia 31
agreſtis 30
alpina 29
Anagallis ib.
aphylla 28
arvenſis 30
auſtriaca ib.
Beccabunga 29
Bellardi 31
bellidioides 29
biloba 31
camtſchatica 29
carnea ib.
carolinienſis 31
catarractæ 29
Chamædrys 30
decuſſata ib.
elliptica 29
fruticuloſa ib.
hederæfolia 30
hybrida 28
incana 28
inciſa ib.
laciniata ib.
Lappago 30
latifolia ib.
longifolia 28
marilandica 31
maritima 28
montana 30
multifida ib.
nummularia 31
officinalis 28
paniculata 30
pectinata ib.
peregrina 31
piloſa 30
pinnata 28
proſtrata 30
pumila 29
romana 31
ſalicifolia 29
ſaxatilis ib.
ſcutellata ib.
ſerpyllifolia ib.
ſibirica 28
ſpicata ib.
ſpuria ib.
ſucculenta 31
tenella 29
Teucrium ib.
triphylla 30
urticæfolia ib.
verna 31
virginica 28

Viburnum 310, 496, 497
acerifolium 496
caſſinoides 497
cuſpidatum ib.
dentatum 496
dilatatum 497
eroſum ib.
hirtum 497
Lantana 496
Lentago ib.
macrophyllum 497
nitidum ib.
nudum 496
obovatum ib.
Opulus ib.
prunifolium ib.
ſcandens ib.
ſerratum ib.
tinoides ib.
Tinus ib.
tomentoſum 497
villoſum 496
virens 497

Vicia 1077, 1110-1112
anguſtifolia 1112
benghalenſis 1111
biennis ib.
bithynica 1112
bohemica 1110
caneſcens 1111
caroliniana 1110
caſſubica 1111
Clymenum 1112
Cracca 1111
dumetorum ib.
exſtipulata ib.
Faba 1112
Gerardi 1111
globoſa 1112
hybrida ib.
lathyroides ib.
lutea ib.
monantha 1111
multiflora ib.
narbonenſis 1112
niſſoliana 1111
onobrychoides ib.
peregrina 1112

Vicia
piſiformis 1110
ſativa 1112
ſepium 1111
ſerratifolia 1112
ſilvatica 1111
tenuifolia *ib.*

Villarſia 306, 447
aquatica 447

Vinca 294, 435
lutea 435
major *ib.*
minor *ib.*
puſilla *ib.*
roſea *ib.*

Viola 302, 412-414
arboreſcens 414
arvenſis 413
biflora *ib.*
calcarata 414
Calceolaria *ib.*
canadenſis 413
canina *ib.*
ceniſia *ib.*
cordata 412
cornuta 414
cucullata 412
decumbens 413
diandra 414
enneaſperma *ib.*
grandiflora *ib.*
hirta 412
Hybanthus 414
Ipecacuanha *ib.*
Itubu *ib.*
Krockeri 412
lanceolata *ib.*
mirabilis 413
montana *ib.*
nummularifolia 413
obliqua 412
odorata *ib.*

Viola
oppoſitifolia 414
palmata 412
paluſtris *ib.*
parviflora 414
pedata 412
pinnata *ib.*
primulifolia *ib.*
procumbens 413
pubeſcens *ib.*
pumila *ib.*
riphæa *ib.*
ſagittata 412
ſtipularis 414
ſtricta 413
ſuffruticoſa 414
tricolor 413
uniflora *ib.*
villoſa 412

Virea 1162, 1174
ſcabra 1174

VIRECTA 297, 334
biflora 334

Virola 526, 570
ſebifera 570

Viſcum 217, 273
album 273
antaroticum *ib.*
capenſe *ib.*
flavens *ib.*
macroſtachyon *ib.*
opuntioides *ib.*
pauciflorum *ib.*
purpureum *ib.*
rotundifolium *ib.*
rubrum *ib.*
terreſtre *ib.*
verticillatum *ib.*

VISNEA 740, 767
Mocanera 767

Vitex 890, 962, 963
Agnus caſtus 963
altiſſima 962
divaricata *ib.*
Leucoxylon 963
Negundo *ib.*
ovata 962
pinnata 963
ſinuata *ib.*
trifolia 962
umbroſa 963

Vitis 301, 421
arborea *ib.*
heptaphylla *ib.*
heterophylla *ib.*
japonica *ib.*
indica *ib.*
Labruſca *ib.*
laciniofa *ib.*
pentaphylla *ib.*
trifolia *ib.*
vinifera *ib.*
vulpina *ib.*

Vogelia 81, 107
capitata 107

Volkameria 890, 961
aculeata 961
japonica *ib.*
inermis *ib.*
Kæmpferi *ib.*
ſcandens *ib.*
ſerrata *ib.*

Volutella 647, 652, 1459 *ſq.*
aphylla 652
nuda 1460
volvata 1459

Votomite 216, 278
gujanenſis 278

Voyria 293, 334
cærulea 334
roſea *ib.*

Wachendorſia 82, 120
graminifolia 120
paniculata ib.
thyrſiflora ib.
Walcuffa 998, 1029
torrida 1029
Wallenia 211, 246
laurifolia 246
Waltheria 996, 1008, 1009
americana 1008
anguſtifolia ib.
caroliniana 1009
elliptica ib.
indica ib.
ovata ib.
Webera 776, 820
quinquenervia 820
WEIGELA 291, 337
japonica 337
Weinmannia 602, 636
hirta 636
parviflora ib.
pinnata ib.
racemoſa ib.
tomentoſa ib.
trifoliata ib.
Willdenovia 298, 362
Schreberi 362
WILLICHIA 82
repens ib.
Willugbeja 296, 434
accida 434
gujanenſis ib.
WINTERA 780, 852, 853
aromatica 853
axillaris 852
granadenſis 853
Wiſenia 312, 515
indica 515
Witheringia 211, 247
ſolanacea 247
WITSENIA 82, 107
maura 107
Wormia 780, 851
triquetra 851
WULFERIA 20, 40
carinthiaca 40
WURMBEA 527, 587
capenſis 587
Xanthium 325, 464
americanum 464
echinatum ib.
fruticoſum ib.
orientale ib.
ſpinoſum ib.
ſtrumarium ib.
Xanthorhiza 604, 646
apiifolia 646
Xanthoxylum 312, 509
caribæum 509
Clava ib.
trifoliatum ib.
Xeranthemum 1163, 1218 *ſq.*
annuum 1218
Xeranthemum
bellidioides 1218
caneſcens ib.
fulgidum 1219
imbricatum 1218
paniculatum 1219
proliferum 1218
recurvatum 1219
retortum 1218
ſeſamoides 1219
ſpecioſiſſimum 1218
ſpinoſum 1219
ſquamoſum ib.
Stæbelina ib.
ſtoloniferum ib.
variegatum ib.
veſtitum 1218
virgatum 1219
Xerophyta 522, 530
madagaſcarienſis 530
Ximenia 615
americana 615
elliptica ib.
inermis ib.
Xiphidium 82, 119
floribundum 119
Xylocarpus 600, 611
Granatum 611
XYLOPHYLLA 311, 499
anguſtifolia 499
latifolia ib.
longifolia ib.
montana ib.
Xylopia 282, 866
glabra 866
muricata ib.
Xylosma 771, 797
orbiculatum 797
ſuaveolens ib.

Xyloſtroma 1287
1442
giganteum 1442
Xyris 83, 122
americana 122
indica ib.
Xyſtris 300, 390
Schreberi 390

Yucca 525, 562
aloifolia 562
Draconis ib.
filamentoſa ib.
Glorioſa ib.

Zamia 781, 863
anguſtifolia 863
Cycadis ib.
pumila ib.
Zannichellia 418
paluſtris ib.
Zanonia 310, 500
indica 500
Zea 85, 148
Curagua 148
Mays ib.
Zinnia 1165, 1246
Bidens 1246
multiflora ib.
pauciflora ib.
verticillata ib.
Zizania 526, 579
aquatica 579
paluſtris ib.
terreſtris ib.
Ziziphora 20, 43
acinoides 43
capitata ib.
hiſpanica ib.
tenuior ib.
Zœgea 1165, 1263
aleppica 1263
capenſis ib.
Leptaurea ib.
Zonnia 1076, 1096
bracteata 1096
Zoſtera 781, 863
ciliata 863
marina ib.
oceanica ib.
ſtipulacea ib.
uninervis ib.
Zygophyllum 657, 681
æſtuans 681
album ib.
arboreum ib.
coccineum ib.
cordifolium ib.
Fabago ib.
maculatum ib.
microphyllum ib.
Morgſana ib.
ſeſſilifolium ib.
ſimplex ib.
ſpinoſum ib.

Digitized by Google

INDEX II.

NOMINUM TRIVIALIUM ſ. PROPRIORUM,

ET SYNONYMORUM.

NOT. Quæ literarum characteribus conſuetis expreſſa leguntur, nomina Specierum trivialia indicant, quæ vero *curſivis*, *Synonyma ab aliis uſurpata*.

Abelmoſchus 1066
Abies 1073
Abrotanum 1209
Abſinthicum 1211
Abſus 668
Abutilon 1048
Acango 529
Acanthium 1190
Acarna *ib.*
Acetabulum 1365, 1459
Acetoſa 586
Acetoſella 734
Acetoſellus 586
Achæmenis 897
Achenia 1061
Achillea 1206, 1208
Achras 398
Achirantha 427
Archyranthes 426
Acidoton 1036
Acinodendron 683
Acinos 913
Aciphylla 480
Aciſonthera 605
Acmella 1193
Achronychia 619
Acroſpermum 1478
Acroſtichum 1311, 1322
Acturus 938
Aeuſi 443
Adenanthera 554
Adenoſtema 1256
Adhactota 32
Adiantum nigrum 1304
Adima 422
Ægagropila 1395
Ægiceras 747
Ægilops 644
Ægilops 196 *ſq.*
Aeginetia 955
Agallocha 203
Agara 1390
Agaricus 1430 *ſq.* 1440
Agarum 1390
Agaſtachys 145
Ageratoides 1200
Ageratum 1252
Ageria 31
Agnus caſtus 963
Agrimonia 1195
Agrimonoides 757
Agroſtis 163, 171,
Ahovai 433
Aira 157, 176
Aizoon 704, 731
Akara 814
Alaternus 400
Alcea 1055
Alectorolophus 923
Alhagi 1123
Alicaſtrum 12
Alifanus 605
Alkekengi 381
Alliaria 983
Allovia 8
Alnus 282

Aloë

Aloë 561
Aloides 852
Alſinaſtrum 643
Alſine 17
Alypum 226
Alyſſon 908
Alyſſum 971
Alyxia 430
Amalago 76
Amalanchior 841
Amanitea 1400
Amarella 462
Amaryllis 537
Ambotai 869
Ambu 418
Amelloides 1239
Amellus 1205, 1237
Ammi 483
Ammodytes 1135
Amomum 483
Ampelopraſum 541
Amſonia 439
Anacampſeros 731, 752
Anacardium 493
Anagallis 29, 957
Anandria 1224
Ananas 529
Anaſtomoſis 1449
Anblatum 924
Andrachne 697
Andromeda 620, 622, 626
Andropogon 152, 194
Androſæmum 1157
Anemonoidæ 871
Anguina 102
Anguria 100
Anil 1129
Aniſum 492
Anſerina 858
Anthelmia 333
Anthemis 1248, 1261
Antheuphorbium 1195
Antholyza 107
Anthora 838
Anthriſcus 473
Antoſtaphylos 621
Apargia 1176
Aparine 240, 241
Aperemoa 869
Aphaca 1109
Apios 763, 1106
Apucuita 668
Aquifolium 287
Arbor toxicaria 389
Arbor triſtis 23
Arbuſcula 73, 204
Archangelica 482
Arctotoides 1275
Arcturus 938
Arcuma 8
Arcyriæ 1467
Areira 683
Argemone 809
Arguzia 324
Aria 829
Ariboa 788
Ariſarum 865
Ariſtella 191
Armeria 510, 710, 715
Armeriaca 795
Armoracia 975
Artemiſia 374, 1250
Artocreas 1478
Aruncus 850
Arundo 171, 579
Arundo 172, 174, 195
Aſak 803
Aſarina 934
Aſchrek 668
Aſcidium 1484
Aſclepium 489
Aſellus 1102
Aſigron 1156
Aſpalathus 1087
Aſparagus 558
Aſpergillus 1487
Aſa fœtida 479
Aſter 1240
Aſteriſcoides 1261
Aſteriſcus 1270
Aſteroides 1262
Aſtragalus 1094, 1125
Atamuſco 539
Athamanta 486
Atocion 716
Atoto 762
Atraphaxoides 637
Aurantium 1153
Aubletia 41
Auricula 327, 1176, 1459
Auricularia 232, 902
Auricularia 1431, 1440 *ſq.*
Auriſcalpium 1439
Avellana 637, 966
Avena 171 *ſqq.*
Averrhea 287
Azadiracha 681
Azarolus 830
Azedarach 680

B

Baccabunga 29
Baducca 806
Bæothryon 125
Bailloviana 1386
Balanghas 1034
Balanus 1427
Balſamea 614, 1073
Balſamina 101, 415
Balſamita 1209, 1247
Balſamum 677
Bankſia 9, 21
Barba jovis 1099, 1440
Barbula 1335
Barometis 1312
Bartramia 750, 1335
Baſilicum 918
Baſtera 1386
Batata 574

Triglochin 527, 587
bulboſum 587
maritimum ib.
paluſtre ib.
Trigonella 1075, 1078, 1145, 1146
corniculata 1146
Fœnum græcum ib.
hamoſa ib.
indica ib.
laciniata ib.
monſpeliaca ib.
platycarpos 1145
polycerata ib.
ruthenica ib.
ſpinoſa 1146
ſtellata ib.
ſtriata 1145
Trigonia 655, 673
lævis 673
villoſa ib.
Trigonis 598, 610
tomentoſa 610
Triguera 295, 338
baccata 338
TRILLIX 774, 805
lutea 805
Trillium 527, 588
cernuum 588
erectum ib.
ſeſſile ib.
Triopteris 662, 725
citrifolia 725
jamaicenſis ib.
rigida ib.
Trioſteum 299, 369
anguſtifolium 369
perfoliatum ib.
Triplaris 743, 767
americana 767
ramiflora ib.
Tripſacum 87, 178
dactyloides 178
hermaphroditum ib.
Triſetaria 87, 177
Forſkahlii 177
Triſtemma 656, 693
mauritianum 693
Triticum 88, 199, 200
æſtivum 199
bicorne 200
bromoides ib.
compoſitum ib.
hibernum 199
junceum 200
maritimum ib.
monococcum ib.
polonicum ib.
proſtratum ib.
pumilum ib.
repens ib.
Spelta ib.
tenellum ib.
turgidum ib.
unilaterale ib.
Triumfetta 740, 750
annua 750
Bartramia ib.
Lappula ib.
procumbens ib.
rhomboidea ib.
ſemitriloba ib.
Trixis 1166, 1271
aſpera 1271
eroſa ib.
terebinthinacea ib.
Trolius 782, 881
aſiaticus 881
europeus ib.
Tropæolum 598, 605
hybridum 605
majus ib.
minus ib.
peregrinum ib.
Trophis 217, 277
americana 277
Tſiana 1, 9
ſpecioſa ib.
Tubea 1286, 1481
album 1481
guloſorum ib.
oleraceum ib.
paraſiticum ib.
Tubercularia 1287, 1482
faſciculata 1482
nigricans ib.
ſulcata ib.
volvata ib.
vulgaris ib.
Tubifera 1472
cylindrica ib.
ferruginoſa ib.
fragiformis ib.
Tubiflora 19, 27
carolinenſis 27
TULBAGHIA 525, 535
alliacea 535
cepacea ib.
Tulipa 547
biflora 547
Breyniana ib.
Geſneriana ib.
ſilveſtris ib.
Tunatea 772, 820
gujanenſis 820

Turia 303, 403
cordata 403
cylindrica ib.
Gijef ib.
Leloja ib.
Moghada ib.
Turnera 311, 503, 504
ciſtoides 504
gujanenſis ib.
frutiſcens ib.
Pumilea 503
racemoſa 504
rupeſtris 503
ſidoides ib.
ulmifolia ib.
TURRÆA 657, 679, 680
glabra 679
lanceolata ib.
maculata 680
pubeſcens ib.
ſericea ib.
tomentoſa ib.
virens 679
Turritis 968, 987, 988
alpina 938
glabra 987
hirſuta 988
Tuſſilago 1164, 1224-1226
alba 1225
alpina ib.
Anandria 1224
dentata 1225
diſcolor ib.
Farfara ib.
frigida ib.
hybrida 1225
japonica ib.
lutea ib.
Tuſſilago
nana 1224
nutans 1225
palmata 1226
paradoxa 1225
Petaſites ib.
pumila 1224
radiata 1226
rubella 1225
ſibirica 1224
ſilveſtris 1225
ſpuria ib.
Tympanis 1285, 1460
ſaligna 1460
Typha 85, 147
anguſtifolia 147
latifolia ib.
Ubium 779, 839
quadrifurium 839
Ulex 1076, 1093
capenſis 1093
europæus ib.
Ulmus 305, 456
americana 456
campeſtris ib.
effuſa ib.
hollandica ib.
nemoralis ib.
pubeſcens ib.
pumila ib.
Ulva 1285, 1390, 1392
articulata 1391
codendulifolia 1392
compreſſa 1391
confervoides ib.
cuneata ib.
dichotoma ib.
glandiformis ib.
Ulva
inteſtinalis 1391
labyrinthiformis ib.
Lactuca ib.
lanceolata 1390
latiſſima ib.
Linza 1391
lumbricalis ib.
maccana ib.
montana 1390
oryziformis 1391
papilloſa ib.
pavonia 1390
porrifolia 1392
Priapus 1391
purpurea 1390
ramoſa 1391
reticulata 1390
rugoſa 1391
Sagarum 1392
ſquamaria 1390
ſtellata 1391
umbilicalis 1390
vermicularis 1391
Uncaria 299, 370
gujanenſis 370
Uniola 88, 183
bipinnata 183
mucronata ib.
paniculata ib.
ſpicata ib.
Unona 282, 869
diſcreta 869
UNXIA 1161, 1249
camphorata 1249
Urutea 656, 677
gujanenſis 677
Urceolaria 296, 390
exotica 390
Urena 1000, 1058, 1059
americana 1058

Urena
leprocarpa 1058
lobata ib.
multifida ib.
procumbens ib.
reticulata ib.
ſinuata ib.
tricuſpis ib.
Typhalæa 1059
viminea ib.
Urtica 217, 268-272.
æſtuans 271
alata 268
alienata 269
arborea 272
argentea 271
baccifera ib.
balearica 269
betulifolia 270
canadenſis 271
cannabina ib.
capenſis ib.
capitata ib.
ciliaris 269
ciliata ib.
cuneifolia 272
cylindrica 269
depreſſa 270
diffuſa 269
dioica 268
divaricata 271
Dodartii 269
elongata ib.
ferox 270
filiformis 269
fruteſcens 272
gracilis 269
grandifolia ib.
herniarioides 270
japonica 271
iners 269
interrupta 271

Urtica
lappulacea 271
laxa 268
lucida 271
macrophylla 270
microphylla 268
nivea 272
nudicaulis 268
nummulariæfolia 270
palmata 271
paraſitica ib.
Parietaria 270
piluliſera 269
pumila ib.
radicans 270
repens ib.
reticulata ib.
rhombea ib.
ruderalis 271
rufa 270
rugoſa 268
ſerrulata 270
ſeſſiliflora 271
ſpicata 269
ſtimulans 272
ſtolonifera 268
trianthemoides 270
urens ib.
villoſa 271
virgata 269
Utricularia 20, 39, 40
alpina 39
bifida 40
cærulea ib.
folioſa 39
fibroſa 40
gibba ib.
inflata ib.
inflexa ib.
minor ib.
obtuſa ib.
pumila ib.
purpurea ib.

Utricularia
ſtellaris 40
ſubulata ib.
vulgaris ib.
Uvaria 782, 868
javanica 868
lanceolata ib.
longifolia ib.
zeylanica ib.
Uvularia 525, 546
amplexifolia 546
cirrhoſa ib.
hirta ib.
lanceolata ib.
perfoliata ib.
ſeſſiliflora ib.
Vaccinium 601, 620-622
album 621
amœnum ib.
anguſtifolium 620
Arctoſtaphylos 621
bracteatum ib.
cereum 620
ciliatum 621
corymboſum ib.
diffuſum 620
frondoſum 621
fuſcatum ib.
hirtum 620
hiſpidulum 622
ligustrinum 621
macrocarpon 622
meridionale ib.
mucronatum 621
Myrtillus 620
pallidum 621
reſinoſum ib.
ſtamineum 620
tenellum 621
uliginoſum 620

Vaccinium
venuſtum 621
virgatum ib.
virgineum 622
Vitis idæa 621
VAHLIA 307, 463
capenſis 463
Valantia 214, 240, 241
Aparine 241
articulata ib.
Cruciata ib.
Cucullaria ib.
filiformis 240
glabra 241
hiſpida 245
hypocarpa 241
muralis 240
Valentinia 601, 618
ilicifolia 618
Valeriana 81, 91, 92
Calcitrapa 91
celtica ib.
Cornucopiæ ib.
dentata 92
dioica 91
echinata 92
elongata ib.
Locuſta ib.
mixta ib.
montana 91
officinalis ib.
Pha ib.
pyrenaica 92
rubra 91
ſaxatilis 92
ſcandens ib.
ſibirica ib.
ſinenſis ib.
ſupina ib.
tripteris 91

Valeriana
tuberoſa 91
villoſa 92
Vallaris 137, 391
indica 391
VALLEA 294, 814
ſtipularis 814
Valliſneria 22, 80
ſpiralis 80
Vandellia 953
diffuſa 953
Vangueria 299, 367
madagaſcarienſis 367
Varronia 295, 394
alba 394
bullata ib.
curaſſavica ib.
globoſa ib.
humilis ib.
lineata ib.
macroſtachya ib.
martinicenſis ib.
mirabiloides ib.
Vatairea 1076, 1085
guianenſis 1085
Vateria 775, 819
indica 819
VATICA 741, 748
ſinenſis 748
Velezia 307, 459
rigida 459
Vella 967, 969, 970
annua 969
Pſeudo-cytiſus 970
tenuiſſima ib.
Veratrum 527, 589
album 589
luteum ib.
nigrum ib.
Sabadilla ib.
viride ib.

Verbaſcum 294, 377, 378
bicolle 377
Blattaria 378
Boerhaavii ib.
Chaixi ib.
ferrugineum ib.
hæmorrhoidale ib.
lychnitis ib.
Myconi ib.
nigrum ib.
Oſbeckii ib.
phlomoides ib.
phœniceum ib.
pulverulentum ib.
ſinuatum ib.
ſpinoſum ib.
thapſoides 377
Thapſus ib.
Verbena 20, 41, 42
Aubletia 41
bonarienſis ib.
capitata 42
caroliniana ib.
curaſſavica 41
globiflora 42
haſtata ib.
jamaicenſis 41
indica ib.
lappulacea ib.
mexicana ib.
mutabilis ib.
nodiflora ib.
officinalis 42
orubica 41
priſmatica ib.
procumbens 42
ſpuria ib.
ſtœchadifolia 41
ſupina 42
triphylla ib.
urticifolia ib.

Verbeſina 1165, 1255 *ſq.*
alata 1255
biflora 1256
Boſvellea *ib.*
calendulacea *ib.*
dichotoma *ib.*
fruticoſa *ib.*
gigantea *ib.*
laciniata *ib.*
Lavenia *ib.*
nodiflora *ib.*
pinnatifida *ib.*
ſinenſis *ib.*
virginica *ib.*

Vermicularia 1286, 1480
hiſpida 1480
Pſeudo-ſphæria *ib.*
pubeſcens *ib.*

Veronica 19, 28-31
acinifolia 31
agreſtis 30
alpina 29
Anagallis *ib.*
aphylla 28
arvenſis 30
auſtriaca *ib.*
Beccabunga 29
Bellardi 31
bellidioides 29
biloba 31
camtſchatica 29
carnea *ib.*
caroliniensis 31
catarractæ 29
Chamædrys 30
decuſſata *ib.*
elliptica 29
fruticuloſa *ib.*
hederæfolia 30
hybrida 28
incana 28
inciſa *ib.*
laciniata *ib.*
Lappago 30
latifolia *ib.*
longifolia 28
marilandica 31
maritima 28
montana 30
multifida *ib.*
nummularia 31
officinalis 28
paniculata 30
pectinata *ib.*
peregrina 31
piloſa 30
pinnata 28
proſtrata 30
pumila 29
romana 31
ſalicifolia 29
ſaxatilis *ib.*
ſcutellata *ib.*
ſerpyllifolia *ib.*
ſibirica 28
ſpicata *ib.*
ſpuria *ib.*
ſucculenta 31
tenella 29
Teucrium *ib.*
triphylla 30
urticæfolia *ib.*
verna 31
virginica 28

Viburnum 310, 496, 497
acerifolium 496
caſſinoides 497
cuſpidatum *ib.*
dentatum 496
dilatatum 497
eroſum *ib.*
hirtum 497
Lantana 496
Lentago *ib.*
macrophyllum 497
nitidum *ib.*
nudum 496
obovatum *ib.*
Opulus *ib.*
prunifolium *ib.*
ſcandens *ib.*
ſerratum *ib.*
tinoides *ib.*
Tinus *ib.*
tomentoſum 497
villoſum 496
virens 497

Vicia 1077, 1110-1112
anguſtifolia 1112
benghalenſis 1111
biennis *ib.*
bithynica 1112
bohemica 1110
caneſcens 1111
caroliniana 1110
caſſubica 1111
Clymenum 1112
Cracca 1111
dumetorum *ib.*
exſtipulata *ib.*
Faba 1112
Gerardi 1111
globoſa 1112
hybrida *ib.*
lathyroides *ib.*
lutea *ib.*
monantha 1111
multiflora *ib.*
narbonenſis 1112
niſſoliana 1111
onobrychoides *ib.*
peregrina 1112

Vicia
piſiformis 1110
ſativa 1112
ſepium 1111
ſerratifolia 1112
ſilvatica 1111
tenuifolia ib.
Villarſia 306, 447
aquatica 447
Vinca 294, 435
lutea 435
major ib.
minor ib.
puſilla ib.
roſea ib.
Viola 302, 412-414
arboreſcens 414
arvenſis 413
biflora ib.
calcarata 414
Calceolaria ib.
canadenſis 413
canina ib.
ceniſia ib.
cordata 412
cornuta 414
cucullata 412
decumbens 413
diandra 414
enneaſperma ib.
grandiflora ib.
hirta 412
Hybanthus 414
Ipecacuanha ib.
Itubu ib.
Krockeri 412
lanceolata ib.
mirabilis 413
montana ib.
nummularifolia 413
obliqua 412
odorata ib.
Viola
oppoſitifolia 414
palmata 412
paluſtris ib.
parviflora 414
pedata 412
pinnata ib.
primulifolia ib.
procumbens 413
pubeſcens ib.
pumila ib.
riphæa ib.
ſagittata 412
ſtipularis 414
ſtricta 413
ſuffruticoſa 414
tricolor 413
uniflora ib.
villoſa 412
Virea 1162, 1174
ſcabra 1174
VIRECTA 297, 334
biflora 334
Virola 526, 570
ſebiſera 570
Viſcum 217, 273
album 273
antarcticum ib.
capenſe ib.
flavens ib.
macroſtachyon ib.
opuntioides ib.
pauciflorum ib.
purpureum ib.
rotundifolium ib.
rubrum ib.
terreſtre ib.
verticillatum ib.
VISNEA 740, 767
Mocanera 767
Vitex 890, 962, 963
Agnus caſtus 963
altiſſima 962
divaricata ib.
Leucoxylon 963
Negundo ib.
ovata 962
pinnata 963
ſinuata ib.
trifolia 962
umbroſa 963
Vitis 301, 421
arborea ib.
heptaphylla ib.
heterophylla ib.
japonica ib.
indica ib.
Labruſca ib.
lacinioſa ib.
pentaphylla ib.
trifolia ib.
vinifera ib.
vulpina ib.
Vogelia 81, 107
capitata 107
Volkameria 890, 961
aculeata 961
japonica ib.
inermis ib.
Kæmpferi ib.
ſcandens ib.
ſerrata ib.
Volutella 647, 652, 1459 ſq.
aphylla 652
nuda 1460
volvata 1459
Votomite 216, 278
gujanenſis 278
Voyria 293, 334
cærulea 334
roſea ib.

Wachendorfia 82, 120
graminifolia 120
paniculata ib.
thyrſiflora ib.
Walcuffa 998, 1029
torrida 1029
Wallenia 211, 246
laurifolia 246
Waltheria 996, 1008, 1009
americana 1008
anguſtifolia ib.
caroliniana 1009
elliptica ib.
indica ib.
ovata ib.
Webera 776, 820
quinquenervia 820
WEIGELA 291, 337
japonica 337
Weinmannia 602, 636
hirta 636
parviflora ib.
pinnata ib.
racemoſa ib.
tomentoſa ib.
trifoliata ib.
Willdenovia 298, 362
Schreberi 362
WILLICHIA 82
repens ib.
Willugbeja 296, 434
accida 434
gujanenſis ib.

WINTERA 780, 852, 853
aromatica 853
axillaris 852
granadenſis 853
Wiſenia 312, 515
indica 515
Witheringia 211, 247
ſolanacea 247
WITSENIA 82, 107
maura 107
Wormia 780, 851
triquetra 851
WULFERIA 20, 40
carinthiaca 40
WURMBEA 527, 587
capenſis 587
Xanthium 305, 464
americanum 464
echinatum ib.
fruticoſum ib.
orientale ib.
ſpinoſum ib.
ſtrumarium ib.
Xanthorhiza 604, 646
apiifolia 645
Xanthoxylum 312, 509
caribæum 509
Clava ib.
trifoliatum ib.
Xeranthemum 1163, 1218 *ſq.*
annuum 1218

Xeranthemum
bellidioides 1218
caneſcens ib.
fulgidum 1219
imbricatum 1218
paniculatum 1219
proliferum 1218
recurvatum 1219
retortum 1218
ſeſamoides 1219
ſpecioſiſſimum 1218
ſpinoſum 1219
ſquamoſum ib.
Stæbelina ib.
ſtoloniferum ib.
variegatum ib.
veſtitum 1218
virgatum 1219
Xerophyta 522, 530
madagaſcarienſis 530
Ximenia 615
americana 615
elliptica ib.
inermis ib.
Xiphidium 82, 119
floribundum 119
Xylocarpus 600, 611
Granatum 611
XYLOPHYLLA 311, 499
anguſtifolia 499
latifolia ib.
longifolia ib.
montana ib.
Xylopia 282, 866
glabra 866
muricata ib.
Xylosma 771, 797
orbiculatum 797
ſuaveolens ib.

Xyloſtroma 1287, 1442
giganteum 1442
Xyris 83, 122
americana 122
indica ib.
Xyſtris 300, 390
Schreberi 390

Yucca 525, 562
aloifolia 562
Draconis ib.
filamentoſa ib.
Glorioſa ib.

Zamia 781, 863
anguſtifolia 863
Cycadis ib.
pumila ib.

Zannichellia 418
paluſtris ib.

Zanonia 310, 500
indica 500
Zea 85, 148
Curagua 148
Mays ib.
Zinnia 1165, 1246
Bidens 1246
multiflora ib.
pauciflora ib.
verticillata ib.
Zizania 526, 579
aquatica 579
paluſtris ib.
terreſtris ib.
Ziziphora 20, 43
acinoides 43
capitata ib.
hiſpanica ib.
tenuior ib.
Zœgea 1165, 1263
aleppica 1263
capenſis ib.
Leptaurea ib.

Zornia 1076, 1096
bracteata 1096
Zoſtera 781, 863
ciliata 863
marina ib.
oceanica ib.
ſtipulacea ib.
uninervis ib.
Zygophyllum 657, 681
æſtuans 681
album ib.
arboreum ib.
coccineum ib.
cordifolium ib.
Fabago ib.
maculatum ib.
microphyllum ib.
Morgſana ib.
ſeſſilifolium ib.
ſimplex ib.
ſpinoſum ib.

Aloë 561
Aloides 852
Alſinaſtrum 643
Alſine 17
Alypum 226
Alyſſon 908
Alyſſum 971
Alyxia 430
Amalago 76
Amalanchior 841
Amanitea 1400
Amarella 462
Amaryllis 537
Ambotai 869
Ambu 418
Amelloides 1239
Amellus 1205, 1237
Ammi 483
Ammodytes 1135
Amomum 483
Ampelopraſum 541
Amſonia 439
Anacampſeros 731, 752
Anacardium 493
Anagallis 29, 957
Anandria 1224
Ananas 529
Anaſtomoſis 1449
Anblatum 924
Andrachne 697
Andromeda 620, 622, 626
Andropogon 152, 194
Androſæmum 1157
Anemonoidæ 871
Anguina 102
Anguria 100
Anil 1129
Aniſum 492
Anſerina 858
Anthelmia 333
Anthemis 1248, 1261
Antheuphorbium 1195
Antholyza 107
Anthora 838
Anthriſcus 473
Antoſtaphylos 621
Apargia 1176
Aparine 240, 241
Aperemoa 869
Aphaca 1109
Apios 763, 1106
Apucuita 668
Aquifolium 287
Arbor toxicaria 389
Arbor triſtis 23
Arbuſcula 73, 204
Archangelica 482
Arctotoides 1275
Arcturus 938
Arcuma 8
Arcyriæ 1467
Areira 683
Argemone 809
Arguzia 324
Aria 829
Ariboa 788
Ariſarum 865
Ariſtella 191
Armeria 510, 710, 715
Armeriaca 795
Armoracia 975
Artemiſia 374, 1250
Artocreas 1478
Aruncus 850
Arundo 171, 579
Arundo 172, 174, 195
Aſak 803
Aſarina 934
Aſchrek 668
Aſcidium 1484
Aſclepium 489
Aſellus 1102
Aſigron 1156
Aſpalathus 1087
Aſparagus 558
Aſpergillus 1487
Aſa fœtida 479
Aſter 1240
Aſteriſcoides 1261
Aſteriſcus 1270
Aſteroides 1262
Aſtragalus 1094, 1125
Atamuſco 539
Athamanta 486
Atocion 716
Atoto 762
Atraphaxoides 637
Aurantium 1153
Aubletia 41
Auricula 327, 1176, 1459
Auricularia 232, 902
Auricularia 1431, 1440 *ſq.*
Auriſcalpium 1439
Avellana 637, 966
Avena 171 *ſqq.*
Averrhea 287
Azadiracha 681
Azarolus 830
Azedarach 680

B

Baccabunga 29
Baducca 808
Bæothryon 125
Bailloviana 1386
Balanghas 1034
Balanus 1427
Balſamea 614, 1073
Balſamina 101, 415
Balſamita 1209, 1247
Balſamum 677
Bankſia 9, 21
Barba jovis 1099, 1440
Barbula 1335
Barometis 1312
Bartramia 750, 1335
Baſiticum 918
Baſtera 1386
Batata 574

Batatus 341
Batrachia 1015
Behan 1266
Behen 712, 716
Belladonna 381, 539
Bellidiaſtrum 1243
Benedicta 1268
Benghas 417
Bengoin 650, 699
Bergiana 628
Bergkia 651
Bermudiana 118
Bernardia 1036
Berula 482
Beryllus 1416
Betel 76
Betonica 32
Betulus 754
Beurreria 394
Bidens 1246, 1260
Bidens 1193
Bihai 423
Bilimbi 128
Biſtortæ 638
Blakea 820
Blattaria 378
Blechum 957
Blitum 205
Boæformis 138
Boaria 25
Bohea 821
Bois cochon 614
Bois dentelle 632
Boldus 566
Boletus 1440
Bombarda 1477
Bona nox 346
Bonarota 31
Bonduc 672
Bonducella *ib.*
Bonus Henricus 448
Borbonia 651
Borbonia 1113
Boſvallea 1256
Botrys 449, 893, 1018
Bourgati 467
Boviſta 1464
Brathys 1156
Breynia 807
Bryopteris 1289
Bryum 1326, 1328 *ſq.*
Bubonium 1241
Buceras 702
Buchnera 41, 923
Bulbine 554
Bulbocaſtanum 475
Bulbocodium 108, 535
Bunius 107, 486
Buphthalmum 1279
Bupleurum 465
Burgoni 801
Burſa paſtoris 474, 1383
Byſſus 1356

Caapela 1006
Cacalioides 1276
Cacao 1151
Cacatin 688
Cachanlahuan 462
Cainito 395
Cakile 997
Calaba 814
Calabura 811
Calamintha 914
Calamus 568
Calceola 414
Calceolus 62, 1436
Calcitrapa 91
Calcitrapæ 1268
Calcitrapoides *ib.*
Calendula 1273
Caliculus 1452
Calinea 805
Callicornia 1245
Callipteris 1311
Callorocca 393
Calycifloræ 770, 778 *ſqq.*
Calyptranthæ 792
Camara 945
Cammarum 838
Campanella 1431
Campanula 577
Camphora 650
Candel 747
Candelabrum 439
Canifolia 476
Cantharellus 1430
Capillus Veneris 1316
Capraria 947
Caprea 74
Caprifolium 368
Caput galli 1126
Caput Meduſæ 198, 759
Caput Meduſæ 1444
Caracalla 1102
Caragana 1116
Carambola 728
Carandas 806
Carcharias 1474
Cardamomum 9
Cardiaca 909
Cardinalis 356
Carduelis 1184
Carduncellus 1192
Carduncúlus 1190, 1266
Cari 384
Corica 96
Carota 474
Carum 486
Carvata 59
Carvi 491
Caryophyllus 711
Caſcarilla 1029
Caſſapoa 96
Caſſia 649
Caſſine 287
Caſſipurea 817

Caſſitha 785
Caſtanea 757
Catalpa 940
Catappa 701
Cataria 899
Catechu 649, 804
Catianus 1105
Catinus atrum 495
Caucalis 474
Cauda felis 554
Cavenia 803
Cedrus 1073
Ceiba 1040
Celoſia 463
Cembra 1072
Centaurea 1202
Centaureum 1263
Centaurium 461
Centauroides 1268
Centella 468
Cepa 543
Cepæa 731
Cephalotes 1201
Ceraſus 795
Ceratonia 805
Ceratoſpermum 1476
Cetbarato 1252
Cerefolium 487
Cerei 784
Cereolus 1413
Cerris 644
Ceruana 1257
Cervaria 476
Ceroiana 505
Cervicaria 350
Ceterach 1301
Chætophora 1392
Chairi 373
Chamæbuxus 1082
Chamadrys 895
Chamæceraſa 368
Chamæceraſus 795
Chamæciſtus 594
Chamæcriſtæ 671
Chamæcypariſſus 1205
Chamædrys 30
Chamæjaſma 634
Chamælea 94
Chamæmeſpilus 841
Chamæmoly 544
Chamæmorus 857
Chamæpeuce 1202
Chamæpitys 893
Chamæſyce 761
Chamomilla 1249
Champaca 868
Chanas 97
Chaos 1472
Characias 766
Characera 946
Charantia 101
Chate 100
Cheiranthus 949
Cheiranthus 986
Chelonoides 942
China 582
Chionanthus 49
Chironia 618
Chironium 480
Chloroxylon 649
Chordorhiza 139
Chryſodon 1422
Chryſogonum 556
Chytraculia 792
Cicer 1134
Cicera 1109
Cicla 452
Cicutaria 488
Cineraria 1228, 1276
Cinna 170
Cinnamomum 649
Cipura 118
Cirrullus 101
Cladium 137
Clathrus 1390
Clathrus 1467
Clava 760
Clava Herculis 509
Clavaria 1484
Clavaria 1474
Clavis 1421
Clavus 1420
Clavus 1405
Clematitis 591
Clematis 1244
Clinopodium 910
Cliffortiana 357
Cluſiana 859
Clymenum 1110, 1112
Clypeolus 66
Cneorum 344
Cobbe 495
Cocculus 756
Cochlearia 972
Cocoës 1367
Cœli roſa 735
Cojan 1114
Colocaſia 864
Colocynthis 100
Colpoon 429
Colubrina 387
Columa 637
Columella 1061
Coma aurea 1203
Cominia 495
Commelina 533
Commerſonia 799
Conami 203
Connati 253
Conomon 100
Conſolida 837
Contra 1210
Contragenea 265
Convallaria 266
Convallaria 558
Convolvulus 639
Convolvulus 347
Cookia 675
Copaja 942
Corallodendrum 1087
Coralloides 1376, 1444
Corallorhiza 56

Coriaria 494
Corindum 642
Coris 1159
Cornu Alces 1444
Cornu Cervi *ib.*
Cornucopiæ 123
Cornuti 875
Coronaria 842
Coronopus 575
Cota 1251
Cotoneaſter 841
Cotula 1251
Cotula 1248, 1255
Cotyledon 516, 704
Courbail 667
Cracca 1111
Craſſula 519
Crataeca 774
Crater 1452
Craterella *ib.*
Criſta 671, 672
Criſta caſtrenſis 1343
Criſta galli 922, 1087, 1126
Crocodilia 1266 *ſq.*
Crocodilium 1267
Croſſopetalum 255
Crotalaria 665
Croton 94, 701
Cruciata 241, 462
Crucibulum 1454
Crupina 1264
Crus corvi 157
Crus Galli 829, 157
Crux Andræe 1160
Cubeba 77
Cucullaria 241, 1079
Cucurbitula 1475
Cujavillus 786
Cujete 943
Culcita 1314
Culilaban 649
Cumete 787
Cunonia 112
Cuphea 753
Cupula 1461
Curagua 148
Curandas 433
Curcas 1027
Curcuma 5
Cururu 641
Cyani 1264 *ſq.*
Cyathus 1430
Cycadis 863
Cydonia 842
Cymbalaria 930
Cyminum 484
Cynapium 486
Cynocrambe 745
Cynops 254
Cynoſurus 181
Cypariſſus 766
Cyphia 357
Cytiſus 1098, 1127

Daboecia 622
Dæmia 444
Dahi 807
Dalea 1139, 1198
Dallbarda 857
Damaſconium 592
Dandelion 1169
Datora 379
Dens canis 546
Diadema 1455
Dicera 316
Dicranum 1328
Dictamnus 912
Didire 1104
Didymadon 1333
Diervilla 369
Digitalis 1428
Dilleniana 718, 1040
Dioſcoridis 965, 1180, 1220
Docha 173
Dolichos 1094, 1106
Dombeya 1037 *ſq.*
Donatia 207
Donax 194
Doria 1229
Doronicum 1230, 1242
Dortmanna 355
Doyenium 1145
Dorgonium 343
Draba 972
Draco 558, 1086
Dracontium 864
Dracunculus 864, 1212
Drakena 265
Droebachienſe 1224
Drymeja 143
Dryopteris 1313
Dudaim 100
Duhoon 287
Dulcamara 383
Duna 173

Ebenum 617
Ebenus 1087
Ebulus 497
Ecaſtaphyllum 1086
Ecbolium 32
Echinomelocacti 784
Echinus 512
Eglantaria 853
Elamifera 614
Elatine 931
Elatines 351
Elegia 201
Elengi 612
Elephas 922
Elliba 960
Eluteria 505
Elvela 1440, 1442
Emblica 203
Embolus 1467
Emerus 1118
Endivia 1184
Endocarpon 1370

Enſete 567
Entada 801
Ephemerum 331
Epidendrum 1466
Epidendrum 60
Epigeios 172
Epipactis 469
Epiphyllanthus 499
Epipogium 55
Epithymum 285
Epixylon 1471
Eragroſtis 180, 183
Erianthos 1039
Erinacea 1100
Erinaceus 1439
Erinus 352, 357
Eriocephalus 1277
Eriopila 574
Eriſithales 1189
Erm nea 836
Eruca 989
Erucago 991
Erucaria ib.
Erucaſtrum 989
Ervilia 1113
Eryſiphe 1486
Erythrina 1083
Erythroxylon 400, 1028
Eſculus 645
Eſula 766
Eucomis 545
Eugenia 792
Euodia 258
Eupatoria 757
Euphorbia 442
Euſtachiana 807
Euterpe 569

Faba 1112
Fabago 681
Faba indica 1104
Faba nigrita 1102
Faga 284
Fagopyrum 639
Falcaria 483
Falx 176
Farfara 1225
Farſetia 985
Faſciola 66
Favus 1436
Ferulago 478
Feſtuca 182
Fibula 1421
Ficaria 877
Ficoides 1195
Ficus indica 785
Filipendula 850
Filix 1370
Filix femina 1312
Filix mas ib.
Filum 1384
Fiorniana 1034
Fiſſidens. 1338
Fiſtula 669
Flagellum 138, 1389
Flammula 873, 877
Flos aëris 63
Flos aquæ 1396
Flos cobalti 1397
Flos cuculi 736
Flos jovis 735
Fœniculum 941
Fœnum græcum 1146
Fragaria 861
Frangula 399
Friſea 428
Fructifloræ 772, 778 *ſqq.*
Fumana 823
Fumus 1421
Funaria 1327
Fungoidaſter 1452
Fuſus 1408

Gærtnera 1386
Gaguedi 225
Galactia 1107
Galanga 8
Galatea 476
Galbanum 484
Gale 284
Galeobdolon 905
Galium 235
Gandaruſca 33
Garcini 104
Geaſter 1465
Geniſta 1089
Gentiana 618
Georgia 1327
Geraſcanthes 392
Gerbera 243
Gethyllis 564
Geum 705
Gheſperubilla 432
Gigas 1448
Gijef 403
Gingidium 474, 481
Githago 785
Glaucium 809
Glaux 1134
Globba 6
Glycina 1086
Gnaphalium 1220, 1282
Gnemon 1003
Gnidia 24
Gnidium 632
Gnomon 1477
Gorteria 1192
Goſſypium 1040
Granatum 98, 611, 793
Granum Paradiſi 5
Grimmia 1334
Groſſularia 420
Groſſulariæ 419
Gryllus 165
Guaicuru 652
Guara 614
Guazuma 1151
Guidonia 816

Gutta 810
Gymnandra 922
Gymnoſtomum 1333

Hælava 932
Hæmanthus 540
Hæmaſtigma 1455
Hæmatomma 1361
Halicacabum 642
Hamcur 204
Hapalanthus 121
Harmala 750
Harra 990
Hartogia 409
Haſpan 136
Haſtile 1175
Hauponis 1198
Hedwigia 1331
Hedypnois 1182
Hedyſarum 1086, 1127 *ſq.*
Heiſteria 1082
Helenium 1240
Heleonaſter 139
Helianthemum 825
Helimus 450
Helix 420
Helix 72
Helminthochorton 1394
Helonias 548
Helvella 1430 *ſq.*
Helxine 639
Hemionitis 1301
Hepaticæ 870
Herba venti 911
Hermannia 519
Heſperis 981
Hibiſcus 1060 *ſq.*
Hippocaſtanum 595
Hippocrepis 1310
Hippomarathrum 489
Hirculus 706
Hirundo 1452
Holodendron 1116
Holoſchœnus 125
Holoſtea 718
Horminum 45
Hoſpita 683
Hura 9
Huggan 683
Hyacinthus 1416
Hyacinthus 532
Hydnora 1005
Hydrolapathum 584
Hydropiper 638, 643
Hyleanthus 414
Hypericum 1069
Hypochæris 1177
Hypociſtis 745
Hypogloſſum 105
Hypophylladendron 222
Hypophyllum 104
Hypopithys 685
Hypoxylon 1465, 1474
Hypſolodendron 494
Hyſſopifolia 753
Hyſterophorus 375
Hyſtrix 195, 198, 959, 1092, 1476

Jabotapita 681
Jacea 1265
Jaceæ 1263 *ſq.*
Jacobæa 1228
Jalappa 342, 377
Jambos 787
Janipha 1027
Jaroba 943
Jatiauca 339
Iberis 973
Icaca 796
Idatimon 819
Jemadophila 1358
Jeminicus 132
Ilex 644
Ilex dodon 99
Illecebrum 1345
Illecebrum 427
Inaa 801
Infundibulum 1452
Inophyllum 814
Intybus 1184
Jolithus 1356
Jonquilla 536
Jonthlaſpi 977
Ipecacuanha 414
Iria 132
Irio 982
Iſchæmum 164
Iſnardi 1267
Iſora 727
Ituba 414
Jujuba 401
Jungia 420
Juſſieua 768
Juſticia 960
Iva 893
Ivira 1034
Ixia 117, 119, 1005
Ixina 278

Kaki 617
Kali 127, 452
Kalmianum 1156
Kanki 612
Karetas 529
Katka 172
Karſtienſis 1147
Kataf 614
Kerere 941
Keule 850
Keura 12
Kleinia 1195
Kœlpinia 1183
Kœlreutera 517, 1327
Kœtjape 681
Kopela 427

- Labellum 1455
- Lablab 1103
- Labruſca 421
- Laburnum 1115
- Lacryma 149
- Lactuca 1391
- Ladanum 905
- Lagetto 632
- *Lagopoda* 1141 *ſq.*
- Lagopus 221, 1008
- Lampas 1064
- *Lampugeng* 6
- Lancea 1191, 1315, 1293
- Lanceola 67
- Lanceolaria 1084
- Langaus 7
- *Languas* 6
- Lantana 496
- Lapeironſia 108
- Lappa 1184
- Lappago 30
- Lappula 315, 750
- Larix 1072
- Laſianthus 1069
- Lathyris 763
- Latus 617
- Laurentia 357
- Laureola 631
- Lauroceraſus 794
- Lavenia 1256
- Lebbek 802
- *Leerſia* 1331
- Leloja 403
- Lencea 110
- Lens 1113
- Lentago 496
- Lentiſcus 457
- Leonatis 910
- *Leontica* 767
- Leontopetalon 556
- Leontopodium 1278
- Leonurus 6, 910
- Leptaurea 1263
- Leptoſtachyon 921
- *Leskea* 1341
- Leucadendron 1154
- *Leucadendron* 221 *ſqq.*
- Leucanthemum 1247
- Leucoglochin 139
- Leucoxylon 651, 942, 963
- Leviſanus 224
- Leviſticum 481
- Libanitis 893
- Libanotis 476, 478
- *Licaria* 574
- Ligta 564
- *Liguſtrum* 26
- Liliago 555
- Lilia Agarinthus 552
- Liliaſtrum 555
- Liliifera 867
- *Lilium convallium* 559
- Lima 184, 456
- Limonium 511
- Linaria 931
- Lineatus 1104
- Lingua 59, 877, 1276, 1295, 1429, 1477
- Linophyllum 428
- Linoſyris 1203
- *Linum* 289
- Linum ſtellatum 331
- Linza 1391
- Lobelia 361
- Locuſta 92
- Lœflingiana 192
- Lomenia 112
- Lonchitis 1309
- *Lonchophyllum* 59
- *Lonicera* 333
- Lophanthes 898
- *Lotoidea* 1140 *ſq.*
- Lotus 400 812
- *Lotus* 1097 *ſq.*
- Lubia 1105
- Lucidor 113
- Luffa 101
- Luma 790
- Lunaria 585, 1292
- Lupinaſter 1140
- *Lupilina* 1143 *ſq.*
- Lupulus 451
- Luteola 758
- Lychnidea 951
- Lychitis 378, 910
- *Lycium* 394
- Lycogala 1471
- Lycoperdon 1466, 1471
- *Lycoperdon* 1459, 1470 *ſq.* 1473, 1481
- Lycoperſicon 384
- Lygiſtum 277
- *Lyſimachia* 332

- Macqui 751
- Macucu 396
- Macula 1475
- *Mæſia* 1329
- Magaca 121
- Mahagoni 680
- Mahaleb 795
- Majeta 691
- Majorana 913
- Makal 792
- Malus 842
- *Mammea* 1039
- Mancinella 1003
- Mandragora 381
- Manghas 433
- *Minghas* 674
- Mangle 747
- Mangoſtana 748
- Manihot 1027, 1067
- *Mapania* 122
- Mappa 1074, 1397
- Mariſcus 135
- *Marmelos* 774
- Marmetos 749

Marototoni 466
Marrubiaſtrum 909
Marſilea 1297
Martagon 545
Maru 913
Marum 894
Maſtichina 913
Matichodendron 397
Matrella 169
Matricaria 1244, 1250
Max 1102
Mays 148
Me[illegible]lia 328
Medica 1152
Menium 341, 350
Medulla panis 1438
Melanium 753
Melanocardium 943
Meleagris 545
Melhania 1028
Meliloba 565
Meliloti 1140
Meliſſophyllum 916
Melo 100
Melocactus 784
Melongena 384
Melopepo 101
Mercurialis 94
Mercurialis 468
Merjamia 48
Meriana 113
Merianella ib.
Metel 379
Metkan 634
Metopium 494
Meum 486
Megereum 631
Michelianus 129
Micranthus 399
Microcos 818
Milium 160
Millefolium 1254
Mini 787
Mioga 6
Mitra 1450
Mitreola 333
Mnium 1326, 1331, 1336, 1348 *ſqq.*
Mocanera 767
Moghadd 403
Mokuſin 1449
Molle 683
Mollugo 239, 506
Moly 544
Mombin 729
Monetaria 1084
Monnieria 37
Monorchis 57
Monſoniana 626
Moræa 114
Moringa 673
Morio 52
Morſus ranæ 654
Moryſana 681
Moſchatellina 643
Moſcheatos 1005
Moſchus 1263
Mouriri 678
Mourocenia 497
Mucedo 1484, 1486
Mucilago 1466
Mucor 1425, 1481
Mucor 1357, 1462, 1466, *ſqq.* 1471, 1484, 1487
Mungo 1102
Mungos 333
Murcila 723
Murex 965
Murrubium 1198
Murucuja 501
Muſa 423
Muſcari 560
Muſcipula 716
Muſſænda 433
Mutellina 485
Mutellina 1210
Myagrum 971
Miconis 1248
Myoſuros 64
Myrica 1382
Myrobalanos 729
Myrrhina 1018
Myrthiphyllum 363
Myrtillus 620
Myſtax 1014
Myxa 392

Nagi 284
Napeta 401
Napellus 838
Napus 988
Nardus 166
Narthecia 554
Naſturtium 980
Neckera 1340
Negando 616
Negundo 963
Nelumbo 812
Neoltia 59
Nepeta 914
Nepetella 900
Nepita 914
Nica 1116
Nidus 1301
Nidus avis 56
Nigellaſtrum 722
Nigrina 927
Nil 340
Ninſi 483
Niruri 203
Niſſolia 1109
Noli tangere 415
Noſtar 1447
Noucheli 811
Noga 673
Nummularia 331
Nummularius 401
Nutrix 1098
Nux Vomica 387

Nyctanthe 233
Nictelea 1330

Occarium 1439
Ochrus 1108
Octoblepharis. 1331
Octoſperma 1453
Oculus Cati 1217
Oculus Chriſti 1240
Ocymum 902
Odontites 923
Œnoplia 401
Offa 1404
Oleander 435
Ollaria 818
Olus atrum 490
Onites 912
Onobrychis 1126, 1133
Ononides 768
Opobalſamum 614
Opopanax 490
Oporina 1242
Opulus 496
Opuntiæ 785
Orellana 812
Oreoſelinum 476
Orſota 803
Orchis 61
Ormithis 51
Ornus 75
Orontium 934
Orthotricha 1335
Orvala 904
Osmunda 1385
Oſtruthium 488
Oſtrya 754
Otites 713, 1307
Oxyacantha 830
Oxycedrus 1004
Oxycoccus 622

Padus 794
Pagapata 747

Paliurus 400
Pallas 1101
Pallor 1400
Palmetta 1388
Palmetto 569
Palove 1028
Panaces 480
Panacocco 1116
Pandacaki 434
Panicum 166, 196
Papaver 1053
Papaya 701
Papillaria 1377
Papiria 564
Papyrus 133
Pardalianches 1243
Pareira 1006
Parelias 764
Parellus 1364
Parietaria 268
Paronychia 427
Parqui 388
Parretaria 270
Parſonſia 753
Parterium 1135
Parthenium 1249
Paſſerina 633
Patagua 1026
Patientia 584
Patumo 812
Pavetta 364
Pavia 595
Payco 448
Pecan 755
Pecten 487
Pectis 1245
Pelecinus 1137
Peloria 931
Pemphis 733
Penæa 1082
Pentapetes 1038
Pentſtamon 928
Peplis 761
Peplus 763

Pepo 101
Perado 287
Paragua 497
Perebea 96
Pereskia 786
Periclymena 368
Peripea 952
Periploca 439
Perſea 650
Perſica 793
Perſicariæ 637 *ſq.*
Perſonata 1184
Pes capreæ 244
Pes tigridis 347
Petaſites 1225
Peteſia 277
Petroſelinum 493
Petigeræ 1373
Peziza 1478
Peziza 1431, 1450, 1461
Pharnaceum 105
Phegopteris 1310
Phellos 643
Phelypæa 924
Phlegmaria 1289
Phleum 75
Phlomidis 962
Phœnix 180, 190
Phœnopyrum 841
Phormium 532
Phu 91
Phylica 410
Phyllanthos 785, 1050
Phyllanthus 499
Phyteuma 356, 758
Pica 1306
Picea 1073
Picris 1178
Pileolus 1458
Piloſella 1176
Pilularia 1383
Pimenta 792
Pinaſter 1071

Pinaſtra 226
Pinea 1072
Pinguin 529
Piperella 914
Piperita 258
Piriri 746
Piſcidium 972
Piſtolochia 591
Piſum 1446
Pitajaya 784
Pithyuſa 764
Placenta 1419, 1475
Placomium 1385
Plantago 591
Plectanthrus 917
Pneumonanthe 460
Poa 174
Podagraria 493
Polemonium 345
Pohlia 1335
Polium 896
Pollveria 841
Polygonatum 550
Polygonatum 559
Polypodium 1316, 1321
Pomum 541
Pongelium 726
Ponteria 248
Porophyllum 1196
Portula 578
Portulacaſtrum 834
Poſopoſa 701
Præcox 862
Priapus 1391
Primula 325
Prinus 644
Prionitis 959
Priſmatocuſpi 352
Proteus 1463
Protium 614
Pſeud Acacia 1115
Pſeudacorus 115
Pſeudarmeria 510
Pſeudhyſſopus 896
Pſeudoæmella 1193
Pſeudobraſilium 417
Pſeudocaſpicum 383
Pſeudochamædrys 30
Pſeudochamæpitys 893
Pſeudo – China 583, 1227
Pſeudococcinea 48
Pſeudocyperus 146
Pſeudocytiſus 970
Pſeudodictamnus 909
Pſeudonarciſſus 535
Pſeudoplatanus 616
Pſeudopſidium 787
Pſeudoſphæria 1480
Pſoræ 1365
Pſoralea 1128
Pſyllium 254
Ptarmica 1252
Ptelea 618
Pteranthus 281
Pterococcus 767, 833
Pterota 258
Pulegium 903
Pulicaria 1241
Pulmonariæ 1366
Pulſatillæ 870
Pumilea 503
Pungam 1086
Pyracantha 840
Pyretrum 1251

Quamoctil 345
Quapara 724
Quebitea 596
Quila 195
Quiviſia 682

Radula 945, 1234
Ramariæ 1444
Ramoatchi 852
Rapa 988
Raphaniſtrum 990
Rapunculus 348
Rarania 485
Ratabulum 1344
Relhaniæ 1207 *ſq.*
Remirea 122
Rete 1449
Reticularia 1466
Rhabarbarum 654
Rhagadiolus 1183
Rhapontica 1265 *ſq.*
Rhaponticum 654
Rhodora 694
Rhoeas 809
Ribes 654
Ribeſia 419
Ricinella 1036
Ricinocarpos 1031
Ripogonum 583
Ritero 1280
Robur 644
Rocella 1377
Rocoubea 836
Roſa marina 1381
Roſa ſinenſis 1065
Rotang 570
Rothmannia 434
Rotula 1424
Royoc 371
Ruellia 964
Rugi 195
Ruhamon 248
Ruſſula 1401
Ruta muraria 1304
Ruyſchiana 915

Sabadilla 589
Sabdariſſa 1066
Salanthus 256
Sæneb 496
Sagarum 1392, 1447
Sagittifolia 812

Sagu 570
Salicaria 752
Salina 1004
Satjunca 91
Salſilla 564
Salſola 422
Salviaſtrum 895
Sambuc 23
Sambucina 420
Samia 911
Samyda 700
Sanſeverina 561
Santolina 1253
Saphia 982
Saponaria 460, 642
Sapota 573
Sappan 672
Sarcocolla 249
Sarſaparilla 582
Saſanqua 1069
Saſſafras 651
Saururus 597
Saxifraga 716
Scabioſa 1265
Scammonea 340
Scandix 473
Scariolo 1172
Sceptrum 222, 934, 1411
Sceptrum Carolinum 926
Schangini 1080
Schinoides 458
Schœnanthus 1 4
Schœnoides 125, 578
Schœnopraſum 543
Schœnus 75, 122, 132, 139
Sciadaphyllum 509
Scirpus 122
Sclarea 47
Scieriæ 137
Scolopendium 1301
Scolymus 223, 1190
Scopa 202
Scoparia 449
Scopolia 380
Scordium 896
Scorodonia 896, 937
Scorodopraſum 542
Scorpiurus 1123
Scorpius 1089
Scurrule 575
Scutellariæ 1362
Sebeſtena 392
Secamone 440
Sedum 517
Sejal 802
Selago 1289
Selago 27, 226 *ſq.* 951
Semen 1481
Seminutum 1458
Semſek 1211
Senecio 1276
Senega 1083
Senejal 803
Senna 669
Sennæ 667
Senſitiva 801
Sera 1236
Seraria 221
Seriana 641
Seriphium 1282
Serpentaria 550
Serpyllum 973
Serra 1307, 1385
Serraria 252
Serratula 1202, 1266
Sesban 1121
Sibthorpia 595
Sida 1040
S.deroxyloides 726
Sidoides 503
Silaus 477
Silene 709, 736
Siler 479
Siliqua 431
Siliquaſtrum 666
Simaruba 682
Simira 93
Sipho 591
Siriboa 76
Sitarum 483
Siſyrinchium 115
Smilax 559
Soda 452
Soja 1105
Solandra 468
Solandra 360
Solanum 381
Soldanella 343
Solidago 1204
Sonneratia 747
Sophera 670
Sorghum 173
Sparganophora 1197
Spartium 1094
Spartum 123
Speculum 352
Spelta 200
Sphærocarpon 1089
Sphærocephala 1468
Sphærocarpus 1471
Sphæroſpermos 399
Sphondilium 480
Spica 900
Spica venti 168
Spicanthus 1293
Spilanthus 1193
Spina Chriſti 400
Squamula 1430
Stæhelina 1219
Staphis agria 837
Stelis 576
Stella 1134
Stewartia 1069
Stigma 1476
Stilbum 1434
Stipa 177
Stæbe 1267

Stœbe 1264
Stœchas 900
Stratiotes 565
Strathiopteris 1293
Styraciflua 832
Suber 644
Sunſub 668
Sur 97
Surubea 407
Swartzia 1321
Sycomorus 96
Symphoricarpos 369

Taab 98
Tabacum 380
Tabernæmontana 439
Tabularia 1443
Tachia 244
Tæda 1072
Tagera 668
Tagetes 1277
Tagore 383
Talus 1475
Tamaquarina 438
Tamonea 37, 689
Tanacetum 1207, 1277
Tanarius 1074
Tanacarvilleca 60
Tamboa 689
Taubona 798
Tapia 749
Tapogomea 372
Tapura 93
Taquari 746
Taraxacon 1175
Taraxacon 1174 ſq.
Tartonraira 631
Tataria 992
Tatula 329
Tazetha 536
Teff 174
Telankotta 387
Telephium 731
Tenageia 572
Tendo 1384
Terebinthus 457
Termis 1100
Tetragonotheca 1270
Tetrahit 905
Tetralix 627
Tetraphis 1327
Teucrium 29
Thaliana 987
Thamnia 816
Thapſi 939
Thapſus 377
Thelypteris 1311
Theodora 673
Thevetia 433
Thoninia 388
Thora 878
Thumung 6
Thunbergia 433
Thymbra 897
Thymelhæa 631
Thymifolia 753
Thirſine 745
Tibuchina 691
Tiburbu 812
Tiglium 1030
Timmia 1327
Timulu 1082
Tintinabulum 1423
Tinus 496
Tiraculli 760
Tithymoloides ib.
Tobira 407
Tococa 690
Toka 98
Tomex 246, 745
Tonxat 8
Toqueve 393
Tora 668
Tordylium 473
Tortula 1333
Totta 623
Toxicaria arbor 389
Toxicodendrum 494
Trachelium 350
Tradescanti 1233
Tragacantha 1135
Tragium 492
Tragoriganum 913
Tragus 452, 1272
Tremella 1369
Tremella 1459
Trema 229
Trichia 1470
Trichia 1468
Trichomanes ramoſum 1304
Trichomanis 1348
Trichoſtomum 1332
Triticæ 1468
Trifolium 1121, 1138
Trichoſanthes 500
Trionum 1067
Triplium 843
Tripolium 1232
Trixago 923
Troglodytarum 567
Tſcampaca 868
Tuba 1451
Tuberaria 824
Tubulifera 1472
Tulipifera 867
Tuna 785
Tupa 355
Turbith 489
Turpethum 341
Typhalæa 1059

Ulmaria 850
Ulva 1446
Umbilicariæ 1374
Umbilicus 730
Umbraculum 1419
Umbros 32

Unedo 697
Ungi 790
Unguis Cati 800
Uregu 868
Urinaria 203
Urtica 267
Uſnea 1379
Uſneæ 1378
Uſtilago 1472
Utea 93
Utimata 666
Uva criſpa 420
Uvaria 561
Uva urſi 697
Uvea 1448
Uvedelia 1270
Uvifera 640

Vaalac 918
Vacaria 710
Vaccinium 622
Valdivia 195
Valerandi 358
Vanilla 63
Venetum 1262
Verbaſcum 938
Verbeſina 1250
Verbeſina 1193
Vernix 494
Veſicaria 977
Veſicaria 1142 *ſq.*
Veſpertilio 501, 642
Vincetoxicum 445
Viorna 873
Vira 1215
Virgaaurea 1237
Viſcaria 736
Viſnaga 474
Vitalba 873
Vitaliana 325
Viticella 873
Vitis idæa 621
Vochy 20
Volucris 57
Vourcapoa 1086
Vuapa 93
Vulneraria 1099
Vulvaria 449

Wampi 675
Watſonius 111
Webera 1330
Wedelia 1270
Weiſſia 1334
Winterania 749
Wolgericus 1114

Xanthocarpus 841
Xanthoxylum 283
Xeranthenoides 1191
Xiphium 114
Xylopyrus 401
Xyloſteum 369

Yervemora 455

Zabucajo 819
Zanoniæ 121
Zatachendi 917
Zeocrithon 199
Zerumbet 5
Zeugiter 148
Zingiber 5
Zizyphus 400
Zuzygium 792
Zygis 913

F I N I S.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google